

ວິທີປູກ ເຫັດຕິນແຮດ

ບົດນຳ

ເຫັດຕິນແຮດເປັນເຫັດຜັນໃຫຍ່ ຈະສົ່ງເສີມເປັນພິດເສດຖະກິດໄດ້. ເປັນເຫັດຊະນິດນຶ່ງທີ່ນຳມາປະກອບອາຫານຈະມີກິ່ນຫອມ, ລົດຫວານ ເປັນອາຫານທີ່ປອດໄພຈາກສານເຄມີ.

ປະຈຸບັນນີ້, ຄົນເຮົາທີ່ຢາກໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ຕ້ອງປູກພືດກິນເອງເພື່ອໃຫ້ປອດໄພຈາກສານເຄມີ ດັ່ງນັ້ນຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບການປູກເຫັດຕິນແຮດ

ລັກສະນະເຫັດຕິນແຮດ

ເຫັດຕິນແຮດເປັນເຫັດຂະໜາດໃຫຍ່, ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບພູມອາກາດທົ່ວໄປຂອງປະເທດ. ສາມາດນຳມາຮັບປະທານເປັນອາຫານໄດ້.

ການເຮັດຫົວເຊື້ອເຫັດຕິນແຮດ

ການເຮັດຫົວເຊື້ອເຫັດຕິນແຮດນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການເຮັດຫົວເຊື້ອເຫັດທົ່ວໄປເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕອນມີດັ່ງນີ້ :

1. ການລ້ຽງເຊື້ອເຫັດໃນອາຫານວຸ້ນ

ເຫັດຕິນແຮດຈັດເປັນເຫັດທີ່ສາມາດແຍກເນື້ອເຍື່ອຈາກດອກເຫັດນຳມາລ້ຽງໃນອາຫານວຸ້ນ (P D A) ໄດ້ດີ ຊະນິດນຶ່ງ, ໂດຍເຮັດການຄັດເລືອກດອກເຫັດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ນຳໝັກດີບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດລົບກວນ. ແລ້ວນຳເອົາມາລ້ຽງໃນອາຫານວຸ້ນໄດ້ 7 — 10 ວັນເລັ່ນໂຍເຫັດຕິນແຮດ ກໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຜ່ຂະຫຍາຍເຕັມໜ້າອາຫານວຸ້ນ.



ນຳເຊື້ອເຫັດວາງໃສ່ອາຫານວຸ້ນ

2. ການເຮັດກ້ອນເຊື້ອເຫັດຕິນແຮດ

ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືການເຮັດເຫັດນາງລົມນາງຟ້າ ໂດຍການປະສົມວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ປູກເຊັ່ນຂີ້ເລື່ອຍຈາກນັ້ນຈຶ່ງຫິດນ້ຳ ແລະ ປັບຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ເໝາະສົມ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳ



ຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດ

3. ສູດປະສົມຂີ້ເລື່ອຍ

- ຂີ້ເລື່ອຍໄມ້ເນື້ອອ່ອນ 100 ກລ
- ຮຳອ່ອນ 10 ກລ
- ຢົບຊຳ 1 — 2 ກລ
- ດິເກືອ 2 ຊິດ
- ປູນຂາວ 1 ກລ
- ຄວາມຊຸ່ມ 60 — 65 %

4. ການຕຽມວັດສະດຸປູກ

4.1 ດິນປືນທີ່ຊຸດເລິກຈາກຜິວດິນ 25 ຊມ (ໃນກໍລະນີບໍ່ມີການປູກຜັກເທິງໜ້າດິນ)

4.2 ກ້ອນເຊື້ອເຫັດຕິນແຮດ ທີ່ມີ ເສັ້ນໄຍເດີນເຕັມຖືກ້ອນເຊື້ອ. (ຜິ້ນທີ່ 1 ແມັດໃຊ້ກ້ອນເຊື້ອ 100 ຖືງ).

4.3 ໝານປູກ ຄວນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຂັງ

4.4 ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມເກົ່າ

4.5 ຊຸດດິນໃຫ້ເລິກ 20 — 25 ຊມ ຂະໜາດຂອງໝານ 1 X 4 ແມັດ ຫຼື ຍາວກວ່ານັ້ນ ຕາມແຕ່ຄວາມ ຕ້ອງການ.

4.6 ເມື່ອຕຽມໝານປູກແລ້ວໃຫ້ນຳຖືກ້ອນເຊື້ອສຶກຖືງຢ່າງອອກໃຫ້ຍິ່ງເຫຼືອແຕ່ກ້ອນເຊື້ອ, ແລ້ວນຳລົງດິນໃຫ້ຕິດກັນຈົນເຕັມໝານປູກ. ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນໄຍຂອງແຕ່ລະກ້ອນປະສານກັນຢ່າງໄວ, ເພື່ອໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນຈາກນັ້ນ ນຳດິນປືນທີ່ຕຽມໄວ້ມາປົກເທິງກ້ອນເຊື້ອ, ແລ້ວນຳເອົາແກ່ນຜັກມາປູກໃສ່ເທິງໝານປູກເຫັດ ອາຍຸປະມານ 1—2 ເດືອນ, ນຳເຝືອງມາປົກແກ່ນຜັກ ແລະ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ. ຄວນຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຢ່າໃຫ້ແຫ້ງຜັກທີ່ປູກຄວນເກັບໄດ້ໃນໄລຍະ 40 — 60 ວັນ ຊຶ່ງລະຫວ່າງນັ້ນເຊື້ອເຫັດຈະເລີ່ມອອກດອກ, ເມື່ອເກັບຜັກລ້ຽນທຳອິດແລ້ວກໍ່ຄວນໃຫ້ເຮັດຮົ່ມໃນໝານໂດຍໃຊ້ຕານ່າງເກັບແສງ 60 — 80 % ເຊິ່ງໃຫ້ສູງ 2,50 ແມັດ ຫຼືຈະໃຊ້ກ້ານໝາກຟ້າວກໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າ, ເກັບຜັກໄປແລ້ວນັ້ນຄວນປູກຜັກຊື່ ຫຼື ຜັກກະລຳໄປ

ໃນໝານທີ່ຢູ່ຮົ່ມນັ້ນ ຄວນນຳດິນປະສົມປຸຍອິນຊີໂຮຍກ່ອນປູກຜັກ ແລ້ວນຳເຝືອງມາຄຸມອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຜັກເກີດຂຶ້ນ ເຫັດຕິນແຮດກໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເກັບດອກເຫັດໄດ້. ເຫັດຕິນແຮດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 — 45 ວັນ ໃນການເກີດດອກແຕ່ຖ້າອຸນຫະພູມຕ່ຳໃນລະດູໜາວກໍ່ຈະອອກດອກຊ້າປະມານ 45 — 60 ວັນ. ຫຼັງຈາກເກີດດອກຈະໃຊ້ເວລາ 7 — 10 ວັນ ກໍ່ຈະເກັບຜົນຜະລິດໄດ້, ຂະໜາດນ້ຳໜັກຂອງດອກເຫັດຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຖືງທີ່ໃຊ້ປູກ 1 ຖືງໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 1 — 2 ກລ / ຢີ ບາງກຸ່ມໜັກເຖິງ 10 ກລ .

5. ການເບິ່ງແຍງຮັກສາເຫັດຕິນແຮດ

ລະຫວ່າງຜັກຊຸດສອງຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ຫົດນ້ຳຕາມປົກກະຕິຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຢ່າໃຫ້ແຫ້ງ, ສາມາດເກັບຜັກແລະເຫັດຄຽງຄູ່ກັນໄປດ້ວຍໂດຍການຫົດນ້ຳຄັ້ງດຽວໄດ້ປະໂຫຍດທັງຜັກ ແລະ ເຫັດ.



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



ວິທີປູກ

ເຫັດຕິນແຮດ



ຂຽນໂດຍ: ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ

ໂທລະສັບ: (021) 740252

ແຟກ: (021) 740252

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)