


ການປູກເຫັດບົດ

ບົດນຳ

ເຫັດ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານສູງ ມີລິດຊາດແຊບດີ ປະກອບດ້ວຍທາດຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ທາດໂປຣຕີນ, ຄາໂບໂຮເດດ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຫຼ່ງທາດອື່ນໆ , ໃນສະໄໝບູຮານ ມີຜູ້ໃຊ້ເຫັດປຸງແຕ່ງເປັນຢາປິວ ພະຍາດບາງຊະນິດ

ໃນປະຈຸບັນວິທະຍາການຕ່າງໆ ກ້າວໜ້າຂຶ້ນ ມະນຸດສາມາດນຳເອົາເຫັດມາປູກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ : ເຫັດເຟືອງ, ເຫັດນາງລົມ, ເຫັດຫຼູຫຼຸ, ເຫັດຫອມເນື່ອງຈາກມີວັດຖຸຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງມີຜູ້ ຫັນມາປະກອບອາຊີບຜະລິດເຫັດຂາຍ ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆຕະຫຼອດຈົນຊາວໂຮ່ນາ ກໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບປູກເຫັດ ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ ຫຼາຍຕະຫຼອດປີ ເພາະວ່າການປູກເຫັດບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງປະເທດລາວ ເຮົາ ເປັນປະເທດກະສິກຳ ສາມາດນຳເອົາເຟືອງ , ຂີ້ເລື່ອຍ, ຊີ້ນີ້ທົ່ວໆໄປ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຜົນທີ່ຫຼາຍ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຖືກວິທີ ກໍ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ .



1. ລັກສະນະເຮືອນເຫັດ

ເຮືອນທີ່ໃຊ້ປູກເຫັດຄວນມີຂະໜາດກວ້າງ 4 ແມັດ, ຍາວ 6 ແມັດ, ສູງ 3 ແມັດ ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍໄຟຫ້ຍາ ດ້ານຂ້າງເຮືອນເຫັດຄວນເປັນພລາສຕິກເຄືອບ ສາມາດເປີດ—ປິດໄດ້ສະດວກ

2. ການຜະລິດຖົງເຊື້ອເຫັດ

ມີສູດອາຫານທີ່ໃຊ້ເຮັດກ້ອນເຊື້ອປູກເຫັດດັ່ງນີ້ :

ສູດທີ 1

* ຂີ້ເລື່ອຍໄມ້ເນື້ອອ່ອນ	100	ກິໂລ
* ຮຳລະອຽດ	75	ກິໂລ
* ປູນຂາວ	2	ກິໂລ
* ຢົບຊຳ	500	ກິໂລ
* ດິເກືອ	200	ກິໂລ
* ຄວາມຊຸ່ມ	65 — 75	ເປີເຊັນ

ສູດທີ 2

* ຂີ້ເລື່ອຍໄມ້ເນື້ອອ່ອນ	100	ກິໂລ
* ຮຳລະອຽດ	3	ກິໂລ
* ນ້ຳຕານຊາຍ	2	ກິໂລ
* ປູນຂາວ	1	ກິໂລ
* ຢົບຊຳ	2	ກິໂລ
* ດິເກືອ	200	ກິໂລ
* ຄວາມຊຸ່ມ	65—75	ເປີເຊັນ



ຮູບ: ຖົງເຊື້ອເຫັດ

ນຳຂີ້ເລື່ອຍມາປະສົມກັບອາຫານເສີມຄຸກໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ຕົ້ມນ້ຳລົງໄປຈົນກະທັ່ງມີຄວາມຊຸ່ມພໍດີ ຄື : ຂະນະກຳຂີ້ເລື່ອຍໄວ້ໃນມື້ ຈະບໍ່ມີນ້ຳໄຫຼອອກມາຕາມວ່າງມື້ ເມື່ອແບມືອອກຂີ້ເລື່ອຍຍັງຈັບຕົວກັນເປັນກ້ອນ ຫຼື ແຕກປະມານ 2 ຫາ 3 ກ້ອນ ຈາກນັ້ນນຳສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວບັນຈຸຖົງພລາສຕິກທີ່ນ້ຳຮ້ອນ ໃຫ້ແໜ້ນພໍສົມຄວນປະມານຖົງລະ 800 ກຣາມ ພ້ອມໃສ່ຄໍພລາສຕິກ ແລະ ຈຸດດ້ວຍສຳລິ ນຳໄປຫ້ໄຂ້ເຊື້ອດ້ວຍອຸນຫະພູມ 100 °C ເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ເຊື້ອເຂົ້າຝາງຖົງປະມານ 10 — 20 ແມັດຕໍ່ໄປ.

3. ການບົ່ມຝັກກ້ອນເຊື້ອເຫັດ

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການເຂ່ຍເຊື້ອລົງກ້ອນຖົງເຫັດແລ້ວ ນຳຖົງກ້ອນເຊື້ອ ໄປບົ່ມຝັກໄວ້ໃນເຮືອນເຫັດທີ່ມີອຸນຫະພູມປະມານ 28—30 ອົງສາ (ອຸນຫະພູມຫ້ອງ) ໃຫ້ມີການຖ່າຍເທ, ລະບາຍອາກາດຢ່າງພຽງພໍ ບົ່ມຝັກກ້ອນເຊື້ອເຫັດປະມານ 25—30 ວັນ ເຊື້ອເຫັດຈະຈະເລີນເຕັມຖົງບົ່ມຝັກຕໍ່ໄປ

ອີກປະມານ 1—2 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນໂຍເດີນໜາແໜ້ນ ແລະ ແຂງແຮງ (ເສັ້ນໂຍຮັດຕົວ) ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຂົນຍ້າຍເຂົ້າ ໂຮງເຮືອນ ສຳລັບເປີດດອກ .



ຮູບ: ການບິນພັກກ້ອນເຊື້ອເຫັດ

4. ການຜະລິດດອກເຫັດ

ເມື່ອນຳກ້ອນເຊື້ອເຫັດທີ່ເດີນເຕັມຖົງ ແລະ ແໜ້ນໂຕ ແລ້ວເຂົ້າເຮືອນເຫັດ ເປີດດອກໃຫ້ຈຸກສຳລິອອກ ຫົດນ້ຳໃຫ້ ຊຸ່ມ ອຸນນະພູມພາຍໃນເຮືອນຄວນຢູ່ປະມານ 7—10 ວັນ ເຫັດກໍ່ຈະເກີດຕຸ່ມດອກນ້ອຍໆ ບໍລິເວນປາກຖົງ ໃຫ້ເອົາມິດ ປາດປາກຖົງອອກໃຫ້ໝົດ ພໍດອກເຫັດເລີ້ມໃຫຍ່ໃຫ້ເປີດ ເຮືອນເຫັດໂດຍການມ້ວນພລາສຕິກດ້ານຂ້າງຂຶ້ນເພື່ອຖ່າຍ ເທລະບາຍອາກາດ ເຫັດສາມາດເກີດດອກໄດ້ຫຼັງຈາກເສັ້ນ ໂຍແໜ້ນຕົວແລ້ວ 1—2 ເດືອນ .

5. ການເກັບຜົນຜະລິດ

ໃຫ້ເກັບມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ຄື: ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ໂດຍໃຊ້ມືຖືງ ດອກເຫັດທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່ອອກ ທະຍອຍເກັບເລື້ອຍໆ ຈົນໝົດ

ຈາກນັ້ນຈຶ່ງປ່ອຍປະໄວ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫົດນ້ຳ 7—10 ວັນ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫົດນ້ຳ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນນະພູມໃຫ້ຢູ່ປະມານ 37—40 ອົງສາເຊ ຈົນເຫັດເກີດຕຸ່ມດອກ ແລະ ເມື່ອດອກ ເຫັດເລີ້ມໃຫຍ່ຈຶ່ງເປີດພລາສຕິກດ້ານຂ້າງອອກ ເພື່ອຖ່າຍ ເທລະບາຍອາກາດອີກຄັ້ງ .



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



ເຕັກນິກ ການປູກເຫັດບົດ



ຂຽນໂດຍ : ໜ່ວຍງານວິຊາຊີບ

ໂທລະສັບ/ແຟກ: 021 740252

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)