

ອຸນຫະພູມໜາວໃນຊ່ວງເດືອນທັນວາ ຫາ ເດືອນມັງກອນແມ່ນເປັນບັນຫາໜຶ່ງໃນການຕົກກ້ານາແຊງຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະພື້ນທີ່ທີ່ມີລະດັບສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 600 ມ ຂຶ້ນໄປ. ອຸນຫະພູມໜາວເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ ກ້າບໍ່ແຕກງອກດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກ້າບໍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸຂອງເຂົ້າແກ່ຍາວອີກດ້ວຍ. ພື້ນທີ່ສູງເທົ່າໃດ, ບັນ ຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ວິທີທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຕ້ອງນຳໃຊ້ແນວພັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນຳ ໃຊ້ຜ້າຢາງປົກຄຸມຕາກ້າເວລາຕົກກ້າ.

ແນວພັນ


ໃນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຢູ່ເຂດທີ່ມີລະດັບໜ້າດິນສູງແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າດໍເຊັນ: ທ່າດອກຄຳ 5.

ການໃຊ້ຜ້າຢາງປົກ

ການໃຊ້ຜ້າຢາງປົກຄຸມຕາກ້າເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດ ແລະ ນ້ຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ກ້າແຕກງອກ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີກ່ວາຕົກ ກ້າທຳມະດາ. ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸຂອງການເກັບກ່ຽວສິ້ນລົງອີກ ດ້ວຍ. ນອກນັ້ນຊາວກະສິກອນຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຜ້າຢາງສາມາດ ປ້ອງກັນໝູໄດ້ອີກ. ວິທີການຕົກກ້າແບບໃຊ້ຜ້າຢາງປົກເຮັດໃຫ້ຊາວ ກະສິກອນຮູ້ຈັກເວລາອັນເໝາະສົມທີ່ຈະຕົກກ້າໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າສາ ມາດຕົກກ້າໃນຊ່ວງເດືອນທັນວາເຊິ່ງເປັນເດືອນທີ່ມີອຸນຫະພູມໜາວ ສຸດ.



ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ພາຍຫຼັງຫ່ວານກ້າ ແລະ ກ່ອນກ້າແຕກງອກ ພົດຄວນໃຊ້ຜ້າຢາງປົກຄຸມໂລດ (ເບິ່ງຮູບສະແດງ). ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຢາງທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບລົມພັດ, ໃນຊ່ວງກາງຄືນຄວນ ດຶງຜ້າຢາງລົງແຕ່ລະດ້ານຕິດກັບພື້ນດິນໄວ້, ໃນຊ່ວງກາງວັນຖ້າອາກາດຮ້ອນຫຼາຍກໍ່ໃຫ້ເປີດສິ້ນໃດສິ້ນໜຶ່ງຂອງ ຜ້າຢາງຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດລ່ວງ. ເມື່ອກ້າສູງພໍທີ່ຈະປັກດຳໄດ້ແລ້ວໃຫ້ຮີ້ຜ້າຢາງອອກໂດຍຮີ້ອອກກ່ອນການ ປັກດຳຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າແຂງ ແລະ ແຂງແຮງເພື່ອນຳໄປປັກດຳ.



ຂຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນປະກອບໂດຍ: B Linquist, S Fukai ແລະ J. Basnayake

ແປໂດຍ: ຖານີ ແກ້ວວົງວິຈິດ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ເບິ່ງໃນເວັບ www.knowledgebank.irri.org



ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ
ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ