

ຂໍ້ແນະນຳ ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

ເອກະສານ ປະກອບການຝຶກອົບຮົມ 07:

CETDU
Central Extension
Training and
Development Unit





ປຶ້ມຄູ່ມືໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງລວມມີ:

- ວິທີການສົ່ງເສີມ (ພາກ 1 ຫາ 19)
- ເຄື່ອງມື ສຳລັບວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
- ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ກະສິກຳ ສ້າງສັດ ປູກຜັງຫລັກສູດ (ພະນັກງານສົ່ງເສີມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະພະນັກງານສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ)

ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນເຈດຕະນາເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກຳ. ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງໂຄງການ Leap ໂດຍການ ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຄູ່ຝຶກຂອງກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ (ໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ CETDU) ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ພະນັກງານ ສົ່ງເສີມຂັ້ນເມືອງສາມາດຖ່າຍທອດໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ.

Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

22. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດນ້ຳ
23. ຂໍ້ແນະນຳວິທີການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
24. ເຕັກນິກການປູກເຂົ້າແບບກະເສດສຸມ
25. ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ EM
26. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກກ້ວຍ
27. ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍຜົນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
28. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເພື່ອປັບປຸງດິນ
29. ເຕັກນິກການປູກຫວານຫາງແຂ້
30. ເຕັກນິກການປູກໝາກມັງກອນ
31. ເຕັກນິກການປູກສາລີ

ແຜ່ນພິບ

1. ເຕັກນິກການລ້ຽງໝູ
2. ພະຍາດກາຝາກຂອງໝູ
3. ເຕັກນິກການຕັດແຂ້ວໝູ
4. ການອະນຸບານໝູນ້ອຍເກີດໃໝ່
5. ເຕັກນິກການລ້ຽງໄກ່ຜິ້ນບ້ານ
6. ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່
7. ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ
8. ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະການນຳໃຊ້ໃນນາເຂົ້າ
9. ເຕັກນິກການຕົກກ້າດາປ່ອກ
10. ເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານດິນຕີນ
11. ເຕັກນິກການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ
12. ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງພືດ (ເຂດພາກໃຕ້, ກາງ ແລະເໜືອ)
13. ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຄ້ຽວເອື້ອງ

ປຶ້ມຄູ່ມືໃນແຕ່ລະເລື່ອງ

1. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫຍ່
2. ເຕັກນິກການປູກຜັກບູອກໂຄລີ
3. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າປີ
4. ເຕັກນິກການປູກຜັກກະລໍ່າດອກ
5. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂາວ
6. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດນາ
7. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ
8. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວ
9. ເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມ
10. ເຕັກນິກການປູກໝາກແຕງກວາ
11. ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ
12. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຢວກ
13. ເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ
14. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຂີ້ໜູ
15. ເຕັກນິກການປູກຜັກສະຫຼັດ
16. ເຕັກນິກການປູກໝາກເຜັດຊີ້ຝາ
17. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວແບ່ງ
18. ເຕັກນິກການປູກໝາກຖົ່ວຍັດ
19. ເຕັກນິກການປູກຜັກບົວຫົວໃຫຍ່
20. ເຕັກນິກການປູກໝາກເລັ່ນ
21. ເຕັກນິກການປູກຖົ່ວຝັກຍາວ

ເອກະສານ 07:

ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ

ສາລະບານ

ຜັກກາດຫົວ (Chinese Radish).....	2
ລັກສະນະທົ່ວໄປ	2
ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ	3
ການກຽມດິນ.....	3
ການປູກ	4
ການປົວລະບັດຮັກສາ	4
ການເກັບກ່ຽວ	6



ການພວນດິນ ແລະເສຍຫຳ້າ

ພວນດິນໂລ່ງ ແລະຜູ້ຍຸດຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສາມາດລະບາຍນ້ຳ ແລະອາກາດດີຂຶ້ນ ພວນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. ການກຳຈັດຫຳ້າແມ່ນ ເຮັດພ້ອມກັບການພວນດິນ. ຖ້າມີຫຳ້າເກີດໃຫ້ຟ້າວຫຼືກອກຖ້າປ່ອຍໃຫ້ ຫຳ້າເກີດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການກຳຈັດ ແລະສິ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຕົກຕໍ່າ.

ການເກັບກ່ຽວ

ຜັກບົວໃຫຍ່ທີ່ປູກໃນບ້ານເຮົາ ມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວຍາວປະມານ 90 ຫາ 100 ວັນ. ຫຼັງຈາກປູກແມ່ນສາມາດເລີ່ມເກັບກ່ຽວໃນເວລາໃບ ບົວຫົວໃຫຍ່ເລີ່ມຄາຍກາບໃບອອກ ແລະສີຂອງໃບເລີ່ມປ່ຽນເປັນສີເທົາ, ເປືອກຫຸ້ນຫົວຊັ້ນນອກເລີ່ມແຫ້ງເປັນສີນ້ຳຕານ. ຫຼັງຈາກຫຼືກຕົ້ນຂຶ້ນມາ ແລ້ວຄວນວາງທັງໃບ ແລະຫົວຕ່ຽງກັນໄປເພື່ອປ້ອງກັນແດດເຜົາ. ໃຫ້ຕາກ ໄວ້ໃນໝານ 5 ຫາ 7 ວັນ ຈົນໃຫ້ໃບ ແລະ ຕົ້ນແຫ້ງ. ເມື່ອຕາກຜັກບົວຫົວ ໃຫຍ່ໄດ້ດີແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ມືດຕັດຕົ້ນຫ່າງຈາກຫົວປະມານ 2 ຫາ 3 ຊຸດມ. ຈະ ເຮັດໃຫ້ເກັບຮັກສາໄດ້ດີ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດເຂົ້າທຳລາຍໄດ້ງ່າຍ.

ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເມສາ 2003

ທັງນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. ໃຫ້ແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອ: ເທື່ອທີ 1 ໃສ່ຕອນປູກແບບຮອງຜື່ນແລ້ວພວນປົກລົງໃນດິນ, ເພີ່ມອີກກໍໄດ້ເຊັ່ນ: ຢູ່ເຮຍ ຫຼື ແອມໂມນຽມໂນເຕດຈຳນວນ 60 ກິໂລ/ຮຕ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະພຽງພໍທັງເຊົ້າ ແລະແລງ, ຖ້າຜັກກາດຫົວຂາດນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ຂະໜາດ ຂອງຄຸນນະພາບລົດລົງໄປ.

ການພວນດິນ

ຄວນເຮັດຕອນທີ່ຫຍ້າຍັງມີໜ້ອຍ ແລະຕົ້ນຜັກກາດຫົວຍັງນ້ອຍຢູ່ນອກຈາກນີ້ຄວນເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ໃກ້ຕົ້ນເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງຮາກໄດ້.

ການຄຸມດິນ

ໃຊ້ເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງປົກບໍລິເວນເທື່ອຕົ້ນເພາະຜັກບົວຫົວໃຫຍ່ມີລະບົບຮາກຕື້ນ. ການປົກຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງໜ້າດິນ ແລະປ້ອງກັນຫຍ້າອີກ.

ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກການປູກຜັກກາດຫົວ

ຜັກກາດຫົວ (Chinese Radish)

ຜັກກາດຫົວ ເປັນຜັດຜັກທີ່ເຮົາໃຊ້ປູກເພື່ອບໍລິໂພກພາກສ່ວນຮາກທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເນື້ອມີສີຂາວ ໃຊ້ປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ປະເພດແກງຈິດ. ຜັກກາດຫົວເປັນຜັດທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດ ໃນທະວີບອາຊີປູກຫຼາຍໃນປະເທດຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຜັກກາດຫົວ ເປັນຜັດຜັກຢູ່ໃນຕະກຸນ Cruciferae ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ: *Raphanus sativus* var. *longipinnatus* Linn. ເປັນຜັດຜັກລື້ນລຸກມີອາຍຸສິ້ນປົດຮວງ (Annual) ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ຢອດເມັດເຖິງເກັບກຽວປະມານ 42 ຫາ 60 ວັນ, ຮາກຂະຫຍາຍເປັນຫົວສີຂາວຈະເລີນເຕີບໂຕເທິງໜ້າດິນເລັກນ້ອຍ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນລັກສະນະຂອງຫົວ



ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ເປັນຮູບຊົງບັ້ງ, ຮູບຊົງກົມ, ຮູບກ້ວຍຍາວ ຫຼື ອື່ນໆ. ທັງໝົດຂຶ້ນຢູ່ ກັບລັກສະນະປະຈຳພັນຂອງແຕ່ລະພັນ. ຜັກກາດຫົວສາມາດ ເຕີບໂຕໃນດິນເກືອບທຸກໆຊະນິດແຕ່ມັກດິນຫ່າງປົນຊາຍປະຕິກິຣິ ຍາຂອງດິນ (pH) 5.8 ຫາ 6.8 ຫຼື ເປັນກົດເລັກນ້ອຍ, ມີຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ສູງພິສິນຄວນ. ບ້ານເຮົາສາມາດປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແຕ່ຊ່ວງເວລາເໝາະສົມ ຄື ຊ່ວງເວລາທີ່ມີອຸນຫະ ພູມ ປະມານ 15 ຫາ 25 °C ຫຼື ລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ເດືອນມັງກອນ

ພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ພັນທີ່ນິຍົມປູກໃນບ້ານເຮົາ ສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນດໍເຊັ່ນພັນ: ເຄຢູ 1 ແລະພັນອື່ນໆ.

ການຕຽມດິນ

ເນື່ອງຈາກຜັກກາດຫົວ ເປັນພືດທີ່ມີລະບົບຮາກເລິກຄວນຂຸດໂຖ ດິນເລິກ ປະມານ 30 ຊຕມ. ຕາກດິນໄວ້ 7 ຫາ 10 ວັນ ແລ້ວໃສ່ດ້ວຍຝຸ່ນ ຄອກ ຫຼືຝຸ່ນບົ່ມຄົນເຂົ້າກັນໃຫ້ທົ່ວພວນດິນ ໃຫ້ລະອຽດເກັບຫຍ້າ ແລະເສດ ໄມ້ອື່ນໆ ອອກຍົກໜ້າດິນຂຶ້ນໃຫ້ເປັນໜານໆ.

ການປູກ

ໄລຍະປູກທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຊຸມຫ່າງກັນປະມານ 25 ຊຕມ. ແລະລະຫວ່າງແຖວ 30 ຊຕມ. ຫຼັງຈາກຕຽມດິນແລ້ວໃຫ້ເຮັດຊຸມນ້ອຍໆ ແລ້ວຢອດເນັດໃນຊຸມໆລະ 3 ຫາ 5 ເນັດ ປົກດິນໜ້າ ປະມານ 0.5 ຊຕມ. ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວປົກດ້ວຍເຝືອງແຫ້ງ ຫຼືຫຍ້າແຫ້ງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມ ຊຸ່ມຊື່ນ ຂອງດິນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼັງຈາກເບື້ອງອກປະມານ 15 ວັນ ຫຼືມີໃບ ແທ້ 2 ຫາ 3 ໃບ ຄວນຖອນແຍກໃຫ້ ເຫຼືອຊຸມລະ 2 ຕົ້ນ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຝຸ່ນທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ ຄືຝຸ່ນເຄມີ ສູດ 15_15_15 ຫຼື 13_13_21 ຫຼື ສູດອື່ນໆ ທີ່ໄກ້ຄຽງກັນນີ້. ໃສ່ອັດຕາ 300 ຫາ 600 ກລ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸ ດົມສົມບູນຂອງດິນ. ການໃສ່ຝຸ່ນເທື່ອທີ 1 ໃສ່ເປັນ ຝຸ່ນຮອງຟື້ນກ່ອນປູກ, ເທື່ອທີ 2 ໃສ່ຫຼັງ ຈາກປູກໄດ້ 30 ຫາ 40 ວັນ ໂຮຍຂ້າງຫ່າງຈາກ ຕົ້ນເລັກ ນ້ອຍພວນດິນປົກຫຼັງຈາກປູກ ໂດຍໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງຕົ້ນກ່ອນ ແລ້ວພວນ ດິນປົກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໃສ່ຝຸ່ນເພີ່ມ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນແອນໂມນຽມຊຸນເຟດ ຫຼື ຢູເຣຍ ໃນຊ່ວງການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເທື່ອ ທີ່ 2 ໃສ່ຕອນພືດມີອາຍຸປະ ມານ 20 ຫາ 85 ວັນ ໂດຍໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງຕົ້ນ ແລ້ວພວນດິນປົກ. ນອກ ຈາກນີ້ໄລຍະທຳອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕອາດຈະໃສ່ຝຸ່ນ ທີ່ແນະນຳ ໃສ່ສູດ 13_13_21 ຫຼື 15_15_15 ໃນອັດຕາ 300 ຫາ 600 ກິໂລ/ເຮັກຕາ