

ບົດນຳ

ມີຫຼາຍຂໍ້ແນະນຳໃນວຽກງານສົ່ງເສີມທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງການພັດທະນາ ການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພືດແຕ່ລະຊະນິດ. ແຕ່ໃນນີ້ແມ່ນໄດ້ຍົກເອົາການໃຫ້ນ້ຳແກ່ເຂົ້າ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ.

ເອກະສານນີ້ ເພື່ອແນະນຳແນວຄວາມຄິດຫຼັກການ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ. ແນໃສ່ໃຫ້ມີການປັບປຸງການສະໜອງນ້ຳເພື່ອຍົກສະນັດທະພາບຂອງເຂົ້າ ແລະເປັນບ່ອນອີງໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດ.

1. ຄວາມສຳຄັນຂອງນ້ຳຕໍ່ຕົ້ນເຂົ້າລວມມີ:


- ນ້ຳເປັນພາຫະນະນຳອາຫານນ້ຳຕານ ແລະແຮ່ທາດໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນເຂົ້າ
- ຕົ້ນເຂົ້າໃນ 1 ເຮັກຕາໃຊ້ນ້ຳຢ່າງໜ້ອຍ 8 ລ້ານລິດ (400. 000 ຖິ່ງ) ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ
- ຖ້າຂາດນ້ຳ, ອາກາດ ແລະແສງແດດຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອາຫານຫຼຸດລົງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນ້ຳເປັນປັດໃຈຈຳກັດ.

ສະນັ້ນຈິ່ງແນະນຳລາຍລະອຽດໃນການສະໜອງນ້ຳແກ່ເຂົ້າ

2. ຊ່ວງໄລຍະຫ່ວານກ້າ

- ຫຼັງຈາກຫ່ວານກ້າໃໝ່ໆ ຄວນຄ່ອຍໆ ເບັ້ງນ້ຳເຂົ້າ (ຖ້າມີ ຊຸປ໌) ເພື່ອໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຈົນກວ່າກ້າຈະຈັບດິນ (ມີລະ 2 ຫາ 3 ເທື່ອ) ແຕ່ຢ່າໃຫ້ນ້ຳຂັງເປັນເດັດຂາດ
- ໄລຍະນີ້ບໍ່ຄວນໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຕົ້ນກ້າ, ລະດັບນ້ຳຈະຕ້ອງໃຫ້ພໍດີຖ້ວມໜ້າດິນປະມານ 1 ຊຸດນ ກໍ່ພໍ. ໃນກໍລະນີນ້ຳຫຼາຍໄພດກໍ່ໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳອອກ, ເມື່ອອາຍຸກ້າໄດ້ 10 ວັນ ແລ້ວກໍ່ຄວນຮັກສານ້ຳໃນລະດັບ 5 ຊຸດນ ຢູ່ສະເໝີ.
- ຖ້າຫາກອຸ່ນຫະພູມຕ່ຳຫຼາຍເວລາກາງຄືນ ກໍ່ໃຫ້ເບັ້ງນ້ຳເຂົ້າຖ້ວມຕົ້ນກ້າ, ມີເຊົ້າມາເວລາແດດອອກຈິ່ງຄ່ອຍເບັ້ງນ້ຳ


ອອກໃຫ້ຢູ່ລະດັບເດີມ ຫຼືຮັກສາໄວ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົ້ນກ້າ.



ຂໍ້ສັງເກດ: ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຕາກ້າແຫ້ງ ຫຼືລະດັບນ້ຳເລີກ ເກີນໄປ, ຖ້າຕາກ້າແຫ້ງຈະເຮັດໃຫ້ກ້າຫຼີກຍາກ (ຫຍາບ) ຫຼືເຮັດໃຫ້ກ້າຂາດຫົວໂກນ, ແຕ່ນ້ຳຫຼາຍໄພດ (ຂັງ) ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າຂຶ້ນຂໍ້ ຫຼືເຮັດໃຫ້ກ້າໃບຍາວການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າຈຳນວນການແຕກກໍ່ ກໍ່ຈະໜ້ອຍ.

3. ໃນຊ່ວງໄລຍະປັກດຳ

- ຫຼັງຈາກປັກດຳແລ້ວຄວນຮັກສາລະດັບນ້ຳສູງປະມານ 1 ຫາ 2 ຊຸດນເທົ່ານັ້ນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຕົ້ນກ້າທີ່ຫາກໍ່ປັກດຳ
- ຖ້ານ້ຳຫຼາຍກວ່າ 1 ຫາ 2 ຊັງຕີແມັດ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າອ່ອນແອຈຳນວນການແຕກກໍ່ກໍ່ຈະໜ້ອຍຜົນຜະລິດຕ່ຳ
- ໃນຊ່ວງນີ້ ຖ້າຫາກຂາດນ້ຳບາງຄັ້ງຄາວກໍ່ອາດບໍ່ລົງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍປານໃດແຕ່ຖ້າຂາດນ້ຳຫຼາຍ ຫຼືດິນເກີນໄປກໍ່ຈະລົງຜົນສະທ້ອນເສຍຫາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.



ຂໍ້ສັງເກດ: ໃນຊ່ວງນີ້ເຫັນວ່າການໃຫ້ນ້ຳບໍ່ຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍປາດໃດ. ສະນັ້ນ, ໃນຊ່ວງນີ້ຈະບໍ່ສຳຄັນເທົ່າໃດມີແຕ່ຮັກສາລະດັບນ້ຳສະໜ້າສະເໝີຖ້າມີນ້ຳພຽງພໍ.

4. ຊ່ວງເລີ່ມແຕກກໍ່ ແລະແຕກກໍ່ສູງສຸດ

- ໃນຊ່ວງນີ້ເຂົ້າຕ້ອງການຝຸນເລັ່ງ ແລະຮັກສາລະດັບນ້ຳປະມານ 1 ຫາ 2 ຊັງຕີແມັດ, ບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໃນນາແຫ້ງເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຝຸນເລັ່ງສູນເສຍໄປໃນອາກາດຫຼາຍ. ຝຸນເລັ່ງທີ່ໃສ່ລົງດິນນາຈະປ່ຽນເປັນຮູບການໃໝ່ຍ້ອນອາກາດຮູບການນີ້ຈະປ່ຽນເປັນອາຍ ແລະສູນເສຍໄດ້ງ່າຍ
- ນ້ຳປ່ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາກາດຊຶມລົງດິນ ແລະຊຶມລົງໜ້ອຍເທົ່າໃດຝຸນເລັ່ງຍິ່ງປ່ຽນເປັນອາຍໄດ້ໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຈິ່ງສ້ອມແປງຄັນນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍນ້ຳ.




ຊ່ວງເລີ່ມແຕກກໍ່ ແລະ ແຕກກໍ່ສູງສຸດ

ຂໍ້ສັງເກດ: ຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງທີ່ເຂົ້າຕ້ອງການແຮ່ທາດ, ອາຫານຕ່າງໆ ແລະ ນ້ຳເພື່ອສົ່ງຮັດໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນເຂົ້າ.

5. ໃນຊ່ວງເຂົ້າຕັ້ງທ້ອງ (ມານ)

- ເຂົ້າໄດ້ອາຍຸແຕ່ 60 ຫາ 90 ວັນ ແມ່ນຊ່ວງເຂົ້າມານໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນຂາດນ້ຳບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດຈົນເຖິງກ່ອນໜ້າເກັບກ່ຽວປະມານ 10 ວັນ. ຖ້າຂາດນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕົກຕ່ຳ ແລະ ເສຍຫາຍໄດ້.
- ເຂົ້າມີ ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳໃນລະດູຝົນແມ່ນ 4 ຫາ 5 ມມ / ວັນ ແລະ ໃນລະດູແລ້ງປະມານ 5 ຫາ 7 ມມ/ວັນ (ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າການຊົມລົງຜື່ນດີ ແລະ ສູນເສຍຕາມຄອງເໝືອງ, ທົ່ງນາຕ່າງໆ)
- ບໍ່ຄວນໃສ່ຝຸນເຄມີໃນເວລານ້ຳຍັງໄຫຼຢູ່ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢຸດນຶ່ງເສຍກ່ອນ
- ເພື່ອຄວບຄຸມຫຍ້າໄດ້ດີໃນເມື່ອທີ່ປູກເຂົ້າຄວນໃຫ້ນ້ຳຢູ່ໃນລະດັບ 5 ຫາ 10 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ສະເໝີ.
- ເພື່ອຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນເມື່ອທີ່ຄວນສ້ອງແປງຄັນນາ ໃຫ້ມີຂະໜາດ ແລະ ສູງພໍສົມຄວນ (30 ຊມ x 30 ຊມ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຮົ່ວຊຶມ.



5.ຫາ10 ຊຕມ

ລະດັບນ້ຳ

ຂໍ້ສັງເກດ: ເຮົາຕິລາຄາໄດ້ວ່າໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະເຂົ້າມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ. ຖ້າຂາດນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ຈະສົ່ງຜົນເຖິງຜົນຜະລິດຕົກຕ່ຳ ແລະ ເສຍຫາຍໄດ້.

6. ໃນຊ່ວງກ່ອນໜ້າເກັບກ່ຽວ

- ຄວນປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເນື້ອທີ່ນາເຂົ້າກ່ອນໜ້າເກັບກ່ຽວ 10 ວັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າສຸກດີ.
- ໃນຊ່ວງນີ້ເຂົ້າຕ້ອງການນ້ຳພຽງແຕ່ໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນເມື່ອທີ່ການຜະລິດເທົ່ານັ້ນ.



Laos Extension for Agriculture Project

P.O. Box 9159

Vientiane, Lao P.D.R.

Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277

Email: leap@laoex.org

Email: cetdu@laoex.org

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້


ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ

ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ຂໍ້ແນະນຳ

ເຕັກນິກການໃຫນ້າແກ່ເຂົ້າ



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ: CETDU

(ໜ່ວຍງານພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນສູນກາງ)

ຮ່ວມກັບ:

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)