

1. ເມັດພັນເຂົ້າທີ່ດີແມ່ນເມັດພັນແນວໃດ?

- ສີຂອງເມັດພັນ ເປັນສີດຽວກັນ
- ເມັດເຕັມດີແລະ ໃຫຍ່ສະເໝີ
- ບໍ່ມີເມັດພັນຊະນິດອື່ນເຈືອປົນ
- ປອດຈາກເຊື້ອພະຍາດແລະແມງໄມ້ທຳລາຍ
- ບໍ່ມີເສດຫຍ້າ, ເພືອງ ແລະເມັດລົບປົນ
- ຄວາມງອກຕ່ຳສຸດບໍ່ຫລຸດ 80%
- ເປັນເມັດພັນທີ່ໄດ້ຈາກ R2



2. ການແຊ່ ແລະ ປົ່ມເມັດພັນເຂົ້າປູກ

2.1. ກ່ອນແຊ່

- ຄວນຕາກ 1 ແດດ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເມັດເຂົ້າ ງອກດີ ແລະຝັດເອົາເມັດລົບອອກກ່ອນ.

2.2. ການແຊ່ເມັດພັນ

- ເອົາເມັດພັນໃສ່ກະທໍາຫລືໃສ່ເປົາປ່ານ ລົງແຊ່ ນ້ຳ ແລະຄົນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອເອົາເມັດລົບ ອອກ ໃຫ້ໝົດ, ຄວນແຊ່ 1 ຫາ 2 ມື້ ຫລື 24 ຫາ 48 ຊົ່ວໂມງ

ແລ້ວແຕ່ເມັດພັນມີເບື້ອງໜ້າ ຫລື ບາງ, ເວລາແຊ່ໄດ້ 12-24 ຊົ່ວໂມງຄວນປ່ຽນ ນ້ຳໃໝ່ ຫລື ຄົນໃຫ້ນ້ຳເນົ່າເສັ້ງຈາກການແຊ່ ເມັດນັ້ນ ອອກ
- ການປົ່ມ: ປົ່ມໃນ 2 ວັນ ຫລື 48 ຊົ່ວໂມງ, ເວລາປົ່ມໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງຄວນປັ້ນເປົາໜຶ່ງເທື່ອ ແລະຫົດນ້ຳເພື່ອເມັດທາງໃນບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ, ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ງອກ ສະເໝີດີ
- ເມື່ອສ້າງເກດຈາວອອກດີແລ້ວເອົາໄປ ຫ່ວານ

2.3. ການກຽມດິນຕົກກ້າ

- ຕ້ອງເລືອກເອົາບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ: ສະດວກຕໍ່ການປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າ, ອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄຖດິນດາກແດດໄວ້ 1 ຫາ 2 ອາທິດ ຈຶ່ງເອົານ້ຳເຂົ້າຖວ້ມແຊ່ໄວ້ປະມານ 1 ອາທິດຫຼັງຈາກ ຄາດດິນມຸ້ນແລ້ວຄວນຫ່ວານຝຸ່ນຄອກໃສ່ 1 ກິໂລ/ຕາແມັດ ແລ້ວປັບໜ້າດິນໃຫ້ພຽງ, ແລະແບ່ງເຮັດເປັນ ແບ່ງ ຫຼື ເປັນໜານກ້ວາງແຕ່ 1.5-2 ແມັດ ຍາວສຸດ ແຕ່ຈະເໝາະສົມ ຂອງໄຮ່ນາແລະ ຄວນມີຮ່ອງລະບາຍ

2.4. ການຫ່ວານກ້າ.

- ການຫ່ວານກ້າເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຕອນແລງ ທີ່ມີແສງແດດອ່ອນ, ຫ່ວານໃນອັດຕາ

ແນວປູກ 100 ກອນ/ຕາແມັດ ຫຼື 1 ຂົດ/ຕາແມັດ ການຫ່ວານໃສ່ ດິນຕົມຫຼືເໝາະສົມແມ່ນ ໃຫ້ເມັດເຂົ້າລົງດິນ 1/2 ຫລື ເຄິ່ງເມັດ. ຫລັງຫ່ວານກ້າໄດ້ 7-10 ວັນ ຄວນເລັ່ງຝຸ່ນ ຢູ່ເລັຍອັດຕາສ່ວນ 5 ກອນ/ຕາແມັດ ໃນເວລາຕົ້ນກ້າ ບ່າງ ແຕ່ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ກ້າອົ້ວ ຍ້ອນຝຸ່ນຫລາຍ ເກີນ ໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນຫ່ວານຝຸ່ນຊ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາກ ຍາວ ແລະ ຫລົກຍາກ. ອາຍຸກ້າໄດ້ 25 ວັນແມ່ນພໍດີ ເພື່ອນຳໄປປັກດຳໄດ້.

2.4. ກຽມດິນປັກດຳ

- ໄຖເທື່ອທີ 1 ແຊ່ໄວ້ 2-4 ອາທິດ, ໄຖເທື່ອ 2 ກ່ອນປັກດຳ 1 ອາທິດ, ຈາກນັ້ນຄາດໃຫ້ລະອຽດແລະ ປັບໜ້າ ດິນໃຫ້ພຽງເພື່ອປັກດຳ
- ເຮັດແບ່ງປັກດຳກ້ວາງ 5 ແມັດ, ໄລຍະຫ່າງແບ່ງ/ແບ່ງ 30 ຊມ ເພື່ອການບົວລະບັດໄດ້ງ່າຍ

3. ການປັກດຳ

- ການປັກດຳບໍ່ຄວນດຳລົງເລີກຫຼາຍປະມານ 2 ຂໍ້ມື
- ລະດັບນ້ຳປັກດຳບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ 2-5 ຊມ
- ໄລຍະຫ່າງ: 20 x 20 ຊມ ໃນດິນບ່າງ ແລະຄວນຫ່າງ ກວ່ານີ້ໃນນາທີ່ມີດິນງາມ, 20 - 25 ສຸມ/ຕາແມັດ ແລະປັກດຳ 2-3 ກິບ/ສຸມ
- ການປັກດຳຕ້ອງດຳເປັນແຖວ



4. ການບົວລະບັດຮັກສາ

- ອັດຕາຝຸ່ນໃນ 1 ເຮັກຕາປະມານ 60:30:30
- ຮອງພື້ນປະກອບມີ ຝຸ່ນຄອກ 5 ໂຕນ ຫລື 0.5 ກິໂລ/ຕາແມັດ, 200-500 ກິໂລ ປູນຂາວ ແລະ 15:15:15 ປະມານ 200 ກິໂລ/ຮຕ ຫລື 1 ກິໂລ/50 ຕາແມັດ

+ ເລ່ງຄັ້ງທີ 1: ຫ້ລງປັກດຳໄດ້ 20-25 ວັນ, ໃສ່ຝຸ່ນຢູເລັຍ 33 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ຫລື 1 ກິໂລ/300 ຕາແມັດ

+ ເລ່ງຄັ້ງທີ 2: ຫ້ລງປັກດຳໄດ້ 40-45 ວັນ, ໃສ່ຝຸ່ນຢູເລັຍ 33 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ກ່ອນເລ່ງຝຸ່ນຕ້ອງ ເສັຍຫ້ຍາ ແລະຄວນໃຫ້ນ້ຳເລິກປະມານ 5-10 ຊມ

5. ວິທີການເກັບກ່ຽວ.

ການເກັບກ່ຽວເມັດພັນຈະນິຍົມໃຊ້ແຮງງານ ຄົນ ຈະໄດ້ເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ກວ່າໃຊ້ກົນ ຈັກ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

- ກ່ອນການເກັບກ່ຽວເຂົ້າເມັດພັນຕ້ອງໄດ້ລົງ ຕັດເຂົ້າ ປົນຢ່າງນ້ອຍ 3 ຄັ້ງ ຄື: ໄລຍະແຕກກໍ, ອອກດອກ ແລະ ກ່ອນເກັບກ່ຽວ 5-7 ວັນ, ເກັບກ່ຽວເຂົ້າໃນໄລຍະທີ່ ໝາະສົມຄື 30 ວັນ ຫຼັງການອອກດອກ ຫຼືເມື່ອສັງເກດ ເຫັນເຂົ້າສຸກ ແກ່ໃນຮວງປະມານ 85%, ກ່ອນເກັບກ່ຽວ 1 ອາທິດ ຄວນລະບາຍນ້ຳອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເຂົ້າສຸກແກ່ສະໝໍ່າສະເໝີແລະສະດວກໃນ ການເກັບກ່ຽວ, ຄວນຕາກເຂົ້າໃນທຸ່ງນາປະມານ 2-3 ແດດ

6. ການຟາດເມັດພັນເຂົ້າແລະເກັບມ້ຽນ

ການຟາດເຂົ້າເປັນວຽກທີ່ຕໍ່ເນື່ອງອາດ ຈະໃຊ້ແຮງງານຄົນ ຄວນຟາດພຽງ 2-3 ບາດ ເພື່ອໄດ້ເມັດ ເຕັມດີ ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ເຂົ້າ ຊ່ວຍກໍໄດ້ທັງນີ້ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານຂອງເມັດ ພັນທີ່ຜະລິດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປົນກັບແນວພັນອື່ນ

7. ເກັບຮັກສາ

ຄວນເກັບຮັກສາໃນ ເປົາປ່ານ ຫລື ພາ ສະນະທີ່ສະອາດແລະເກັບໄວ້ໃນທີ່ ອາກາດ ຖ່າຍເທ ຫລື ລ່ວງດີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືການປູກຂະຫຍາຍເມັດພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3
ໃນລະດັບ ຊາວນາ



ໂຄງການປັບປຸງ ລະບົບ
ການຂະຫຍາຍ ແລະ ແຈກຢາຍເມັດພັນເຂົ້າ
ໂທ: 021 740254



ເດືອນ 5 ປີ 2009