

P.D.D.P 2 ໂຄງການພັດທະນາ ຊຸມນະບົດ ເມືອງຜົ້ງສາລີ

ຄ.ພ.ມ.ຜ 2 PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU DISTRICT DE PHONGSALY



ໂດຍ : ຂະແໜງສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການຕະຫລາດ

ກໍລະກົດ 2006

ພາກສະເໜີ

ຫມາກນັດເປັນພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນເຂດຮ້ອນ (ແທບອາຟລິກກາ, ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ອາຊີ). 60% ຂອງຜົນຜະລິດໃນທົ່ວໂລກແມ່ນມາຈາກແທບອາຊີ (ປະເທດຈີນ : 1 500 000 ໂຕນ).

ຫມາກນັດສາມາດບໍລິໂພກສົດ ແລະ ຍັງສາມາດນຳມາແປຮູບເປັນກວນຫມາກນັດ, ນຳເຂົ້າໂຮງງານເພື່ອແປຮູບເປັນຫມາກນັດກະບ່ອງ ຫລື ເປັນນ້ຳຫມາກໄມ້. ແລະ ນຳເຂົ້າໂຮງງານອຸດສາຫະກຳເພື່ອແປຮູບ ເປັນຫມາກນັດກະບ່ອງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດນຳເອົາຫມາກນັດມາຜະລິດເປັນເຫລົ້າດື່ມ, ຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ຍັງສາມາດນຳເອົາໃບຫມາກນັດມາເຮັດເປັນອາຫານສັດລ້ຽງໄດ້.

ຫມາກນັດປະກອບມີທາດນ້ຳຕານສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫມາກນັດຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນຫມາກໄມ້ບຳລຸງຮ່າງກາຍເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງ. ຫມາກນັດບັນຈຸທາດວິຕາມິນສູງ ແລະ ເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຢ່ອຍລະບົບກະເພາະອາຫານ.

ການຜະລິດຫມາກນັດຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພື່ອນຳມາບໍລິໂພກສົດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຫມາກນັດສົດຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. ການແປຮູບຫມາກນັດເພື່ອຈຳໜ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ. ໃນບາງເຂດ, ໂດຍສະເພາະຫມູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫລີກ, ການນຳຫມາກນັດມາຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃຫຍ່ແມ່ນຍັງມີຄວາມຍຸ້ງຍາກ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາຈາກບັນຫາຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈຳນ່າຍຫມາກນັດໄດ້ພຽງແຕ່ໃນເຂດຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ.

ການປູກຕົ້ນຫມາກນັດ

ສະພາບແວດລ້ອມວິທະຍາ

ອຸນຫະພູມເໝາະສົມສະເລ່ຍໃນການຜະລິດຫມາກນັດແມ່ນ 25 ອົງສາ. ຖ້າອຸນຫະພູມຕ່ຳຫລາຍ, ການເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຫມາກນັດຈະຊ້າ, ເນື້ອຫມາກນັດຈະອອກເປັນສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີລົດຊາດຂົມ. ຢູ່ຜົ້ງສາລີ, ປະລິມານຜົນຕົກແມ່ນມີຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຫມາກນັດ (1 200 ຫາ 1 500 ມມ/ປີ). ກໍລະນີມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ຕົ້ນຫມາກນັດກໍສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບໄດ້ສະພາບໄດ້ ແຕ່ມີການເຕີບໂຕຊ້າແດ່. ກໍລະນີຂາດນ້ຳ, ພວກເຮົາສາມາດເອົາເຟືອງມາປົກຄຸມບໍລິເວນຕົ້ນຫມາກນັດເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸມຊື່ນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການລະເຫີຍອາຍ.

ການກະກຽມພື້ນທີ່ປູກ

ດິນຫມາກນັດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນດິນເບົາ, ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ດິນກົດ. ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການປູກຕົ້ນຫມາກນັດແມ່ນດິນແກມຊາຍ (pH ຢູ່ລະຫວ່າງ 4.5 - 5.5). ນອກນັ້ນ, ຕົ້ນຫມາກນັດກໍ່ຍັງມັກດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ. ຖ້າດິນບໍ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ, ເຮົາສາມາດປັບປຸງດິນຄືນດ້ວຍການໃຫ້ຜຸ່ນອາສິດ ຫລື ຜຸ່ນວິທະຍາສາດ.

ກ່ອນຈະມີການປູກຕົ້ນຫມາກນັດ, ມັນຈະເປັນການດີຫລາຍຖ້າໄຖພວນດິນ ແລະ ປະຕາກແດດ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດຖ້າປູກພືດຊະໜິດອື່ນໆໃສ່ໃນພື້ນທີ່ດິນທີ່




ກຸ່ມໄວ້ນັ້ນໃນໄລຍະໃດນຶ່ງ ກ່ອນຈະມີການປູກຕົ້ນຫມາກນັດໃສ່ໃນຮອບໃຫມ່ຕໍ່ໄປ.

ຖ້າເປັນດິນທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງ, ຄວນປູກຕົ້ນຫມາກນັດເປັນໜານ (ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜານແມ່ນ 1,5 ແມັດ) ແລະ ຕ້ອງກະກຽມຊຸມໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົ້ນເບ້ຍຫມາກນັດທີ່ຈະປູກ.



ຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພື້ນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 1 ຫາ 2% ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບປູກຕົ້ນຫມາກນັກ. ໃນເຂດພື້ນທີ່ມີຄ້ອຍຊັນສູງ ເຖິງ 10% ກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງກະກຽມພື້ນທີ່ໃຫ້ດີ ແລະ ປູກປະປົນກັບພືດຊະໜິດອື່ນໆ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການໄຫລເຊາະດິນຂອງນ້ຳຝົນ.



ການເພາະປູກຕົ້ນຫມາກນັດ

ຕົ້ນຫມາກນັດເປັນພືດທີ່ມີອາຍຸນັບແຕ່ເວລາປູກເຖິງການເກັບກ່ຽວດົນປະມານ 15-18 ເດືອນ. ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວປີທຳອິດ, ຕົ້ນຫມາກນັດສາມາດປົ່ງໜ່ວຍແຫນອງອອກ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ຕື່ມອີກໃນປີທີ່ສອງ ແລະ ປີທີ່ສາມ. ຕົ້ນຫມາກນັດມີຮອບວຽນການປູກໃນລະຫວ່າງ ແຕ່ 4 ຫາ 5 ປີ. ຕົ້ນຫມາກນັດມັກເກີດໄດດີໃນເຂດທີ່ມີແສງແດດ (ບໍ່ຄວນປູກຕົ້ນຫມາກນັດໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີຮົ່ມບັງ).



ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນຫມາກນັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳພາຍຫລັງການເກັບກ່ຽວ ແມ່ນຄວນປະຕິບັດເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ແຫນອງອ່ອນຈໍ່ແຫນອງອອກໃຫມ່ໃນຂອບເຂດຕ່ຳສຸດຂອງລຳຕົ້ນຫມາກນັດໃນເວລາຫມາກນັດເປັນຫມາກໃຫຍ່ເຕັມທີ. ແຫນອງທີ່ຢູ່ຕ່ຳສຸດ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການໂຄ້ນລົ້ມຂອງຕົ້ນຫມາກໜ່ວຍແຫນອງເຫມາະສົມທີ່ຈະຈົ່ງໄວ້ ຄວນເລືອກປະໄວ້



ການຫຸ້ມຫໍ່ຫມາກນັດດ້ວຍໃບຫມາກນັດ ກໍ່ແມ່ນວິທີການນຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫມາກນັດໃຫຍ່ ຫລື ຕົງດີ (ແຕ່ 7 ຫາ 10 ໃບ).

ຄວາມໜາແໜ້ນໃນການປູກຕົ້ນຫມາກນັດ ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1 ຫາ 7 ຕົ້ນ/ນຶ່ງແມັດກາເລ ແລ້ວແຕ່ຜູ້ປູກຕ້ອງການ ແລະ ຈະປູກຕົ້ນຫມາກນັດພຽງຢ່າງດຽວ ຫລື ຈະປູກພືດອື່ນໆປະສົມກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ຖ້າເປັນດິນທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນສູງ, ຄວນປູກຕົ້ນຫມາກນັດເປັນໜານ (ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜານ ແມ່ນ 1,5 ແມັດ) ແລະ ຕ້ອງກະກຽມຂູມໃຫ້ແທດເຫມາະກັບຕົ້ນເບ້ຍຫມາກນັດທີ່ຈະປູກ.

ລະດູປູກຕົ້ນຫມາກນັດທີ່ເຫມາະສົມ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີນາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ຫລື ຕົ້ນລະດູຝົນ. ສິ້ນສ່ວນທີ່ນຳມາປູກແມ່ນໜ່ວຍແຫນອງ ຫລື ຈຸກຫມາກນັດ. ຄວນແກະເອົາໃບຫມາກນັດຕາມໃກ້ໆຕີນແຫນອງ ຫລື ຈຸກອອກ ກ່ອນຈະນຳໄປປູກ.

ແຫນອງ ຫລື ຈຸກທີ່ເຫມາະສົມໃນການປູກແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມຍາວ ແຕ່ 25-30 ຊມ. ນຳເອົາຈຸກ ຫລື ແຫນອງຫມາກນັດລົງຂູມທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວນັ້ນ, ຖິ້ມດິນ ແລະ ຢັດດິນໃຫ້ແໜ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຫນອງ



ຫລື ຈຸກຫມາກນັດລົ້ມ, ແຕ່ບໍ່ຄວນຢັດແຫນ້ນຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ແຫນງ ຫລື ຈຸກຫມາກນັດ ບວບຊຳ້ ແລະ ເຕີບໂຕຊຳ້.

ການໃສ່ຝຸ່ນ

■ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໃນ 2 ໄລຍະຄື :

- ① ໃນໄລຍະການເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຫມາກນັດ ໂດຍສັງເກດການເລີ່ມປົ່ງໃບອ່ອນສີຂາວ ພາຍຫລັງປູກໄດ້ໃນໄລຍະໃດ


ນຶ່ງ, ໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາ

ສາດສູດ 46 - 00 - 00,

ໃສ່ໃນອັດຕາ 1 ບວງແກງ

ສວດ/1 ຕົ້ນ ຫລື 50 ກິ

ໂລ/2 000 ຕົ້ນ. ໃສ່ບໍລິເວນຮ່ອງອ້ອມເຫງົ້າຫມາກນັດທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ (ຊຸດອ້ອມເຫງົ້າແລ້ວເອົາຝຸ່ນໃສ່ອ້ອມເຫງົ້າໃຫ້ທົ່ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາດິນຖິມຄືນ).



- ② ໄລຍະໄກ້ຈະອອກໝາກ ໂດຍສັງເກດຈາກຕົ້ນຫມາກນັດ ມີປະມານ 30 ໃບ ໂດຍນຳໃຊ້ຝຸ່ນສູດ 15-15-15, ໃສ່ໃນອັດຕາ 1 ບວງແກງສວດ/1 ຕົ້ນ ຫຼື 50 ກິໂລ/2000 ຕົ້ນ, ໃສ່ບໍລິເວນຮ່ອງອ້ອມເຫງົ້າຫມາກນັດທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ (ຊຸດອ້ອມເຫງົ້າແລ້ວເອົາຝຸ່ນໃສ່ອ້ອມເຫງົ້າໃຫ້ທົ່ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາດິນຖິມຄືນ).

ດ້ານການຄ້າ

ຢູ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ຫມາກນັດເລີ່ມຂາຍກັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນສິງຫາ. ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້, ຫມາກນັດຈະອັງຕະຫລາດ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາຖືກ ຫນ່ວຍລະ 500 ກີບ, ເບື້ອງໜຶ່ງກໍ່ເພາະເປັນລະດູການງອກຫມາກຂອງຫມາກໄມ້ໃຫ້ຫມາກຫລາຍໆຊະນິດນຳອອກມາຂາຍພ້ອມດຽວກັນ.

ການນຳໃຊ້ສານຮໍໂມນຄວບຄຸມການອອກຫມາກ ສາມາດໃຫ້ເຮົາເກັບກ່ຽວຫມາກນັດກ່ອນລະດູປົກກະຕິ ຄືເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນໄປ. ການຄວບຄຸມຫມາກນັດໃຫ້ອອກຕາມແຕ່ໄລຍະແມ່ນເຮັດໃຫ້ສາມາດຂາຍຫມາກນັດໃນລາຄາດີ ຄື 2 000 ຫາ 3 000 ກີບຕໍ່ຫນ່ວຍ.

ການນຳໃຊ້ຮໍໂມນ (ສານຄວບຄຸມການອອກຫມາກນັດ)

ສານຮໍໂມນມີຫລາຍຊະນິດ, ອະທິເຊັ່ນ :

- ❶ ຊີ້ສາມັນ : ອີທີຟອນ , ໃນກະບ່ອງບຸຈຸນຮໍຢາ 1 ລິດ
- ຊື່ການຄ້າ : ເຣດ-ຟອນ (RED-FON)
- ສັບພະຄຸນ : ໃຊ້ຄວບຄຸມການອອກຫມາກ (ຫມາກນັດ)
- ລາຄາຊື້ : 500 ບາດໄທ (ລາຄາປີ 2006)
- ແຫຼ່ງຜະລິດ : ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຈີນ



ປະລິມານນຳໃຊ້

ນຳເອົານ້ຳຮໍໂມນ 15 ເຊເຊ (ຫນຶ່ງບວງ ແກງ) ປະສົມນ້ຳ 20 ລິດ ແລະ ຝຸ່ນວິ ທະຍາສາດສູດ (46-00-00) 300 ກລາມ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ. ນຳເອົາ ຢາສ່ວນປະສົມແລ້ວ ຢອດໃສ່ກາງຍອດ ຕົ້ນຫມາກນັດທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 9-12 ເດືອນ (ຕົ້ນຫມາກນັດມີນ້ຳໜັກສົດ 2,5-3 ກິໂລກຣາມ), ໃນອັດຕາ 60 ຫາ 80 ເຊເຊຕໍ່ຕົ້ນ. ຫລືໃຊ້ມາດຕະຖານອື່ນໃນການຢອດຮໍໂມນເຊັ່ນວ່າ ນຳ ເອົານ້ຳຢາປະສົມແລ້ວບັນຈຸໃສ່ 2 ຈອກແກ້ວນ້ອຍ ຫລື ນຶ່ງຈອກ ແກ້ວທຳມະດາກັບອີກເຄິ່ງຈອກ ຫລື ປະມານ 4 ຫາ 5 ບວງແກງກໍ່ໄດ້, ແລ້ວນຳໄປຢອດໃສ່ກາງຍອດຂອງຕົ້ນຫມາກນັດ. ປະສິດທິພາບຫຼັງ ໃຊ້ຮໍໂມນຫຼາຍກ່ວາ 90% ອອກຫມາກ.



1 ບວງແກງບັນຈຸນ້ຳ
ຢາໄດ້ 15 ເຊເຊ



1 ຈອກນ້ອຍບັນຈຸນ້ຳ
ຢາໄດ້ 30 ເຊເຊ



1 ຈອກທຳມະດາບັນຈຸ
ນ້ຳຢາໄດ້ 50 ເຊເຊ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ບໍ່ຄວນປະຕິບັດການຢອດຮໍໂມນໃນເວລາແດດກ້າ ເພາະມັນຈະເປັນການເຜົາໄຫມ້ໃບ ອ່ອນຕົ້ນຫມາກນັດ. ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊຳຄັນອີກ, ການໃຊ້ຄັ້ງທີ 2 ຄວນໃຊ້ຫ່າງຈາກຄັ້ງທຳອິດຢ່າງ ຫນ້ອຍ 7 ວັນ (ກໍລະນີທີ່ວ່າ ຫຼັງຈາກຢອດໄດ້ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ເກີດມີຝົນຕົກຮຸ່ ຊຶ່ງຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຢອດຊຳຄັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ). ຫຼັງຈາກປະສົມຮໍໂມນແລ້ວ ຄວນໃຊ້ໃຫ້ຫມົດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ການເກັບກຽວ

ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ຫລັງຈາກຢອກຮໍໂມນໄດ້ໃນໄລຍະ 30 ຫາ 45 ວັນ ຫມາກນັດຈະເລີ້ມຈຸ່ຫມາກ. ຖ້ານັບແຕ່ມີລົງມືປະຕິບັດຢອກຮໍໂມນຈົນເຖິງມື້ເກັບກຽວອອກຂາຍແມ່ນມີປະມານ 140 ຫາ 180 ວັນ.

❷ ຊີ້ສາມັນ : ອີທີຟອນ

ຊື່ການຄ້າ: ອີເທຣລ 3% ຟີຈີອາ (ETHREL® 3% PGR)

ປະລິມານນຳໃຊ້

ນຳເອົາສານອີທີຟອນ 200-667 ຊີຊີ ປະລິມານ 20 ລິດ ແລະ ຝຸ່ນວິທະຍາສາດສູດ (46-00-00) 300 ກລາມ ກ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ. ນຳເອົານ້ຳຢາປະສົມແລ້ວ

ໄປຢອດໃສ່ໃຈກາງຍອດຕົ້ນຫມາກນັດທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 9-12

ເດືອນ (ຕົ້ນຫມາກນັດມີນ້ຳໜັກສົດ 2,5-

3 ກິໂລກຣາມ) ໃນອັດຕາ 60-80 ຊີ

ຊີຕໍ່ຕົ້ນ. ຫລິນຳເອົາສານອີທີຟອນ 1 ລິດ

+ ນ້ຳ 200 ລິດ + ຝຸ່ນ 3 ກລ (46-00-00)

ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ. ນຳເອົານ້ຳຢາປະສົມ

ແລ້ວນັ້ນ ໄປຢອດໃສ່ໃຈກາງຍອດຕົ້ນ

ຫມາກນັດ ໃນອັດຕາສ່ວນຄືກັນກັບສະແດງໃນຂ້າງເທິງ, ຕ້ອງຢອດໃນ ເວລາອາກາດເຢັນ.

ຫລືໃຊ້ມາດຕະຖານອື່ນໃນການຢອກຮໍໂມນເຊັ່ນວ່າ ນຳເອົານ້ຳ

ຢາປະສົມແລ້ວບັນຈຸໃສ່ 2 ຈອກແກ້ວນ້ອຍ ຫລື ນຶ່ງຈອກແກ້ວທຳມະ

ດາກັບອີກເຄິ່ງຈອກ ຫລື ປະມານ 4 ຫາ 5 ບວງແກງກໍໄດ້, ແລ້ວນຳໄປ

ຢອດໃສ່ກາງຍອດຂອງຕົ້ນຫມາກນັດ. ປະສິດທິພາບຫຼັງໃຊ້ຮໍໂມນຫຼາຍ

ກ່ວາ 90% ອອກຫມາກ.



ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ບໍ່ຄວນປະຕິບັດການຢອກຮໍໂມນໃນເວລາແດດກ້າ

ເພາະມັນຈະເປັນການເຜົາໄຫມ້ໃບ


ອ່ອນຕົ້ນຫມາກນັດ. ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊັ້ນອີກ, ການໃຊ້ຄັ້ງທີ 2 ຄວນໃຊ້ຫ່າງຈາກຄັ້ງທຳອິດ

ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ວັນ (ກໍລະນີທີ່ວ່າ ຫຼັງຈາກຢອກໄດ້ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ເກີດມີຝົນຕົກຮຸ່ ຊຶ່ງຈຳ

ເປັນຕ້ອງໄດ້ຢອດຊັ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງ). ຫຼັງຈາກປະສົມຮໍໂມນແລ້ວ ຄວນໃຊ້ໃຫ້ຫມົດພາຍໃນ 24

ຊົ່ວໂມງ.

ແຜນວາດການຢອດຮໍໂມນ ເພື່ອຄວບຄຸມການອອກຫມາກຂອງຫມາກນັດ



ລາຄາຜົນຜະລິດ ແລະ ກຳໄລເພີ່ມ/ຫມາກ (ເງິນກີບ, ປີ 2006)

ກອງ	ລາຄາຂາຍ	ຈຳນວນຕົ້ນຢອດຮໍໂມນ	ລາຍຈ່າຍ/ຕົ້ນ	ກຳໄລສຸດທິ/ຫມາກ	ຄວາມແຕ່ກຕາງ/ລະດູປົກກະຕິ
10 ເຊເຊ	2 500	12	208	2 292	1 792
20 ເຊເຊ	3 000	24	125	2 375	1 875
50 ເຊເຊ	5 000	60	83	2 417	1 917
ສະເລ່ຍ	3 500	32	139	2 361	1 861