

ການແທກສີຂອງໃບເຂົ້າ

1. ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການແທກສີຂອງໃບເຂົ້າ

ສີຂອງໃບເຂົ້າສາມາດບົ່ງບອກເຖິງຄວາມພຽງພໍ, ການຂາດແຄນ ຂອງທາດອາຫານ, ຫລື ການເກີດພະຍາດຕ່າງໆຂຶ້ນກັບຕົ້ນເຂົ້າ. ສິ່ງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍ ແມ່ນການຂາດແຄນທາດອາໄສດ (N)

ການແທກສີຂອງໃບເຂົ້າ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາຄັ້ງທຳອິດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຕໍ່ມາກໍ່ມີການພັດທະນາຂຶ້ນມາໃຫມ່ຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍ IRRI.

ການແທກສີທາງໃບແມ່ນການໃຊ້ເຄື່ອງມື ວັດແທກລະດັບທາດ N ຂອງຕົ້ນເຂົ້າ ເພື່ອແນໃສ່ໃນການຈັດການກັບຝຸ່ນ N ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

2. ແຜ່ນແທກສີ



ຮູບ: ແຜ່ນແທກສີໃບເຂົ້າ

ແຜ່ນແທກສີ ແມ່ນເຄື່ອງມື ທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ລາຄາຖືກ ເຊິ່ງຊາວນາໂດຍທົ່ວ ໄປກໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້. ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນແທກສີປຽບທຽບກັບສີຂອງໃບເຂົ້າດ້ວຍສາຍຕາເປົ່າ, ມັນບົ່ງບອກລະດັບຖານະຂອງທາດ N ທີ່ບັນຈຸ. ໃນກໍລະນີເຫັນພຶດຂາດທາດ N ຜູ້ນຳໃຊ້ກໍ່ສາມາດກຳນົດອັດຕາຝຸ່ນ N ໃສ່ໄດ້ທັນທີ ຕາມຂໍ້ແນະນຳ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນ.

ແຜ່ນແທກສີຈັດເປັນ 6 ລະດັບຄື: ແຕ່ລະດັບ (1) ສີຕອງອ່ອນ ຫາ ລະດັບ (6) ສີຂຽວຊ້ຳ ເຊິ່ງ ມີຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ N ຕາມສີ.

3. ຄວາມສຳຄັນຂອງລະດັບສີ ຫຼື ລັກສະນະຂອງສີ

ຂໍ້ສຳຄັນຂອງການອ່ານສີຂອງໃບເຂົ້າ ເພື່ອເລັ່ງຝຸ່ນ N ແມ່ນ: ຖ້າຜົນຂອງການວັດແທກໃບເຂົ້າມີຜົນ

- ຈາກລະດັບ (3)ລົງມາ, ສຳລັບແນວພັນທີ່ໃບຂຽວອ່ອນ (ສຳລັບຊະນິດເຂົ້າທີ່ມີກິ່ນຫອມ)
- ຈາກລະດັບ (4) ລົງມາ ສຳລັບເຂົ້າຕຳ (Semi- dwarf)
- ຈາກລະດັບ (5)ລົງມາສຳລັບເຂົ້າຝັນປະສົມ (Hybrids)


ນອກຈາກນັ້ນ ສີຂອງໃບເຂົ້າ ອາດແຕກຕ່າງໄປຍ້ອນວິທີການປັກດຳດ້ວຍ ເຊິ່ງມີມາດຖານການວັດແທກດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ :

ປະເພດເຂົ້າ	ນາຫວ່ານ, ນາຢອດເມັດ	ປັກດຳ
ເຂົ້າຫອມ (Aromatic rice)	—	3
ເຂົ້າຕຳ (Semi dwarf)	3	3.5 - 4
ລູກປະສົມ (Hybrid)	4	4

4. ວິທີການນຳໃຊ້ແຜ່ນແທກສີໃບເຂົ້າ

4.1 ໃຊ້ແຜ່ນແທກສີ ອ່ານສີຂອງໃບເຂົ້າ ຫຼັງຈາກປັກດຳໄດ້ 14 ວັນ ຫຼື ທຽບສີເມື່ອອາຍຸເຂົ້າໄດ້ 21 ວັນ ສຳລັບນາ ຫວ່ານ ແລະ ນາຢອດເມັດ. (ໂດຍມີການແທກເປັນປົກກະຕິໃນທຸກໆ 7 ວັນ ຫຼື 14 ວັນ. ແທກສີ ຈົນເຖິງ ວັນເຂົ້າເລີ່ມອອກດອກ).

4.2 ການແທກສີແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງຢູ່ໃນຊ່ວງດຽວກັນ 8-10 ໂມງເຊົ້າ ຫຼື 2-4 ໂມງແລງ. ໂດຍຫັນຫຼັງບັງແສງແດດໄວ້ໃຫ້ເປັນຮິ້ນ ແລ້ວອ່ານສີໃບເຂົ້າຜ່ອນບັນທຶກ.



ຮູບ: ວິທີການແທກສີຂອງໃບເຂົ້າ

4.3 ແຕ່ລະຄັ້ງແທກເອົາ 7-10 ໃບເຂົ້າ ໂດຍຊຸ່ມເອົາແບບບັງເອີນ, ເລືອກແທກໃບທີ່ສົມບູນດີ.

4.4 ເລືອກແທກໃບທີ່ຂະຫຍາຍໂຕເຕັມທີ່ ໃນ 10 ກໍເຂົ້ານັ້ນ ໂດຍແປະເຄິ່ງກາງໃບໃສ່ແຜ່ນທຽບສີ ດັ່ງຮູບຂ້າງເທິງ (ຫ້າມຖອນ ຫຼື ຕັດໃບເຂົ້ານັ້ນເດັດຂາດ)

4.5 ພາຍຫຼັງການແທກສີຂອງໃບເຂົ້າໄດ້ 7 ຫຼື 10 ໃບ

ແລ້ວຄ່າສະເລ່ຍອອກມາຕໍ່ກ່ອນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້
ນັ້ນ ຕ້ອງໃສ່ຝຸນ N , (23 Kg N/ha) ສຳລັບລະດູຝົນ
ຫຼື ໃສ່ (35 Kg N/ha) ສຳລັບລະດູແລ້ງ.

- 4.6 ປະລິມານຝຸນ N ທີ່ໃສ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບຜົນເຂົ້າ Semi dwarf
ແມ່ນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ເຂົ້ານາປັກດຳ	ລະດູແລ້ງ	ລະດູຝົນ
1	ຫຼັງການປັກດຳ 14 — 28 ວັນ	30 Kg N/ha	20 Kg N/ha
2	ຫຼັງການປັກດຳ 29 — 48 ວັນ	45 Kg N/ha	30 Kg N/ha
3	ຫຼັງການປັກດຳ 49 ວັນ ຫາ ອອກດອກ	30 Kg N/ha	20 Kg N/ha
	ເຂົ້ານາຫວ່ານ, ນາຢອດເມັດ	ລະດູແລ້ງ	ລະດູຝົນ
1	ຫຼັງການຫວ່ານ, ຢອດເມັດ 21 — 34 ວັນ	30 Kg N/ha	20 Kg N/ha
2	ຫຼັງການຫວ່ານ, ຢອດເມັດ 35 — 55 ວັນ	45 Kg N/ha	30 Kg N/ha
3	ຫຼັງການຫວ່ານ, ຢອດເມັດ 56 ວັນ — ອອກດອກ	30 Kg N/ha	20 Kg N/ha



ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



ຂໍ້ແນະນຳ ການແທກສີຂອງໃບເຂົ້າ



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 - 732 162. Mobile: 020 - 5526277
Email: cetdu@laoex.org

ຮຽບຮຽງໂດຍ :

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETDU)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)