

1. ຄວາມສໍາຄັນຂອງກ້າ


ກ້າເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການສ້າງຜົນຜະລິດ ຫຼື ໝາກຜົນເກັບກ່ຽວເຂົ້າໃນທ້າຍລະດູການ. ຖ້າຕົ້ນກ້າແຂງແຮງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປັກດຳງ່າຍ, ແຕກກໍດີ, ຕົ້ນເຂົ້າແຂງແຮງ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຂໍ້ແນະນຳໃນການຕົກກ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົ້ນກ້າທີ່ມຸກ ແລະແຂງແຮງດີ ອັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄຳວ່າ: **ຍົກສະມັດຕະພາບ** ການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

2. ວິທີຕຽມດິນຕ້າກ້າ

ດິນທີ່ຈະໃຊ້ເປັນບ່ອນເຮັດໜານກ້ານັ້ນຕ້ອງເປັນບ່ອນທີ່ຮາບພຽງ ດີໄກ່ແລ່ງນ້ຳ ເພື່ອມີນ້ຳຮັບປະກັນ, ຄວນມີຮົ້ວໜາແໜ້ນປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ສັດທຳລາຍ ແລະບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໄກ່ຮົ່ມໄມ້.

ຫຼັງຈາກຊອກບ່ອນໄດ້ແລ້ວໃຫ້ເອົາຝຸ່ນຄອກຫວ່ານໃສ່ໃນອັດຕາ 1 ຫາ 2 ກິໂລ/ຕາແມັດ, ເບັ້ງນ້ຳເຂົ້າ ແລ້ວໂຖຣຸດປະໄວປະມານ 7 ຫາ 15 ວັນ, ແລ້ວຈຶ່ງມາໂຖຄົ້ນ ແລະຄາດໃຫ້ລະອຽດແຫຼກແຫຼວ ດີ, ຖ້າມີຝຸ່ນເຄມີ ສູດ 16:20:00 ຫຼື 18:46:00 ກໍ່ໃຫ້ຫວ່ານໃສ່ ໃນ ອັດຕາ 20 ກຼາມ ຕໍ່ 1 ຕາແມັດ (ໜຶ່ງກຳ ຕໍ່ 1 ຕາແມັດ).



ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຍົກເປັນໜານກວ້າງປະມານ 2 ແມັດ ແລະລວງຍາວ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມຂອງເນື້ອທີ່ຕາກ້າ, ເຮັດຮ່ອງຂັ້ນລະ

ຫວ່າງໜານຕໍ່ໜານ, ໃຫ້ກວ້າງປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດຫຼືສອກ ໜຶ່ງ, ເພື່ອໃຊ້ເປັນທາງຍ່າງໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະເປັນ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເຂົ້າ ແລະອອກທີ່ສະດວກອີກດ້ວຍ, ຂະໜາດເນື້ອ ທີ່ລວມຂອງໜານກ້າ (ຕາກ້າ) ສໍາລັບຈະໃຊ້ກ້າປັກດຳ 1 ເຮັກຕາ, ຕ້ອງມີປະມານ 800 ຫາ 1,000 ຕາແມັດ, ສໍາລັບເຂົ້າທ່າດອກ ຄຳ 1 ແລະທ່າດອກຄຳ 5.

ສະນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກກະເສດສູນຈຶ່ງເປັນເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ສາ ມາດຍົກສູງສະມັດຕະພາບເຂົ້າໂດຍກົງໃນເນື້ອທີ່ຈຳກັດ, ນອກ ຈາກນັ້ນຍັງປັບປຸງດິນ ໃນໄລຍະຍາວອີກ.

3. ການຕົກກ້າ

ກ. ການກຳນົດເວລາຕົກກ້າ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຫ້ເລີ່ມລົງມືຕົກກ້າ ແຕ່ວັນທີ່ 15 ພະຈິກ (11) ຫາ 15 ທັນວາ (12), ແມ່ນເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ການຕົກກ້າໃຫ້ເອົາ ແນວເຂົ້າປູກທີ່ມີອາຍຸຍາວກວ່າໝູ່ຕົກງວດທຳອິດກ່ອນ (ກໍລະນີ ນຳໃຊ້ຫຼາຍ ແນວພັນ).

ຂ. ອັດຕາແນວປູກ


ການເຮັດນາແຊງຈະຕ້ອງໄດ້ປັກດຳຖືກວ່ານາປີ, ເພາະວ່າມີແສງ ແດດຫຼາຍຕົ້ນເຂົ້າຕ່ຳ ແລະລຳຕົ້ນແຂງແຮງ, ສະນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ແນວ ເຂົ້າປູກໃນອັດຕາ 80 ຫາ 100 ກິໂລ, ສໍາລັບຕົກກ້າປັກດຳ 1 ເຮັກ ຕາ.

ຄ. ການແຊ່ແນວປູກ

ກ່ອນຈະນຳແນວເຂົ້າປູກໄປແຊ່ນັ້ນຕ້ອງຝັດ, ຮ່ອນເອົາເມັດລົບ ເມັດ, ຫຍ້າ ແລະສິ່ງເຈືອປົນອື່ນໆອອກໃຫ້ໝົດໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາ ແຕ່ເມັດເຕັມໄປຕາກປະມານ 1 ຫາ 2 ແດດ, ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາເຂົ້າ ປູກໃສ່ຝັຍ ຫຼືໂຫທີ່ບັນຈຸນ້ຳ ແລະໃຫ້ຊາວເອົາເມັດທີ່ຝູຂັ້ນໜ້ານ້ຳ ອອກໃຫ້ໝົດ (ວິທີການເອົາເມັດລົບ ຫຼືເຂົ້າໜາກກາງອອກໃຫ້ໝົດ ນັ້ນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດພະຍາດເຫງົ້າເນົ້າໄດ້ ແລະຈະໄດ້

ກ້າທີ່ມຸກດີ).

ຈາກນັ້ນ, ອາດຈະເຫໃສ່ກະຕ່າ ຫຼືໂຖປານກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວແຊ່ລົງນ້ຳທີ່ສະອາດປະໄວ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືມື້ໜຶ່ງກັບຄືນໜຶ່ງ.



ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກທ່ອງຖິ້ນໃດອາກາດໜາວຈັດນັ້ນໃຫ້ຕົ້ມນ້ຳ ໃຫ້ຟືດແລ້ວເອົານ້ຳເຢັນປະສົມໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ຮ້ອນ 3 ເຢັນ, ໃຫ້ ນ້ຳພ່ອນເອົາມືຈຸ່ມລົງໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງເອົາກະຕ່າ ຫຼືກະບຸງແນວເຂົ້າ ປູກແຊ່ລົງປະໄວມື້ໜຶ່ງກັບຄືນໜຶ່ງເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ເມັດເຂົ້າງອກໄວ ຂຶ້ນ.

ງ. ການບົນແນວປູກ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງກະກຽມສະຖານທີ່ບົນເຊັ່ນ: ໃນບາງເຂດທີ່ມີອາ ກາດໜາວຄວນຂຸດຂຸນ, ສໍາລັບບົນຂະໜາດຂອງຂຸນເລິກປະມານ 45 ຫາ 50 ຊຕມ, ລວງກວ້າງສູດແລ້ວແຕ່ຈະພໍດີ, ເອົາເຟືອງຮອງ ພື້ນແລ້ວຈຶ່ງເອົາເຂົ້າປູກທີ່ແຊ່ ຊຶ່ງໄດ້ບັນຈຸໃສ່ໂຖແລ້ວນັ້ນລົງເອົາ ເຟືອງປົກເປັນຊັ້ນທຳອິດ ແລ້ວກໍ່ເອົາແພຢາງປົກເປັນຊັ້ນທີສອງ, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ເອົາເຟືອງປົກໃຫ້ໜາພໍສົມຄວນ ແລະເອົາໄມ້ ຫຼືວັດຖຸ ທີ່ໜັກເຕັງໄວ້, ມື້ຕໍ່ມາໃຫ້ເອົານ້ຳອຸ່ນພົມໂຖ່ແນວປູກແລ້ວປົກໄວ້ ຄືນ.

ສໍາລັບເຂດອົບອຸ່ນແມ່ນໃຫ້ເອົາເຂົ້າທີ່ແຊ່ນັ້ນຂຶ້ນມາແລ້ວເອົາໂຖ ປານຈຸ່ມນ້ຳໃຫ້ປຽກດີມາປົກຄຸມໃຫ້ໜັກໝົດປະໄວປະມານ 36 ຫາ 48 ຊົ່ວໂມງ, (ເອົານ້ຳຫິດມື້ເຊົ້າ ແລະມື້ແລງໃຫ້ຊຸ່ມຕະຫຼອດເວ ລາ), ເມື່ອເຫັນໝໍ້ເຂົ້າອອກປະມານ 3 ຫາ 5 ມມ, ແລ້ວຈຶ່ງນຳເອົາ

ໄປຫວ່ານໃສ່ໝານກ້າທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນ.

ຈ. ການຫວ່ານກ້າ

ເມື່ອທີ່ຕາກ້າ 1 ແມັດມົນທົນ, ຕ້ອງຫວ່ານກ້າທີ່ງອກແລ້ວປະມານ 80 ຫາ 100 ກູນ ຂອງເມັດແຫ້ງ, ໃຫ້ຫວ່ານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ການຫວ່ານນັ້ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ເມັດເຂົ້າຝັງປະມານ 2 / 3 ຄື ໃຫ້ສິ້ນໜຶ່ງຂອງເມັດເຂົ້າຝັງດິນຂຶ້ນມາ, ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຫວ່ານກ້າເວລາດິນຕາກ້າພໍແຂ້ງເປັນຕົ້ນພໍດີ ງາມ, ໝາຍວ່າບໍ່ຄວນໃຫ້ໜ້າດິນຂອງຕາກ້າແຫຼວເກີນໄປ ເພາະວ່າເວລາຫວ່ານນັ້ນເມັດເຂົ້າຈະຫຼົບລົງຕົນໂພດ ແລ້ວກໍຈະພາໃຫ້ການເບິ່ງໜ້າຂອງກ້າຫຍຸ້ງຍາກ, ກົງກັນຂ້າມຫາກໜ້າດິນ ຂອງໝານກ້ານັ້ນແຫ້ງເກີນໄປ, ເວລາຫວ່ານກ້າເມັດເຂົ້າຈະບໍ່ຈົມດິນແລ້ວ ນົກ, ໝູ, ມົດ, ແມງສັດຕູຜິດອື່ນໆ ກໍຈະມາກິນໝົດ.

ສ. ການບົວລະບັດຮັກສາໝານກ້າ

ຫຼັງຈາກຫວ່ານກ້າ 3 ຫາ 4 ວັນແລ້ວ, ໃຫ້ຄ່ອຍເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າຕາກ້າ ການເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າໃນໄລຍະທຳອິດບໍ່ໃຫ້ຖ້ວມຕົ້ນກ້າ, ລະດັບນ້ຳຈະຕ້ອງໃຫ້ພໍດີຖ້ວມໜ້າດິນປະມານ 1 ຊຸດນ ກໍພໍ, ໃນກໍລະນີຫຼາຍໂພດກໍໃຫ້ເບິ່ງອອກ, ເມື່ອອາຍຸກ້າປະມານ 10 ວັນແລ້ວ, ໃຫ້ເບິ່ງນ້ຳເຂົ້າຂັງໄວ້ ໂດຍໃຫ້ຮັກສາລະດັບນ້ຳຈາກໜ້າດິນຂຶ້ນໄປ, ປະມານ 5 ຊຸດນ. ໃນກໍລະນີທີ່ບ່ອນໃດມີລົມພັດແຮງເປັນປະຈຳ ຫຼືໃນໄລຍະອຸ່ນຫະພູມຂອງອາກາດມີຄວາມໜາວຈຳດັ່ງນັ້ນໃຫ້ຊອກຫາໄປໄມ້ ຫຼືຜ້າຢາງໄປລ້ອມໝານກ້າໄວ້, ເຮັດແນວນີ້ກໍເພື່ອຮັກສາອຸ່ນຫະພູມຢູ່ໝານກ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ຊ. ອາຍຸຂອງກ້າ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນເກັບກ່ຽວສູງ, ອາຍຸກ້າທີ່ຈະນຳໄປປັກດຳຕ້ອງນອນໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ 20 ຫາ 25 ວັນ, ແຕ່ວ່າໃນລະດູແລ້ງນີ້ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນອາກາດເລັ່ມເຢັນ ແລະໜາວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນ 12 ສາກົນເປັນຕົ້ນໄປ ຍ້ອນອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ແນວພັນເຂົ້າເປັນພັນປັບປຸງ, ຕົ້ນກ້າທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 20 ວັນແລ້ວກໍອາດອ່ອນນ້ອຍ ແລະຕົ້ນສັ້ນຈົນບໍ່ສາມາດຈະຫຼົກໄດ້ຊ້ຳ, ໃນກໍລະນີເຊັ່ນນີ້ກໍປ່ອຍໃຫ້ກ້າມີໄປເບິ່ງ 4 ຫາ 5 ໄປ, ຈຶ່ງຫຼົກໄປປັກດຳກໍໄດ້.



Laos Extension for Agriculture Project

P.O. Box 9159

Vientiane, Lao P.D.R.

Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277

Email: leap@laoex.org

Email: cetdu@laoex.org

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້


ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ

ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ຂໍ້ແນະນຳ

ເຕັກນິກການຕົກກ້ານາແຊງ



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ: CETDU

(ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນສູນກາງ)

ຮ່ວມກັບ:

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)