

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດຖະນາຖາວອນ

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ແນະນຳ

ເຕັກນິກການປູກລຳໂຍ ເງິນລ້ານ

[ສະຫັບສະຫຼຸບໂດຍ]

[ຄຸງການສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ LEAP]

[Laos Extension for Agriculture Project]

[Date]

ສາລະບານ

ບົດໃຈການສະສິດ ແລະ ການປະຕິບັດດູແລຮັກສາ	3
ສະມາບດີນຜ້າອາກາດທີ່ເພາະສົມ	3
ວິທີການປູກລຳໂຍ	4
ການປະຕິບັດຫຼັງຈາກປູກ	4
ຂັ້ນຕອນການຕັດກົ່ງງ່າ	5
ລັກສະນະພຶດສາສາດ ແລະ ສາຍພັນລຳໂຍ	5
ລັກສະນະພຶດສາສາດ	6
ການຈັດການປຸ້ຍ ແລະ ນ້ຳໃນລຳໂຍ	6
ການໃຫ້ປຸ້ຍຫາງໃບຂອງລຳໂຍ	8
ໂຊດ / ພະຍາດ ຂອງລຳໂຍ	9
ໂຣດຈຸດສີນ້ຳຕານ (Algal Spot)	9

NAFES ໜ່ວຍງານ ຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ P.O. Box 811, Vientiane Lao P.D.R. Tel / Fax: 021 - 740252		 Training and Development Unit
Recd. No.: 03 AUG 2007	Call No.: 1131	

ບັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ການປະຕິບັດດູແລຮັກສາ

ສະພາບດິນຜ້າອາກາດທີ່ເພາະສົມ

- **ດິນ:** ໂດຍທົ່ວໄປ ຄວນເປັນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ແລະ ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກເປັນແຫຼ່ງທີ່ມີທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອອກດອກຕິດໝາກ ເຊັ່ນ ດິນຕະກອນຫຼືດິນນ້ຳໄຫຼ (Alluvial Soil) ຊຶ່ງເປັນດິນທີ່ມີໜ້າດິນລືກ ເກີດຈາກການຫັບຖິ້ມຂອງຕະກອນດິນທີ່ໄດ້ ຈາກການຖືກນ້ຳທ້ວມ ດິນຊະນິດນີ້ຈະພົບຫຼາຍໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ຳສາຍໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ ແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຕົ້ນ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າບໍລິເວນລຸ່ມນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ຈະປູກລຳໂຍໄດ້ດີນຳ ຊຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການປຸ້ຍເລີຍກໍຍັງໄດ້ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ການຜະລິດລຳໂຍກໍນຳໃຊ້ປຸ້ຍເຄມີເຂົ້າຊ່ວຍອີກທາງໜຶ່ງເຊັ່ນກັນ.
- **ນ້ຳ:** ການປູກລຳໂຍຈຳເປັນຕ້ອງມີນ້ຳຊົນລະປະທານເຂົ້າຊ່ວຍໂດຍສະເພາະ ໃນຊ່ວງຫຼັງອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກອ່ອນໃນເດືອນ ມັງກອນ (1) ຫາ ເດືອນ ເມສາ (4) ໂລຍະທີ່ຕິດໝາກອ່ອນນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ປຸ້ຍທາງດິນ 1 ຄັ້ງ ດັ່ງນັ້ນດິນຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພໍ ເພື່ອລະລາຍປຸ້ຍໃຫ້ຮາກໄດ້ດູດຊົມເຂົ້າສູ່ລຳຕົ້ນໄປຫາໃບ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການສັງເຄາະແສງ ແລະ ສົ່ງອາຫານໄປຫາໝາກອ່ອນໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງອາໄສນ້ຳຝົນຈາກເດືອນພຶດສະພາ (5) ຈົນເຖິງເດືອນ ສິງຫາ (8) ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງການເກັບກ່ຽວ.
- **ອຸນຫະພູມ:** ນັບເປັນບັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າທາດອາຫານ ແລະ ນ້ຳ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງກ່ອນອອກດອກນັ້ນລຳໂຍຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານຄວາມໜາວເຢັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລຳໂຍໃຫ້ເກີດຕາດອກ ອຸນຫະພູມໃນຊ່ວງນັ້ນຢູ່ລະຫວ່າງ 10 - 15 ອົງສາເຊ ດິນເຖິງ 1 - 2 ເດືອນ (ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນທັນວາ) ແລະ ມັກພົບເລື້ອຍວ່າມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນມາ ແລະ ມີຝົນ ໃນລະຫວ່າງນີ້ເປັນບາງຊ່ວງ ໃນຊ່ວງນີ້ລຳໂຍເຮັດໃຫ້ລຳໂຍທີ່ຝັກຕົວມາໄດ້ໂລຍະໜຶ່ງແຕກໃບອ່ອນອອກມາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຫາກບໍ່ມີການຈັດການໜ້າລາຍໃບອ່ອນດັ່ງກ່າວຖິ້ມໄປ ໃບກໍຈະແກ່ບໍ່ທັນອອກດອກໃນປີນັ້ນເຮັດໃຫ້ລຳໂຍເວັ້ນປົກໄດ້.
- **ການຂະຫຍາຍຜົນ:** ການຂະຫຍາຍຜົນລຳໂຍໄດ້ຫຼາຍວິທີໄດ້ແກ່:
 1. **ວິທີການປູກດ້ວຍເມັດ:** ວິທີນີ້ຊາວກະສິກອນທົ່ວໄປບໍ່ນິຍົມ ເນື່ອງຈາກໃຫ້ໝາກຊ້າ ແລະ ໝາກທີ່ໄດ້ມັກບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຄື ເປັນໝາກນ້ອຍ ເນື້ອນ້ອຍ ເນື້ອແຫຼວ ແມ່ນຈະມີລັກສະນະໝາກດີກກ່າຈົ່ງແຕ່ມີຄຸນນະພາບທາງການຄ້າ ແຕ່ວິທີນີ້ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ນັກບັບປຸງຜົນເພາະຕ້ອງຄັດເລືອກລູກປະສົມຕ່າງໆຈະການປູກດ້ວຍເມັດ.
 2. **ວິທີຕິດຕາ ແລະ ສຽບຍອດ:** ເປັນວິທີທີ່ເພາະສົມກັບການປູກດ້ວຍເມັດໄວ້ກ່ອນແລ້ວໃນແປງປູກ ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ກະທົບກະເທືອນກັບຮາກແກ້ວ ການເຮັດໃນເຮືອນປູກປູກຊ້ານັ້ນນອກຈາກຈະເສຍເວລາກ້າເບ້ຍຈາກເມັດແລ້ວ ຕອນແຍກລົງຖິງປູກກໍຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຮາກແກ້ວຖິ້ມໄປ ປູກໃນຖິງເມື່ອອາຍຸ 8 - 12 ເດືອນ ຈຶ່ງຈະປ່ຽນຍອດໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຊ້າໄວ້ອີກປະມານ 1 ປີ ຈຶ່ງນຳລົງປູກກໍຕ້ອງຕັດແຕ່ງຮາກອີກຄັ້ງໜຶ່ງບໍ່ເຊ່ນນັ້ນຮາກຈະຄົດໄປມາຫຼາຍ ເນື່ອນຳໄປປູກແລ້ວເກີດ

ອາການທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຮາກຂັດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ປະສົບກັບບັນຫາເລື່ອງການໂຄ່ນລົ້ມຂອງຕົ້ນ.

3. **ວິທີການຕອນກິ່ງ:** ເປັນວິທີທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ເປັນວິທີທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກເຮັດໄດ້ງ່າຍໃດ້ຜົນດີ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍພຽງປະມານ 45 - 60 ວິນ ກໍ່ສາມາດຕັດກິ່ງໄປຊ້າໃດ້ ແລະ ໃດ້ຂະໜາດຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ຄວາມແຂງແຮງກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບກິ່ງທີ່ເລືອກ ຕ້ອງແຂງແຮງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແລະ ເມື່ອນຳມາຊ້າແລ້ວການປະຕິບັດດູແລຮັກສາໃດ້ດີສຳໃດ້ວິທີ ການຕອນນີ້ເຖິງກິ່ງຈະບໍ່ມີຮາກແກ້ວ ກໍ່ຕາມແຕ່ກໍ່ສາມາດງອກຮາກແມ່ນຈະບໍ່ໃຫ່ຍແຂງແຮງເທົ່າຮາກແກ້ວແຕ່ສາມາດຍັງເລິກລົງດິນໃດ້ເຊັ່ນກັນ.

ວິທີການປູກລຳໂຍ

1. **ໄລຍະປູກໂດຍຫົວໄປ:** ຈະປູກລຳໂຍໄລຍະ 10 x 10 ແມັດ ຫຼື 8 x 8 ແມັດ. ລຳໂຍເລັ່ມອອກຕອກຕິດໝາກເມື່ອອາຍຸໃດ້ 3 - 4 ປີເຊິ່ງມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງຊົງຜຸນພຽງປະມານ 2 - 3 ແມັດ ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຊ່ວງລຳໂຍຕົວຍັງນ້ອຍຄວນປູກຜິດລົ້ມລູກຫຼືໄມ້ໃຫ້ໝາກຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ໃດ້. ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບຍັງສາມາດກຳຈັດວັດສະຜິດໄປໃນຕົວດ້ວຍ. ເມື່ອມີການໃຫ້ປຸຍ ແລະ ນ້ຳກັບຜິດແຊມລຳໂຍກໍ່ຈະໃດ້ຮັບປຸຍ ແລະ ນ້ຳນັ້ນດ້ວຍໂດຍສະເພາະຖ້າມີການປູກຜິດແຊມໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ມີການໃຫ້ນ້ຳກັບຜິດແຊມອິດດ້ວຍກໍ່ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລຳໂຍໃດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ນຊື່ນ ເຊິ່ງມີທິດວ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລຳໂຍໃດ້ດີຂຶ້ນ ນອກຈາກນັ້ນ ວັດສະຜິດເລົ່ານັ້ນຍັງສາມາດນຳມາເປັນປຸຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.
2. **ການກຽມຂຸມປູກ:** ປົກກະຕິຂຸມຂະໜາດ 80 x 80 x 80 ຂຸມ ໂດຍປະມານແຕ່ວາດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕ່ຳຈະຂຸດໃຫ້ຂຸມກວ່າງຂຶ້ນໃສ່ຝຸນຄອກປະສົມກັບດິນອັດຕາສ່ວນ 1 : 1 ແລະ ໃສ່ຝຸນຮອງກັນຂຸມລະ 2 - 3 ກຸມ. ນຳດິນທີ່ປະສົມກັບຝຸນຄອກ ແລະ ຖິ້ມຂຸມໃຫ້ສູງຈາກລະດັບໜ້າດິນຂຶ້ນ ປະມານ 15 - 20 ຂຸມ. ຄວນມີການຕັດຮາກກ່ອນປູກລົດຝຸນຖ້າບໍ່ຕັດຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງລຳໂຍຊ້າຊ້າ ແລະ ມີການໂຄ່ນລົ້ມສູງຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາລົງຂຸມ ແລະ ຜັງດິນໃຫ້ແໜ້ນສູງຈາກໜ້າດິນ ປົກກະຕິເລັກນ້ອຍ ທັງນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຖວ້ມຂັງຫຼັງຈາກປູກເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫຼັງຈາກຖິ້ມດິນແລ້ວຕ້ອງຫຼີດນ້ຳໃຫ້ປຽກ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ດິນຕິດກັບກະເບົາຊ້າຮາກຈະເລິກລົງສູ່ດິນໃດ້ສະດວກ.

ການປະຕິບັດຫຼັງຈາກປູກ

1. **ການປູກໄມ້ບັງລົມ (wind break)** ເນື່ອງຈາກວ່າມີປະສົບກັບບັນຫາຝ້າຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີຢ່າງໜ້ອຍເຊິ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນລະດູຝົນປີທີໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນຊ່ວງປ່າໂຍຕິດໝາກຂະໜາດໃຫ່ຍພໍສົມຄວນແຕ່ຍັງເກັບກຽວບໍ່ທັນໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຜົນສະດີດິນໃນປີທີ່ໜຶ່ງບໍ່ແນ່ນອນໜ້ອຍຫຼືດຽວ ສະນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້ລວງໜ້າ ຈຶ່ງຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງປູກຜິດບັງລົມຄວບຄູ່ກັບການປູກລຳໂຍດັ່ງແຕ່ປີທຳອິດໄມ້ບັງລົມອາດເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດອື່ນທີ່ແຂງແຮງ. ແຕ່ມີຂໍ້ຄວນ

ລະດັບຄືຈະພົບຮາກ ແລະ ອິນເຈົ້າຂອງໄມ້ບັງລົມມາລົບກວນລ່າໂຍຊຶ່ງຄວນປູກຮ່າງຈາກລ່າໂຍ
ປະມານ 10 -20 ແມັດເປັນຢ່າງຕໍ່າ.

2. ການເຮັດອິນເຈົ້າ: ໂລຍະທຳອິດຂອງການປູກຄວນບັງລົມພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນກ້າທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ
ເພາະຊ່າຍັງບໍ່ເຄີຍຊືນກັບແສງແດດ ດຈະເຮັດໃຫ້ໃບແຮ້ງ ແລະ ລົມໄດ້ແຕ່ຖ້າເປັນຕົ້ນກ້າທີ່ຢູ່ໃນກາງ
ແຈ້ງຢູ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດອິນເຈົ້າ ຂໍແຕ່ມີຄວາມຊຸມຊື່ນທີ່ພໍພຽງເພາະຕົ້ນກ້າຊະນິດນີ້ທົນ
ຫານຕໍ່ແສງແດດຢູ່ແລ້ວ.
3. ການປູກພືດຄຸມດິນ: ພືດຄຸມດິນທີ່ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ແກ່ພຽງພືດຕະກູນຖົ່ວຕ່າງໆ ທີດດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ
ເພີ່ມອິນຊີວັດຖູໃນດິນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປ້ອງກັນການສະລ້າງໄດ້ດີ. ກໍ່ລະນີທີ່ປູກໃນບໍລິ
ເວນທີ່ລາກຊັນຫຼາຍແຕ່ ໃນພື້ນທີ່ຮາກພຽງມັກມີບັນຫາຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຮາກຂອງພືດຄຸມດິນເຂົ້າໄປ
ລົບກວນລະບົບຮາກຂອງລ່າໂຍ. ແຕ່ພົບວ່າການປູກພືດຄຸມຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ລ່າ
ໂຍ ຊ້າກວ່າການທີ່ແປງຕັດຫຍ້າ ແລະ ໂຖພວນດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປູກພືດຄຸມໃຫ້ຮ່າງຈາກ
ຊົງພຸ່ມຂອງລ່າໂຍປະມານ 2 ແມັດເປັນຢ່າງນ້ອຍ.
4. ການສ້າງຊົງພຸ່ມຂອງລ່າໂຍ: ການສ້າງຊົງພຸ່ມຂອງລ່າໂຍໃຫ້ເປັນຕົ້ນຂັ້ນໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປະປອຍ
ໃຫ້ເກີດກິ່ງກ້ານເມື່ອສູງຈາກພື້ນດິນປະມານ 50 ຊມ. ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກິ່ງ
ກ້ານແຂງແຮງກວ່າທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເກີດກິ່ງກ້ານນ້ອຍຈາກໂຄນຕົ້ນ. ເຊິ່ງເປັນຫຼາຍກິ່ງນ້ອຍໆ.
ເຊິ່ງມີບັນຫາສື່ຕົກຂັ້ນໃນພາຍຫຼັງ

ຂັ້ນຕອນການຕັດກິ່ງງ່າ

ເມື່ອລ່າໂຍຕັ້ງພຸ່ມແລ້ວກໍ່ເລີ່ມມີການຕັດກິ່ງງ່າໄດ້ແລ້ວ ໂດຍການຕັດກິ່ງນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ໃນພຸ່ມທີ່ຕີບໜາ
ອອກບາງ ເມື່ອລ່າໂຍອອກດອກຕິດໝາກແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕັດແຕ່ວກິ່ງພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວໝາກແລ້ວ
ຄວນຕັດແຕ່ງໂດຍບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ຊົງພຸ່ມມີຄວາມສູງຫຼາຍ ແຕ່ຈະລ້ຽງກິ່ງໃຫ້ແຜ່ອອກທາງດ້ານຂ້າງຈະດີກວ່າ
ເພາະຈະສະດວກຕໍ່ການພົ່ນສານເຄມີ ແລະ ເກັບກ່ຽວດີໄປ ແມ່ນວ່າອາດຕ້ອງໄຊ້ໄມ້ຄ້າແຕ່ກໍ່ເປັນໄມ້ຄ້າທີ່
ສັ້ນໆທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີລາຄາຖືກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດໃຫ້ໂດຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ຈະເຮັດໄດ້ ໃນອານາຄົດ.

ລັກສະນະພືດສາສາດ ແລະ ສາຍພັນລ່າໂຍ

ລ່າໂຍເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຄິ່ງເຂດຮ້ອນ ທີ່ມີລັກສະນະບາງຄ້າຍຄືກັບໝາກລົມຈີ່ ແລະ
ໝາກງາະ ມີຊື່ວິທະນະຍາສາດວ່າ *Euphoria Longana Lamk, Cambess or Dimocarpus*
Longan, Lour or Nephelium Longana, ຢູ່ໃນວົງຕະກູນ *Sapindaceae or Soapberry* ຊຶ່ງ
ມີພືດທີ່ຈັດຢູ່ໃນວົງຕະກູນນີ້ເຖິງ 130 ສະກຸນ (*Genus*) ປະມານ 1,100 ຊະນິດ (*Species*).

ລັກສະນະພຶດສາສາດ

- 1. **ລຳຕົ້ນ:** ລຳໂຍເປັນໂມ້ໃຫ້ໝາກຢືນຕົ້ນ ທີ່ມີຊິງພຸ່ນແຜກຮ່າງຂະໜາດຂອງຊິງພຸ່ນມີຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດກາງຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບແນວພັນ ເມື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ລຳຕົ້ນຈະສູງປະມານ 10 - 20 ແມັດ ເນື້ອໂມ້ອ່ອນເຮັດໃຫ້ກິ່ງກ້ານຫຼັກງ່າຍ ເບືອກ ແລະ ລຳຕົ້ນບໍ່ລຽບ ແລະ ມີສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີເທົາ.
- 2. **ພາກສ່ວນໃບ:** ລັກສະນະຂອງໃບເປັນໃບຮ່ວມທີ່ປະກອບດ້ວຍໃບອ່ອນຢູ່ເທິງກ້ານໃບຮ່ວມກັນ (Pinnately compound leaves) ກ້ານໃບຮ່ວມຍາວປະມານ 4 - 6 ຊມ. ໃບຍ່ອຍມີ 2 - 5 ຄູ່ ແລະ ຈັດລຽນຕົວໃນລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັນ ຫຼື ສະລັບກັນ ຮູບຮ່າງໃບຍ່ອຍເປັນຮູບວີ ຫຼືຮູບຫອກກວ້າງ 3 - 6 ຊມ. ແລະ ຍາວ 7 - 15 ຊມ. ຂອບໃບລຽບ ແລະ ບໍ່ມີວນປາຍໃບ ຖານໃບຂ້ອນຊ້ຳປ້ານ ດ້ານຫຼັງໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມກວ່າດ້ານທ້ອງໃບ ຜິວໃບດ້ານຫຼັງລຽບ ສ່ວນດ້ານທ້ອງໃບສາກເລັກນ້ອຍ.
- 3. **ຊໍ່ດອກ ແລະ ດອກ:** ຊໍ່ດອກລຳໂຍເປັນແບບ compound dichasis ຊຶ່ງມີການແຕກກ້ານດອກອອກເປັນ ຖ່າຈາກກ້ານທີ່ແຕກ ແລະ ແຕ່ລະກ້ານຖ່ານ້ານຈະແຕກຖ່າອີກຄັ້ງ ຊໍ່ດອກເກີດຈາກຕາດອກທີ່ບໍ່ລິເວນປາຍກິ່ງ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍອາດຈະເລີນຕາຊ້າງຂອງກິ່ງໄດ້. ຄວາມຍາວຂອງຊໍ່ດອກປະມານ 20 - 50 ຊມ. ການຮຽງຕົວຂອງຊໍ່ດອກເປັນແບບ panicle ແລະ thyrse.
- 4. **ພາກສ່ວນໝາກ:** ຈັດເປັນໝາກດ່ຽວທີ່ມີຮູບຮ່າງຂ້ອນຂ້າງກົມ ຫຼືຮູບໂຂ່ ເບືອກຂອງໝາກມີສີນ້ຳຕານອ່ອນ ຜິວຂອງເບືອກເປັນຕຸ່ມ ຫຼືເກືອບລຽບແລ້ວແຕ່ແນວພັນ ຂະໜາດຂອງໝາກແຕກຕ່າງກັນຕາມແນວພັນ ເນື້ອຂອງລຳໂຍຜິວພະນາມາຈາກກ້ານໄຂ້ ມີສີຂາວຄ້າຍບຸ້ນ ຂາວຊຸ່ນ ຫຼືສີຊຸ່ນພູ ຫຼືແຕກຕ່າງກັນໄປລັກສະນະເນື້ອແສ່ ແທ້ງ ກອບ ຫຼື ໜຽວ ຕະຫຼອດເຖິງລົດຊາດຈະແຕກຕ່າງກັນຕາມແນວພັນ.
- 5. **ພາກສ່ວນແກ່ນ:** ມີລັກສະນະກົມຈົນເຖິງກົມແບນ ເບືອກຫຸ້ນເມັດສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ ຫຼືສີດຳເປັນມັນສ່ວນທີ່ຕິດກັບຂ້ວນເມັດເປັນວົງກົມສີຂາວທີ່ມີລັກສະນະນ້ອຍ ຫຼືໃຫຍ່ຕ່າງກັນຕາມແນວພັນ.

ການຈັດການປູ່ຍ ແລະ ນ້ຳໃນລຳໂຍ

ລຳໂຍເປັນພືດທີ່ໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດຍາວນານ ໂດຍນັບແຕ່ອອກດອກໃນເດືອນມັງກອນ (1) ຈົນເຖິງເດືອນສິງຫາ (8) ປະກອບກັບພາກເໜືອຝືນຈະໝົດໃນເດືອນຕຸລາ (10) ເຮັດໃຫ້ລຳໂຍມີເວລາໃນການຕຽມຕົ້ນ ສ້າງຄວາມສົມບູນໃຫ້ຜົນຜະລິດການອອກດອກໃນປີຕໍ່ໄປພຽງ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ນອກຈາກນັ້ນການສົ່ງເສຍທາດອາຫານໄປກັບຜົນຜະລິດທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງຕົ້ນລົດນ້ອຍຖອຍລົງອີກດ້ວຍ ການຈັດການປູ່ຍ ແລະ ນ້ຳໃຫ້ຕົ້ນລຳໂຍມີຄວາມສົມບູນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ວ່ອງໄວຫັນກັບເວລາເປັນແນວທາງທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຕົ້ນລຳໂຍທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ຈຳມີລະບົບຮາກລືກ ປະມານ 1,5 ຫາ 2 ແມັດ ແລະ ປະລິມານນ້ຳທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລຳໂຍຄື 1,200 ເມ / ຢື ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຈັດການປູ່ຍ ແລະ ນ້ຳໃນລຳໂຍພໍຈະແຍກການດຳເນີນການໄດ້ 2 ໄລຍະຄື:

1. ໂລຍະຕົ້ນລ່າໂຍຍັງບໍ່ທັນມີຜົນສະດີດ (ອາຍຸ 1 ຫາ 4 ປີ): ໃນໂລຍະນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ອາຫານ ແລະ ທາດບຳລຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນລ່າໂຍໄດ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ທາງດ້ານຊີວິດແສຍກ່ອນ.
 - (1). ປີທີ 1, ຄວນໃສ່ປຸຍດອກ 1 ປີບ ແລະ ເຄມີສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 100-150 ກຼາມ / ຕົ້ນ / ຄັ້ງ ໂດຍໃສ່ 3 ຄັ້ງໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ ແລະ ເດືອນກັນຍາ ທຸກຄັ້ງທີ່ໃສ່ປຸຍເຄມີຄວນມີການຫຼີດນ້ຳຕາມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍທາດອາຫານໂດຍສະເພາະໂນໂຕຣເຈນ ແຕ່ຫາກຫຼັງໃສ່ປຸຍເຄມີຜົນຕົກ ການຫຼີດນ້ຳກໍ່ຈຳເປັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄວນມີການພວນດິນເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໂລຍະນີ້ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຈັດການໃດໆ ອີກເລີຍ ເພາະຈະເປັນການໄປລົບກວນລະບົບຮາກຂອງລ່າໂຍຊຶ່ງກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງດີໃຫ້ຢຸດສະງັກກໍ່ເປັນໄດ້. ສຳລັບການໃຫ້ນ້ຳປີທຳອິດຄວນໃຫ້ນ້ຳແກ່ລ່າໂຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຖ້າຫາກມີຜົນຕົກກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫຼີດນ້ຳເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ໃນກໍລະນີຫາກເກີດມີນ້ຳຂັງກໍ່ຄວນລະບາຍນ້ຳອອກຈາກບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນ. ສຳລັບສ່ວນທີ່ມີບັນຫາໃນການຈັດຫນ້າ ຫຼືມີບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຕະຫຼອດໃນຕົ້ນລະດູແລ້ງ ຄວນລົດການໃຫ້ນ້ຳເພື່ອໃຫ້ລ່າໂຍພັກຕົວຊ່ວງລະດູແລ້ງ ເພາະຖ້າໃຫ້ນ້ຳແກ່ຕົ້ນລ່າໂຍບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼືບໍ່ພຽງພໍກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນລ່າໂຍຕາຍໄດ້. ຕະຫຼອດໂລຍະປີທຳອິດທີ່ປູກລ່າໂຍນັ້ນ ບໍ່ຄວນລົບກວນບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນຂອງລ່າໂຍຖ້າບໍ່ຈຳເປັນແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນ ການກຳຈັດວັດສະດີບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນບໍ່ຄວນໃຊ້ຈັກ ຊຶ່ງຈະເປັນອັດຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຮາກຂອງລ່າໂຍທີ່ກຳລັງຕັ້ງຕົວ ເຮັດໃຫ້ການດູດນ້ຳ ແລະ ທາດອາຫານຂະຫຍາຍໄປໄດ້. (2). ປີທີ 2 - 4, ຄວນໃສ່ປຸຍດອກໃນອັດຕາ 2-4 ປີບ / ຕົ້ນ ຕາມອາຍຸຂອງຕົ້ນລ່າໂຍສຳລັບວິທີການໃສ່ນັ້ນສາມາດຫວ່ານໃສ່ບໍລິເວນລຸ່ມຂອງຊີງຜຸ່ມກໍ່ໄດ້ ແມ່ນວ່າຈະມີເສຍວັດສະດີຄຸນຢູ່ກໍ່ຕາມ ນອກຈາກນັ້ນການຫວ່ານປຸຍດອກທັບເສຍວັດສະດີເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນການຊ່ວຍເລັ່ງໃຫ້ເສຍວັດສະດີທີ່ປົກຄຸມຢູ່ ຍ່ອຍສະຫຼາຍກາຍເປັນອິນຊີວັດ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນດິນດັ່ງກ່າວມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເພີ່ມຂຶ້ນທັງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີອີກດ້ວຍ, ສ່ວນປຸຍເຄມີນັ້ນຄວນໃສ່ສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 200 - 300 ກຼາມ ແລະ ປຸຍສູດ 46-0-0 ຫຼືຢູເຣຍ ໃນອັດຕາ 100 - 200 ກຼາມ / ຕົ້ນ / ຄັ້ງ ໂດຍໃສ່ 3 ຄັ້ງໃນລະຫວ່າງເດືອນ ພຶດສະພາ ກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນກັນຍາ, ການໃສ່ສາມາດຫວ່ານໃສ່ຊີງຜຸ່ມ ຫຼືວິທີຂຸດໃສ່ເປັນຈຸດໆ ໂດຍຮອບຂອງຊີງຜຸ່ມ ແລະ ຖິ້ມ ຈາກນັ້ນຄວນຫຼີດນ້ຳຕາມທຸກຄັ້ງ ໃນກໍລະນີໃສ່ປຸຍດ້ວຍການຫວ່ານ, ສຳລັບການໃຫ້ນ້ຳໃຫ້ປະຕິບັດຕາມປີທຳອິດ.
2. ໂລຍະຕົ້ນລ່າໂຍໃຫ້ຜົນສະດີດ (ອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປ): ການຈັດການປຸຍ ແລະ ນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ສາມາດແຍກອອກເປັນ 3 ໂລຍະຄື: (1). ໂລຍະປຳລຸງຕົ້ນໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕແລ້ວສົມບູນ: ໃສ່ປຸຍເຄມີສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 2 - 3 ກິໂລກຼາມ / ຕົ້ນ ຕາມອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດຂອງຊີງຜຸ່ມ ຂຸດໃສ່ເປັນຈຸດໆ ບໍລິເວນຮອບຊີງຜຸ່ມ ໃສ່ຊ່ວງກ່ອນການເກັບກ່ຽວ 2 ອາທິດ (ປະມານເດືອນ ສິງຫາ), ຫຼັງຈາກຂຸດຂຸນໃສ່ປຸຍແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫຼີດນ້ຳຕາມກໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເກັບກ່ຽວຜົນສະດີດທີ່ອອກດອກຕິດຜົນໃນປີກ່ອນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ສາມາດຕັດຕົງໆໄດ້ທັນທີ ແລ້ວຈຶ່ງຫຼີດນ້ຳຢ່າງເຕັມທີ ໃສ່ປຸຍເຄມີອີກຄັ້ງໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນກັນຍາ ເຖິງຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ໂດຍໃສ່ປຸຍສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 1 - 3ກິໂລກຼາມ / ຕົ້ນ ຮ່ວມກັບປຸຍສູດ 46-0-0 ຫຼືຢູເຣຍ ໃນອັດຕາ 1 - 2 ກິໂລກຼາມ / ຕົ້ນ ຕາມອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດຂອງຊີງ

ຜູ້ມ ໂດຍຫວ່ານໃສ່ໃຫ້ຫົວຊົງຜູ້ມ ແລະ ຫົດນ້ຳຕາມ. ສຳລັບການໃກ້ນ້ຳໄລຍະນີ້ບໍ່ຈຳເປັນເພາະວ່າ ເປັນຊ່ວງລະດູຝົນ ແຕ່ຖ້າຝົນຫາກຖິ້ມຊ່ວງກໍຄວນຫົດນ້ຳເພື່ອໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢ່າງສະໝໍ່າສະ ເໝີ. (2). ໄລຍະຕຽນຕົ້ນລຳໂຍໃຫ້ຜ່ອມຕໍ່ການອອກດອກ: ໄລຍະນີ້ຄວນໃສ່ປຸ່ຍສູດ 8-24-24 ຫຼື 12-24-12 ໃນອັດຕາ 2 - 3 ກິໂລກຼາມ / ຕົ້ນ ໃສ່ໃນຊ່ວງຫ້າຍເດືອນຕຸລາ ເຖິງຕົ້ນເດືອນພະຈິກ ຫວ່ານ ໃສ່ໃຫ້ຫົວຊົງຜູ້ມ ແລະ ຫົດນ້ຳຕາມ. ການໃຫ້ນ້ຳໄລຍະນີ້ ຫາກຝົນເລີ້ມຖິ້ມຊ່ວງ ຄວນໃຫ້ນ້ຳຈົນເຖິງ ຕົ້ນເດືອນພະຈິກ ຈາກນັ້ນຄວນຢຸດໃຫ້ນ້ຳ. (3). ໄລຍະອອກດອກຕິດໝາກ: ຫຼັງຈາກລຳໂຍແຫ່ງຊ່ ດອກ ແລະ ເລີ່ມດອກບານແລ້ວ ຈຶ່ງເລີ່ມໃຫ້ນ້ຳ ພ້ອມກັບໃສ່ວັດສະດຸຄຸມໂຄນຕົ້ນ ການເລີ່ມໃຫ້ ນ້ຳຄັ້ງທຳອິດຄວນໃຫ້ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ອນປະມານ 50 ລິດ ບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໆ ເລີ່ມປະລິມານນ້ຳຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນເຕັມທີໃນອາທິດທີ 2 - 3 ຫຼັງຈາກໃຫ້ຄັ້ງທຳອິດແລ້ວ ຊຶ່ງໄລຍະນີ້ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ພຽງພໍຕະຫຼອດເວລາ ປະກອບກັບໃນຊ່ວງນີ້ ເປັນລະດູແລ້ງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ ເມື່ອໝາກມີຂະ ໜາດ 0,5 ມິລິແມັດ ໃຫ້ໃສ່ປຸ່ຍສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 2 - 3 ກິໂລ / ຕົ້ນ ຫວ່ານໃຫ້ຫົວຊົງຜູ້ມ ແລະ ຫົດນ້ຳຕາມເມື່ອໝາກມີຂະໜາດ 1,2 ຊມ. ໃຊ້ສູດ 13-13-21 ໃນອັດຕາ 2 - 3 ກິໂລກຼາມ ຫວ່ານໃຫ້ຫົວ ຊົງຜູ້ມ ແລະ ຫົດນ້ຳຕາມ. ສຳລັບປຸ່ຍດອກຄວນໃສ່ທຸກໆປີ ປີລະ 1 ຄັ້ງໃນອັດຕາ 5 - 10 ປີບ ຕາມ ອາຍຸ ແລະ ຂະນາດຂອງຊົງຜູ້ມ ຫວ່ານໃຫ້ຫົວຊົງຜູ້ມໃນຊ່ວງເດືອນກຸມພາ ຫຼື ເດືອນມີນາ ໄລຍະ ນີ້ປຸ່ຍດອກມັກຈະແຫ້ງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ ເນື່ອງຈາກຢ່ອຍສະຫຼາຍຢ່າງດີແລ້ວ.

ການໃຫ້ປຸ່ຍທາງໃບຂອງລຳໂຍ

ໃນບາງພື້ນທີ່ສະພາບດິນປູກລຳໂຍອາດມີບັນຫາ ຫຼືອາດເນື່ອງຈາກປັດໄຈສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຜົນຕົກ ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນ້ອຍ ການຈັດການນ້ຳບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມອາຫານຈາກດິນຂອງລຳ ໂຍບໍ່ໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ຫຼືບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຫັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ການໃຫ້ປຸ່ຍທາງໃບແກ່ລຳໂຍຈຶ່ງເປັນແນວທາງ ສຳລັບຜູ້ປຸກປານີໄດ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນໄລຍະກ່ອນການອອກດອກ ຊ່ວງເດືອນຕຸລາ ຈົນເຖິງເດືອນ ພະຈິກ ສະພາບລຳໂຍຄວນຈະຕ້ອງມີຄວາມສົມບູນ ກິ່ງກັນ ແລະ ໃບຄວນຈະແກ່ ແລະ ພ້ອມຕໍ່ກັບການສະ ສົມອາຫານສຳລັບການອອກດອກ ຫາກມີການແຕກໃບອ່ອນ ຫຼືອາຍຸໃບຍັງອ່ອນຈົນເກີນໄປ ອາດມີຜົນຕໍ່ການ ອອກດອກໃນປີນັ້ນໆ ໄດ້ ຈຶ່ງຄວນໃຊ້ປຸ່ຍສູດ 0-52-34 ຫຼືສູດ 10-20-20 ຫຼື 10-20-10 ພົມທາງໃບໃຫ້ຫົວເຜື້ອໃຫ້ ໃບໄດ້ຮັບທາດຟົດສະຟັດ ແລະ ທາດໂປເຕຊຽມ ຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເປັນການແລ້ງໃຫ້ໃບລຳໂຍ ແກ່ໄວຂຶ້ນໄດ້, ໃຊ້ໃນອັດຕາ 120 ກຼາມ / ນ້ຳ 20 ລິດ ພົມໃຫ້ຫົວທັງຕົ້ນ 3 ຄັ້ງ ທຸກໆ 7 ວັນ ໃນກໍລະນີດິນທີ່ມີ ຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດ ຊຸບຟ, ສຳລັບໃບເຂດພື້ນທີ່ທີ່ອາໄສນ້ຳຢືນ ແລະ ດິນມີຄວາມ ອຸດົມສົມບູນຕ່ຳ ຄວນພົມຈຳນວນ 5 ຄັ້ງ ໂດຍຈະພົມໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາ ໃນຂະນະໃບລຳໂຍເກືອບຈະມີອາຍຸ ເຕັມ.

ໂຣດ / ພະຍາດ ຂອງລຳໂຍ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລຳໂຍເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີຫາກມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ແກ້ວສົມ ດິນທີ່ປູກຄວນຈະເປັນດິນຮ່ວມທີ່ມີການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ມີອົນຊີວັດຫຼາຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມການປູກລຳໂຍໃນປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນມັກປະສົບບັນຫາດ້ານພະຍາດຂອງລຳໂຍ ແລະ ແນວໂມ້ສັດຕູ ມີດຢູ່ສະເໝີ ສຳລັບບັນຫາເລື່ອງ ພະຍາດ / ໂຣດລຳໂຍມີດັ່ງນີ້:

ໂຣດ Witches'Broom

ນັບວ່າເປັນໂຣດທີ່ສຳຄັນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການປູກລຳໂຍ ມັກພົບເຫັນຫຼາຍໃນລຳ ໂຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 3 - 4 ປີຂຶ້ນໄປ ລຳໂຍທີ່ມັກເປັນໂຣດນີ້ມັກພົບເຫັນໃນບຳໂຍ ພັນບັບປຸງ ແລະ ລຳໂຍພັນພັນ ເມືອງ.

ຜົນສະນະອາການ

ອາການທີ່ປະກົດຈາກລັກສະນະພາຍນອກ ຈະປະກົດເຫັນທີ່ສ່ວນຍອດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນຕາ ຊ່ວງທຳ ອິດໃບຍອດຈະແຕກມີລັກສະນະເປັນຝອຍບໍ່ປະປົນໄປກັບໃບປົກກະຕິ ໃບ ແລະ ກິ່ງກ້ານທີ່ແຕກເປັນຝອຍຈະ ແຂງກະດ້າງ ຊິໄປທາງດ້ານປາຍຂອງກິ່ງ ຫຼື ຊີ້ຂັ້ນ ເມື່ອເຖິງຊ່ວງລະດູການອອກດອກ ຍອດທີ່ເປັນໂຣດຈະ ອອກຊໍ່ດອກຊະນິດຕິດໃບປົນກັບຕິດດອກເປັນຊໍ່ສັ້ນໆ ອາດຕິດໝາກໄດ້ 1 - 5 ໝາກ ກໍລະນີທີ່ເປັນໂຣດຢ່າງຮຸນ ແຂງໃບຍອດຈະແຕກມີລັກສະນະເປັນຝອຍ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼືເປັນຝອຍທັງຍອດ ອາການໃບຍອດທີ່ ເປັນຝອຍຊິໄປທາງບໍລິເວນສ່ວນປາຍກິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຝອຍກວດເຮືອນນີ້ເອີ້ນວ່າ ໂຣດຝອຍກວດ ເຮືອນ ເມື່ອລຳໂຍທີ່ເປັນໂຣດນີ້ຍັງຄົງໃຫ້ຜົນຜະລິດຢູ່ ແຕ່ເມື່ອອາການຂອງໂຣດຫາກຮຸນແຂງຫຼາຍກໍຈະ ບໍ່ມີໝາກ / ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ເລຍ ຫຼືອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນລຳໂຍຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ

ຄັດເລືອກກິ່ງພັນປູກທີ່ມີກິ່ງຕອນ ຫຼື ກິ່ງຕາຈາກຕົ້ນແມ່ພັນທີ່ບໍ່ສະແດງອາການຂອງໂຣດດັ່ງກ່າວ ສຳລັບຕົ້ນທີ່ສະແດງອາການຂອງໂຣດຄວນທຳລາຍຖິ້ມ ແລະ ເຜົາທຳລາຍເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍ ຂອງໂຣດ ໄປຫາຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີໂຣດ ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ.

ໂຣດຈຸດສີນ້ຳຕານ (Algal Spot)

ໂຣດສີນ້ຳຕານພົບທົ່ວໄປໃນພືດທີ່ປູກລຳໂຍ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ ຊຶ່ງມີຄວາມຮຸ່ນສູງເພາະແກ່ ການເກີດໂຣດ ໂຣດນີ້ພົບເຫັນຫຼາຍໃນພືດຫຼາຍຊະນິດນອກຈາກລຳໂຍເຊັ່ນ: ຫຸລຽນ ໝາກມ່ວງ ໝາກກ້ຽງ ຢາງແລະ ລື່ນຈີ່ ແລະ ໝາກເງາະເປັນຕົ້ນ.

ລັກສະນະອາການ

ອາການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ພົບເຫັນເທິງໃບລຳໂຍ ຈະເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ນູນຂຶ້ນຕາມຜິວໃບດ້ານເທິງເລັກນ້ອຍ ຂອບຂອງຈຸດບໍ່ລຽບມີລັກສະນະເປັນແສກໆ ສີຂ້ອນຂ້າງຂຽວປົນເທົາເກີດຂຶ້ນກະແຈກກະຈາຍເທິງຜິວຂອງ ໃບດ້ານເທິງທີ່ຖືກກັບແສງແດດ ຕໍ່ມາຈຸດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ນສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍ ເມື່ອເກີດອາການຢ່າງຮຸນແຮງບໍລິເວນກຶ່ງກ້ານຈະແຕ້ງ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດ

ໃນບໍລິເວນ / ຝື່ນທີ່ປູກລຳໂຍ ຫາກມີການຜົນສານກຳຈັດ / ປ້ອງກັນໂຣດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນການລະບາດຂອງໂຣດນີ້ ສານປ້ອງກັນກຳຈັດໂຣດຜິດ ທີ່ເປັນສານປະກອບຫອງແດງ ກຳສາມາດປ້ອງກັນກຳຈັດໂຣດຊະນິດນີ້ໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນ: Copper Oxychloride ແລະ Bordeaux mixture ເປັນຕົ້ນ.