

ລັກສະນະທົ່ວໄປ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວດິນ

ຖົ່ວດິນເປັນພືດລົ້ມລຸກ ມີໝາກເກີດຢູ່ໃນພື້ນດິນ.ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ.ເຊິ່ງປະຊາຊົນມັກໃຊ້ໃນການກິນ ແລະປຸງແຕ່ງອາຫານ,ນ້ຳມັນພືດ, ຢາປົວພະຍາດ. ເປັນພືດປະກອບດ້ວຍນ້ຳມັນ 40 — 60 %ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍທາດໂປຼຕິນ 25 — 35 %, ມີວິຕະມິນ B ແລະ ວິຕະມິນ E. ລຳຕົ້ນຍັງໃຊ້ເປັນອາຫານສັດແລະ ເປັນພືດປັບປຸງ

ລະດູການປູກ ແລະ ລັກສະນະດິນ

- ຖົ່ວດິນປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແຕ່ປູກໄດ້ດີແມ່ນຕົ້ນລະດູແລ້ງ ຄື ທ້າຍເດືອນ 10 ຫຼື ລະດູຝົນທ້າຍເດືອນ 5 ຕົ້ນເດືອນ 6.
- ລັກສະນະດິນ ຖົ່ວດິນ ມັກດິນຊາຍແດນຕົ້ນທີ່ລະບາຍນ້ຳດີ ໂດຍສະເພາະແລ້ວດິນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນແຄມນ້ຳດິນແດງ. ດິນບໍ່ຊຸ່ມເກີນໄປ, ປູກໄດ້ໃນດິນທີ່ມີ pH 6,5 — 7.

I. ແນວພັນ

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກໃນປະຈຸບັນ ມີ 2 ຊະນິດຄື:

- ຊະນິດຕັ້ງຊື່ເພາະແກ່ການປູກຍາມແລ້ງ, ຍາມຝົນ
- ຊະນິດຕົ້ນເລືອ ເພາະສຳລັບປູກຍາມແລ້ງ.

ສຳລັບແນວພັນຢູ່ຫາດຕອກແກ້ວແມ່ນພັນດິສິນຄວນເຊັ່ນ: ພັນຫ້ວຍສິ້ນ,ພັນວຽງຈັນ, ພັນອຸດົມໄຊ 2, ພັນ 80 / ຖຸດ 5, ພັນດັ່ງກ່າວມີອາຍຸ 120 ຫາ 140 ວັນ.

ການຕຽມເນື້ອດິນປູກ

ແນວປູກຕ້ອງແກະເລືອກເອົາແຕ່ເນື້ອດີ ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມງອກບໍ່ຫຼຸດ 90 % ກ່ອນປູກຄວນປະສົມນ້ຳຢາ ເຊັ່ນ: ເຊວິນ 85 % ຫຼື ອອນເດັກໃນອັດຕາ 1g / ແນວຖົ່ວດິນ 1 ກຸງ ນອກນັ້ນປົນຢາກັນເຊື້ອເຫັດທຳລາຍອີກເຊັ່ນ: ຊີລີແຊນ ຫຼື ກັບຕັນໃນອັດຕາ 2g/ ແນວປູກ 1ກຸງ ເພື່ອກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້.

II. ການກຽມດິນ

- ດິນທີ່ຈະປູກຕ້ອງໃຖໃຫ້ເລິກປະມານ 10 — 15 ຊຕມ.
- ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 1 ອາທິດຈາກນັ້ນໃຫ້ຄາດ 1 — 2 ຄັ້ງ ຂຶ້ນກັບຄວາມເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ດິນຮາບພຽງດີປາສະ

ຈາກຫຍ້າ ຫຼື ເສດເຫຼືອອື່ນໆ.

- ຖ້າລະດູຝົນຕ້ອງຍົກເປັນຄູປູກຢູ່ເທິງຄູ.
- ໃສ່ຝຸ່ນຄອກປະສົມເວລາໂຖຄາດໃນອັດຕາ 1 ກຸງ / 1m².

III. ວິທີການປູກ

ຄວນປູກເປັນແຖວ,ຊຸດເປັນຊຸມ ແຕ່ລະຊຸມໃສ່ປະມານ 2 — 3 ເມັດ. ຊຸມເລິກປະມານ 2 ຂັ້ນ. ເມື່ອຕົ້ນໃຫຍ່ຄວນຫຼີກຢອນຕົ້ນອອກໃຫ້ເຫຼືອຊຸມລະຕົ້ນກໍ່ພໍ.

- ຖ້າເປັນພັນຕັ້ງຊື່ໃຫ້ປູກໃນໄລຍະ 60 X 30 Cm. ໂດຍໃຊ້ເນື້ອດິນ 40 — 50 kg / ha.
 - ຖ້າພັນເລືອຕາມດິນໃຫ້ປູກໄລຍະຫ່າງ 80 X 30 Cm. ໂດຍໃຊ້ເນື້ອດິນ 50 — 60 kg / ha.
- ຄວນປູກເປັນ 2 ແຖວເຄິ່ງກັນ ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງ 25 Cm.

IV. ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຖົ່ວດິນສາມາດສັງເກດເອົາທາດອາຊິດ (N) ຈາກອາ

ກາດມາປຸງແຕ່ງເປັນທາດອາຫານໄດ້ .ແຕ່ກໍ່ຄວນໃຊ້ຝຸ່ນ

- ຝຸ່ນຜື່ນເມືອງ: ນຳໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ເວລາຕຽມດິນໃສ່ໃນອັດຕາ 10 — 20 T / ha.

- ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ: ຄວນໃສ່ຝຸ່ນ 16 _ 20 _ 00 ໃນອັດຕາ 250 Kg /ha. ໃສ່ຮອງຜື່ນກ່ອນຄາດສຸດທ້າຍ ສ່ວນການໃສ່ຜື່ນໃສ່ກ່ອນຟືດອອກດອກ 3 — 5 ວັນ ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 4 —5 ອາທິດຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ປະເພດຢູເຣຍ 46 % ຈຳນວນ 50 kg/ha

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຖ້າສະພາບດິນແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍ ຄວນໃສ່ນ້ຳກ່ອນຕຽມດິນປູກ **ຄັ້ງທີ 1** : ໃສ່ຫຼັງຈາກປູກ 2 — 3 ອາທິດ ຈຳນວນ 250 — 350 m³ / ha. **ຄັ້ງທີ 2** : ໃສ່ຫຼັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນຜື່ນຈຳນວນ 600 — 800 m³ / ha. **ຄັ້ງທີ 3** : ແມ່ນຫ່າງຈາກຄັ້ງທີສອງ 2 ອາທິດ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນອີກ 2 — 3 ອາທິດ .

ການເສຍຫຼາຍພວນດິນ

ເສຍຫຍ້າ 3 ຄັ້ງ ຄວນເສຍຫຍ້າເວລາຟືດຍັງນ້ອຍ ຫຼັງຈາກປູກ 10—15 ວັນ . ຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນເວລາກ່ອນຟືດອອກດອກ 3 — 5 ວັນ (ຄູນຕົ້ນຄັ້ງທີ 2) ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ 30 — 40 ວັນ. ໂລຍະຟືດຕິດໝາກທຳອິດ ຫາກມີຫຍ້າຫຼາຍກໍ່ຄວນຫຼີກເອົາອອກ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້

ແມງໄມ້ທີ່ມັກທຳລາຍແມ່ນປະເພດສ່ຽນດິນ, ບຶງກິນໃບ ບຶງຮຳໃບ ແລະ ເຈາະລຳຕົ້ນ.

ການປາບ ແລະ ປ້ອງກັນ :

ສ່ຽນດິນ ຄວນໃຊ້ຢາຝູຮາດານ 3 % ຫວ່ານໃນອັດຕາ 15 kg / ha. ບຶງກິນໃບ, ຮຳໃບ ແລະ ເຈາະລຳຕົ້ນຄວນສີດຢາອາໂຊຕຣິນນາ ລາໂທອນ ໃນອັດຕາ 2 — 3 ບ່ວງຕັກແກງ / 20 ລິດ, ໃນ 7 — 10 ວັນ / ຄັ້ງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າມີວິທີການໃນການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູຟືດ (ຖົ່ວດິນ) ແບບຜື່ນເມືອງແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາເຄມີ.

໑. ການເກັບກ່ຽວ

ເລີ່ມເກັບກ່ຽວເມື່ອຝັກແກ່ 60— 70 % ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຝັກແກ່ນັ້ນຄວນຫຼີກຫຼີ ຂຸດຂຶ້ນມາ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງຝັກ ວ່າເມັດຕົ້ນດີ, ແກະຝັກອອກຈະເຫັນວ່າເປືອກດ້ານໃນເປັນສີນ້ຳຕານແກ່ ສະແດງວ່າຝັກບໍ່ໄດ້. ກ່ອນເກັບກ່ຽວຄວນເອົານ້ຳເຂົ້າໃສ່ກ່ອນໃຫ້ຝຸ່ນຈົ່ງຫຼີກ ຫຼື ຂຸດ ແລ້ວ ໃຫ້ຕາກແດດໄວ້ປະມານ 4 — 6 ຊົ່ວໂມງຈົ່ງນຳເອົາມາປິດໝາກ ແລະ ຕາກໄວ້ປະມານ 3 — 5 ແດດໃຫ້ແຫ້ງ. ຖ້າຈະໃຊ້ເປັນເມັດຜັນບໍ່ຄວນເກັບກາຍ 1 ປີ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງເມັດຕ້ອງມີ 8 — 9 %.



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



ຂໍ້ແນະນຳ ບາງເຕັກນິກ ການປູກຖົ່ວດິນ

ພັດທະນາໂດຍ: ໜ່ວຍງານພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)