

D117

ວິທີປູກ

ໝາກຂາມຫວານ, ໝາກມ່ວງ
ໝາກຂຽບ ແລະ ໝາກລຳໂຍ



0048

ຈັດພິມໂດຍ

ສານິກພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍປຶ້ມແຫ່ງລັດ ສປປ.ລາວ

ຮວມມືກັບ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດສະຫະປະຊາຊາດ



**ວິທີປູກ
ໝາກຂາມຫວານ,
ໝາກມ່ວງ,ໝາກຂຽບ,
ໝາກລຳໂຍ ແລະ
ໝາກກະທັນ**



ASSOCIATION FOR SENDING PICTURES TO
LAO CHILDREN IN JAPAN

ຈັດພິມໂດຍ
ສຳນັກພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍປຶ້ມແຫ່ງລັດ ສປປ.ລາວ
ຮ່ວມມືກັບ
ອົງການອາຫານແລະ ການກະເສດສະຫະປະຊາດ
ວຽງຈັນ 1994

ຮັບຜິດຊອບການຝຶມຈຳໜ່າຍ :

ສິວຽງແຂກ ກອນນິວົງ ແລະ ລາດຊະນິວົງ ອະມາຣາທິທາດາ

ອະນະຈັດທຳ

ບຸນອູ ຜັນຫະວິໄຊ

ຮຽບຮຽງໂດຍ : ແສງເພັດ ສິນມະນິວົງ

ແຕ້ມໜ້າປົກ ຄຳເພັດ ລັດຕະນະວົງ

ຂມ 55 /ສພປ.

ຫບ 541 /ພຈໝປ.

ຝຶມທີ່ວິສາຫະກິດການຝຶມຈຳໜ່າຍສຶກສາ

ຈຳນວນ 2.000 ຫົວ

ຂະໜາດ 14,5×20 ຊມ.

ຄຳນຳ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກຳແລະຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າຂາຍຕາມທ້ອງຖະຫລາດຂອງລາວແລະສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດໂດຍໄດ້ ຮັບການອຸປະຖຳທຶນຮອນຈາກອົງການອາຫານແລະການກະເສດປະຈຳລາວ, ສຳນັກພິມແລະຈຳໜ່າຍປຶ້ມແຫ່ງລັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ(ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ)ຮ່ວມກັບກົມປູກຝັງແລະສົ່ງເສີມການກະເສດ(ກະຊວງກະສິ ກຳ ປ່າ ໄມ້)ຈຶ່ງ ໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມຫົວນ້ອຍກມາຮັບໃຊ້ບັນດາທ່ານ. ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການອາຫານແລະການກະເສດປະຈຳລາວເຊິ່ງແມ່ນທ່ານ ດຣ ຝຣັ່ງຊິດ ມຸດຕາປາ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານແລະການກະເສດປະຈຳລາວໃຫ້ການດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ປຶ້ມຫົວນ້ອຍເປັນຄູ່ມືການປູກຝັງທີ່ໄດ້ນຳຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີປູກໝາກ ຂາມ ຫວານ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂຽບ, ໝາກລຳໂຍແລະວິທີປູກໝາກກະທັນ ເຊິ່ງຈະນຳພົນປະໂຫຍດອັນຫລວງຫລາຍມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງຢາກນຳພົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຫລືຢ່າງຫນ້ອຍ ກໍ່ຈະນຳພົນຜະລິດຮັບໃຊ້ວັດການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນຢ່າງດີ.

ຍ້ອນວ່າເປັນເທື່ອທຳອິດໃນການຈັດພິມປຶ້ມຫົວນ້ອຍກມາຮັບໃຊ້ບັນດາ ທ່ານສະນັ້ນຈຶ່ງຫວັງວ່າຈະ ໄດ້ຮັບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້, ຫາກທ່ານ ມີຄວາມເຫັນປະການໃດ ກະລຸນາສົ່ງຂ່າວໄປຍັງສຳນັກພິມ ແລະຈຳໜ່າຍ ປຶ້ມແຫ່ງລັດ ຕູ້ ປ.ນ. 1300 ວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໂທລະສັບ 212106

212472, 212473, 212475, ແຟ້ກ : 856(21)215628, 213082
ຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືແລະຮັກແພງ.
ສຳນັກພິມແລະຈຳໜ່າຍປຶ້ມແຫ່ງລັດ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ວິທີປຸກໝາກຂາມຫວານ

ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງໝາກຂາມຫວານ :

ໝາກຂາມມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຕາເວັນອອກ. ໝາກຂາມຫວານມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນແຂວງຕ່າງໆຂອງປະເທດ ເຮົາເຊັ່ນ : ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ໃນປັດຈຸບັນ ຂະບວນປຸກໝາກຂາມຫວານໄດ້ເລີ່ມປຸກຫຼາຍຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ເມືອງປາກລາຍ, ບໍ່ແຕນ, ແກ່ນທ້າວ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ).

- ລັກສະນະທົ່ວໄປ :

ໝາກຂາມເປັນພືດທີ່ມີໃບປະສົມ, ໃບສະຫຼັ້ນໃນລະດູຮ້ອນ, ເລີ່ມປົ່ງໃບອ່ອນໃນລະດູຝົນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຈະເລີ່ມອອກດອກໃນທ້ອງເດືອນ ເມສາ ຫລື ພຶດສະພາ (ເດືອນ 4-5 ສາກົນ) ເລີ່ມຈັບໝາກ(ຕິດຝັກ) ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ໃຊ້ເວລາປະມານ 8-10 ເດືອນຈຶ່ງຈະສຸກແກ່ ຈຶ່ງຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງທ້ອງເດືອນທັນວາເຖິງເດືອນ ກຸມພາຂອງປີຕໍ່ໄປ.

- ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ :

ໝາກຂາມຫວານສາມາດຈະເລີ່ມເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນດິນທຸກປະເພດ

ເຊັ່ນ ດິນໜຽວລ້ວນ, ດິນຊາຍລ້ວນ, ດິນຫີນແຮ່. ແຕ່ວ່າດິນທີ່ ເໝາະ
ສົມສຳລັບການປູກພືດຊະນິດນີ້ ແມ່ນເປັນດິນລ້ວນ ຫລື ດິນຊາຍແກນຕົມ.
ທີ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ເປັນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງພໍສົມ ຄວນ
ໂດຍສະເພາະຄວນເປັນດິນທີ່ມີຫາດ ໂປຕັສຊຽມ (K) ສູງພຽງພໍ. ສະ
ຖານທີ່ປູກແມ່ນເຂດມີຝົນຕົກຫລາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ຫ້າຍລະດູຝົນຄວນ ຈະ
ຕ້ອງຢູ່ໃນໄລຍະຝັກໝາກຂາມໃກ້ຈະແກ່. ເພາະວ່ານ້ຳຝົນແມ່ນສາຍເຫດ
ນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໝາກຂາມທີ່ສຸກແກ່ນັ້ນຕົກຕ່ຳ. ໝາກຂາມ
ຫວານເປັນພືດທີ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ປົກກະຕິມັກແສງແດດຫລາຍກ່ວາຮົ່ມ ,
ດັ່ງນັ້ນ ຄວນປູກໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງແດດຢ່າງພຽງພໍ ເພາະວ່າຕົ້ນໄມ້ປະ
ເພດນີ້ແມ່ນປ່ຽນໃບກ່ອນອອກດອກ.

ສາຍເຫດທີພາໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງໝາກຂາມຫວານປ່ຽນແປງບໍ່ ຄື
ສະພາບເດີມທີ່ເຄີຍຫວານມານັ້ນ ສາມາດສັງເກດໄດ້ວ່າ ດິນຂາດປະ ລິ
ມານອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ອະອິນຊີວັດຖຸ ເຊັ່ນຫາດໂປຕັສຊຽມ (K) ພຽງພໍ
ດັ່ງນັ້ນ ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ຫາດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງ ຄຸນ
ນະພາບໝາກໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າຕົ້ນພືດສາມາດສ້າງແປ້ງຫວານ ແລະ
ຫາດຊຸນໄດ້ດີ.

ແນວພັນ :

ໝາກຂາມຫວານຢູ່ບ້ານເຮົາ ໄດ້ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວຢູ່ຕາມເຂດ
ແຂວງຕ່າງ ໆ. ແນວພັນຈຳນວນນຶ່ງກໍ່ຖືກປະເທດໄກ້ຄຽງນຳໄປປັບປຸງຈົນ
ກາຍເປັນພັນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຮົາເຈົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງຕ່າງ
ຂອງບ້ານເຮົາຍັງມີແນວພັນທີ່ຈຳນວນນຶ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໃຜໄດ້ຂະຫຍາຍແລະ
ປັບປຸງໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການນິຍົມປູກໝາກຂາມ ຫວານ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍນຳໃຊ້ແນວພັນມາຈາກຕ່າງປະເທດມາປູກເຊັ່ນ :
ພັນຫມົນຈົງ, ພັນສີທອງ, ພັນນ້ຳເຜັງ, ພັນວິຊຽນ ແລະ ອື່ນ ໆ.

ການຂະຫຍາຍພື້ນ:

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການຂະຫຍາຍພື້ນໝາກຂາມຫວານສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍວິທີ ເປັນຕົ້ນວ່າ ການກ້າແກ່ນ, ການຕອນ, ການຕໍ່ກົງ, ການສຽບຍອດ. ສໍາລັບການກ້າແກ່ນນັ້ນສ່ວນຫລາຍພັກຈະກາຍເປັນພັນ ໝາກຂາມສົ້ມ. ຈະມີຈຳນວນໜ້ອຍຕົ້ນທີ່ສູດທີ່ຈະຄົງຕົວໃນສະພາບຫວານຄື ກັບຕົ້ນແມ່. ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງໃຊ້ເວລາດົນຈຶ່ງຈະໃຫ້ໝາກສ່ວນການ ຕອນ ແມ່ນມີຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີຮາກແກ້ວ ແລະ ການອອກຮາກກໍຍາກຈຳນວນຮາກ ທີ່ອອກມາກໍມີຈຳນວນໜ້ອຍ. ການສຽບຍອດ ຫລື ການປ່ຽນຍອດແມ່ນນິຍົມກັນເຮັດດ້ວຍການປ່ຽນແນວພັນໃນຕົ້ນໃຫຍ່ໂດຍການຕັດຕົ້ນໃຫ້ແຕກກົງ ງ່າຍໆ ນ້ອຍຂຶ້ນມາໃໝ່ແລ້ວນຳເອົາຍອດພັນທີ່ຕ້ອງການໄປປ່ຽນກັບກົງງ່າໃໝ່ນັ້ນ ເມື່ອຕິດດີແລ້ວກໍບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕມາແໜ້ນຕົ້ນເດີມ ວິທີນີ້ນັ້ນໄມ້ຈະໃຫຍ່ໄວ, ການເປັນໝາກກໍໄວ (ປະມານ 2 ປີ ຫລັງຈາກ ການສຽບຍອດກໍສາມາດເປັນໝາກໄດ້).

ວິທີປະຕິບັດ:

1- ການຫາມກົງ: ເປັນວິທີຂະຫຍາຍພື້ນໝາກຂາມຫວານໜ້ອຍໆ ກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າໃຊ້ເວລາສັ້ນສາມາດຕັດໄປປູກໄດ້.

ກ. ການກ້າແກ່ນ ເພື່ອເຮັດຕົ້ນຕໍ.

ສ່ວນຫລວງຫລາຍນິຍົມໃຊ້ແກ່ນໝາກຂາມສົ້ມໄປກ້າໂດຍ ແຈ້ງນ້ຳໄວ້ປະມານ 1 ມັກອນກ້າ ປັດຈຸບັນແມ່ນນິຍົມກັນແບບກ້າໃສ່ຖົງຢາງ ທີ່ມີຂະໜາດ 4×6 ມິວ (ຫລື 9×13 ຊຕມ) ຊຶ່ງໃນຖົງບັນ ຈຸດ້ວຍດິນປະມານຝຸນຄອກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແກ່ນໝາກຂາມຖ້າບໍ່ໄດ້ ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍາດ ຫລືແມງໄມ້ແລ້ວມັກຈະງອກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກ້າແກ່ນໃນຖົງຢາງໂດຍໃຊ້ 1-2 ແກ່ນຕໍ່ 1 ຖົງ. ໃນເມື່ອອາ ຢູ່ຂອງເບ້ຍໝາກຂາມໄດ້ 6-8 ເດືອນ ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນ ກາງ

0,5 ຊມ. ກໍສາມາດນຳໄປຫາກົງໄດ້.

ຂ. ການກະຕຽມຕົ້ນຕໍ.

ການຫາກົງ ມັກມີຍົນກັນເຮັດໃນລະດູຝົນເພາະວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ທົດນຳຕົ້ນຕໍທີ່ເອົາໄປຫາກົງບາງເທື່ອອາດຈະໃຊ້ໜຸ່ງຜ້າໃນຖົງບາງເພາະວ່າວິທີນີ້ຈະໄດ້ຖົງທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ຮັກສາຄວາມອຸ່ມຊື່ນໄດ້ດີ ແລະ ດິນກໍ່ວາດິນ, ສະດວກໃນການຂົນສົມທາງເທິງຕົ້ນສູງ.

ໃນກໍລະນີການກ້າແກ່ນເຮັດຕົ້ນຕໍໃສ່ໝານກ້າເບ້ຍຄວນປະຕິ ບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ຊຸດເອົາຕົ້ນຕໍທີ່ມີໜ້າຕ້າງໃຫຍ່ຂະໜາດ 4-8 ມມ ອອກຈາກໝານກ້າມາຕຽມໄວ້ໂດຍການຕັດແຕ່ງຮາກທີ່ຍາວກວ່ານັ້ນອອກພ້ອມກັບກົງງ່າຂ້າງເທິງຂອງລຳຕົ້ນ.

- ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳເອົາຕົ້ນຕໍໃສ່ຖົງຢາງແລ້ວເອົາກາຍຜ້າວ ມຸ່ນຫລື ແກບເກົ້າແຊ່ນ້ຳໄວ້ນັ້ນນຳມາບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງຍັດໃຫ້ແໜ້ນ, ລະ ວັງໃນການບັນຈຸກາຍຜ້າວ ຫລືແກບນັ້ນ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລະອຽດເພາະວ່າມັນອາດຈະກະທົບກະຕື່ອນເຖິງຮາກ.

- ເມື່ອບັນຈຸແກບ ແລະ ຕົ້ນຕໍໃສ່ຖົງຢາງແລ້ວກໍ່ເອົາເຊືອກ ຟາງມັດປາກຖົງຢາງແລ້ວນຳໄປແຊ່ນ້ຳໄວ້ກ່ອນ 5-7 ວັນເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ແຂງແຮງ ແລະ ລົງເຄີຍກັບສະພາບໃນຖົງຢາງ. ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຕົ້ນຕໍທີ່ບັນ ຈຸໃນຖົງຢາງໄປຫາກົງໃສ່ກັບກົງພື້ນດີຂອງຕົ້ນແມ່ພັນທີ່ຕ້ອງການ.

ຄ. ວິທີຕໍ່ຫາມແບບສຽບຂ້າງດັດແປງ.

- ຈາກຂັ້ນຕອນກະກຽມຕົ້ນຕໍເປັນທີ່ສຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ນຳມາ ປາດສະຫລຽງເປັນຮູບສີ່ວ ຕາມແນວຂອງເປືອກ ແລະ ແກ່ນ ຊົງມີປາກ ບາດຍາວປະມານ 2,5-3,5 ຊຕມ. ແລ້ວປາດຂ້າງຫຼັງອອກອີກ 0,5 ຊຕມ ປາກບາດທີ່ປາດຄວນຈະສູງຈາກຄໍຮາກ ຫລື ຖົງຢາງປະມານ 8-12 ຊຕມ

- ຄັດເລືອກກົງພັນດີແຂງແຮງຈາກຕົ້ນແມ່ພັນ ແລ້ວໃຊ້ມືດ ປາດ ທັງເປືອກ ແລະ ແກນແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງປາກບາດຍາວ 2,5-3,5 ຊຕມ ແລ້ວ ປາດລັດເປືອກນອກໃຫ້ມີມູມອ່ຽງ 45 ອົງສາ.


- ຕໍ່ມາກໍ່ນຳປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍ່ມາຊຽບ (ຕິດ) ເຂົ້າກັບກົງພັນດີ ຈັດແປງປາກບາດໃຫ້ແຈບ ແລ້ວກໍ່ໃຊ້ຢາງຄຽນໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ມັດຖົງ ຢາງຕົ້ນຕໍ່ຕິດກັບງ່າຫາມັນນັ້ນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແກວ່ງໄກວ ຫລື ເຫນັງຕຶງໄດ້.

- ຕິດຕາມເບິ່ງທຸກໆ 1 ຫລື 2 ອາທິດຕໍ່ຄັ້ງຫາກສັງເກດ ເຫັນ ວ່າເບົ້າຕົ້ນຕໍ່ມັນຂາດນ້ຳກໍ່ຫຼຸດນ້ຳຕົ້ມ ຫລື ຫາກມີມືດ ແລະ ແມງໄມ້ ອື່ນໆ ນາກັດຢາງຄຽນ ຫລື ເບົ້າຕົ້ນຕໍ່ມັນກໍ່ໃຫ້ສ້ອມແປງ ຫລື ປ່ຽນຖ່າຍໃໝ່.

- ປະມານ 6-8 ອາທິດ ປາກບາດທັງສອງກໍ່ສ້າງເປັນ ເຫຍື່ອ ໃຫມ່ຂຶ້ນມາຕິດປະສານກັນເຂົ້າເປັນເປື່ອນດຽວກັນຈາກນັ້ນກໍ່ກະກຽມຕັດ ກົງ ພັນ.

- ກ່ອນຈະຕັດແຍກອອກຈາກຕົ້ນແມ່ ຄວນຈະບາກງ່າຂອງແມ່ ພັນ ລຸ່ມບ່ອນຕໍ່ 5-7 ຊຕມ ໄວ້ກ່ອນ. 7-15 ວັນ ແລ້ວຈຶ່ງຕັດແຍກອອກ ມາ ຈາກຕົ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍ່ຕັດແຕ່ງໃບ ແລະ ກົງງ່າທີ່ບໍ່ສົມບູນອອກ ຈາກ ນັ້ນກໍ່ແກ້ຖົງຢາງຕົ້ນຕໍ່ມັນອອກ ແລະ ນຳໄປປູກຊຳໄວ້ໃນຖົງຢາງເກັບມ້ຽນ ໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມຈົນກໍ່ວາຕົ້ນໄມ້ແຂງແຮງ ແລະ ແຕກຍອດໃໝ່ແລ້ວຈຶ່ງ ນຳ ໄປປູກໄດ້.


ຮູບ 1 : ການຕໍ່ຕາມແບບສຽບຂ້າງດັດແປງ.




1. ການກະຕຽມຕົ້ນຕໍເພື່ອຕໍ່ຕາມ



2. ການສັດເສືອກກິ່ງຜັນຕີ.



3. ນຳປາກບາດປະກົບໃຫ້ເຂົ້າກັບແຈບຕີ ແລະ ອຸສຸນທັດໄວ້ໃຫ້ແຕ່ນັ້ນ.



4. ຕົ້ນໄມ້ພັນໃໝ່ກ່ອນ ຫລື ຫລັງຈາກ ຕັດອອກຈາກກິ່ງຜັນຕີ.

2. ການຕໍ່ຫາມແບບສຽບຫລັມ (ຮູບ 2.4)

- ນຳຕົ້ນຕໍມາປາດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງປາກບາດຍາວ 5-7 ຊຕມແລ້ວ
ປາດອີກຂ້າງໜຶ່ງໃຫ້ເປັນຮູບຫລັມຍາວ 3-5 ຊຕມ.

- ຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ມີດປາດເປືອກ ແລະ ແກນກຶງແມ່ພັນແຕ່ລຸ່ມ ຂຶ້ນ
ເທິງໃຫ້ປາກບາດຍາວ 3 ຫາ 5 ຊຕມ.

- ຕໍ່ມາກໍນຳປາກບາດຂອງຕົ້ນຕໍສຽບໃສ່ປາກບາດງ່າພັນ ຈັດແບ່ງ
ໃຫ້ເໝືອນເຍື້ອຈະເລີນຢູ່ແນວດຽວກັນແລ້ວນຳໃຊ້ຢາງຄຽນໄວ້ໃຫ້ແທ້ພັນ ນັດ
ຖືງຢາງຕົ້ນຕໍນັ້ນຕິດກັບກຶງພັນໄວ້ນຳດ້ວຍ.

- ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເຮັດຄວັດຫນຶ່ງ.

ການປຸກ.

ການກະກຽມເນື້ອຫີປຸກ: ແມ່ນອີງຕາມສະຖານທີ່, ສະພາບຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຖ້າຫາກເປັນເນື້ອຫີປຸກເບີກໃຫມ່ຈະຕ້ອງມີການໄຖດິນໃຫ້ ເລິກ
ແລະເກັບຕໍ່ ຫລື ເສດກຶງງ່າອອກຈາກສະຖານທີ່ໃຫ້ຫມົດ. ຈາກນັ້ນ ກໍໃຫ້
ຄາດດິນເພື່ອກຳຈັດຫຍ້າ ຫລື ວັດຊະພິດ ແລະ ຊ່ວຍພວນດິນໃຫ້ລະ ອຽດ
ຈາກນັ້ນກໍຕາກດິນໄວ້ປະມານ 1-2 ອາທິດ.

ຫມາກຂາມຫວານເປັນພືດທີ່ມີຝຸ່ນບໍ່ສາເຫມີກັນ ມີກຶງງ່າເກີດບໍ່ເປັນ
ລະບຽບ. ແຕ່ລະຊະນິດແນວພັນກໍມີອັນແຕກຕ່າງ ສະນັ້ນໄລຍະປຸກກໍ ເຊັ່ນ
ດຽວກັນ. ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຮົາຄວນປຸກໃນໄລຍະ 10 x 10 ມ
ຫລື 10 x 12 ແມັດ, ບາງກໍລະນີທີ່ເປັນແນວພັນທີ່ມີຝຸ່ນນ້ອຍ, ຂ້ອນຂ້າງ
ສະຫມໍ່າສະເຫມີ ແມ່ນໃຊ້ໄລຍະປຸກປະມານ 8 x 8 ແມັດ ຫລື 8 x 10
ແມັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກມີການຕັດແຕ່ງກຶງງ່າທີ່ດີໂດຍຕະຫຼອດ
ເວລານັ້ນອາດຈະໃຊ້ໄລຍະປຸກທີ່ແຄບກໍ່ວ່າ.

ການກະຕຽມຊຸມປຸກ. ເພື່ອຢາກໃຫ້ຕົ້ນຫມາກຂາມໃຫຍ່ໄວແມ່ນຂຶ້ນ
ກັບການຕຽມຊຸມປຸກທີ່ດີ ໂດຍທົ່ວໄປມີກນິຍົມກັນຊຸດຊຸມຂະໜາດ 1 ແມັດ

ກ້ອນ ($1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$) ກ້ວາງ,ຍາວ,ເລິກ,ເນື້ອຊຸດດິນອັນ ມາ
 ແລ້ວໃຫ້ປະສົມດິນກັບຝຸນຄອກ ຫລື ຝຸນບິນ ແລະ ອາດຈະປະສົມກັບ ເສດ
 ຫຍ້າ ຫລື ເປືອກຖົ່ວຕ່າງໆ ທີ່ປະໄວ້ດິນແລ້ວກ່ອນຈະເອົາດິນປະສົມຝຸນລົງ
 ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເອົາຝຸນຜັນສູດ ອາຊິດ, ຟໍສຟໍ, ກາລີ (NPK) ($0,3,0$)
 ໃນອັດຕາ 1 ກິໂລກລາມຕໍ່ຊຸມ ຫລືໃຊ້ສູດ 15-15-15 ໃນອັດ ຕາ
 0,5 ກິໂລກລາມຕໍ່ຊຸມ.

ການເອົາດິນປະສົມລົງໃນຊຸມແມ່ນໃສ່ຈົນໃຫ້ລ້ຽມຊຸມສູງກ່ວາຫນ້າດິນ
 ພໍປະມານເພາະຫລັກກວ່ານການຍຸບຂອງດິນເວລາຝົນຕົກ ແລະ ຈະເປັນສາ
 ເຫດໃຫ້ຮາກຕົ້ນໄມ້ເນົາໃນເນື້ອດິນນ້ຳຂັງ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກ
 ການຫາມກົງ ລົງປູກປູກກາງຊຸມ ໃຫ້ຮອບປາກບາດຈາກການຫາມນັ້ນຢູ່ ສູງ
 ກ່ວາລະດັບຫນ້າດິນປູກພຽງເລັກນ້ອຍ, ຢຽບດິນໃຫ້ແທ້ນັ້ນ ໃຊ້ໄມ້ປັກ ຫລັກ
 ເພື່ອພາລ່າຕົ້ນທີ່ປູກໃຫມ່ຫລັກກວ່ານການຫັກລ້ຽມທີ່ກະທົບຈາກລົມ. ຫລັງຈາກ
 ປູກແລ້ວຄວນຫັກນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມພໍສົມຄວນ ຈາກນັ້ນໃຊ້ມີດປາດຢາງຄຽນທີ່ ພັນ
 ປາກບາດຮອບຫາມກົງບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລ່າຕົ້ນຈະກົວທີ່ຮອຍຫາມ ແລະ
 ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເຕີບໂຕຊ້າເນື້ອເວລາຕົ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກໍຈະຫັກລ້ຽມໄດ້ງ່າຍ.

ການເລືອກຕົ້ນຫມາກຂາມຫວານ ທີ່ຈະໃຊ້ປູກນັ້ນສ່ວນຫລາຍນີ້ ຍິນ
 ເລືອກຕົ້ນທີ່ເຮັດຈາກສ່ວນທີ່ໄວ້ໃຈຫລືສູນສະຖານທີ່ຂອງລັດ ຈຶ່ງນຳມາ ຊຳ
 ໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອຈະໄດ້ບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ລ່າຕົ້ນມີຄວາມແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ
 ຕົ້ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ປົກກະຕິແລ້ວຕົ້ນພັນດີແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງທ້າຍລະດູຝົນ
 ແລ້ວມາຊຳໄວ້ອີກ 4-5 ເດືອນ ແລ້ວນຳໄປປູກຕົ້ນລະດູຝົນ (ພຶດສະພາ)
 ຈຶ່ງຕົ້ນຫມາກຂາມຫວານຈະມີຄວາມສູງປະມານ 80-100 ຄຸຕມ ຕົ້ນຈະມີ
 ຄວາມແຂງແຮງສະໝໍ່າສະເໝີເນື້ອປູກແລ້ວມັກຈະຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄວ
 ກ່ວາຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການຫາມໃຫມ່ໆ.

ການປົວລະບັດຮັກສາ:

ເພື່ອຢາກໃຫ້ຕົ້ນໝາກຂາມຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ສະໜ້າສະ
ເໝີຈຳຕ້ອງໄດ້ດູແລຢ່າງເນື່ອງມີດລຽນຕິດ ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ຈຳ ຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້:

- ການຕັດແຕ່ງ: ໄມ້ກິນໝາກທຸກປະເພດນັ້ນຕ້ອງມີການຕັດແຕ່ງ
ເປັນລັກສະນະປະຈຳຂອງພືດຊະນິດນີ້, ການຕັດແຕ່ງກົງວ່າສຳລັບ ຕົ້ນ
ໝາກຂາມຫວານ ແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ປີທີ 3-4 ຫລັງຈາກປູກ ເວລາຕົ້ນໄມ້
ເລີ່ມເປັນໝາກ. ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຈະຕັດແຕ່ງໃຫ້ຕົ້ນໝາກຂາມຫວານ ໃຫ້
ມີຊົງຟຸ່ມດີ ແລະ ສວຍງາມເປັນລະບຽບແມ່ນເລີ່ມຕັດແຕ່ງແຕ່ພືດມີ ຄວາມ
ສູງ 50 ຊຸຕມ ເພື່ອໃຫ້ແຕກກົງວ່າສາຂາອອກໄປເປັນຟຸ່ມ.

ຫລັງຈາກໄດ້ເກັບກູ້ໝາກຂາມຫມົດແລ້ວຄວນຕັດແຕ່ງວ່າທີ່ຕາຍວ່າ
ໝົດພະຍາດ ຫລື ແມງໄມ້ທຳລາຍ, ວ່າທີ່ຫັກ, ວ່າທີ່ປົງໄຂ່ວກັນຈົນຕິບ ຫນາ
ການຕັດແຕ່ງວ່າໃຫ້ຟຸ່ມມີຊ່ອງຫວ່າງເພື່ອຮັບແສງສະຫວ່າງເພາະວ່າ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກໄປທົ່ວທຸກກົງວ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ຝັກມີຄຸນນະ
ພາບດີ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາການຫັກຂອງວ່າເມື່ອເວລາຝັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ. ຕົ້ນໝາກຂາມຫວານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນໝາກ ຫລືຫລັງ
ຈາກປູກໄດ້ 1 ປີ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫລືຝຸ່ນບິນປະສົມກັບຝຸ່ນເຄມີສູດ 15-
15-15 ໃນອັດຕາ 200-300 ກລາມ/ຕົ້ນ ໃນນີ້ໃຫ້ແບ່ງໃສ່ 2-3 ລັງ
ບາງລັງໃນຊ່ວງສູດທ້າຍອາດຈະມີການເພີ່ມປຸ້ນ ຫລືຝຸ່ນເຄມີທາດ ເຂົ້າ
ນຳເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວຂຶ້ນ. ອັດຕາຝຸ່ນທີ່ໃສ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອາ ຍຸ
ແລະ ຂະໜາດຂອງ ຕົ້ນ, ເມື່ອເວລາໝາກຂາມເລີ່ມຈະໃຫ້ ໝາກ
ແລ້ວນັ້ນຕ້ອງປ່ຽນສູດຝຸ່ນເຄມີຕາມຊ່ວງເວລາດັ່ງນີ້.

ໃນຊ່ວງເວລາກ່ອນອອກດອກ. ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີສູດ 8-24- 24
ຫລື 9-24-24 ຫລື 12-24-12 ເພື່ອຊ່ວຍການສ້າງຕາຂອງດອກ.

ໃນຊ່ວງເວລາຫລັງຈາກຕິດໝາກ 1-2 ເດືອນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນເຄ ມີ

ສູດ 15-15-15 ເພື່ອບຳລຸງຜັກໃຫ້ສົມບູນ.

ໃນຊ່ວງເວລາຝັກໃຫຍ່ (ຫຼັງຈາກຕິດໝາກ 5 ເດືອນ) ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນເຄມີສູດ 13-13-21. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຝັກມີຄຸນນະພາບດີ. ມີຄວາມຫວານສູງ, ສຳລັບອັດຕາທີ່ໃສ່ນັ້ນຄວນ ຄຳນຶ່ງ ຫລືອິດໄລ່ຕາມຂະ ໜາດຂອງຕົ້ນ ແລະ ສະພາບການຕິດຝັກ. ໂດຍຫົວໄປຕົ້ນຂາມມີອາຍຸ 5-6 ປີ ຈະມີຝຸ່ນສູງ 4-5 ແມັດ. ດັ່ງນັ້ນຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີ ຄັ້ງລະ 1-2 ກິ ໂລ ກຼາມ ສ່ວນຝຸ່ນຄອກ ຫລືຝຸ່ນບົມ ນັ້ນອາດຈະໃສ່ໃນໄລຍະທີ່ຕິດຝັກ ແລ້ວ 1-2 ເດືອນ ໃນອັດຕາ 20-30 ກິໂລກຼາມ ພ້ອມກັບຝຸ່ນເຄມີ ສູດ 15-15-15. ເລີຍກໍໄດ້ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນມີຄວາມແຂງແຮງສົມບູນ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຝັກຈະດີຂຶ້ນ.

ໝາກຂາມຫວານເປັນພືດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາດໂບຕັສຊຽມ ສູງ ພໍສົມຄວນຊຶ່ງມັກຈະພົບເຫັນໃນສ່ວນທີ່ປູກມາດົນແລ້ວ, ນອກຈາກນີ້ກໍ ແມ່ນຂາດການບຳລຸງຮັກສາໃສ່ຝຸ່ນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ການປ່ຽນແປງ ລົດຊາດຂອງນວນໝາກຂາມ. ອີກຢ່າງນຶ່ງໃນກໍລະນີໝາກຂາມຫວານ ຊ່ວງຫຳອິດມີຄວາມແຊບ, ຫວານດີ ແຕ່ພໍຕໍ່ມາອີກ 5-6 ປີຊັ້ນພືດລົດຊາດສັ້ນເກີດຂຶ້ນ ໃນກໍລະນີນີ້ອາດຈະມີສາຍເຫດຕ່າງ ໆດັ່ງນີ້:

ສາຍເຫດທີ 1 : ທາດອາຫານທີ່ມີສະສົມຢູ່ໃນດິນຈຶກຕົ້ນ ໝາກຂາມດູດເອົາໄປລ້ຽງລຳຕົ້ນຈົນເກືອບຫມົດ ບໍລິມາດທີ່ໃສ່ປຸ້ຍ ຫລື ຝຸ່ນລົງໄປບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົ້ນໝາກຂາມທີ່ຈະດູດເອົາໄປລ້ຽງຝັກ ໝາກຂາມ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ໝາກຂາມມີຄວາມຫວານເພີ່ມຂຶ້ນຄວນໃສ່ ຝຸ່ນ ຫລື ປຸ້ຍໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົ້ນພືດ ນອກຈາກນີ້ກໍຄວນ ໃສ່ປຸ້ຍໃຫ້ລຽນຕິດກ່ວາເກົ່າ ແລະ ປຸ້ຍທີ່ຈະໃຊ້ຄວນເລື່ອງໃສ່ປະເພດໂປ ຕັດຊຽມ (K).

ສາຍເຫດທີ 2 : ນ້ຳກໍແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໝາກຂາມສັ້ນ.

ເພາະວ່ານັ້ນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍລະລາຍຝຸນ ຫລື ປຸ່ຍໃຫ້ເປັນທາດອາຫານ ສາມາດຫລໍ່ລ້ຽງຕົ້ນພືດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຄວນໃຫ້ດິນຂາດນ້ຳ ຫລື ປະໂຫຍດ ດິນແຫ້ງແລ້ງເກີນໄປໃນຊ່ວງເວລາເປັນຫມາກ.

ກົງກັນຂ້າມ ທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມັກໄດ້ຍິນຢູ່ເລື້ອຍ ໆວ່າຫມາກ ຂາມເປັນພືດທີ່ ຫົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ແມ່ນຄວາມຈິງສຳລັບຫມາກຂາມສົ້ມ ແຕ່ຖ້າຈະປູກຫມາກຂາມຫວານແລ້ວຄວນຄຳນຶງເຖິງແຫລ່ງນ້ຳເຟືອໄວ້ ທົດເວລາຝົນບໍ່ຕົກ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການ ປູກຫມາກຂາມຫວານ.

ການໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ (ຮໍໂມນ) ແລະ ປຸ່ຍໃບ :

ໃນປັດຈຸບັນການປູກຫມາກຂາມຫວານນັ້ນ ຊາວສວນຈະມັກໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ ຫລື ຮໍໂມນ ແລະ ປຸ່ຍສີດໃສ່ໃບ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຝັກຫມາກຂາມມີຄຸນນະພາບດີຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສວນໃນເມືອງ ທີ່ຂາດນ້ຳ ແລະ ການສີດປຸ່ຍເຂົ້າໃສ່ໃບແມ່ນສາມາດປ່ຽນແທນຈາກການດູດຊຶມທາດອາຫານຈາກຮາກ.

ສານກະຕຸ້ນທີ່ມັກໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈຳພວກ NAA ເຊັ່ນ: ຮົນນີ ແຟນໂນຟິກສ໌, ຟິກສ໌ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ການໃຊ້ສານປະເພດນີ້ແມ່ນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂວັນດອກ ຫລື ຂວັນຂອງຝັກຫມາກວ່າເກົ່າ ຕົກຫລິ້ນຍາກ . ອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຊ້ຄື: ສານກະຕຸ້ນ (ຮໍໂມນ) 1 ຊີຊີຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ. ວິ ທີ່ສີດແມ່ນແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະ.

- ໄລຍະທຳອິດແມ່ນສີດເວລາດອກກຳລັງຈູນ.
- ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນສີດເວລາຫລັງຈາກດອກຍາມ.
- ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນສີດເວລາເປັນຝັກອ່ອນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ ຫລື ຮໍໂມນບໍ່ແມ່ນວ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫມາກຈັບໄດ້ດີ ແຕ່ກໍມີບາງປັດໃຈທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ:

1- ຈະຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳຢາງສະໝໍ່າສະເໝີໃນເວລາພຶດເລີນແຕກໃບ
ອ່ອນ.

2- ຄວນຈະກະຕວງໄລຍະໃຫ້ດອກບານກ່ອນ ຫລືນຳຫລັງໃນຊ່ວງ
ເວລາຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລຽນຕິດ. (ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໃຊ້ຢາກະຕຸ້ນ ໃຫ້
ດອກອອກໄວ ຫລືຊ້າ). ປົກກະຕິດອກໝາກຂາມຈະອອກໃນທ້ອງ ເດືອນ
ເມສາເຖິງເດືອນ ພຶດສະພາ(ເດືອນ 4-5 ສາກົນ).

3- ການຊ່ວຍໃຫ້ມີການປະສົມເກສອນດີ. ຕາມທຳມະຊາດ ແລ້ວ
ໝາກຂາມຫວານເປັນພືດທີ່ປະສົມ ແຕ່ເກສອນຜູ້ແລະ ເກສອນແມ່ນັ້ນ ຈະ
ສຸກບໍ່ພ້ອມກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຳຕ້ອງໃຊ້ວິທີປູກໝາກຂາມສັມສະລັບກາງແຖວຂອງ
ຕົ້ນໝາກຂາມຫວານເພື່ອ ຊ່ວຍ ການປະສົມພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການໃຊ້ປຸ່ຍໃບ :

ໄລຍະແຕກໃບອ່ອນຄວນໃຊ້ປຸ່ຍສູດ 10-52-17 ; 15-30-15
ຫລື 10-45-10.

ໄລຍະທີ່ຕິດຝັກແລ້ວ 1-2 ເດືອນ ຄວນໃຊ້ປຸ່ຍ 10-20-30.

ໄລຍະທີ່ຝັກມີອາຍຸ 5-6 ເດືອນ ຄວນໃຊ້ປຸ່ຍ ສູດ 13-00-46.
ຫລື 00-00-50.

ອັດຕາທີ່ໃຊ້ແມ່ນ 40-50 ກຸ້ມຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດໝູກ ໆ 10-
15 ວັນຕໍ່ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ 2-3 ຄັ້ງ. (ຖ້າສ່ວນໝາກຂາມຫາກມີລະບົບຊົນ
ລະປະທານທີ່ດີກໍຄວນໃສ່ປຸ່ຍ ຮາກຈະດີກ່ວາ).

ວິທີຈຳກັດຫຍ້າ (ວັດຊະພືດ);

ອາດຈະຕັດ ຫລືຖາງ ໃນຕົ້ນ ແລະ ຫ້າຍລະດູຝົນ (ແຕ່ລະ ວັງ
ຫຍ້າແຫ້ງອາດຈະເກີດໄຟໄຫມ້) ຫາຄວາມສະອາດໃຫ້ດີ. ຈາກນັ້ນກໍ ໃຊ້
ໄຖ ຫລືຄາດ ພວມດີນຕາມຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ແຖວ.

ການອອກດອກ : ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ ໝາກຂາມຫວານ ຈະ

ອອກດອກ ຫຼັງຈາກເລີ່ມແຕກໃບອ່ອນ ໃນທ້ອງເດືອນພຶດສະພາ ເຖິງ
ເດືອນມິຖຸນາ (ເດືອນ 5-6 ສາກົນ) ຫຼັງຈາກຈົບຝັກຈະໃຊ້ເວລາ ປະ
ມານ 8-10 ເດືອນຈຶ່ງຈະແກ່ ຈຶ່ງຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງເດືອນຫັນວາ ເຖິງ
ເດືອນກຸມພາ (ເດືອນ 12-2 ສາກົນ).

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ຝັກແຕກ : ສ່ວນຫລາຍໝາກຂາມຫວານ ຈະ
ແຕກໄປຕາມແລວເສັ້ນຜຸ້ມເນື້ອເຫຍື່ອຊັ້ນໃນຂອງເປືອກໝາກຂາມໃນ ເວ
ລາແກ່ນໝາກຂາມປ່ຽນສີຈາກຂຽວເປັນນ້ຳຕານແກ່ (ໄລຍະເປັນມັນໝູ່) .
ສາຍເຫດດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດມາຈາກສາຍເຫດຕ່າງ ໆດັ່ງນີ້:

1. ເປັນນ້ຳແນວພັນຂອງໝາກຂາມ
2. ມີແມງໄມ້ເຂົ້າຫຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ເປືອກຂອງໝາກຂາມ ຂະ
ຫຍາຍໂຕບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ດັ່ງນັ້ນກໍມີການແຕກແຕງ.
3. ລະບົບການດູກນ້ຳຂອງຮາກບໍ່ດີ, ເນື່ອງຈາກເວລາຕ່ຽງ ຈຶ່ງ
ຕົ້ນຕໍຖືກຕັດຮາກສິ້ນເກີນໄປ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໂຕຢັ້ງລົງດິນເລີກ, ສະ
ເພາະປູກໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງພໍດີຖືກລະດູຝົນ ຫລື ຫົດນ້ຳໃນເວລາບໍ່ສົມຄວນ
ເກີດມີການໂພດນ້ຳຢູ່ພາໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝັກບໍ່ສາມາດປັບຕົວໃຫ້
ກັບສະພາບຈຶ່ງເກີດມີການຫັກ ຫລືແຕກ.

ວິທີແກ້ໄຂ : ຈຳຕ້ອງຄັດເລືອກແນວພັນທີ່ດີບໍ່ແຕກ, ຫົດນ້ຳ ສະ
ໝໍ່າສະເໝີ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ເຂົ້າຫຳລາຍ (ເຈາະຝັກ), ສຳ ລັບ
ຕົ້ນໝໍ່າລະບົບຮາກບໍ່ສົມບູນຄວນມີການເສີມຮາກຊ່ວຍ, ລະບົບການພວມດິນ
ໃຫ້ເຮັດປົກກະຕິ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການລະເຫຼີຍຂອງນ້ຳຈາກໄຕ້ດິນ.

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ຝັກແຕ້ງ :

1. ພະຍາດແມງໄມ້ ເຈາະງ່າ ຫລືຫຳລາຍ ເຊັ່ນບັງເຫລືອງກັດ
ກິນໃບ ຫລືຝັກອ່ອນ ຖ້າວ່າໃບຖືກຫຳລາຍຫລາຍ ງ່າກໍຈະແຕ້ງການ ສັງ
ເຄາະທາດອາຫານຈາກໃບບໍ່ມີພຽງພໍ, ເຮັດໃຫ້ຂວັນຂອງຝັກແຕ້ງ ແລະ

ຫລິ້ນງ່າຍ.

2. ງ່າຫັກ ຫລືບິດ ເຮັດໃຫ້ຫາດອາຫານໄປລ້ຽງຝັກໄດ້ຫນ້ອຍຝັກ ຈຶງບໍ່ຕົມ ແລະ ແຫ້ງ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ :

- ພະຍາດ : ຕາມຫຳມະດາແລ້ວໝາກຂາມຫວານຈະມີ ພະຍາດລົບກວນຫນ້ອຍ, ທີ່ຜ່ານມາເຄີຍພົບເຫັນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຊື້ອລາແປງ ຊຶ່ງເກີດກັບໃບໝາກຂາມ ແລະ ເຊື້ອລາດຳ ມັກເກີດຕາມຝັກໝາກຂາມ ແກ່ ຫລືຫລັງຈາກຝັກຖືກເກັບກ່ຽວ. ການປ້ອງກັນແມ່ນໃຊ້ຢາປະເພດ ຄາເບັນດາຊິນ ຫລືແມ່ນໂຄເຊບ ສິດກ່ອນເກັບກ່ຽວ 1-2 ເດືອນ.

- ແມງໄມ້ : ແມງໄມ້ກັດກິນໃບ ຈຳພວກດ້ວງປຶກແຂງ (ແມງກະນຸນ). ບັງເຈາະລຳຕົ້ນ, ບັງຮຳໃບ, ບັງຫອບ, ແມງງວງຊ້າງນ້ອຍ ເຈາະຝັກ, ນອດເຈາະຝັກ ແລະ ອື່ນ ໆ.

ການປ້ອງກັນ :

ສຳລັບດ້ວງປະເພດຕ່າງ ໆແມ່ນໃຊ້ຢາປະເພດໂມໂນໂຄຣໂຕຟອສ ຄາບາຣິນ (ເຊວິນ), ນາລາໄຫອນ, ເນນທາມີໂຕຟອສ ເຫລົ່ານີ້ ສິດເວລາເລີ່ມມີການລະບາດ. ຫລືໃນກໍລະນີໃຊ້ໄຟໄຕ້ກາງຄືນແລ້ວຈັບ ເອົາແມ່ດ້ວງຍິງເປັນການດີ.

ສຳລັບດ້ວງເຈາະຝັກ. ສ່ວນຫລາຍນິຍົມກັນປາບແບບໃຊ້ວິທີ ອົບອາຍນ້ຳຮ້ອນ ຫລືອົບແຫ້ງກໍໄດ້ຈະຊ່ວຍປາບໄດ້ດີ.

ການເກັບຝັກ :

ເວລາໝາກຂາມສຸກແກ່ດີແລ້ວ (ນວນຈະມີສີນ້ຳຕານ ແລະ ແຍກຕົວອອກຈາກເປືອກ ເວລາປອກຈະງ່າຍ ຫລືສັງເກດເຫັນເປືອກເປັນ ນ້ຳຕານແກນໂມກ ແລະ ແຫ້ງ). ວິທີເກັບຄວນໃຊ້ຄັນໃດອັນໄປເກັບ ແລະ ໃຊ້ມືດຕັດ ຕັດຂວັນຂອງຝັກໝາກຂາມສະເພາະ ເວລາເກັບແມ່ນໃຊ້ ເວ

ລາຫ່າງກັນປະມານ 4-5 ວັນ/ຄັ້ງ ແລະ ປະມານ 4-5 ຄັ້ງ/ຊົ່ວ ຈະ
ເກັບໄດ້ໜັກດີ. ສະນັດຕະພາບ. ເມື່ອຕົ້ນໝາກຂາມມີອາຍຸເຖິງ 10-
15 ປີ ສາມາດໄດ້ຜົນຜະລິດເຖິງ 50 ກິໂລກຼາມ/ຕົ້ນ/ປີ.

ວິທີເກັບຮັກສາ : ການເກັບຝັກໝາກຂາມຫວານໄວ້ດົນອາດຈະມີ
ບັນຫາດ້ານເຊື້ອລາຫ່າງລາຍ ຫລືບາງເທື່ອກໍອາດຈະມີມອດຈາະຝັກ ເມື່ອ
ເປັນເຊັ່ນນີ້ຄວນມີວິທີການປ້ອງກັນເຊັ່ນ:

1. ກ່ອນເກັບຮັກສາຄວນອົບອາຍນ້ຳ ຫລືໜຶ່ງເສັຍກ່ອນ. ປະ
ມານ 5 ນາທີແລ້ວມາ ເບີຍໃສ່ແດດ ຫລືໃຊ້ພັດລົມ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳບັນຈຸ
ເຂົ້າຖົງຢາງ.

2. ການອົບແຫ້ງແມ່ນໃຊ້ລະບົບແບບອົບໃບຢາສູບ. ໃຊ້ອຸ່ນຫະພູມ
ຮ້ອນປະມານ 80 ອົງສາເຊ. ນາມປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ. (ວິທີນີ້ ຍົມ
ໃຊ້ກັນໂດຍເກັບຮັກສາໄວ້ດົນປະມານ 2-3 ເດືອນ).

ວິທີປູກໝາກນ່ວງ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ :

- ໝາກນ່ວງມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ຟີລິບປິນ, ກ່ອນນີ້ 400 ປີກ່ອນເຄີຍປູກ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍໝາກນ່ວງຈາກອິນເດຍໄປອອກອາຟຣິກາ, ເອີລົບຕອນໃຕ້ ແລະ ອາເມລິກາລາຕິນ. ໝາກນ່ວງສຸກ ມີສານ ແລະ ທາດອາຫານປະກອບດ້ວຍເປັນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ນ້ຳ 76-80%, ນ້ຳຕານ 13-20% ທາດຂຸນ 0,5-0,8%, ທາດສົມ 0,2-0,54% ແລະ ບາງວິຕາມິນ ເຊັ່ນ ວິຕາມິນອາ ແລະ ວິຕາມິນເຊ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດນຳ ໃຊ້ເປັນອາຫານຕົ້ນໝາກນ່ວງໄປປຸງແຕ່ງຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂດຫລາຍຊະນິດ.

ລັກສະນະທາງພຶກສາ : ໝາກນ່ວງຈັດເຂົ້າໃນຕະກູນAnacardiaceae ແລະ ຊົດຫະຍາສາດ *Mangifera indica* ເປັນພືດໝາກບູຍາວ ຂຽວຕະຫລອດປີ.

- ລະບົບຮາກ : ມີຮາກແກ້ວ ແລະ ຮາກຟອຍ, ຮາກແກ້ວ ສາມາດຢັ້ງເຢັນໄດ້ເຖິງ 3-4 ແມັດ.

- ລຳຕົ້ນ : ສູງເຖິງ 4,5-21 ແມັດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕົ້ນສູງນັ້ນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນປູກດ້ວຍແກນ.

- ໃບ : ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ຄວາມຍາວປະມານ 15-30 ຈິງຕິແມັດ ແລະ ກວາງປະມານ 3-9 ຈິງຕິແມັດ. ຂົນກັບແນວພັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.

- ດອກ : ມີຢູ່ 2 ຊະນິດ ເຊັ່ນ ດອກຖູ່ ແລະ ດອກແມ່ ແລະ ດອກສົມບູນເພດ (ມີທັງຖູ່ ແລະ ແມ່ຢູ່ດອກດຽວກັນ). ສີຂອງດອກຈະເປັນສີເຫຼືອງ, ສີກຸຫລາຍຈາກ ໑, ສີນ້ຳໝາກກວ່າ ໒ ເຫຼືອເປັນຕົ້ນ.

ແນວພັນໝາກມວງ : ປັດຈຸບັນຢູ່ປະເທດເຮົາມີຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນ ໝາກມວງປ່າ ແລະ ໝາກມວງຫນາຍຂອງນວນຊົນ (ພັນປັບປຸງ ແລະ ພັນພັນເມືອງ) .

- ສຳລັບແນວພັນປັບປຸງຫນາຍກັນປັດຈຸບັນແມ່ນ: ໝາກມວງ ນ້ຳດອກໄມ້ (ໃຊ້ກາຍສຸກ) ແລະ ກົບດິບແມ່ນພັນຂຽວສະເຫວີຍ, ຟ້າລົມເຫຼືອເປັນຕົ້ນ.

- ສຳລັບພັນພັນເມືອງ ແມ່ນມີ ໝາກມວງຫນັງ, ມວງກະເສນ, ມວງແກວ, ມວງກະສີ, ມວງໂຂ, ມວງຂຸ, ມວງງາຊາງ, ມວງ ກະສວຍ ເຫຼືອເປັນຕົ້ນ.

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທະຫມາະສົມ : ໝາກມວງສາມາດປູກໄດ້ດີໃນເຂດຮ້ອນ ແລະ ດິນຊຸມຊັນມີອຸນຫະພູມອາກາດປານກາງ ລະຫວ່າງ 20-30 ອົງສາ ລະດັບນ້ຳທະເລປະມານ 100-800 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳຝົນປະມານ 1.200-2.500 ມມ/ປີ. ສຳລັບດິນແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ, ແຕ່ດິນທະຫມາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນດິນປືນຊາຍ, ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ຄວາມເປັນກົດເປັນດາງຂອງດິນແມ່ນຢູ່ໃນ ລະຫວ່າງ PH 5-7.

ການຂະຫຍາຍພັນ : ມີ 2 ວິທີດ້ວຍກັນເຊັ່ນ :

1- ຂະຫຍາຍພັນແບບມີເພດສົມບູນ (ໃຊ້ແກນປູກ)

2- ຂະຫຍາຍພັນແບບບັນເພດ (ໃຊ້ສ່ວນຕ່າງໆຂອງລຳຕົ້ນ)

- ການຂະຫຍາຍພັນແບບບັນເພດສົມບູນ : ວິທີນີ້ແມ່ນການຂັດ ຢູ່ ບ່ອນວ່າ ລຳຕົ້ນບາດກ້າ ຫລື ລູກງາຍ ແຕ່ຂະໜາດສ່ວນຫລາຍກວ່າເຊັ່ນ ວ່າ ບໍ່ສາມາດຮັກສາພັນເດີມໄດ້, ມີອາຍຸຍາວ (ດົນຈົນໃຫ້ໝາກ), ໃຫ້ ໝາກໝາກອຸ່ນ, ບັນລັດແຊບເຫມືອນດັ່ງກ່າວ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນນ ບັນການໃຊ້ແກນກາໄວເພື່ອເຮັດຕົ້ນຕໍສຳລັບຂະຫຍາຍພັນແບບບັນເພດ.

- ການຂະຫຍາຍພັນແບບບັນເພດ : ແມ່ນການຂະຫຍາຍພັນແບບ ໃຊ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລຳຕົ້ນເຊັ່ນ ການ, ງາ, ຍອດ, ຕາ ໂດຍໃຊ້ ຫຼັກການກຸງ, ສຽບຂາງ, ສຽບຍອດ, ຕິດຕາ. ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ໃນປັດຈຸ ບັນແມ່ນນັບໃຊ້ຫຼັກ ຫຼັກກຸງເປັນສ່ວນຫລາຍ ເພາະວ່າຫຼັກກຸງໄດ້ຮັບ ຜົນສູງ ແລະ ຫຼັກການກວາ.

ວິທີຂະຫຍາຍພັນ : ແມ່ນມີຫລາຍຂັ້ນຕອນເຊັ່ນວ່າ :

+ ການຕັ້ງຕົ້ນຕໍ : ການຕັ້ງຕົ້ນຕໍໃນສະໜາມ ຫລື ຖົງຢາງ ຈົນມີອາຍຸ 4-5 ເດືອນຊຶ່ງໃຫ້ມີຂະໜາດຂອງລຳຕົ້ນໃຫຍ່ປະມານການ ສີ ດຳ, ກະຕຸ້ນກາບຫມາກພາວຫຍ ແລະ ພັກຫຍໃຫ້ໄປປະມານ 3-5 ເດືອນ ນັ້ນໃສ່ຖົງຢາງ ແລະ ນຳຕົ້ນຕໍຕັ້ງໄວ້ນາມາໃສ່ ຈົ່ງສົມ (ລຳຕົ້ນ) ຈາກ ປາກຖົງຢາງຍາວປະມານ 8-10 ຊັງຕີແມັດ. ການບັນຈຸກາບຫມາກພາວ ໃສ່ຖົງຄວນຍືດໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຍືດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນເຊັ່ນກັນ. ຈາກນັ້ນ ກໍ ນຳໄປຫາມື້ໃສ່ກົງງາພັນດີ. ສຳລັບກົງງາພັນດີຄວນເລືອກເອົາງາຫມອກ ຍຸ່ມປະມານ 1 ປີ. ຈາກຕົ້ນຕໍຕ່ອງການຊົງເຫັນວ່າເປັນພັນດີ.

ຂັ້ນຕອນຕ່າງ ໆຂອງວິທີປະຕິບັດການຕາມກຳດ້ານ :

1. ຕັ້ງຕົ້ນຕໍໃຫ້ຮັບຮອຍ
2. ເລືອກກົງງາຂອງພັນດີຕ່ອງການ
3. ປາດສະຫລຽງຕົ້ນຕໍ ແລະ ງາຫຍຈະຫມາຍໃຫ້ເຫຼົ້າງັນ

4. ຄຸ້ນດ້ວຍຢາງແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງໃຫ້ແໜ້ນຕິດຈອດກັນດີ

5. ເວລາຫາມສຳເລັດແລ້ວຄວນໃຊ້ເຊື້ອກັບຕົງຢາງຂອງຕົນໄດ້
ໄວ້ຕັກຢາງເພື່ອໃຫ້ການເຕີ້ນຖືກຕ້ອງໄປ.

6. ຫຼັງຈາກຫາມໄດ້ 45 ວັນ ກໍ່ສາມາດຕັດກົງງາຫາມໄປຊຳ
ໄດ້.

ວັດຖຸປຸກ : ຫຼັງຈາກຂຸດຂຸມຂະໜາດ 1 m^3 ($1 \times 1 \times 1$) m^3
ແລ້ວ ແນມເອົາຝຸ່ນຄອກປົນກັບດິນຫນ້າຫຼຸດອອກຈາກຂຸມນັ້ນລົງໃສ່ພື້ນ ຂຸມ
ແລະ ເອົາດິນພື້ນຂຸມຕົວເປັນສີ່ຫາງເທິງໃຫ້ເຕັມຂຸມ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່
ເອົາຕົ້ນຫາມຈາກການຊຳໄວ້ນປຸກໃສ່ເຄິ່ງກາງຂອງຂຸມ (ຂົນລະຍົງຄວນ
ໃຊ້ໄມ້ປັກໃສ່ໂກງກັບລຳຕົ້ນເພື່ອມັດຕົ້ນມວງໃສ່ ເພາະເປັນວັດຖຸປຸກ ກັບ
ການຫັກ ຫຼໍ່ ລຸ່ມ). ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ເຊື້ອ ຫຼໍ່ ເສດຫຍ້າປົກປາກຂຸມເພື່ອ
ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງນ້ຳ (ຖ້າຂຸມນັ້ນເຫັນວ່າມີຄວາມແຫ້ງກໍ່ຄວນ ຫົດ
ນ້ຳ).

ໄລຍະປຸກ : ສ່ວນຫລາຍມັກປຸກໃນໄລຍະ 8×8 ມ ຫຼື 7×7 ມ
ຫຼັງຈາກປຸກໄດ້ 3 ປີອາດຈະໄດ້ເກັບໝາກ ຖ້າຫາກມີການບົວລະບັດຮັກ
ສາດີ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ :

- ການໃສ່ຝຸ່ນ : ໃນຊ່ວງການຈະເລີນເຕີ້ຍໂຕ, ຕົ້ນຫາມກຸ້ນວົງ
ຕ່ອງການຝຸ່ນອາຊິດ (N). ໃນລະຍະເລີນ ຈະເປັນໝາກແມ່ນ ຕ່ອງ
ການຫາດຟັສຟໍ (P) ແລະ ໂປຕາສ (K) ເປັນສ່ວນຫລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ
ເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ອັດຕາຝຸ່ນຕ່ອງໃຊ້ແມ່ນ 200 -
300 ກຣາມຕຕົ້ນ ໃສ່ອອມວົງລັດສະໝຂອງຝຸ່ນປຸ່ຍເຄິ່ງສ່ວນ ຫລາຍ
ມັກໃຊ້ 15-15-15 ຫຼື 13-13-13.

- ການໃຫ້ນ້ຳ : ເວລາຕົ້ນມວງຍັງນ້ອຍ ແລະ ໃນຫ້ອງລະ ຄູ່

ແລງຄວນຫົດນ້ຳ ອາຫິດລະເຫຼືອ. ຖ້າຫາກຕົນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຫົດເວ ລາ
ຫລັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ເກັບກຽວ.

- ການເສຍຫຍາ ແລະ ພວນດີນ : ຖ້າເຮົາປູກໃນເນອຫ ນ້ອຍ
ສາມາດໃຊ້ແຮງງານຄົນຖ້າງເຮົາ ແຕ່ຖ້າເປັນເນອຫກວາງ ແລະ ເປັນ
ການປະຢັດເສດຖະກິດແມ່ນຄວນໃຊ້ລົດຕັດຫຍາ ຫລື ໃຊ້ຢາອາຫຍາ ຈາກ
ນັ້ນກໍ່ໄຖ ຫລື ຄາດຕັດຫຍາທຽມກູ້ເພື່ອບັນຝຸ່ນໄປໃນຕົວ ແລະ ອີກສາ ການ
ລະເຫຼືອຂອງນ້ຳໃຕ້ຕົ້ນໄດ້ເປັນສ່ວນຫລາຍ.

+ ການຕັດແຕງ : ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຕຸ່ມ ແສງ
ສະຫວາງສອດເຂົ້າໄປຫົວຝຸ່ນ ທຽມກູ້ເພື່ອສະດວກໃນການເກັບກຽວ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນມວງມີໂອກາດໄດ້ສົ່ງເຄາະແສງຫລາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ເປັນການ
ປ້ອງກັນພະຍາດແມງໄມ້ໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ.

ຂະໜາດໃນການຕັດແຕງແມ່ນໃນຊ່ວງ 3 ປີຫ້ອິດ ແມ່ນເລີ່ມ ຕັດ
ແຕງ ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນຕັດແຕງເວລາເກັບກຽວ. ການຕັດແຕງແມ່ນຕັດ ງາ
ແກ, ງາເປັນພະຍາດ ຫລື ແມງໄມ້ຫ້າລາຍ, ງາຫຍຸ້ງທາງໃນຂອງຝຸ່ນ.

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ :

- ພະຍາດ : ສ່ວນຫລາຍມັກຈະພົບແອນແທກໂນສ ແລະ ເຊອ
ລາມັກຈະພົບລາແປງ. ສຳລັບພະຍາດແອນແທກໂນສ ມັກລະບາດຢູ່ໃນ ,
ດອກ ແລະ ໝາກ ແລະ ເຊອລາແປງມັກຈະລະບາດຢູ່ບໍລິເວນດ້ວງກັນ.

ອາການໝູ່ພັນສະຫອນແມ່ນ: ສຳລັບໃບຈະເປັນຈຸດສີນ້ຳຕານ ຫລື
ສີດຳ ເປັນຮູບວົງມົນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ເສຍອະນຸພາບຂອງໃບເຮັດໃຫ້
ໃບແຕງ ແລະ ເປັນຮູ. ສຳລັບດອກແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ດອກຫລົ້ນ. ສຳລັບ
ໝາກຈະເຫັນໄດ້ເປັນຈຸດສີນ້ຳຕານ.

ວິທີປ້ອງກັນ : ໃຊ້ຢາປະເພດ ກູປຣາວິດ, ນີໂມນິນຈຳນວນ 2-
3 ບວງຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສົດໃຫ້ຫົວບໍລິເວນລຳຕົ້ນ.

ໝາກໄມ້ : ສ່ວນຫລາຍແມ່ນພະຍາກຳນ, ແມງວັນຫອງ, ບັງ
ຈາະລຳຕຸ້ນ. ວັດຖຸປ່ອງກັບແມ່ນໃຊ້ຢາສິດປະເພດເຊວິນ 85% (ຄາບາ
ຣິນ) ໃນອັດຕາ 2-3 ບວງແກງຕຸ້ນຕໍ່ 20 ລິດສິດໃຫ້ຫວັບລ່ວນລຳຕຸ້ນ.

ການເກັບກຮູ້ : ຫລັງຈາກຕາມມວງບານດອກ ຫາ ໝາກແກຈະ
ໃຊ້ເວລາ 3-4 ຄົວອນຂຶ້ນກັບຊະນິດແນວພັນ. ການເກັບກຮູ້ຈອນລະມັດ
ລະວັງບໍ່ໃຫ້ແຕກ ຄວນໃຊ້ກະຕອງ ຫລື ກະຕາ ປັດເອົາຈາກນນກໍ່ ຄວນ
ເອົາໜ່ວຍຊົມໄວບໃຫ້ຢາງມວງຖືກໜ່ວຍຄາບດຽນນຈະບງາມ, ລຳບາກ
ຕການບມ ແລະ ໝາກຈະບສວຍງາມ.

ວິທີ ປູກໝາກຂຽບ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ :

ໝາກຂຽບເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຖົນກຳເນີດຢູ່ເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຂດແຫ້ງ ແລ້ງຂອງອາເມລິກາກາງ ແຕ່ກໍມີການຂະຫຍາຍນຳມາປູກຢູ່ບ້ານເຮົາ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ.

ປັດຈຸບັນໝາກຂຽບຖືວ່າເປັນພືດສົນຄ້າປະເພດໜຶ່ງຂອງບ້ານ ເຮົາ ຊຶ່ງມີຜາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດຕາມລະດູການ, ຄົນນັກນິຍົມກິນຊຶ່ງມີລົດ ຈາດຫອມຫວານຫັງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກງ່າຍ ສາມາດເກີດໄດ້ໃນດິນທຸກປະ ເພດ ແລະ ເກືອບທຸກສະພາບແວດລ້ອມ. ທຶນທານຕໍ່ພະຍາດປັງແມງຕ່າງ ໆ ທຶນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ.

ກ່ຽວກັບທາດອາຫານບັນຈຸໃນໝາກຂຽບແມ່ນ ທາດຊຸ່ນປະ ມານ 1,8% ໄຂມັນ 0,14%, ນ້ຳຕານ 18,4%.

ລັກສະນະທາງພຶກສາດ : ໝາກຂຽບແມ່ນຈັດເຂົ້າໃນຕະກູນ ຊຶ່ງມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ *Tamarindus indica* L. ລັກສະນະຂອງ ລຳຕົ້ນແມ່ນເປັນພືດ ເຄິ່ງໝູ່ເຄິ່ງສູງ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງປະມານ 2-7 ແມັດ.

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ເໝາະສົມ :

ຕົ້ນໝາກຂຽບເປັນພືດເຂດຮ້ອນທີ່ທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງດັ່ງ ນັ້ນ

ຄວາມອຸ່ມອຸ້ມຂອງອາກາດ ປານກາງ, ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ໃນ
ເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຄັ່ງແຫ້ງແລ້ງ. ເພື່ອໃຫ້ໝາກຂຽບໜ່ວຍໃຫຍ່ ແລະ
ຈຸນນະພາບດີຄວນປູກໃນລະດູການທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ ປູກຕົ້ນລະດູຝົນ
ໝາກຂຽບສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ ແຕ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນ ດິນ
ຊາຍແກນຕີນ.

ແນວພັນ :

ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານເຮົາມີແນວພັນພຽງ 2 ຊະນິດເຊັ່ນພັນໝາກ ຂຽບ
ຝ້າຍ ແລະ ພັນໝາກຂຽບຫນັງ.

ໝາກຂຽບຝ້າຍ ມີລົດຊາດຫອມ ແລະ ຫວານກວ່າໝາກ ຂຽບ
ຫນັງ, ນວນຕິດກັບເປືອກ, ເວລາສຸກຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາໄວ້ດົນໄດ້ເພາະ
ວ່ານັ້ນເປືອຍ ແລະ ນວນໄວກວ່າ.

ໝາກຂຽບຫນັງ ມີລົດຊາດຂ້ອນຂ້າງສົ້ມເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ຫອມ ແລະ
ບໍ່ຫວານເທົ່າໝາກຂຽບຝ້າຍ ແຕ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ນານກວ່າບໍ່ເປືອຍ
ຫລືນວນງ່າຍ. ເປືອກຂອງໝາກຂຽບຫນັງສາມາດປອກໄດ້ສະດວກ ບໍ່ຕິດ
ກັບນວນຂອງແກ່ນ.

ການຂະຫຍາຍພັນ : ຕາມທຳມະດາໝາກຂຽບມັກມີພື້ນກັນ ໂດຍ
ຫົວໄປແມ່ນໃຊ້ວິທີກ້າແກ່ນ. ແຕ່ວິທີການອື່ນ ໆເຊັ່ນຕິດຕາ, ຫາມງ່າ ຫລື
ຕໍ່ງ່າກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ມັນສິ້ນເປືອງ ແລະ ເສັຍເວລາກວ່າການ ກ້າ
ແກ່ນ.

ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີກ້າແກ່ນ: ເລືອກເອົາຈາກຕົ້ນທີ່ອຸ ດົມ
ສົມບູນ, ມີຈຸນນະພາບດີ, ໜ່ວຍງາມ ແລະ ໃຫຍ່, ປະສະຈາກພະຍາດ
ເຮືອລາ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນ. ແກ່ນໝາກຂຽບທີ່ນຳໄປເຮັດແນວ ບໍ່
ຄວນຕາກແດດ ແຕ່ຄວນເຜີຍລົມໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງໃນຮົ່ມ. ໄລຍະພັກຕົວຂອງແກ່ນ
ໝາກຂຽບເກືອບບໍ່ມີເລີຍ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ນານເຖິງ 3-4

ປີໃນສະພາບອາກາດບ້ານເຮົາ.

ການກັ່ງຕ້ອນໝາກຂຽບ : ກ່ອນຈະນຳແກ່ນໄປກັ່ງຕ້ອນໝາກໄປແຈ້ງ
ນ້ຳຊຸ່ມ (ຊຸ່ມຫະພູມ 54- 57 ອົງສາເຊ) ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ແກ່ນຊຸ່ມນ້ຳ ແລະ ງອກດີ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງເປັນວິທີປ້ອງກັນ ເຊື້ອ
ລາໄດ້ວິທີກັ່ງ ແມ່ນອາດຈະກັ່ງໃສ່ຖົງຢາງ ຫລື ເຮັດເປັນໝາກກໍໄດ້ .

- ການກັ່ງໃສ່ຖົງຢາງ : ກ່ອນອີ່ມຄວນຕຽມດິນເພື່ອຈະເອົາ ເຂົ້າ
ຖົງຢາງສ່ວນປະກອບຂອງດິນມີ ຊາຍ 2 ສ່ວນ, ຝຸ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ ແລະ
ດິນ 3 ສ່ວນ ຂະໜາດຂອງຖົງຢາງແມ່ນປະມານ 8×6 ຊຕມ ໃຊ້ 2
ແກ່ນ ຕັ້ງຫລັງຈາກກັ່ງໄດ້ 15 ວັນແລ້ວ ແກ່ນຈະຫຼອດແລ້ວເລືອກເອົາ
ຕົ້ນບໍ່ແຂງແຮງອອກປະໄວ້ແຕ່ລະຖົງພຽງ 1 ຕົ້ນ.

- ການກັ່ງໃສ່ໝາກກັ່ງ : ຄວນຢອດເມັດໃຫ້ຫ່າງກັນປະມານ 7-
8 ຊຕມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການແອອັດ ແລະ ກະທົບຕໍ່ຮາກເວລາຍ້າຍໄປປູກ .
ເມື່ອຕົ້ນ (ເບ້ຍ) ໝາກຂຽບຫາກສູງປະມານ 10-15 ຊຕມ ຫລື ມີ
3-4 ໃບຄວນຍ້າຍໃສ່ຖົງຢາງຂະໜາດ 6×8 ແລະ ນຳໄປຮັກສາ ໄວ້
ບ່ອນກັ່ງ ຫລື ຮັກສາປະມານ 6-8 ເດືອນຈຶ່ງນຳໄປປູກ.

ການປູກ : ສ່ວນຫລາຍນິຍົມກັນປູກ 2 ວິທີ ເຊັ່ນ:

1. ການນຳເອົາແກ່ນປູກລົງດິນເລີຍ
2. ການນຳເອົາເບ້ຍໄປປູກ

ແຕ່ປັດຈຸບັນນັກປູກແບບໃຊ້ເບ້ຍໃນໄລຍະ 4×4 ແມັດ ຫລືປະມານ
630 ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ ຂະໜາດຂຽນປູກປະມານ 20×20×20 ຊຕມ ໂດຍ
ໃຊ້ຝຸ່ນຄອກປະມານ 2-3 ກິໂລກຼາມ ປະສົມກັບດິນລົງຂຽນ ຫລັງຈາກ ປູກ
ແລ້ວຄວນຫຼີດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມດີ. ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້ກໍແມ່ນຄວນເຮັດຮົ່ມກຳ ບັງ
ແຕ່ລະຕົ້ນໃນເວລາປູກໃຫມ່ ໆ.

ຈາກນັ້ນ ໃນໄລຍະປີທີ 1-2 ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເສັຍ ຫຍ້າ

ພວມດິນ ແລະ ຕັດແຫນງ ກົງງ່າທີ່ເຫນົ້າ, ງ່າຕາຍອອກ ແລະ ກໍ່ຄວນຫົດ
ນ້ຳຖ້າຫາກເຫັນວ່າດິນແຫ້ງ ຫລື ບໍ່ມີຝົນຕົກ.

ການໃສ່ຝຸນ : ອັດຕາຝຸນອອກ ຫລືຝຸນບິນໂປະມານ 3-4 ກິ ໂລ
ກຼາມ/ 1 ຊຸມ ຊຶ່ງໃສ່ໃນຕົ້ນລະດູຝົນ ນອກຈາກນີ້ອາດຈະໃສ່ປຸ່ຍສູດ 8 -
10-5 ຫລື 15-15-15 ໃນອັດຕາ 200-300 ກຼາມ/ຕົ້ນ. ໃສ່ ອ້ອມ
ບໍລິເວນຊົງຝຸນ.

ການໃຫ້ໝາກ : ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນທີ່ເປັນດິນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການບົວ
ລະບັດຮັກສາດີ ໝາກຂຽບຈະເລີ້ມໃຫ້ໝາກໃນ 1 - 2 ປີຫລັງ ຈາກ
ປູກ ແລະ ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດສູງໃນປີທີ 3 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝາກຂຽບຈະເລີ້ມອອກດອກໃນຕົ້ນລະດູຝົນ ແລະອອກເປັນ 2
ຊຸດ ໆຫ້ອິດຈະໃຫ້ໝາກໜ້ອຍແຕ່ໜ່ວຍໃຫຍ່ ແຕ່ຊຸດທີ 2 ຈະໃຫ້ໝາກ
ຫລາຍແຕ່ໜ່ວຍນ້ອຍ.

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຂອງໝາກຂຽບ :

- ພະຍາດ ຮາກເປື້ອນ ສ່ວນຫລາຍມັກເກີດເວລາຕົ້ນຍັງ ນ້ອຍ
ຫລື ເປ້ຍ ແຊ່ນ້ຳເກີນໄປ.

- ເຈຊ້ອລາດຳ ມັກເກີດຢູ່ໝາກ, ກ້ານໃບ, ບອດ.

ວິທີປ້ອງກັນ : ຄວນໃຊ້ຢາ ບອກໂດຝຸນ 3-5 ບ່ວງແກງຕໍ່ ນ້ຳ
20 ລິດ ສິດໃສ່ປ່ອນບໍລິເວນທີ່ມີ ຊຶ່ງສິດ 2-3 ເທື່ອ ໄລຍະຫ່າງກັນ ປະ
ມານ 5-7 ມິຕາເທື່ອ.

ແມງໄມ້ :

- ເພັຍອ່ອນ: ເຊັ່ນປະເພດເພັຍແປ້ງ, ເພັຍຫອຍ ມັກຈະ ເກີດ
ໃນບໍລິເວນ ບອດອ່ອນ, ກ້ານໃບ ແລະ ໝາກ.

- ບັງເຈາະລຳຕົ້ນ :

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຈຳພວກ ນິດ, ນິກ ມັກມາຫາລາຍເວລາໝາກ

ສຸກເກົ່າ.

ວິທີປ້ອງກັນ : ຄວນໃຊ້ຢາເຊອິນ 85% (ຄາບາຣິນ) ປະ
ມານ 1 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດຕອນເຊົ້າ ຫລື ດິເທັດມ່ວນ ຕອນ
ແລງ.

ວິທີປຸກຫມາກລຳໄຍ

ຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານຂອງລຳໄຍ ແມ່ນມີທາດຊີ້ນ 0,9% ໄຂມັນ 0,1% ທາດແປ້ງ 15,4% ແຮ່ທາດອື່ນ ໆ 0,3%.

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ :

1. ດິນ. ລຳໄຍເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ສູງ ເຖິງປານກາງເຊັ່ນ: ດິນລ້ວນ, ດິນລ້ວນປົນຊາຍ ຫລື ດິນລ້ວນປົນໜຽວ ຖ້າເປັນດິນໜຽວກໍຄວນຈັດລະບົບນ້ຳຊຶມລະປະທານເອົາເຂົ້າ ເອົາ ອອກ ໃຫ້ໄດ້ສະດວກ.

2. ນ້ຳ. ໃນເຂດທີ່ມີປະລິມານນ້ຳຝົນ 1.200-1.500 ມມ ຕໍ່ປີໃນໄລຍະ 100-500 ວັນ ຕໍ່ປີແມ່ນເໝາະສົມຕໍ່ການປຸກລຳໄຍ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກມີປະລິມານນ້ຳຝົນໜ້ອຍຈຳຕ້ອງໄດ້ມີຊຶມລະປະທານເພື່ອ ສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຕົ້ນພືດ. ລຳໄຍຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍແມ່ນໃນທ້ອງເດືອນ ມີນາເຖິງເດືອນເມສຸນາ ເພາະໃນຊ່ວງນີ້ ອາກາດຮ້ອນຄວາມຊຸ່ມຂອງ ອາກາດຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ດອກຕົກຫລົ້ນໄດ້ງ່າຍ.

3. ອຸ່ນຫະພູມ. ລຳໄຍຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ, ອອກດອກ ຫລາຍ ໃຫ້ຫມາກຫລາຍ ແມ່ນສະພາບອຸ່ນຫະພູມຂອງອາກາດສະເລ່ຍປະມານ 20-25 ອົງສາເຊ ແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາອອກດອກ ລຳໄຍຕ້ອງການອຸ່ນຫະ ພູມ

ຕຳເຖິງ 10 ອົງສາເຊ ເວລາຕິດໝາກແລ້ວອຸ່ນຫະພູມຈະສູງເຖິງ 40 ອົງສາເຊ ກໍສາມາດໃຫ້ຜົນພະລິດສູງໄດ້.

ລະດູປູກ : ການປູກລຳໄຍຄວນປູກໃນຫ້າຍລະດູຝົນ ເພາະເວລານີ້ ດິນມີຄວາມອຸ່ນ, ອາກາດຄ່ອຍ ໆ ເລີ່ມປ່ຽນຈາກຮ້ອນມາເປັນເວລາດຽວກັນນີ້ ຕົ້ນລຳໄຍແມ່ນເກີດໃບອ່ອນໄດ້ດີກຫນາ, ການລະບາດ ຂອງແມງໄມ້ກໍລົດນ້ອຍຖອຍລົງ. ແຕ່ຖ້າໃນຝົນທີ່ມີນ້ຳຊືນລະປະຫາມອາດ ຈະປູກ ເວລາໃດກໍໄດ້ແຕ່ຄວນລະມັດລະວັງແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດມາ ລົບກວນ.

ກຽວກັບແນວພັນ :

ລຳໄຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດເຊັ່ນ:

1. ລຳໄຍເລືອ. ເປັນລຳໄຍທີ່ມີຫນ່ວຍນ້ອຍນວນຫນ້ອຍແຕ່ ແກ່ນໃຫຍ່ ມີກິນຂົວຄ້າຍຄືກັບກິນມາດ. ສ່ວນຫລາຍມັກນິຍົມປູກເປັນໄມ້ປະດັບ.

2. ລຳໄຍຕ້ນ. ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື:

- ລຳໄຍຝັນເມືອງ : ເປັນລຳໄຍທີ່ມີຫມາກນ້ອຍ ນວນຫນ້ອຍ ແກ່ນໃຫຍ່ ລຳຕ້ນຊື່ເປືອກຫຸ້ມລຳຕ້ນ ມັກແຕກເປັນກາບ. ສ່ວນຫລາຍນິຍົມໃຊ້ເປັນຕ້ນຕໍ່.

- ລຳໄຍໃຫຍ່ (ລຳໄຍ ທີ່ຖືກປັບປຸງແລ້ວ). ປັດຈຸບັນມີຫລາຍແນວພັນເຊັ່ນ: ພັນອີດີ, ພັນແຫ້ວ, ພັນສີຊົນພູ ພັນບ້ຽວຂຽວ ເຫລົ່ານີ້ ເປັນຕ້ນ.

ການຂະຫຍາຍພັນ : ການຂະຫຍາຍພັນລຳໄຍເຮັດໄດ້ຫລາຍວິທີ

1. ການຕອນງ່າ (ໂທມງ່າ) ໃນປັດຈຸບັນຍັງນິຍົມ ໃຊ້ງ່າຕອນໄປ ປູກເປັນສ່ວນຫລາຍ ໂດຍໃຊ້ງ່າທີ່ມີອາຍຸປະມານ 8-12 ເດືອນ ຈາກຕ້ນທີ່ບໍ່ມີພະຍາດລົບກວນ. ກ່ອນຈະຕອນຄວນແອ່ກາບພ້າວໄວ້ປະມານ 3 - 4 ເດືອນ ຫລືໃຊ້ວິທີຕັ້ງຢ່າງຕໍ່າບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 3 ຊົ່ວໂມງ.

ວິທີຕອນ : ເມື່ອເລືອກງ່າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວຊຶ່ງປອດຈາກພະ ຍາດ
ແນງໄມ້ລຶບກວນ.

ໃຊ້ມືດຫັ້ນອ້ອມເປືອກຂອງງ່າລຳໄຍ 2 ບ່ອນຫ່າງກັນປະມານ 2-
5 ຊຸຕມ ອັນກັບຄວາມໃຫຍ່ຂອງງ່າ ແລະ ໃຫ້ງ່າມີຄວາມຍາວແຕ່ ປາຍ
ຮອດປາກ ປາດຕອນປະມານ 30-50 ຊຸຕມ. ຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ປາຍມືດແກະ
ເປືອກອອກ ໃຊ້ຄືມມືດຂູດແກນຂອງງ່າແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.

ຈາກນັ້ນ ໃຊ້ດິນຫມຽວ (ດິດແທ້ແມ່ນໃຊ້ດິນໂພນຈຸນປວໝ) ຫຸ້ມປາກ
ບາດດ້ານເທິງ ຕໍ່ມາກໍໃຊ້ກາບພ້າວທີ່ຕຽມໄວ້ມາຫໍ່.

ໃຊ້ແຜ່ນຢາງຊະນິດຫນາມາຫຸ້ມອີກ, ມັດດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງ
ດ້ວຍເຊືອກຟາງ ຫລື ໄມ້ຕອກໃຫ້ແຫນ້ນປະໄວ້ປະມານ 8-10 ອາທິດເຫັນ
ວ່າງ່າຕອນເກີດຮາກ ຈຶ່ງຕັດໄປຊຳປະໄວ້ປະມານ 1-2 ເດືອນແລ້ວ ຈຶ່ງ
ນຳໄປປູກ.

ການປູກລຳໄຍດ້ວຍງ່າຕອນຄວນເຮັດຮາກເສີມກຳລັງໄປພ້ອມ ກັນ
ທັງນັ້ນກໍຍ້ອນ ງ່າຕອນມີແຕ່ລະບົບຮາກຝອຍ, ບໍ່ສາມາດ ອູ່ລຳຕົ້ນໄດ້ເທົ່າທີ່
ຄວນ, ບໍ່ສາມາດດູດທາດອາຫານ ແລະ ນຳໄປລ້ຽງລຳຕົ້ນໄດ້ດີ.

ວິທີເຮັດຮາກສຳຮອງແມ່ນໃຊ້ແກ່ນລຳໄຍພື້ນເມືອງປູກລົງໃກ້ ໆກັບ
ງ່າຕອນທີ່ປູກນັ້ນ ພໍເມື່ອຕົ້ນຫາກໃຫຍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕດີແລ້ວກໍໄມ້ມັດຕົ້ນ ທັງ
ສອງຕິດເຂົ້າກັນ ດ້ວຍວິທີປາດຂ້າງຂອງລຳຕົ້ນແຕ່ລະຕົ້ນປະມານ 4 ຊຸຕມ
ໃຊ້ເຊືອກ ຫລື ຢາງຄຽນໃຫ້ແຫນ້ນເຫັນວ່າມັນຕິດຈອດກັນດີແລ້ວ ຈຶ່ງ ຕັດ
ຍອດຂອງຕົ້ນທີ່ໃຊ້ແກ່ນປູກນັ້ນອອກ (ໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ເດືອນ).

ການທາມງ່າ : ເປັນວິທີງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຜົນດີ. ວິທີທາມແມ່ນ
ປາດງ່າຕົ້ນຕໍ ແລະ ຕົ້ນພັນ ໃຫ້ຍາວເທົ່າ ໆກັນ ແລ້ວນຳປາກບາດ ມາ
ປະແປະເຂົ້າກັນແລ້ວເອົາເຊືອກ ຫລື ຢາງຄຽນໃຫ້ແຫນ້ນ. ຂະບວນ ການ
ກະຕຽມຕົ້ນຕໍກໍຄ້າຍຄືກັບຜິດອື່ນ ໆ.

ການຕໍ່ ຫລືສຽບງ່າ : ເປັນຂັ້ນຕອນແມ່ນກ້າແກ່ນລຳໂຍໃສ່ຖົງ ຫລື
ພາຊະນະອື່ນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົ້ນຕໍ. ເມື່ອຕົ້ນຕໍໃຫຍ່ເທົ່າກັບສີດຳ ຫລືມີເສັ້ນ
ຜ່າສູນກາງປະມານ 1 ຊຸດ ກໍຕັດຍອດອອກ, ຈຶ່ງຕໍ່ໄວ້ປະມານ 5-10 ຊຸດ
ຕາມ ຈາກປາກຖົງ. ໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດປາຍຕົ້ນຕໍ (ຫ່າງຈາກສິ້ນປະມານ
2-3 ຊຸດ). ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຈິກ ຫລືແລ່ງ ເວລາຜ່າເພື່ອນຳງ່າ ມາ
ສຽບໃສ່.

ການຕຽມຍອດມາສຽບ ແມ່ນຕັດຍອດພັນດີຍາວປະມານ 3-10 ຊຸດ
ຕາມ ໃຊ້ມີດຄົມ ໆປາດເປັນຮູບຫລັ່ມສັ້ນແຫລມຍາວເທົ່າກັບປາກປາດທີ ຜ່າ
ຕົ້ນຕໍໄວ້ແລ້ວນັ້ນ. ຈາກນັ້ນກໍນຳມາສຽບໃຫ້ແຈບເຂົ້າກັນເປັນຢ່າງ ດີ
(ເປືອກຕໍ່ເປືອກດ້ານຂ້າງໃຫ້ຕິດກັນ ເປັນຢ່າງດີ). ໃຊ້ຢາງຄຽນ ໃຫ້
ແຫນ້ນໃນບໍລິເວນ ບ່ອນຕໍ່ກັນນັ້ນ. ຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ຖົງຢາງມາມັດຫຸ້ມ ຍອດ
ສຽບນັ້ນໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຫ້ງ ຫລືລະເຫີຍຂອງນ້ຳຈາກ ງ່າ
ພັນດີທີ່ນຳມາສຽບນັ້ນ. ປະມານ 25-30 ວັນ ເມື່ອເວລາຍອດພັນດີເຕັມ
ວ່າຕິດ, ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນຈົນຄັບຖົງຢາງແລ້ວຈຶ່ງເອົາຖົງຢາງນັ້ນອອກ.
ຈາກນັ້ນປະມານ 2 ເດືອນຈຶ່ງນຳໄປປູກໄດ້.

ວິທີປູກ ແລະ ຕຽມດິນ :

ດິນທີ່ຈະປູກກໍຄວນເປັນດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ຊຸມກໍຕ້ອງກວ້າງ ພໍ
ດີເພື່ອສະສົມທາດອາຫານຂອງພືດ,

ໄລຍະປູກ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ແນວພັນທີ່ ຈະ
ໃຊ້ປູກ, ນ້ຳ ແລະ ປະລິມານຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການ. ປົກກະຕິປັດຈຸບັນນັກນິ ຍົມ
ກັນປູກໃນໄລຍະ 12x12 ແມັດ, 16x16 ແມັດຫລື 12x6 ແມັດ. ຖ້າ
ປູກດ້ວຍງ່າຕອນ ຈະເປັນຫມາກໃນປີທີ 3.

ການຕຽມດິນ ຫລື ຊຸມ, ຂະໜາດຂອງຊຸມແມ່ນ 1 ແມັດ (1 x
1 x 1) ແມັດ ເອົາດິນຊັ້ນເທິງລົງກັນຊຸມແລ້ວ ແບ່ງດິນຊັ້ນລຸ່ມທີ່ອຸດ ຂຶ້ນ

ນາປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກ ທີ່ຝຸ່ນບິ້ມ ແລະ ເສດຜິດຕ່າງ ໆທີ່ເໝາະເປືອຍແລ້ວ ນັ້ນລົງຊຸມ ຈົນເຕັມຈຶງປູກຕົ້ນລຳໄຍ.

ການປົວລະບັດຮັກສາ :

ຫລັງຈາກປູກໄດ້ 1 ປີ ເຫັນວ່າຕົ້ນລຳໄຍຈະເລີນເຕີບໂຕສົມ ບູນ ດີແລ້ວ ຄວນເລີນຕັດແຕ່ງຮູບຊົງຂອງຝຸ່ນ ໂດຍຕັດງ່າທີ່ແຕກຕາມ ເຫງົ້າ ແລະ ດ້ານລຸ່ມອອກໝົດໃຫ້ປະໄວສູງຈາກໜ້າດິນ 90-100 ຊ.ຕມ ໃຫ້ ເຫລືອໄວ້ແຕ່ 3-4 ງ່າເທົ່ານັ້ນ.

ການຕັດແຕ່ງຝຸ່ນ: ຄວນປະຕິບັດກັນໃນລະດູຝົນ ແລະ ໃຫ້ຕັດແຕ່ງ ໄປເລື້ອຍ ໆໃນລະຍະ 3-4 ປີ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ . ຄວນໃສ່ຝຸ່ນປີລະ 2 ຄັ້ງຢ່າງຕໍ່າເຊັ່ນ: ໃສ່ຕົ້ນລະ ຄູຝົນ ແລະ ຫລັງຈາກເກັບໝາກສຳເລັດ. ສຳລັບຝຸ່ນທີ່ນຳໃຊ້ຕໍ່ລຳໄຍ ນີ້ ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ຝຸ່ນບິ້ມ ເພາະຝຸ່ນດັ່ງກ່າວ ນີ້ ຊ່ວຍປັບປຸງດິນໃຫ້ຮັກສານ້ຳໄດ້ ເກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນໄດ້ດີ ແລະ ຖ້າ ຈຳເປັນແມ່ນໃສ່ປຸ້ຍເຄມີປະສົມເຂົ້ານ້ຳ.

ເມື່ອເວລາຕົ້ນລຳໄຍຍັງນ້ອຍມີຄວາມຕ້ອງການທາດອາຫານ ເພື່ອ ລ້ຽງໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຄວນໃສ່ຝຸ່ນປະເພດອາໂຊດ (N) ແລະ ກາລີ (K) (ຕ້ອງໃສ່ຂີ້ເຫຼົ້າໜຸກ ໆປີ). ເວລາໃກ້ຈະອອກຝອກລຳ ໄຍ ຕ້ອງການຝຸ່ນຟອດສະຟໍ (P) ຫລາຍຂຶ້ນ, ອັດຕາຝຸ່ນແມ່ນໂດຍປະ ມານ ຊຸມລະ 100-1.000 ກຳມ/ປີ ຂອງຝຸ່ນສຸດ 15-15-15 ຫລື 13-13-13.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຈຳກັດພະຍາດແມງໄມ້ :

ພະຍາດລຳໄຍແມ່ນວ່າມີຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ພົບໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ ພະຍາດໃບກູດ (ຍອດກູດ). ມີອາການທີ່ຍອດຈະເກີດເປັນຟອຍສີນ້ຳຕານ ປົກຄຸມຕາມຍອດໃນທີ່ສຸດຍອດກໍ່ຕາຍ, ຖ້າວ່າພະຍາດນີ້ໜ້າກໍ່ມີປາກົດ ຂຶ້ນ

ຄວນຕັດຍອດນັ້ນຖິ້ມ ແລະ ຢ່າຂະຫຍາຍພັນຈາກງ່າທີ່ເປັນເດັດຂາດ.

ແມງໄມ້ທີ່ພົບຫົວໄປນຳຕົ້ນລຳໄຍແມ່ນມີຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນວ່າ. ໂຮ
ແດງ - ຈະລະບາດໃນລະດູແລ້ງ ຖ້າມີຝົນຕົກກໍລະຫາຍໄປ.

- ໂຮລຳໄຍ - ເປັນແມງໄມ້ຕົວນ້ອຍສີເຫຼືອງອ່ອນ. ມັກຢູ່ຕາມ
ກ້ອງໄບຮວມຕົວກັນເປັນຈຸດ ໆ. ວິທີປາບແມ່ນໃຊ້ຢາປະເພດດູດຊຶມ ເຊັ່ນ
ໄດເມນໂທຣອດ, ໄບດຣິນ, ອະໂຣເກີ, ເຟີເຟດ ໂຫອນ ສິດຕາມຄຳ
ແນະນຳຢູ່ໃນຢາ.

- ເຜ້ຍ ມັກຈະເກີດຄຽງຄູ່ກັບມົດ. ປະເພດເຜ້ຍມັກພົບແມ່ນເຜ້ຍ
ຫອບ ແລະ ເຜ້ຍແປ້ງ. ໃຫ້ໃຊ້ຢາສິດປະເພດດູດຊຶມ.

- ບັງເຈາະງ່າ. ພວກມັນມັກຈະລະບາດເປັນປະຈຳ.

- ບັງເຈາະເປືອກລຳຕົ້ນ. ສຳລັບບັງປະເພດເຈາະງ່າ ແລະ
ເຈາະເປືອກຂອງລຳຕົ້ນນີ້ຄວນໃຊ້ຢາປະເພດດູດຊຶມ ສິດ ຫລືໃສ່ນຳດິນ ບໍ່
ລິເວນຮາກອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນໃຊ້ຢາປະເພດຖືກໂຕຕາຍ ຊຶ່ງປະສົມນ້ຳໃນ ອັດ
ຕາ 1:1. ແລ້ວໃຊ້ເຂັ້ມສັກຢາສິດເຂົ້າໄປຕາມຮູຂອງຕົວ ຫລືບັງເຈາະ
ນັ້ນ.

- ແມງໄມ້ປີກແຂງ ເຊັ່ນວ່າ ແມງກິນູນ, ແມງຄ່ອມຫອງ ນອກ
ຈາກນີ້ກໍຍັງມີ ບັງຄືບປະເພດກັດກິນໃບອ່ອນ. ວິທີປາບແມ່ນໃຊ້ຢາ ຄາບາ
ຣິນ (ເຊວິນ 85%) ສິດ.

ສັດຕູພືດທີ່ຫຳລາຍໃນລະບະເປັນດອກ :

- ບັງກິນດອກລຳໄຍ ເປັນບັງປະເພດທີ່ເຂື່ອນອອກຈາກແມງກະເບື້ອ
ມັກຫຳລາຍໃບໃນໄລຍະກຳລັງຈູມດອກ.

- ບັງເຈາະກ້ານດອກ. ເປັນບັງຕົວນ້ອຍ ເຫຼົ້າກັບເສັ້ນດ້າຍ. ຖ້າ
ຫາກເກີດບັງຊະນິດນີ້ຫຳລາຍ ລຳໄຍຈະບໍ່ຕິດໝາກ ວິທີປ້ອງກັນແມ່ນ ສິດ
ຢາໃນເວລາເລີ່ມຈຳພວດອອກ.

ສັດຕູພຶດທິທຳລາຍໄລຍະດອກບານ ແລະ ຫມາກສຸກແກ່ :

ໃນລະຍະດອກບານ ນັກຈະມີແມງແຄງມາຫຳລາຍ (ແມງ ແຄງ ໃຫຍ່ພົກເກີດຕາມຕົ້ນຫມາກແງວ).

ໃນລະຍະຫມາກສຸກແກ່. ໜ່ວຍລະໂຍກຳລັງເລີ່ມຫວານນັກຈະ ມີ ແມງວັນຫອງ ແລະ ແມງກະບັບອຸດົມກໍ່ຫວານມາຈາກໜ່ວຍລຳໂຍ ວິ ທີປ້ອງກັນກັບດັກ () ໃນເວລາກາງຄືນ (ຖ້າໃຊ້ຢາສິດອາດຈະ ມີສານພິດຕົກຄ້າງຕາມໜ່ວຍລຳໂຍ).

ການເກັບກູ້ຮ່ວມລຳໂຍ : ເວລາລຳໂຍເລີ່ມອອກດອກຫາສຸກ ແກ່ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ເດືອນ. ການເກັບຄວນແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະ (ເກັບ 2 ເທື່ອ) ຫ່າງກັນເທື່ອລະ 8-10 ວັນ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການເກັບ :

1. ບໍ່ຄວນເກັບລຳໂຍໃນມື້ຝົນຕົກ.
2. ບໍ່ຄວນປະລຳໂຍຄ້າງໄວ້ໃຫ້ສຸກໃນຕົ້ນດິນເກີນໄປບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລຳໂຍຈະມີຄວາມຫວານໜ້ອຍລົງ.
3. ເວລາເກັບບໍ່ຄວນຫັກງ່ຳລຳໂຍ ໃຫ້ປິດ ຫລືກັດໃນບໍລິ ເວນ ກ້ານຂອງພ້ວມຫມາກ.
4. ຄວນເກັບລຳໂຍຕອນເຊົ້າ ຫລືຕອນແລງ.
5. ເຄື່ອງມືໃຊ້ຕັດຮ່ວມລຳໂຍຄວນໃຊ້ມີດຕັດຈາກນັ້ນກໍຮີບສັ່ງ ຕະ ຫັນທີ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄຸນນະພາບກໍຈະຕົກຕ່ຳ.

ວິທີປຸກຫມາກກະຫັນ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ :

ຕົ້ນກະຫັນເປັນພືດປ່າ, ກ່ອນປີ 4.000 ປີ ຫມາກກະຫັນໄດ້ ຖືກນຳມາປຸກເປັນພືດບໍລິໂພກຢູ່ປະເທດຈີນ. ຫມາກກະຫັນມີປະມານ 400 ຊະນິດ. ສຳລັບດ້ານຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແມ່ນນອກຈາກເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ເປັນອາຫານບຳລຸງແລ້ວຍັງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງຢາປະເພດແກ້ວຈັບຫ້ອງ ຫາດອາຫານບັນຈຸຢູ່ຫມາກກະຫັນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈະມີຫາດແຫ້ງ 23-30% ໃນນີ້ຈະບັນຈຸຫາດນ້ຳຕານ 21-62% ຫາດຊຸ້ມ 3% ຫາດສົ້ມ 6%, ວິຕາມິນເຊ 300-800 ມິລິກຼາມ/ກຼາມ. ວິຕາມິນເປ (P P) 25 - 100 ມິລິກຼາມ/ 100 ກຼາມ ແລະ ຫາດເຫລັກປະມານ 5-7 ມິລິ ກຼາມຕໍ່ 100 ກຼາມ.

ລັກສະນະທາງພຶກສາກຂອງຫມາກກະຫັນ :

ກະຫັນເປັນຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດກາງ (ເຄິ່ງຝຸ່ນເຄິ່ງ ໄມ້ໃຫຍ່). ມີຄວາມສູງປະມານ 4-5 ແມັດ ແລະ ຫລາຍກ່ວາຫົນຫານຕໍ່ຄວາມ ແຫ້ງແລ້ງ (dry district) ກິ່ງງ່າ ແລະ ແຫນງ ເກີດຈາກລຳຕົ້ນ, ແຫນງທີ່ແຕກໃຫມ່ ມີສີແດງ ແລ້ວປ່ຽນເປັນສີຂຽວ. ຫມາກມີລັກສະນະກົມ, ຍາວໃບດ້ານເທິງເປັນມັນພື້ນເປັນສີໂມກ, ຂຽວອ່ອນ. ຊົດອກອອກຕາມກິ່ງງ່າ

ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ. ກິນຂອງດອກສ່ວນຫລາຍມີກັນເໝັນ ເມື່ອເວລາ ມີ
ການປະສົມພັນແລ້ວກິນເຫລົ່ານັ້ນກໍ່ຄ່ອຍ ງຸລິດຜ່ອຍໄປຕາມລຳດັບ. ແກ່ນ
ມີກາຍແຂງຕິດກັບນວນ ພາຍໃນແກ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ຫ້ອງ. ແຕ່ ລະ
ຫ້ອງມີ 1 ຈາວ.

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ : ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນດິນປະ ເພດ
ຊາຍແກນຕີນ ເປັນດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງ ຂອງ
ດິນແມ່ນ PH 6-6,5 ຕົ້ນກະທັນເປັນພືດທີ່ມັກແສງ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ຕົ້ນ
ກະທັນສາມາດເກີດໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ ແຕ່ຈຸນນະພາບ ແລະ ຜົນຜະ ລິດ
ຈະແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ການຂະຫຍາຍພັນ : ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນ ສາ
ມາດແບ່ງອອກເປັນຫລາຍວິທີເຊັ່ນ:

1. ວິທີຂະຫຍາຍດ້ວຍແກ່ນ. ການຂະຫຍາຍດ້ວຍວິທີນີ້ແມ່ນມີ ຂໍ້
ດີເຊັ່ນ ລຳຕົ້ນແຂງແຮງມີລະບົບຮາກດີ. ແຕ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງແມ່ນ ບໍ່ສາມາດ ສືບ
ຕໍ່ພັນເດີມໄດ້, ໃຫ້ຜົນຜະລິດຊ້າ ແລະ ຫນ້ອຍ. ສ່ວນຫລາຍວິທີນີ້ ແກ່ນ
ນີ້ແມ່ນໃຊ້ເຮັດຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຫາມັກງາ, ຕິດຕາ, ສຽບຍອດ ຫລື ສຽບ ຂ້າງ

2. ການຂະຫຍາຍດ້ວຍການຕິດຕາມ. ວິທີນີ້ ມີຂໍ້ດີຢູ່ເຊັ່ນ: ໃຫ້
ຜົນຜະລິດໄວ, ກຳນົດ ແລະ ຄັດເລືອກພັນທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ຕາມໃຈ, ຈຸນ ນະ
ພາບຂອງໝາກດີ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງແມ່ນລຳຕົ້ນອາດຫັກ ຫລືຈຶກງ່າຍທີ່ບໍ່ລິ ເວນ
ຕິດຕາໃນເວລາມີຟ້າລົມ ຫລືສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ອຳນວຍຈົນຮອດການ ປົວ
ລະບັດຮັກສາຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ.

3. ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການຫາມັກງາ. ຂໍ້ດີແມ່ນລ້າຍ ງ
ກັບການຕິດຕາ ແຕ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຂະບວນ ແລະ ວິທີການ ມີ
ຫລາຍອັນຕອນກ່ວາ ຍ້ອນວ່າຕ້ອງໄດ້ຕຽມກາບຟ້າວ, ຕ້ອງໄດ້ຊຳໄວ້ ໃນ
ຮົ່ມ ຫລັງຈາກຕັດອອກຈາກຕົ້ນຫາມ. ເພາະສະນັ້ນວິທີ ນີ້ມັກໃນປັດຈຸ

ບັນແມ່ນການຕິດຕາ.

ການປູກ :

ໄລຍະປູກແມ່ນອີງຕາມສະພາບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຖ້າ ເປັນ
ດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນຄວນໃຊ້ໄລຍະທີ່ ເຊັ່ນ: 6×6 ແມັດ ຫລື 7×7 ແມັດ.

ການຕຽມດິນ ຫລືຊຸດຊຸມປູກ ແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບປູກຕົ້ນໄມ້ຊະ ນິດ
ອື່ນ ໆ ເຊັ່ນ: ການປະສົມຝຸ່ນຄອກລົງຊຸມເບື້ອງຕົ້ນກໍແມ່ນໃສ່ ອັດຕາ
1:1.

ການບົວລະບັດຮັກສາ :

ການເສັຍຫຍ້າ: ຫລັງຈາກປູກໄດ້ປະມານ 2-3 ເດືອນຄວນ ເສັຍ
ຫຍ້າອ້ອມຕົ້ນກະທັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຄວນມີການພວນດິນຕາມ
ຫວ່າງຕົ້ນ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ: ແມ່ນປະຕິບັດຫລັງຈາກເສັຍຫຍ້າພວນດິນ, ແຕ່ຄວນ
ລະມັດລະວັງໃນການໃສ່ເພາະວ່າຫລັງຈາກເກັບກ່ຽວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕັດ ຕົ້ນ
ເກົ້າອອກ ເພາະສະນັ້ນບໍ່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນໃກ້ຕົ້ນ ຄວນຫມາຍເຂດຂອງຊົງ ຝຸ່ນ
ໄວ້ແລ້ວໃສ່ຕາມຊົງຝຸ່ນຕົກ ຫລື ຫ່າງຈາກຕົ້ນປະມານ 35 ຊ.ຕມ ອາດຈະ
ໃສ່ເປັນຮ່ອງອ້ອມ ຫລືເຮັດເປັນຈຸດ. ຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ 15-15-
15 ໃນອັດຕາ 300-400 ກຸນ/ຕໍ່ 1 ຊຸນ.

ການຕັດແຕ່ງ: ການຕັດແຕ່ງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ສຸດຕໍ່ບັນຫາ ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດຕໍ່ຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນວິທີ ແລະ ອັນ ຕອນ
ມີດັ່ງນີ້:

* ຕັດແຕ່ງເວລາຕົ້ນຫມາກກະທັນມີອາຍຸ 3 ປີ ໃຫ້ຕັດລຳຕົ້ນອອກ
ຫມົດ, ໃຫ້ຍັງເຫລືອແຕ່ 30 ຊ.ຕມ ຈາກຫນ້າດິນ. ແຕ່ຄວນສັງເກດ ວ່າ
ຕົ້ນກະທັນປູກດ້ວຍການຕິດຕາ ຫລືທາມກົງ ບໍ່ຄວນຕັດຕຳກ່ວາຕາ ຫລື ກົງ
ງ່າແນວພັນ. ຈາກນັ້ນປີທີ 3 ຕໍ່ໆໄປແມ່ນໃຫ້ຕັດສູງຂຶ້ນຈາກລະດັບ ເດີມ

5-10 ຊຸມ. ຫຼັງຈາກຕັດໄດ້ 1-2 ເດືອນ ຈະມີແຫນງໃຫມ່ເກີດ ຂຶ້ນ
ມາ ເຮົາຄວນ ເລືອກເອົາແຫນງໃຫຍ່ ແລະ ສົມບູນໄວ້ 4-5 ແຫນງເພື່ອ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຕັດຖົມຫມົດ. ສະເພາະແມ່ນແຫນງ
ອອກຈາກຕົ້ນຕໍ.

ພະຍາດແມງໄມ້ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ :

ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ. ສາມາດພົບໃນຕົ້ນກະທັນຊຶ່ງ ມີ
ອາການເປື່ອຍເປັນຈຸດ, ໃບກູດຫຸ່ງວຸດຫຼັງ ບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ໄດ້
ເປັນປົກກະຕິ ຫມາກກະທັນບໍ່ສົມບູນ.

ເຊື້ອລາ ມັກເຫັນຕາມໃບ ແລະ ເປືອກຂອງລຳຕົ້ນ ຫລື ກົງງ່າ,
ເຮັດໃຫ້ລຳຕົ້ນບໍ່ສົມບູນໃບເປັນຈຸດສີດຳ.

ວິທີປ້ອງກັນ : ຈຳພວກນີ້ແມ່ນຄວນໃຊ້ຢາ ທີລາຄໍ ໃນອັດຕາ 25
ກຼາມ/ 1 ລິດ ສີດຫົວບໍລິເວນພູມ.

ແມງໄມ້ : ສັດຕູພືດທີ່ມັກຫາລາຍແມ່ນ ພາກສ່ວນໃບ ແລະ ຫມາກ
ເຊັ່ນບັງຮຳໃບ, ບັງເຈາະຫມາກ. ສາຍເຫດແມ່ນເກີດຈາກແມງ ກະ
ເຊື້ອ ແລະ ແມງວັນໜາກໄມ້.

ວິທີປ້ອງກັນ : ຄວນໃຊ້ຢາປະເພດ ເທີເຣັກ ປະສົມກັບນ້ຳໃນອັດ
ຕາສ່ວນ 1/800 ສີດຕາມຫມາກ ແລະ ບໍລິເວນຕົ້ນໝູກ ໆອາທິດ.

ການເກັບກູ່ຮູວ : ຫມາກກະທັນແມ່ນເກັບກູ່ຮູວໄດ້ຫລາຍເທື່ອ ຕໍ່
ຕົ້ນ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ກະທັນສູງກວ່າຕົ້ນເພາະ ການບໍລິໂພກຫມາກກະທັນ ພັນ
ປັບປຸງນີ້ແມ່ນເວລາແກ່(ຝັງ). ເປືອກຂອງຫມາກຈະມີສີຂຽວເລື້ອມ, ລັກ
ຊະນະຜ່ອຍ.

ສາລະບານ

	ໜ້າ
1. ວິທີປູກຫມາກຂາມຫວານ	1
2. ວິທີປູກຫມາກມ່ວງ	16
3. ວິທີປູກຫມາກຂຽບ	22
4. ວິທີປູກຫມາກລຳໄຍ	27
5. ວິທີປູກຫມາກກະທັນ	34

