

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນເພື່ອຄຳປະກັນ

ສະບຽງອາຫານແບບຍືນຍົງ

ທີ່ເມືອງງາ ແລະ ເມືອງໄຊ , ແຂວງອຸດົມໄຊ

**Community Based Rural
Development Project for Sustainable
Food Security in Nga and Xay
District Oudomxay Province**

ບາງຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກວິທີການ ລ້ຽງຄັງ



ຮຽບຮຽງໂດຍ: ປາພອນ ບູລົມ

(ທີ່ປຶກສາວຽກງານປູຝັງ)

ບຸນເຄນ ມະນີຈິດ (ວິຊາການ)

Brice Pletsers (ຊ່ຽວຊານ)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ DWHH /
GAA

ບົດນຳ.

ຄັງເປັນແມງໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່

ກັບລຳຕົ້ນຂອງໄມ້ ຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຢູ່ຕາມ

ທຳມະຊາດແລະທີ່ຄົນເຮົາປູກເອງໄດ້ເຊັ່ນ:

ຕົ້ນຖົ່ວແຮ, ຕົ້ນສົມສາ, ຕົ້ນໝາກແຟນ, ໝາກ

ຂາມປ້ອມ, ຕົ້ນເປົ້າ... ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຍັງດິບ. ຄັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍໆ

ດ້ານເຊັ່ນ: ເປັນສີ່ຍ້ອມຜ້າ, ໄໝ, ເຮັດນ້ຳມຶກ

ພິມ, ນ້ຳມັນຂັດພື້ນ ຕາມລຳພ້າ ອື່ນໆ ແລະ

ຍັງເປັນສິນຄ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດສ້າງລາຍ

ຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວອີກດ້ວຍ. ຄັງເປັນແມງໄມ້

ທີ່ລ້ຽງໄດ້ງ່າຍ ສາມາດ ລ້ຽງໄດ້ທຸກລະດູແລະ

ມີ 3 ຊະນິດແນວພັນຄັງ ຄື: ແນວພັນຄັງ ດໍ,

ກາງ , ປີ ເຊິ່ງທາງໂຄງການ GAA ເມືອງງາ

ແລະ ເມືອງໄຊ ໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງຄັງດໍ ມີ

3 ບ້ານ 8 ຄອບຄົວ 2.5 ha .ມີ: ບ້ານ

ປາງແມງ, ບ້ານວັງຍານ, ແລະ ບ້ານ

ຫ້ວຍໝອກ ສົກປີ 2005 - 2006

1. ການຕຽມພື້ນທີ່ ທີ່ຈະລ້ຽງຄັງ:

➢ ຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການພວກ

ນຳໃຊ້ ຕົ້ນຖົ່ວແຮເປັນບ່ອນລ້ຽງຄັງ.

➢ ກ່ອນການຈະລ້ຽງຄັງເຮົາຕ້ອງປູກ

ຕົ້ນຖົ່ວແຮ

ປະໄວ້ກ່ອນ (ອາຍຸຕົ້ນຖົ່ວຢ່າງຕ່ຳ 6 ເດືອນ

ຂຶ້ນໄປ) ຈຶ່ງສາມາດປ່ອຍໄດ້, ເພື່ອຮັບປະກັນ

ໃນການລ້ຽງຄັງ.

2. ການປູກຕົ້ນຖົ່ວແຮເພື່ອປ່ອຍຄັງ

➢ ລະດູການປູກແມ່ນຕົ້ນລະດູຝົນ 5-6 ຂອງ

ປີ. ທັງນັ້ນກໍ່ເພື່ອປ່ອຍຢູ່ໃນເດືອນ 12 ຫຼື ເດືອນ 2

➢ ໄລຍະການປູກຕ້ອງແມ່ນ ກວ້າງ 2m x

ຍາວ 2 m (ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດິນຮາບພຽງ)

➢ ໄລຍະການປູກຕ້ອງແມ່ນ ກວ້າງ 3 m x

ຍາວ 2 m (ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ)

3. ແນວພັນຄັງ ມີ 3 ຊະນິດ ຄື:

3.1 . ແນວພັນຄັງດໍ ມີອາຍຸ 4 ເດືອນ

3.2 . ແນວພັນຄັງກາງ ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ

ເດືອນຈຳນວນທີ່ໃຊ້ 30-40 kg / ha

(ອີງໃສ່ຮັ່ງຄັງນ້ອຍຫຼືໃຫ່ຍ) ຜົນຜະລິດ

ສະເລ່ຍ 800-1000 ກິໂລ / ຮຕ

3.3 . ແນວພັນຄັງປີ ມີອາຍຸ 12 ເດືອນ

4. ວິທີການປ່ອຍຄັງ

➢ ຕ້ອງຕັດແຕ່ງກິ່ງງ່າຕົ້ນຖົ່ວແຮທີ່ນ້ອຍອອກ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການລ້ຽງຄັງ

➢ ຕ້ອງມັດແນວພັນຄັງ (ຮັ່ງຄັງ)

ກົງກັນຂ້າມກັບທາງທິດຕາເວັນຂຶ້ນ (ເພື່ອບໍ່

ໃຫ້ແນວພັນຄັງຮັບແສງແດດ 100%)

➢ ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຈຳນວນຄັ້ງອ່ອນ1-2ມື້ ທີ່ຂຶ້ນຢູ່ໃນຕົ້ນຖົ່ວແຮ (ຄັ້ງອ່ອນຈະເປັນສີແດງຖ້າຫາກ ແມ່ຄັ້ງຂຶ້ນຫຼາຍແລ້ວ ເຮົາສາມາດຍ້າຍຮັ່ງຄັ້ງໄປໃສ່ຕົ້ນອື່ນ,ອີງໃສ່ຮັ່ງຄັ້ງນ້ອຍຫຼືໃຫ່ຍ)

➢ ຫຼັງຈາກປ່ອຍຄັ້ງໄດ້ 7-10 ວັນ ເຮົາມາດເກັບກູ້ຮັ່ງຄັ້ງອອກຈາກຕົ້ນຖົ່ວແຮ.ໄວ້ຂາຍຕໍ່ໄປ

5.ສັດຕູ ແລະ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ

➢ ມົດ: ມັກຈະເປັນສັດຕູຄັ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຊ່ວງທີ່ຕົວຄັ້ງຍັງອ່ອນ ແລະ ມົດມັກຈະດູດກິນໂຕຄັ້ງອ່ອນ ຢູ່ໃນຊ່ວງຄັ້ງ ມີອາຍຸ7-10ວັນ

➢ ວິທີການປ້ອງກັນ: ໃຊ້ຜ້າຈຸບນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ມັດອ້ອມຕົ້ນຖົ່ວແຮ ເພື່ອປ້ອງ ກັນບໍ່ໃຫ້ມົດໄຕ່ຂຶ້ນໄປ ແລະອະນາໄມພື້ນ ທີ່ອ້ອມຕົ້ນຖົ່ວແຮ.

➢ ເພັຍແປ້ງ : ເປັນສັດຕູທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະດູດນ້ຳລ້ຽງຕາມງ່າ ແລະ ໃບຂອງລຳຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ໃບລົ້ນແລະລຳຕົ້ນຈະຫຼົງແຫ້ງຕາຍໃນທີ່ສຸດ

➢ ການປ້ອງກັນແລະກຳຈັດ : ໃຊ້ຢາສະໝຸນໄພຊິດພື້ນ ຫຼື ຕັດແຕ່ງກິ່ງງ່າມັນອອກ

6. ການເກັບກູ້ຄັ້ງ :

➢ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງອາທິດສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸຄັ້ງ (ປະມານ 130-140 ວັນ) ຕົວຄັ້ງຈະມີສີໂມກຂາວ ມີຂົນຍາວ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂົນຈະລົ້ນ ແລະ ຈະກາຍເປັນສີແດງຊ້ຳ ,ມີຮອຍແຕກຊ້ຳສະແດງວ່າຮັ່ງຄັ້ງແກ່ເຕັມທີ່ ແລະ ເຮົາສາມາດເກັບຮັ່ງຄັ້ງໄປປ່ອຍໃນເນື້ອທີ່ເຮົາກະກຽມໄວ້. ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 800-1000 ກິໂລ / ຮຕ

ໝາຍເຫດ:

ຖ້າຈະຂາຍເປັນສິ້ນຄ້າເຮົາຕ້ອງເອົາຄັ້ງທີ່ແກະອອກຕົ້ນຖົ່ວແຮໄປແຊ່ນຈໍ້ ປະມານ 12-15 ຊົ່ວໂມງ,ແລ້ວນຳເອົາຄັ້ງໄປແຕກແດດຈົນແຫ້ງດີ,ຈຶ່ງສາມາດສົ່ງອອກເປັນສິ້ນຄ້າໄດ້.



ຄັ້ງມີອາຍຸແກ່ເຕັມທີ່

