

ປິ່ວ: Gall midge
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Orseolia oryzae

ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງແມງປິ່ວ:

ແມງປິ່ວແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບຍູງ, ຍາວປະມານ: 3 ຫາ 4 mm ບໍລິເວນທ້ອງຈະມີສີສົມ, ໜວດ ແລະ ຂາແມ່ນມີສີດຳ, ແມງປິ່ວມັກຈະວາງໄຂ່ໃນເວລາກາງຄືນໄຂ່ຂອງແມງປິ່ວແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບແຕ່ມີສີປົວອ່ອນ ແລະ ມັກຈະພົບເຫັນຕາມໃບເຂົ້າ ແລະ ສາມາດວາງໄຂ່ໄດ້ 200 ໜ່ວຍ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວອ່ອນແມງປິ່ວແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ: 25 ຫາ 28 ມື້.

ລັກສະນະການທຳລາຍຂອງແມງປິ່ວ.

ແມງປິ່ວມັກລະບາດໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງຕົກກ້າ ແລະ ໄລຍະແຕກກໍ, ດ້ວງຂອງແມງປິ່ວຈະທະລາຍຍອດອ່ອນຂອງຕົ້ນເຂົ້າຫຼັງຈາກນັ້ນໃບເຂົ້າ ຫຼື ກາບເຂົ້າກາຍເປັນຫຼອດຫຸ້ມເອົາຕົວອ່ອນຂອງແມງປິ່ວໄວ້ ລັກສະນະຂອງໃບເຂົ້າຈະຄ້າຍຄືກັບໃບປິ່ວແທນທີ່ຈະກາຍເປັນໃບເຂົ້າ ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍບ່ອນມັກເອີ້ນວ່າ: ຫຼອດເງິນ Silvershoot ໝໍ້ເຂົ້າທີ່ເປັນຫຼອດຈະບໍ່ອອກຮ່ວງເມື່ອຕົ້ນເຂົ້າເລີ່ມຕັ້ງທ້ອງແລ້ວ ແມງປິ່ວກໍຈະບໍ່ສາມາດທຳລາຍໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອມີການລະບາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າມີການແຕກກໍຜິດປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວອ່ອນໄດ້ທຳລາຍຍອດອ່ອນຂອງເຂົ້າ ສະນັ້ນຈິ່ງເກີດມີການແຕກກໍເພື່ອທົດແທນຍອດອ່ອນທີ່ຕາຍໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແມ່ນຜົນຜະລິດຈະຫຼຸດ ເຫຼືອພຽງ: 50 ຫາ 70 %ຂອງຜົນຜະລິດ.


ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ:

1. ແນວພັນເຂົ້າ:

ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ການທຳລາຍຂອງແມງປິ່ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພັນເຂົ້າຝັນເມືອງເຊັ່ນ: ພັນເມືອງງາ ເຂົ້າໜາກ ຫຼື ແນວພັນເຂົ້າທີ່ແຕກກໍສູງເພື່ອທົດແທນການທຳລາຍຂອງແມງປິ່ວ.

2. ການຕົກກ້າ:

ໃນເຂດທີ່ພຽງແມ່ນໃຫ້ຫວ່ານກ້າໃນຊ່ວງໄລຍະກາງຫາທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ໃຫ້ປັກດຳໃນຊ່ວງກາງຫາທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ແກ່ຍາວຈົນຮອດເດືອນກໍລະກົດ, ເພື່ອເປັນການຕັດວົງຈອນການລະບາດຂອງແມງປິ່ວ.



ໃນເນື້ອທີ່ນາທີ່ມີການປູກເຂົ້າ 2 ລະດູ, ຕົ້ນເຂົ້າໃນຕົ້ນລະດູຝົນອາດບໍ່ຖືກທຳລາຍ ແຕ່ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ປູກໜຶ້້າໃນລະດູຝົນອາດຖືກແມງປິ່ວທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ

3. ການປັກດຳ:

ລົກຫຍ້າອອກຈາກອ້ອມແອ້ມຝີ້ນທີ່ປະມານ: 20 cm ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງປັກດຳ 2 ເທື່ອ, ປັກດຳເປັນແຖວໄລຍະຫ່າງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 25 cm ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມ ພ້ອມກັນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າແຕກກໍໄດ້ດີ, ຫຼືກເວັ້ນການປັກດຳທີ່ບໍ່ພ້ອມພຽງກັນ ຫຼື ຫ່າງກັນກໍໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ອາທິດ.

4. ການປົວລະບັດ:

ຮັກສາລະດັບນ້ຳໃຫ້ມີປະລິມານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມໃນຊ່ວງທີ່ຂາດແສງແດດ, ຫຼືກເວັ້ນການໃສ່ 'ຝຸ່ນອາສິດ (ຝຸ່ນເລັ່ງ N) ແລະ ຄວນແຍກໃສ່ຢູ່: 3 ຄັ້ງໃນຊ່ວງໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົ້ນເຂົ້າ.


5. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງປິ່ວ:

- ຄວນຮັກສາລະດັບນ້ຳໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເມື່ອຂາດແສງແດດ
- ໃຊ້ດອກໄຟ, ຕະກຽງ, ຊາມນ້ຳເພື່ອລ້າແມງປິ່ວໃນເວລາກາງຄືນ
- ໃຊ້ສູນໝູໄຟຝີ້ນປ້ານເຊັ່ນ: ຂົນກະເດົາ, ເຄືອເຂົ້າຮໍ



ຕົວແກ່ຂອງແມງປິ່ວຈະວ່ອງໄວໃນລະດູຝົນ ແຕ່ຈະອ່ອນແອ ແລະ ອາໄສຢູ່ປາເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ.

➢ ໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຂົ້າຕໍ່ກັບການລະບາດຂອງແມງໄມ້ໃນນາເຂົ້າ.




Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159 Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 552677
Email: LEAP@laoex.org



ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ນຄອງໂຄງການ

ຂໍ້ແນະນຳ ການປ້ອງກັນເຂົ້າເປັນບົວ (Gall midge)



ຈັດຝຶນໂດຍ:

ຫົວຍງານພັດທະນາຮູບແບບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ CETDU