

ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີປູກສ້າງສວນຊາ

I. ດິນທີ່ເໝາະສົມ

ໂດຍລວມແລ້ວຕົ້ນຊາສາມາດປູກໄດ້ເກືອບທຸກປະເພດດິນທີ່ມີລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 200-2.000 ແມັດ ແລະ ລະດັບນ້ຳພື້ນດິນ 1 ແມັດ, ດິນມີລະດັບຄວາມເປັນກົດ PH ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 4-6 ແລະ ລະດັບຄວາມຄ້ອຍຊັນບໍ່ເກີນ 30°, ຊັ້ນດິນຕ້ອງເລິກກວ່າ 60 ຊຕມ.

1. ລັກສະນະດ້ານກາຍະພາບຂອງດິນ

ກ. ຄວາມເລິກຂອງຊັ້ນດິນ

ຕົ້ນຊາເປັນພືດໄລຍະຍາວ, ມີລະບົບຮາກທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕລົງທາງເລິກ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວອອກທາງກວ້າງ, ດູດເອົາທາດອາຫານທີ່ມີຊັ້ນດິນເລິກ (1-3 ແມັດ). ຕົ້ນຊາຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ຫຼື ຕ່ຳແມ່ນຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ ທີ່ມີຊັ້ນດິນແຕ່ 40-60 ຊັງຕີແມັດ.

ຂ. ໂຄງສ້າງຂອງດິນ

ດິນທີ່ມີໂຄງສ້າງຜຸຜຸຍ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ດູດຊຶມເອົານ້ຳໄດ້ຫຼາຍ, ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລະບົບຮາກຂອງຕົ້ນຊາ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບັນດາຈຸລິນຊີຂະຫຍາຍຕົວ.

ຄ. ສ່ວນປະກອບຂອງເນື້ອດິນ

ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຊາ, ແມ່ນດິນຊະນິດທີ່ມີລະບົບປະສົມກົມກຽວລະຫວ່າງອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ຊຶ່ງເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຊາປູກກໍ່ຄືຂະບວນການວິວັດຂອງຊີວະເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນດິນ (ອີງຕາມການຈັດແບ່ງປະເພດເນື້ອດິນ ຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ).

ງ. ລະດັບຄວາມເລິກຂອງນ້ຳພື້ນດິນ

ນ້ຳຫຼືດິນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອການປູກຊາຈະຕ້ອງມີຄວາມເລິກ 1 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ, ຍ້ອນວ່າຕົ້ນຊາບໍ່ສາມາດທຶນຕົ້ນນ້ຳຖ້ວມຂັງໄດ້ດິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີນ້ຳໃຕ້ດິນຕົ້ນດິນອີ່ມນ້ຳ, ຕົ້ນຊາຈະຕາຍໄດ້ງ່າຍ.

2. ພູມສັນຖານ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ

ພື້ນທີ່ທີ່ມີລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງໃບຊາ. ຊາທີ່ປູກໃນເຂດສູງ ຈະໃຫ້ຄຸນນະພາບດີ ມີນິດຊາດແຊບຫວານຊຸມຄໍ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ, ແຕ່ຜົນຜະລິດຈະບໍ່ສູງຍ້ອນວ່າຕົ້ນຊາຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ (ຊາທີ່ປູກຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຫຼາຍກວ່າ 800 ແມັດ ຂຶ້ນໄປຈະມີນິດຊາດແຊບ). ສະພາບພູມສັນຖານກໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ ເຖິງສະພາບອາກາດເຂດປູກຊາ, ຊາທີ່ປູກໃນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັ້ນ 30 ຂຶ້ນໄປ ດິນບໍ່ສາມາດເກັບຮັກສານ້ຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນແຫ້ງ, ດິນຖືກເຊາະລ້າງສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນເຊື່ອມ, ຊາກໍ່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າ.

II. ສະພາບພູມອາກາດ

1. ປະລິມານນ້ຳຝົນ

ໃນຈຸລັງຂອງໃບຊາ ມີປະລິມານນ້ຳບັນຈຸປະມານ 80%, ຊຶ່ງແມ່ນພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍຂອງໃບຊາ, ນ້ຳລະເບີຍອອກຈາກໃບ ເພື່ອລົດອຸນຫະພູມພ້ອມດຽວກັນນັ້ນເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ລະບົບຮາກດູດເອົານ້ຳ. ນ້ຳເຮັດໜ້າທີ່ປະສານໃຫ້ທາດບຳລຸງລ້ຽງເຄື່ອນໄຫວໃນຕົ້ນຊາ. ນ້ຳສາມາດເພີ່ມພະລັງດູດຊຶມຂອງຈຸລັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ແກ່ການປູກຕົ້ນຊາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີແມ່ນ 1,300-2,000 ມິລິແມັດ/ປີ.

2. ອຸນຫະພູມ

ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດແຕ່ 22°C - 28°C ມີຜົນດີຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຊາ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 15°C ຫຼື ສູງກວ່າ 30°C ຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຊາຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ.

3. ແສງສະຫວ່າງ

ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນຊາຈະເປັນຕົ້ນໄມ້ປ່າ ເກີດໃນເງື່ອນໄຂຊຸ່ມເຢັນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ ໃນເຂດໃກ້ຄຽງກັບເຂດຮ້ອນ ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຕົ້ນຊາເປັນຕົ້ນໄມ້ມີລັກສະນະລະດັບກາງ, ໃນໄລຍະຍັງນ້ອຍ (ອ່ອນ) ຕົ້ນຊາຈະມັກຮົ່ມແຕ່ເມື່ອຕົ້ນໃຫຍ່ (ແກ່) ແມ່ນມັກແສງແດດ.

ແນວພັນຊາໃບນ້ອຍ ມັກແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກວ່າແນວພັນຊາໃບໃຫຍ່. ແສງສະຫວ່າງກະຈາຍໃນເຂດພູສູງ ມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຊາ ດີກວ່າແສງສະຫວ່າງ ໂດຍກົງ.

ເຂດທີ່ມີນ້ຳໝອກຫຼາຍ, ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ອຸນຫະພູມຕ່ຳ ເປັນເຂດທີ່ສາມາດຜະລິດຊາທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ.

III. ການອອກແບບສວນປູກ

ໂດຍສະເພາະຕົ້ນຊາ ຈະເໝາະສົມປູກໃນເຂດພູດອຍ, ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 0°C ຫາ 25°C . ການອອກແບບສວນຊາ ແບບວິທະຍາສາດໃນເຂດພູດອຍ ເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດຊານັ້ນໄດ້ຫຼາຍປະສິດທິໃນການປົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເກັບກຳຜົນຜະລິດ. ນັ້ນຕ້ອງອອກແບບສວນຊາທີ່ເໝາະສົມກັບການພົວພັນ ເຖິງວົງຈອນຊີວິດຂອງຕົ້ນຊາຄືຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະລ້າງຂອງໜ້າດິນ.

1. ການອອກແບບສວນຊາ

ສວນຊາປະກອບດ້ວຍພື້ນທີ່ໃຫຍ່ນ້ອຍດັ່ງນີ້:

ກ. ເຂດປູກຊາປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໜ່ວຍພູມິພື້ນທີ່ຕິດຈອດກັນມີຂະໜາດເນື້ອທີ່ແຕ່ 10-20 ເຮັກຕາ.

ຂ. ສວນປູກຊາ(ພູ)ປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍພູ 1 ໜ່ວຍ ຫຼື ເຄິ່ງໜ່ວຍພູມິເນື້ອທີ່ 2-3 ເຮັກຕາ.

ຄ. ຕອນສວນປູກມີຂະໜາດເນື້ອທີ່ 0,5-1 ເຮັກຕາປະກອບດ້ວຍແຖວຕົ້ນຊາຫຼາຍໆແຖວຈັດແບ່ງດ້ວຍເສັ້ນທາງຢ່າງນ້ອຍໆ ເພື່ອສະດວກໃນການປົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເກັບໃບຊາ. ຄວາມກວ້າງຂອງຕອນສວນປະມານ 20-100 ແຖວຕົ້ນຊາ, ຄວາມຍາວຂອງແຖວຕົ້ນຊາປະມານ 50-200 ແມັດ.

ງ. ແຖວຕົ້ນຊາປະກອບດ້ວຍຕົ້ນຊາປູກຕ່າງກັນ, ປູກເປັນແຖວຊື່ ຫຼື ເປັນແຖວຕາມເສັ້ນວຽນຈອດ (ເສັ້ນຂອບພູ).

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ	ອົງສາ	ປູກເປັນແຖວ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ	5° - 6°	ປູກເປັນແຖວຊື່
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ	7° - 15°	ປູກເປັນແຖວກົງສະຫຼັບແຖວ
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ	16° - 25°	ປູກເປັນແຖວຕາມພັກຂັ້ນໄດໂຄ້ງໄປຕາມເສັ້ນວຽນຈອດ

2. ການອອກແບບລະບົບເສັ້ນທາງ

ກ. ເສັ້ນທາງແມ່ ແມ່ນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຂດຕໍ່ເຂດ (ເຂດປູກຊາ) ໜ້າທາງມີຄວາມກວ້າງ 5-6 ແມັດ, ເສັ້ນທາງມີລະບົບຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ສອງຟາກທາງປູກໄມ້ສຳລັບໃຊ້ເປັນຮີ່ມ.

ຂ. ທາງເຊື່ອມຕໍ່ສວນແມ່ນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສວນຕໍ່ສວນ, ໜ້າທາງກວ້າງ 4-5 ແມັດ.

ຄ. ທາງໃນສວນ ແມ່ນເສັ້ນທາງແຕ່ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາສວນແຕ່ລະສວນມີຈຸດຕ່າວລົດຢູ່ຈຸດສາມແຍກຕາມຂອບທາງປູກໄມ້ໃຫ້ຮີ່ມ (ປູກຫ່າງໆ).

ງ. ທາງວົງແຫວນແມ່ນ ເສັ້ນທາງວຽນໄປຕາມເສັ້ນຂອບພູຈອດຕິດກັນເລີຍ, ໜ້າທາງກວ້າງ 3 ແມັດ ໜ້າທາງງ່ຽງເຂົ້າໃນ (6° - 7°), ຕາມຂອບທາງປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮີ່ມປູກຫ່າງໆ.

ຈ. ທາງພາຍໃນຕອນສວນ ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຕັດຕາມທາງຂວາງ (ກໍລະນີດິນພຽງ), ຕັດສະໝຽງ. (ກໍລະນີດິນຄ້ອຍຊັນ) ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຫ່າງກັນ 150-200 ແມັດ, ໜ້າທາງກວ້າງ 3-4 ແມັດ, ຂອບທາງບໍ່ ມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ.

ສ. ທາງຍ່າງແມ່ນ ທາງຍ່າງສຳລັບບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຊາມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທາງ 50-70 ແມັດ, ຕັດຂວາງ ຫຼື ສະໝຽງແຖວ ຕົ້ນຊາໜ້າທາງກວ້າງ 1,2-1,3 ແມັດ, ຄວາມງ່ຽງຂອງໜ້າທາງ 10° - 11° ຕາມພື້ນທີ່, ບໍ່ມີ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ.

3. ການອອກແບບອື່ນໆ

- ລະບົບຄອງລະບາຍນ້ຳ, ຄູກັ່ນນ້ຳບໍ່ໃຫ້ໄຫຼປ່າເຂົ້າສວນຊາ, ຄູຕາມເປັນພູ ແລະ ຄູແບ່ງເຂດ.
- ໃນພື້ນທີ່ 2-3 ເຮັກຕາໃດ ຕ້ອງສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ 1 ຈຸດ ແລະ ໃນພື້ນທີ່ 2-3 ເຮັກຕາໃດຕ້ອງສ້າງຊຸມປົ່ມຝຸ່ນຄອກ 1 ຊຸມ.

4. ການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ລະດູການປູກຊາ: ການອອກແບບແຖວ ແລະ ຊຸດຮ່ອງປູກໃນຊ່ວງເດືອນ 11-12 ເພື່ອກຽມປູກປີຕໍ່ໄປ.
- ພື້ນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມກ່ຽງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຍ້າ, ກໍລະນີມີຫີນ, ຕໍ່ໄມ້ຕ້ອງໄດ້ໂຖ ຫຼື ຊຸດອອກ, ພື້ນທີ່ຈະປູກຕ້ອງໄຖ ຫຼື ຊຸດຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຊຸດແຖວເລິກ 40-45 ຊຕມ, ກວ້າງ 40-60 ຊຕມ, ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ, ໃຫ້ປູກພືດຄຸມດິນກ່ອນ ເພື່ອເຮັດຝຸ່ນຂຽວບຳລຸງດິນ.



ການກະກຽມຊຸດແຖວປູກຊາ

IV. ອັດຕາສ່ວນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕົ້ນຊາໃນສວນປູກ

1. ບັນດາສ່ວນປະກອບທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ

- ແນວພັນ: ແນວພັນທີ່ມີຊົງພຸ່ມແຄບ, ຄວນປູກຖີ່. ແນວພັນທີ່ມີຊົງພຸ່ມແຜ່ກວ້າງໃຫ້ປູກຫ່າງ.
- ດິນ: ດິນທີ່ຄ້ອຍຊັນຫຼາຍໃຫ້ປູກຖີ່, ດິນທີ່ບໍ່ຄ້ອຍຊັນຫຼາຍໃຫ້ປູກຫ່າງ.
- ກະກຽມດິນດ້ວຍແຮງງານຄົນ (ບໍ່ໃຊ້ກົນຈັກ) ອາດໃຫ້ປູກຖີ່.
- ລົງທຶນໃສ່ຜຸ່ນຫຼາຍ ແລະ ມີລະບົບທົດນຳ. ໄລຍະຫ່າງການປູກຄວນໃຫ້ພໍດີແທດເໝາະກັບຕົ້ນທຶນ.
- ປູກເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອເກັບກູ້ທຶນໄວ. ໄລຍະປູກຕ້ອງປູກຖີ່ ເພື່ອເກັບຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ.

2. ໄລຍະຫ່າງ

ກ. ບັນດາແນວພັນຊາໃບນ້ອຍທີ່ມີການປັບປຸງສາຍແນວພັນ ເຊັ່ນ: ແນວພັນຊາຂອງຈີນ, ແນວພັນຊາຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແນວພັນຊາ LDP 1, LDP 2 ຂອງ ສ.ສ ວຽດນາມ ທີ່ມີຊົງພຸ່ມເຕັ້ຍ ແມ່ນປູກຕາມໄລຍະຫ່າງ ດັ່ງນີ້:

ໄລຍະຫ່າງ	ອັດຕາສ່ວນຕົ້ນ/ເຮັກຕາ
1.2 ມ x 0.4 - 0.5 ມ	20, 833 - 16,667 ຕົ້ນ
1.3 ມ x 0.4 0.5 ມ	19, 231 - 15,385 ຕົ້ນ
1.4 ມ x 0.35 - 0.4 ມ	20, 354 - 17,855 ຕົ້ນ

ຂ. ແນວພັນຊາຕົ້ນໃຫຍ່ (che shan) ເຂດສູງແມ່ນປູກຕາມຮູບແບບການປູກປ່າ

- ປ່າຊາທີ່ມີເຮືອນຍອດປົກຄຸມໜ້າ, ໄລຍະຫ່າງການປູກແມ່ນ: 2 ມ x 3 ມ ແລະ 2 ມ x 2,5 ມ, ຄວາມໜາແໜ້ນແຕ່ 1,500-2,000 /ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ.
- ປ່າຊາທີ່ມີເຮືອນຍອດປົກຄຸມບາງ ໄລຍະຫ່າງປູກແຕ່ 2 ມ x 2 ມ ແລະ 1,5 ມ x 2 ມ, ຄວາມໜາແໜ້ນແຕ່ 2,500-3,000 /ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ.

V. ເຕັກນິກການປູກຊາ

1. ປູກຊາດ້ວຍກິ່ງງ່າ

ກ. ຂັ້ນຕອນ

- ການປັກຊາດ້ວຍກິ່ງ, ສາມາດຮັກສາໄດ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີ ເດີ່ນຂອງຕົ້ນແມ່ພັນຊາດັ້ງເດີມ, ຜະລິດຕະພັນສູງກວ່າຊາ ທີ່ປູກດ້ວຍແກ່ນແຕ່ 25-30%.
- ຊາທີ່ປູກດ້ວຍກິ່ງປັກຊາມີອາຍຸເກັບໃບໄວກວ່າຊາທີ່ປູກດ້ວຍ ແກ່ນ 1 ປີ.
- ການຂະຫຍາຍພັນງ່າຍ ແລະ ໄວກວ່າ.

ຂ. ລະດູການປູກ

- ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ລະດູການປູກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແມ່ນ ເດືອນ 7-9, ເພາະວ່າປະລິມານນ້ຳຝົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນ ທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນີ້.
- ປູກຊາຄວນປູກ ເວລາດິນມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພໍ, ພາຍຫຼັງຝົນ ຕົກ, ອາກາດມີຄວາມ ຊຸ່ມເຢັນ.

ຄ. ວິທີປູກ

- ປູກຕາມຄອງປູກທີ່ໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຖິມດິນ.
- ຊຸດຊຸມກວ້າງ 20 ຊຕມ, ເລິກ 20-25 ຊຕມ. ຕາມໄລຍະທີ່ ໄດ້ກຳນົດ.
- ຈົກຖົງປະລາສະຕິກ (PE) ອອກ ແລະ ຮັກສາເບົ້າບໍ່ໃຫ້ແຕກ.
- ງຸ່ງເບົ້າຊາລົງຕາມທິດທີ່ສະດວກແລ້ວຖິມດິນ, ຍັດດິນອ້ອມ ເບົ້າໃຫ້ ແໜ້ນ.
- ເອົາດິນຊັ້ນໜ້າທີ່ຜຸຜຸຍ ປົກທາງໜ້າໃຫ້ໜາ 1 ຊມ.
- ພາຍຫຼັງປູກແລ້ວຕ້ອງຫຼີກຫຍ້າອອກຫ່າງແຖວຕົ້ນຊາກວ້າງ 40 ຊມ, ຖ້າມີເງື່ອນ ໄຂກໍ່ຄວນຫິດນ້ຳ.



ການປູກເບ້ຍຊາ ຕາມແຖວປູກ

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່

- ເບົ້າຊາທີ່ຈະນຳໄປປູກບໍ່ຄວນແຫ້ງເກີນໄປເພາະເບົ້າຈະແຕກງ່າຍ.
- ຖ້າເບົ້າປູກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເບົ້າຮັດແໜ້ນ ເວລາປູກເຮັດໃຫ້ຮາກທີ່ເຂົ້າກັນເຮັດໃຫ້ເບ້ຍຊາຕາຍ.
- ເວລາປູກຄວນຈັດເບ້ຍໄປລວງດຽວກັນ ເພື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ.
- ເວລາຖິມຊຸມເບ້ຍຊາ ບໍ່ຄວນຢຽບແໜ້ນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເບົ້າຊາຮັດຕິດກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຊາຂາດ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

VI. ການບົວລະບັດຮັກສາ

1. ການບົວລະບັດ

ກ. ປູກສ້າມ (ປູກສ້ອມ)

- ປະລິມານຕົ້ນຊາປູກສ້າມ: ຈຳນວນຕົ້ນຊາປູກສ້າມໃນແຕ່ລະປີແມ່ນ 10% ຂອງຈຳນວນເບ້ຍຊາທີ່ປູກທັງໝົດ (ເບ້ຍຊາຈຳນວນນີ້ຕ້ອງກະກຽມໃນຊ່ວງລະດູການຜະລິດເບ້ຍ).

ປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການປູກຊາ

- ຂະໜາດຂອງຊຸມ 30 ຊຕມ x 30 ຊຕມ.
- ການໃສ່ຝຸ່ນ: ຝຸ່ນຄອກ 0,5-1 ກິໂລ ຕໍ່ 1 ຊຸມ.
- ວິທີປູກ: ເອົາຖົງຢາງອອກຈາກເບົ້າ, ເອົາເບົ້າລົງຊຸມ, ຖິ້ມດິນ, ຍັດດິນອ້ອມເບົ້າ, ເອົາດິນປົກປາກຊຸມບາງໆ ແລ້ວເອົາຫຍ້າແທ້ງປົກຄຸມເງົ້າຕົ້ນເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ.
- ລະດູການປູກສ້າມ: ລະດູປູກສ້າມແມ່ນເດືອນ 8-9, ເວລາປູກໃຫ້ເລືອກເອົາມື້ທີ່ມີອາກາດຊຸ່ມເຢັນ ແລະ ດິນຕ້ອງຊຸ່ມຊື່ນພຽງພໍຖ້າສວນຊາມີອາຍຸ 2-3 ປີ, ເບ້ຍຊາທີ່ຈະປູກສ້າມຈະຕ້ອງເປັນເບ້ຍໃຫຍ່.

ວິທີປູກສ້າມດ້ວຍເບ້ຍໃຫຍ່ (ເບົ້າໃຫຍ່ ຫຼື ເບົ້າທີ່ປ່ຽນໃໝ່)

- ຂະໜາດຂອງເບົ້າແມ່ນ 18 ຊຕມ x 25 ຊຕມ.
- ອັດຕາສ່ວນດິນໃນເບົ້າ: ດິນ 3 ສ່ວນ, ຝຸ່ນ 1 ສ່ວນ (0.3 ກລ ຝຸ່ນຄອກ + 20 ກຼາມ (P_2O_5) / 1 ເບົ້າ).
- ຄັດເລືອກແນວພັນຊາຊະນິດດຽວກັນ (ອາຍຸ 9 -10 ເດືອນ), ປັກຊາໃສ່ເບົ້າໃຫຍ່.
- ໄລຍະເວລາເພາະລ້ຽງຢູ່ສວນກ້າ: ໄລຍະບົວລະບັດຮັກສາເບົ້າຊາຢູ່ສວນກ້າ(ເບົ້າໃຫຍ່), 7-8 ເດືອນ (ລວມໄລຍະເພາະພັນລ້ຽງຢູ່ສວນກ້າ 16-18 ເດືອນ).
- ມາດຕະຖານຂອງເບ້ຍຊາ: ລວງສູງ 35-40 ຊຕມ ມີໃບ 17-18 ໃບ, ມີຕາຍອດ 1-2 ຕາ, ໜ້າຕ້າງລຳຕົ້ນ 0.5 ຊຕມ.
- ວິທີປູກສ້າມແມ່ນຄືກັນກັບປູກສ້າມ (ຢູ່ຂັ້ນ ກ).

2. ການເສຍຫຍ້າຂ້າຮຸ່ນ

- ພາຍຫຼັງເສຍຫຍ້າ, ຕ້ອງປົກຄຸມໂຄນຕົ້ນດ້ວຍເສດຫຍ້າ, ພືດຊຽວ (ຕົ້ນໄມ້ຝຸ່ນຊຽວ) ແນ່ໃສ່ຄຸມຫຍ້າ, ຕ້ານການກັດເຊາະຂອງນ້ຳເວລາຝົນຕົກແຮງ. ຕ້ອງອະນາໄມຫຍ້າສວນຊາໃຫ້ກ້ຽງ ແລະ ເຮັດໃນຊ່ວງ ເດືອນ 1-2 ແລະ ເດືອນ 7-8.

- ໃນປີນຶ່ງຕ້ອງເສຍຫຍ້າອ້ອມໂຄນຕົ້ນ ສອງຟາກຂ້າງ 2-3 ເທື່ອ ກວ້າງ 30-40 ຊຕມ. ໃນຊ່ວງຕົ້ນຊາອາຍຸ 1 ປີ, ການຫຼີກຫຍ້າດ້ວຍມືທີ່ໂຄນຕົ້ນຊາ ແມ່ນວິທີເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ກິດຈະກຳປູກຊາເພື່ອເປັນສິນຄ້າ

- ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ: ຕ້ອງເສຍຫຍ້າໃຫ້ກຽງ, ໄຖຫວ່າງກາງສອງແຖວ ຫຼື ພວນດິນ ເລິກ 10 ຊຕມ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ, ປັກກິ່ງງ່າ ແລະ ໃບຊາພາຍຫຼັງຕັດແຕ່ງຊົງພຸ່ມ.
- ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ: ຊຸດຕໍ່ໄມ້ອອກ, ຖາງຫຍ້າ, ວາງແຖວ.
- ສວນທີ່ໄດ້ຮັບການເອົາຫຍ້າປົກຄຸມດີໃນລະດູໜາວຈະຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຫຍ້າ ໃນລະດູແລ້ງ.

ສວນຊາເພື່ອເອົາກິ່ງປັກຊາ

- ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ: ຕ້ອງເສຍຫຍ້າອ້ອມໂຄນຕົ້ນໃຫ້ກຽງ, ໄຖລະຫວ່າງກາງແຖວ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຖາງຫຍ້າອ້ອມສວນ.



ການເສຍຫຍ້າ ແລະ ການເອົາຊາກພືດຄຸມດິນ

VII. ເຕັກນິກການຕັດແຕ່ງຊົງພຸ່ມ

1. ການຕັດແຕ່ງຊົງພຸ່ມ

ການຕັດແຕ່ງຊົງພຸ່ມຈະຕັດແຕ່ງໄດ້ເມື່ອເວລາຕົ້ນຊາຢູ່ໃນສວນປະມານ 70% ມີລວງສູງ 65-70 ຊຕມ ແລະ ໜ້າຕ້າງໂຄນຕົ້ນ 1 ຊຕມ ຂຶ້ນໄປ.

ການຕັດແຕ່ງຄັ້ງທີ 1	ການຕັດແຕ່ງຄັ້ງທີ 2
ການຕັດແຕ່ງຄັ້ງທີໜຶ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເວລາຕົ້ນຊາມີອາຍຸ 2 ປີ ໂດຍການຕັດລຳຕົ້ນໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນ 20-25 ຊຕມ, ຕັດງ່າຂ້າງສູງຈາກໜ້າດິນ 35-45 ຊຕມ.	ການຕັດແຕ່ງຊົງພຸ່ມຄັ້ງທີສອງ ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເວລາຕົ້ນຊາ ມີອາຍຸ 3 ປີ ຕັດລຳຕົ້ນສູງຈາກໜ້າດິນ 30-35 ຊຕມ, ຕັດງ່າຂ້າງສູງຈາກໜ້າດິນ 40-45 ຊຕມ.

2. ການຕັດແຕ່ງປັບປຸງເຮືອນຍອດ

ການຕັດແຕ່ງປັບປຸງເຮືອນຍອດ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເວລາຕົ້ນຊາມີອາຍຸ 4 ປີ. ໃນຊ່ວງ 2 ປີທຳອິດຂອງການຕັດແຕ່ງ, ຕັດຍັບຂຶ້ນຄັ້ງລະ 5 ຊຕມ ຂອງຮອຍຕັດເກົ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ່ລະປີຕັດ ຍັບຂຶ້ນຕື່ມ 3 ຊຕມ ສູງຈາກຮອຍຕັດເກົ່າ. ເມື່ອເວລາຮອດຮອບສຸດທ້າຍສູງເຖິງ 70 ຊຕມ. ຈາກໜ້າດິນ, ແຕ່ລະປີຈະຕັດຍັບຂຶ້ນອີກ 1 ຊຕມ ຈາກຮອຍຕັດເກົ່າ.

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ທ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຕັດງ່າຕາອອກທາງຂ້າງ, ທັງນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນ ລະດັບປົກຫຸ້ມຂອງເຮືອນຍອດ. ຕໍ່ກັບສວນຊາ ທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ເຮືອນຍອດບາງອາດຈະໃຊ້ການຕັດແຕ່ງແບບບາບີຕັດ, ປີໜຶ່ງອາດຕັດແຕ່ງປັບປຸງເຮືອນຍອດຄືກັບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ປີຕໍ່ໄປຕັດແຕ່ງ ຊ້ອມເຮືອນຍອດໂດຍຈະຕັດສະເພາະງ່າຊຽວ.

3. ການຕັດແຕ່ງກົງແບບເບົາງ

ພາຍຫຼັງຕັດແຕ່ງປັບປຸງເຮືອນຍອດມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ, ຮອຍຕັດແຕ່ງສູງກວ່າ 90 ຊຕມ (ສູງຈາກໜ້າດິນ), ງ່າຕົ້ນຊາຄົດງໍ, ເປັນປູດ ແລະ ເປັນຕາ, ຕົ້ນຊາອອກຊ່ຍອດ

ນ້ອຍໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳ. ຮອດໄລຍະນີ້ຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ຕົ້ນຊາໃຫ້ຕ່ຳລົງ 60-65 ຊຕມ ຫຼື ວ່າຕົ້ນຊາຍັງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຢູ່, ແຕ່ຕົ້ນຊາສູງໂພດກໍຄວນຕັດແຕ່ງໃຫ້ເຕ້ຍລົງ ໃຫ້ສູງ ຈາກໜ້າດິນ 70-75 ຊຕມ ເພື່ອສະດວກໃນການເກັບໃບຊາ.

4. ການຕັດແຕ່ງໃຫ້ຕົ້ນຊາເຕ້ຍລົງ

ສວນປູກຊາທີ່ໄດ້ທຳການຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ເຕ້ຍລົງຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍປີ, ຈະມີງ່າຄົດ ງໍ, ເປັນປູດເປັນເປົ້າ, ຕົ້ນຊາມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດລົດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຕ້ອງມີການຕັດແຕ່ງໃຫ້ຕົ້ນຊາເຕ້ຍລົງ, ສູງຈາກໜ້າດິນ 40-45 ຊຕມ.

5. ການຕັດແຕ່ງໃຫ້ຕົ້ນຊາໝຸ່ມຄືນ

ສວນຊາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຕັດແຕ່ງປັບປຸງກິ່ງງ່າມາຫຼາຍຄັ້ງຕົ້ນຊາມີອາຍຸແກ່ຜົນ ຜະລິດລົດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຕ້ອງຕັດແຕ່ງໃຫ້ຕົ້ນຊາໝຸ່ມຄືນ, ການຕັດແຕ່ງໃຫ້ໝຸ່ມຄືນ ແມ່ນຕັດສູງຈາກໜ້າດິນ 10-15 ຊຕມ.

6. ໄລຍະເວລາຕັດແຕ່ງ

ການຕັດແຕ່ງແມ່ນເລີ້ມແຕ່ກາງ ເດືອນທັນວາຫາ ເດືອນມັງກອນ. ໃນເຂດທີ່ມີ ນ້ຳໝອກກ້າມຄວນຕັດແຕ່ງຊ້າແດ່. ພາຍຫຼັງນ້ຳໝອກກ້າມຕົກ. ຄວນຕັດແຕ່ງປັບປຸງກິ່ງ ງ່າກ່ອນ, ຈາກນັ້ນ. ຈຶ່ງຕັດແຕ່ງປັບປຸງຍອດ. ຕັດແຕ່ງຊຶ່ງພຸ່ມສວນຊາໝຸ່ມກ່ອນ, ຈາກນັ້ນ. ຈຶ່ງຕັດແຕ່ງສວນຊາທີ່ຈະເລີນເຕັມທີ່ຕາມຫຼັງ.

7. ວິທີຕັດແຕ່ງສວນຊາ ແລະ ອຸປະກອນການຕັດແຕ່ງ

- ການຕັດແຕ່ງເຮືອນຍອດແບບພຽງ. ຄວນຕັດໃຫ້ງ່ຽງຕາມເປັນພູ, ການ ຕັດແຕ່ງຄວນຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ທຳລາຍເປືອກ ແລະ ກິ່ງງ່າຂອງຕົ້ນຊາ.
- ອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕັດແຕ່ງ ແມ່ນນຳໃຊ້ມົດຕັດ (cutter).
- ການຕັດແຕ່ງປັບປຸງກິ່ງງ່າຕັດແຕ່ງຕົ້ນໃຫ້ເຕ້ຍລົງ ແລະ ຕັດແຕ່ງຊຶ່ງພຸ່ມ (cutter).
- ການຕັດແຕ່ງໃຫ້ໝຸ່ມຄືນ, ການຕັດແຕ່ງງ່າໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເລື້ອຍ. ສຳ ລັບແນວພັນຊາທີ່ແຕກກິ່ງງ່າຫຼາຍ ອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກິ່ງງ່າສູງ ມີການຈະເລີນ ເຕີບໂຕສະໝໍ່າສະເໝີອາດສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຕັດເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບຂອງງານ.

VIII. ເຕັກນິກການເກັບໃບຊາ

1. ຫຼັກການເກັບໃບຊາ

- ເກັບເອົາແຕ່ສ່ວນຍອດ ແລະ ໃບ, ແຕ່ໃບທີ່ຍັງເຫຼືອຕ້ອງຮັບປະກັນພື້ນທີ່ໃບຊາດຸ່ນດ່ຽງກັບຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ.
- ການເກັບໃບຊາ ຕ້ອງອີງຕາມແນວພັນ, ຄວາມສາມາດຜະລິດຍອດ ແລະ ຄຸນນະພາບ (ບໍ່ເກັບໃບແກ່ເກີນໄປ, ບໍ່ເກັບໃບອ່ອນເກີນໄປ).

2. ວິທີເກັບໃບຊາ

ກ. ເຕັກນິກພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນໃນການເກັບໃບຊາ (ການເກັບໃບຊາແບບປັບປຸງຊຶງພຸ່ມ)

ປະເພດສວນຊາ	ວິທີການເກັບ
ສວນຊາອາຍຸ 1 ປີ	ເລີ່ມເກັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ, ເດັດເອົາຍອດຂອງຕົ້ນທີ່ມີລວງສູງ 60 ຊຕມ ຂຶ້ນໄປ.
ສວນຊາອາຍຸ 2 ປີ	ເກັບເອົາຍອດບັນດາຕົ້ນຊາທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕດີຫ່າງຈາກໜ້າ ດິນ 50 ຊຕມ ຂຶ້ນໄປ
ສວນຊາພາຍຫຼັງຕັດແຕ່ງຊຶງພຸ່ມຄັ້ງທີໜຶ່ງ	- ເກັບໃບຊາຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 40-45 ຊຕມ ຂຶ້ນໄປ, ສ້າງເປັນໜ້າພຽງງ່ຽງຕາມເປັນພູ - ເກັບໃບຊາຄັ້ງທີສອງແມ່ນເດັດຍອດ ແລະ ໃບສຳຮອງ 2 ໃບ.
ສວນຊາພາຍຫຼັງຕັດແຕ່ງຄັ້ງທີສອງ	ເກັບໃບຊາຄັ້ງທຳອິດແມ່ນສູງກວ່າການຕັດແຕ່ງຄັ້ງທຳອິດ 25-30 ຊຕມ, ເກັບໃບຊາຄັ້ງທີສອງແມ່ນເກັບທຳມະດາ, ປົກກະຕິແລ້ວຄ້າຍຄຽງກັບຕັດແຕ່ງຊຶງພຸ່ມຄັ້ງທຳອິດ.



ການຈັດປະເພດຍອດຊາ

ຂ. ເກັບໃບຊາເພື່ອທຸລະກິດ

- ເກັບຊໍ່ຍອດ (ເອົາ 3 ໃບກັບຍອດ), ໃນເມື່ອພຸ່ມເຮືອນຍອດມີຊໍ່ຍອດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 30% ແມ່ນເກັບເອົາທັງຍອດອ່ອນ.
- ໄລຍະລະດູການເກັບຊາເດືອນ 3-4: ການເກັບໃບຊາບໍ່ຄວນເກັບໝົດຕ້ອງປະໃບແກ້ໄວ້ 2 ໃບ ແລະ ໃບແກ້ 1 ໃບ. ເພື່ອສ້າງພຸ່ມໃຫ້ພຽງ, ຍອດໃດທີ່ສູງກວ່າພຸ່ມແມ່ນເດັດເອົາຍອດຈົນຈຳໃບແກ້.
- ໄລຍະລະດູການເກັບຊາເດືອນ 5-10: ການເກັບໃບຊາບໍ່ເກັບໝົດຕ້ອງປະໃບໄວ້ 1 ໃບ ແລະ ໃບອ່ອນ 1 ໃບ. ເພື່ອຂະຫຍາຍພຸ່ມ, ສ່ວນຍອດທີ່ສູງກວ່າພຸ່ມແມ່ນເດັດເອົາຍອດຈົນຈຳໃບແກ້.
- ໄລຍະລະດູການເກັບຊາ ເດືອນ 11 ການເກັບໃບຊາບໍ່ເກັບໝົດຕ້ອງປະໃບແກ້ໄວ້ 1 ໃບ ແລະ ໃບກະຈາ 1 ໃບ ເພື່ອຂະຫຍາຍພຸ່ມ, ສ່ວນຍອດທີ່ສູງກວ່າພຸ່ມແມ່ນເດັດເອົາຍອດຈົນຈຳໃບແກ້.

ຄ. ການເກັບໃບແບບປະໄວ້ຕາມວິທີການຕັດແຕ່ງຄື:

- ຕັດແຕ່ງສູງຈາກໜ້າດິນ 60-65 ຊຕມ ເກັບສູງຈາກຮອຍຕັດ 15 ຊຕມ.
- ຕັດແຕ່ງສູງຈາກໜ້າດິນ 65-75 ຊຕມ ເກັບສູງຈາກຮອຍຕັດ

10 ຊຕມ.

- ຕັດແຕ່ງສູງຈາກໜ້າດິນ 75 ຊຕມ ເກັບສູງຈາກຮອຍຕັດ 7 -10 ຊຕມ.
- ຕັດແຕ່ງໃຫ້ໜຸ່ມຄືນ, ຕັດແຕ່ງປັບປຸງຍອດເກັບໃບຊາແບບ ປັບປຸງຊຶງພຸ່ມ.

IX. ເຕັກນິກການໃສ່ຜຸ່ນ

1. ການໃສ່ຜຸ່ນສວນຊາປູກໃໝ່ (ສວນຊາປູກສ້າງເບື້ອງຕົ້ນ)

ກ. ຫຼັກການໃສ່ຜຸ່ນ

- ໃສ່ຜຸ່ນຕາມອາຍຸຕົ້ນຊາ ແລະ ຕາມຜົນຜະລິດ, ຕົ້ນຊາຍັງ ນ້ອຍໃສ່ຜຸ່ນໜ້ອຍ, ຕົ້ນຊາໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຜົນຜະລິດສູງໃສ່ຜຸ່ນຫຼາຍ.
- ການໃສ່ຜຸ່ນຄວນຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາດ NPK ໃນດິນ, ໃສ່ຜຸ່ນເສີມທີ່ພຶດຕະການທາດຕ່າງໆ ພຶດຕະການປານກາງ, ພຶດຕະການ ໜ້ອຍໃນເມື່ອຈຳເປັນ.
- ການໃສ່ຜຸ່ນທີ່ໃຫ້ຜົນ ແມ່ນຄວນໃສ່ຜຸ່ນຖືກວິທີ ແລະ ຖືກລະ ດູການ, ໃສ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ໃສ່ຜຸ່ນຮອງພື້ນ, ໃສ່ຜຸ່ນເລັ່ງທັນເວລາ.
- ການໃສ່ຜຸ່ນແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງດິນ, ອາກາດເປັນຕົວ ຕັດສິນອັດຕາສ່ວນຜຸ່ນທີ່ຈະໃສ່.

ຂ. ໃສ່ຜຸ່ນຮອງພື້ນສວນປູກໃໝ່

- ອັດຕາສ່ວນຜຸ່ນອິນຊີ 20-30 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
- ຜຸ່ນ P_2O_5 500-600 ກິໂລ/ເຮັກຕາ.
- ວິທີໃສ່ຜຸ່ນ: ຫວ່ານຜຸ່ນໃຫ້ສະເໝີຕາມຮ່ອງປູກປະລິມຜຸ່ນ ກັບດິນໃຫ້ເຂົ້າກັນກ່ອນການປູກປະມານເຄິ່ງເດືອນຫາໜຶ່ງ ເດືອນ.

ຄ. ການໃສ່ຜຸ່ນເລັ່ງສວນຊາແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ພື້ນຖານ (2-3 ປີ ພາຍຫຼັງ ປູກ). ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

1. ການໃສ່ຜຸ່ນເລັ່ງສວນຊາໃນໄລຍະ 3 ປີ ທຳອິດ.

ຊະນິດຊາ ອາຍຸຊາ	ຊະນິດຜຸ່ນ	ອັດຕາສ່ວນ (Kg/ha)	ຈຳນວນ ເທື່ອໃສ່ (ຕໍ່ຄັ້ງ)	ເວລາໃສ່ (ເດືອນ)	ວິທີໃສ່ຜຸ່ນ
ອາຍຸ 1 ປີ	N	40	2	2-3, 6-7	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ຜຸ່ນເລິກ 6 - 8 ຊຕມ ຫ່າງຈາກຕົ້ນ 25-30 ຊຕມ ຖິມ ດິນໃຫ້ແຈບ
	P ₂ O ₅	30	1	2-3	
	K ₂ O	30	1	2-3	
ອາຍຸ 2 ປີ	N	60	2	2-3, 6-7	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ຜຸ່ນເລິກ 6 - 8 ຊຕມ ຫ່າງຈາກຕົ້ນ 25-30 ຊຕມ ຖິມ ດິນໃຫ້ ແຈບ
	P ₂ O ₅	30	1	2-3	
	K ₂ O	40	1	2-3	
ຕັດແຕ່ງຊົງ ພຸ່ມຄັ້ງທີ 1 (ອາຍຸ 2 ປີ)	ຜຸ່ນອິນຊີ	15,000 - 20,000	1	11-12	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ຜຸ່ນເລິກ 15-20 ຊຕມ ຫ່າງຈາກຕົ້ນ 30-40 ຊຕມ ຖິມ ດິນໃຫ້ແຈບ
	P ₂ O ₅	100	1	11-12	
ອາຍຸ 3 ປີ	N	80	2	2-3, 6-7	ຄົນໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ ຜຸ່ນເລິກ 6-8 ຊຕມ ຫ່າງຈາກຕົ້ນ 30-40 ຊຕມ ຖິມດິນ ໃຫ້ແຈບ
	P ₂ O ₅	40	1	2-3	
	K ₂ O	60	1	2-3,6-7	

2. ການໃສ່ຜຸ່ນສວນຊາ ແນວພັນສຳລັບເອົາກິ່ງປັກຊາ: ເບິ່ງຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຊະນິດຜຸ່ນ	ອັດຕາສ່ວນ Kg/ha	ຈຳນວນ ເທື່ອໃສ່	ເວລາໃສ່ (ເດືອນ)	ວິທີໃສ່ຜຸ່ນ
ຜຸ່ນອິນຊີ	25,000 30,000	1	12-1	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ຜຸ່ນຕາມວ່າງ ຮ່ອງ, ເລິກ 15-20 ຊຕມ ຖິມດິນໃຫ້ ແຈບ.
N	200	1	2-6	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ຜຸ່ນວ່າງແຖວ ເລິກ 6-8 ຊຕມ ຖິມດິນໃຫ້ແຈບ N 60-4%, P ₂ O ₅ 100%, K ₂ O 60-40%
P ₂ O ₅	300	1	12-1	
K ₂ O	200	2	2-6	

3. ການໃສ່ຜຸ່ນສວນຊາສຳລັບຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ຊະນິດຊາ	ຊະນິດ ຜຸ່ນ	ອັດຕາສ່ວນ Kg/ha	ຈຳນວນ ເທື່ອໃສ່	ເວລາໃສ່ (ເດືອນ)	ວິທີໃສ່ຜຸ່ນ
ຊາເພື່ອຜະ ລິດເປັນສິນ ຄ້າ 3 ປີ/ເທື່ອ	ຜຸ່ນອິນຊີ	25,000 30,000	1	12-1	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ ຜຸ່ນຕາມຫວ່າງແຖວ, ເລິກ 15-20 ຊຕມຖິມ ດິນໃຫ້ແຈບ
	P ₂ O ₅	100	1	12-1	
ຜົນຜະລິດ ຕໍ່າກວ່າ 600 Kg/ha	N	100 -120	3-4		ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ ຜຸ່ນຕາມຫວ່າງແຖວ, ເລິກ 6-8 ຊຕມຖິມ ດິນໃຫ້ ແຖວ, ໃສ່: 40-20-30 -10% ຫຼື N 40 -30 30%, P ₂ O ₅ 100%, K ₂ O 60 40%
	P ₂ O ₅	40-60	1		
	K ₂ O	60-80	2		

ຕໍ່ຕາງຕະລາງ 3 ການໃສ່ຝຸ່ນສວນຊາສຳລັບຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ຜົນຜະລິດໄດ້ 600 Kg/ha, ແຕ່ຕ່ຳກວ່າ 800 Kg/ha	N	120-180	3-4	2-4 ແລະ 6-8	ປະສົມໃຫ້ ສະເໝີ, ໃສ່ຝຸ່ນຕາມວ່າງແຖວ, ເລິກ 6-8 ຊຕມ ຖິ້ມ ດິນໃຫ້ ແຈບ, ໃສ່:40- 20-30 -10% ຫຼື N 40-30- 30%. P ₂ O ₅ 100%, K ₂ O 60-40%
	P ₂ O ₅	60-100	1	2	
	K ₂ O	80-120	2	2	
ຜົນຜະລິດໄດ້ 1,200Kg/ha ຂຶ້ນໄປ	N	300-600	3-5	1,3,5,7,9	ປະສົມໃຫ້ສະເໝີ, ໃສ່ ຝຸ່ນຕາມວ່າງແຖວ, ເລິກ6-8ຊຕມຖິ້ມດິນ ໃຫ້ແຈບ, ໃສ່: 30- 20-30-10% ຫຼື N 20-30-20% P ₂ O ₅ 100%, K ₂ O 60-30- 10%
	P ₂ O ₅	160-200	1	1	
	K ₂ O	200-300	2-3	1-5-9	

ເຕັກນິກການປັກຊໍາກິ່ງຊາ

ເຕັກນິກການປັກຊາກິ່ງຊາ

1. ມາດຕະຖານຂອງສວນແນວພັນ

ສວນແນວພັນຊາ ແມ່ນສວນຊາທີ່ປູກ ເພື່ອເອົາກິ່ງມາປັກຊາ. ສວນແນວພັນ ຕ້ອງປູກດ້ວຍກິ່ງພັນ (ບໍ່ແມ່ນປູກດ້ວຍແກ່ນ) ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະ ເປັນແນວພັນຊະນິດດຽວກັນ (ລ້ວນ). ສວນແນວພັນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດູແລຮັກສາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນປູກເປັນຕົ້ນມາ. ພິເສດແມ່ນລະບົບການໃສ່ຜຸນ. ນັບແຕ່ເລີ່ມປູກຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຜຸນອິນຊີຮອງພື້ນ 30-40 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ສົມທົບກັບໃສ່ຜຸນຊູບເປີຟິດສະຟັດ (P_2O_5) 600-800 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ນອກນັ້ນໃນແຕ່ລະປີຕ້ອງໃສ່ຜຸນ NPK ເພີ່ມ, ສຳລັບອັດຕາສ່ວນໃນການໃສ່ໃຫ້ເໝາະສົມ ແມ່ນອີງຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດດິນ. ໃນໄລຍະການປົວລະບັດຮັກສາ ຂໍ້ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນການເສຍຫຍ້າຂ້າຮຸ່ນເປັນປະຈຳ, ປາບສັດຕູພືດທີ່ມາທຳລາຍໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ຕັດແຕ່ງຊຶງພຸ່ມໃຫ້ແທດເໝາະ ເພື່ອຮັບປະກັນລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນກິ່ງງ່າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ.

2. ມາດຕະຖານກິ່ງຊາທີ່ຈະປັກຊາ

ໄລຍະເອົາກິ່ງປັກຊາທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 90-105 ວັນ ຄິດໄລ່ແຕ່ມື້ ບໍ່ເກັບຍອດຊາ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກິ່ງປັກຊາແມ່ນ 2,5-4 ມມ, ເນື້ອທີ່ລວມຂອງໃບແຕ່ 20-25 ຊມ² ຖ້າເນື້ອທີ່ລວມຂອງໃບຫາກໃຫຍ່ກວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດອອກຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ.

ກ່ອນຕັດກິ່ງມາປັກຊາຈະຕ້ອງໄດ້ເດັດຍອດກ່ອນ 10-20 ວັນ ການເດັດຍອດແມ່ນອີງຕາມລະດູການ.

ລະດູການລ້ຽງກິ່ງປັກຊາມີ 2 ລະດູການຕົ້ນຕໍ ຄື: ລະດູໜາວແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຫາເດືອນກຸມພາ, ລະດູຮ້ອນແຕ່ ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດຂອງແຕ່ລະປີ.

3. ຫຼັກການຂອງເຕັກນິກການປັກຊາ

ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ເພື່ອສ້າງສວນກ້າ: ຄັດເລືອກພື້ນທີ່ພຽງ ຫຼື ຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍ, ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳມີລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນເລິກກວ່າ 1 ແມັດເປັນບ່ອນລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີເວລາມີຝົນຕົກ.

ອອກແບບໜານ, ຄັດເລືອກດິນ ແລະ ຖືງຮ່າຍເບົ້າ

ຂະໜາດໜານກ້າກວ້າງ 1 ມ -1.2 ມ, ຍາວແຕ່ 15 ມ-20 ມ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜານແມ່ນກວ້າງ 30-40 ມ, ເນື້ອທີ່ສວນກ້າບໍ່ຄວນກວ້າງກວ່າ 500 ມ².

ດິນສຳລັບຮ່າຍເບົ້າຄວນມີລະດັບຄວາມເປັນກົດ (PH 4.5-5.5) ອົງປະກອບຂອງດິນຄວນຢູ່ໃນລະດັບກາງ ຫຼື ເບົາ. ດິນທີ່ຈະນຳມາຮ່າຍເບົ້າຕ້ອງແມ່ນດິນທີ່ລອກເອົາດິນຊັ້ນໜ້າແຕ່ 10-15 ຊຕມ ອອກ. ຖືກທຸບໃຫ້ມຸ່ນແລ້ວນຳມາຮ່ອນ, ເມັດດິນມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0,5 ຊຕມ.

ເບົ້າຊຳກິ່ງແມ່ນໃຊ້ຖືງຢາງ (PE) ຂະໜາດ 10-12x16-18 ຊຕມ, ເຈາະຮູລະບາຍນ້ຳຢູ່ 1/3 ຂອງພື້ນເບົ້າ 6 ຮູ.

ເຮືອນຮີ່ມມີເສົາເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ຫຼື ຊີມັງຂະໜາດຄວາມສູງ 1.8 ມ, ຫຼັງຄາຮີ່ມອາດຈະໃຊ້ຕານາງດຳ ຫຼື ກະແຕະ, ກ້ານພ້າວແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີ.

ການປັກຊຳ: ກ່ອນການປັກຊຳຄວນຫຼຸດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ 80-85%, ເອົາກິ່ງຊຳປັກລົງເຄິ່ງກາງເບົ້າໃຫ້ໃບປິ່ນໄປຕາມທິດດຽວກັນ, ໃຫ້ກ້ານໃບເກືອບຕິດກັບໜ້າດິນເບົ້າ, ພາຍຫຼັງປັກຊຳສຳເລັດຕ້ອງພົ້ນນ້ຳດ້ວຍບັ້ງສິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົກກິ່ງປັກຊຳຈັບແໜ້ນ.

4. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບົວລະບັດສວນກ້າເບ້ຍ

ພາຍຫຼັງປັກຊຳໄດ້ 10-15 ວັນ, ປາກບາດກິ່ງປັກຊຳເລີ້ມຕິດຈອດກັນ, ອີກ 15-30 ວັນປາກບາດກິ່ງປັກຊຳເລີ້ມເປັນແປ້ວ, ພາຍຫຼັງ 30-60 ວັນ, ກິ່ງປັກຊຳເລີ້ມອອກຮາກ. ຊ່ວງໄລຍະນີ້ ຕ້ອງການເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດເປັນພິເສດ. ເພາະວ່າໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະຕັດສິນຈຳນວນກິ່ງປັກຊຳ ຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ລອດຂອງເບ້ຍຊາ.

4.1 ການຫຼຸດນ້ຳເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ

ອີງຕາມໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກິ່ງປັກຊຳໃນແຕ່ລະໄລຍະຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງກິ່ງປັກຊຳກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໄລຍະທີໜຶ່ງ: ໃນຊ່ວງໄລຍະເອົາກິ່ງປັກຊຳລົງເບົ້າ 15-20 ວັນ ກິ່ງປັກຊຳຍັງບໍ່ທັນປົກກະຕິ, ຈາກໃບທີ່ສົດໃສ, ໃບເລີ້ມມີອາການແຫ້ວ, ໃນໄລຍະນີ້ຈຸລັງເລີ້ມມີການແຍກຕົວ, ປາກບາດທີ່ຖືກຕັດເລີ້ມມີການຈອດ, ກຳລັງດູດນ້ຳບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ການລະ

ເຫຼືອນ້ຳຂອງໃບມີຫຼາຍ. ສະນັ້ນໃນໄລຍະນີ້ກິ່ງປັກຊາຈະມີໂອກາດແຫ້ວໄດ້ງ່າຍ, ການທົດນ້ຳຄວນເຮັດປົກກະຕິ, ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດສູງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະເຫຼືອນ້ຳຂອງໃບ. ສວນກ້າຕ້ອງໄດ້ປົກຄຸມທາງເບື້ອງເທິງ ແລະ ທາງດ້ານຂ້າງ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 80-90% ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ 80%. ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີຝົນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດນ້ຳ 1-2 ເທື່ອຕໍ່ວັນ. ຊ່ວງທ້າຍຂອງໄລຍະທີ່ໜຶ່ງໃບຈະມີສີຂຽວສົດໃສ, ຮອຍຕັດໄດ້ຕິດຈອດ.

ໄລຍະທີສອງ: ແຕ່ 15-30 ວັນ ກິ່ງທີ່ຊາໄດ້ເລີ່ມພື້ນຕົວ, ການດູດນ້ຳຂອງກິ່ງຊາແຂງແຮງຂຶ້ນ, ໜ້າຂອງໃບເບິ່ງບານມີສີເຫຼື້ອມ ແລະ ສົດໃສຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມມີຮອຍແປ້ວ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ພິດແມ່ນ 2 ວັນ ໃຫ້ທົດ 1 ຄັ້ງ, ແຕ່ລະຄັ້ງ 1.5 ລິດ/ມ² ຂອງເບົ້າ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນລະຫວ່າງ 70-80%. ຫຼັງຈາກ 60 ວັນ ກິ່ງທີ່ປັກຊາເລີ່ມອອກຮາກ ແລະ ເລີ່ມແຕກຕາຍອອດ. ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນເລີ່ມໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ຝຸ່ນ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ທົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລະດັບຄວາມຊຸ່ມໃນແຕ່ໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍຊາ.

4.2 ການໃສ່ຝຸ່ນ

ເບ້ຍຊາສວນໃນກ້າແຕ່ໄລຍະຍັງນ້ອຍຫາໃຫຍ່ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຈຳນວນຝຸ່ນ NPK ໃນ 1 ມ² ຂອງເບົ້າແມ່ນ 140 ກຣາມ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍທາດ N 60 ກຣາມ (ຖ້າແມ່ນທາດຢູເຣຍແມ່ນຄິດໄລ່ເອົາ 1/2 ຂອງທາດ N) P₂O₅ 30 ກຣາມ, K₂O 50 ກຣາມ. ແຕ່ຊ່ວງໄລຍະກິ່ງປັກຊາຫາ 2 ເດືອນ ທຳອິດແມ່ນບໍ່ໃສ່ຝຸ່ນຫຍັງໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລີ່ມໃສ່ຝຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອາຍຸ. ປະລິມານຝຸ່ນທີ່ຄວນໃສ່ໃນສວນກ້າເບ້ຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:

1. ປະລິມານຝຸ່ນໃສ່ສວນກ້າ

ອາຍຸປັກຊຳ (ເດືອນ)	ທາດນິຕີ (N)	ຟິດສະຟໍ (P ₂ O ₅)	ກາລີຊຸນເຟດ (K ₂ O)
2	9	4	7
4	13	6	10
6	17	8	14
8	21	12	19
ລວມ	60	30	50

4.3 ວິທີໃສ່ຝຸ່ນ

ລະລາຍຝຸ່ນ NPK ໃນບົວຫິດນ້ຳແລ້ວຫິດໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີຕາມໜ້າໜານ (ຄວາມເຂັ້ມຊຸ້ນ 1%) ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ນ້ຳທຳມະດາຫິດລ້າງ. ເວລາໃດຍອດປົ່ງອອກຍາວ, ມີໃບ 2-3 ໃບ ອາດສິດພົ້ນຍູເຮຍລະລາຍນ້ຳເຂັ້ມຊຸ້ນ 2% ນ້ຳ 1 ລິດ/ 5m². ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຄວນສິດປະສົມກັບຢາຂ້າແມງໄມ້, ສິດພົ້ນພາຍຫຼັງໃສ່ຝຸ່ນແຕ່ລະຄັ້ງ.

4.4 ການປ້ອງກັນແມງໄມ້ທຳລາຍ ແລະ ການເສຍຫາຍ

ໃນສວນກ້າຊາ ໂດຍປົກກະຕິມັກປາກົດມີແມງໄມ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມງເພັຍຊຽວ, ແມງປົກແຂງ,...ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາເລື້ອຍໆ ເພື່ອຈະໄດ້ກຳຈັດດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ ເຊັ່ນ: Actara, Acelant,...ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນສິດຢາປ້ອງກັນຍອດເນົ່າ, ພະຍາດໃບແຫ້ມ, ໃບຈູດ. ແຕ່ລະຊະນິດພະຍາດ, ແມງໄມ້ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນສະນັ້ນຄວນໃຊ້ຢາກຳຈັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນ. ສວນກ້າຄວນອານາໄມເປັນປະຈຳໃຫ້ສະອາດ ແລະ ກ້ຽງ, ເກັບກວດກິ່ງປັກຊຳທີ່ຕາຍ ແລະ ໃບທີ່ລົ່ນອອກ, ຫຼີກຫຍ້າອອກ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຍ່ງອາຫານລະຫວ່າງຫຍ້າ ແລະ ເບ້ຍຊາ.

4.5 ການປູກສຳມ ແລະ ຕອນຍອດ

ເບ້ຍຊາທີ່ຕາຍ ຫຼື ຕິດພະຍາດຄວນຫຼີກຖິ້ມແລ້ວເອົາເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງປູກທົດແທນ. ລະດູການປັກຊຳສຳມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແມ່ນເດືອນທຳອິດພາຍຫຼັງປັກຊຳ, ຖ້າກິ່ງ

ປັກຊາມີຊຸ່ດອກກໍ່ຄວນເດັດຊຸ່ດອອກໃຫ້ໝົດ. ກ່ອນຈະນຳເອົາເບ້ຍຊາໄປປູກ 1 ເດືອນ ຄວນຈະຕັດຍອດຕົ້ນທີ່ສູງອອກ.

4.6 ການປັບແສງ

ພາຍຫຼັງເບ້ຍຊາປົ່ງຮາກ ແລະ ຕຸ່ມຕາຍອດ, ແມ່ນຊ່ວງທີ່ຄວນມີການປັບແສງ ສະຫວ່າງເທື່ອລະເລັກເທື່ອໜ້ອຍ. ເປີດຕານ່າງກັນແສງເທື່ອລະໜ້ອຍໃນມື້ທີ່ອາກາດ ຊຸ່ມເຢັນ. ກ່ອນຈະນຳເອົາໄປປູກ 1 ເດືອນ ຕ້ອງເປີດຕານ່າງປັ່ງແສງອອກໃຫ້ໝົດ, ເພື່ອ ຝຶກເບ້ຍຊາໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ. ໂດຍສົມທົບກັບການຈັດລຽງລະດັບ ເບ້ຍຊາ, ບັນດາເບ້ຍຊາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແມ່ນເອົາໄປຝຶກແສງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເພື່ອ ໃຫ້ເບ້ຍຊາແຂງແຮງ, ສຳລັບບັນດາເບ້ຍທີ່ອ່ອນແອ ແມ່ນສືບຕໍ່ປົວລະບັດຮັກສາໄວ້ໃນ ສວນກ້າ.

4.7 ມາດຕະຖານເບ້ຍຊາທີ່ຈະນຳໄປປູກ

ອາຍຸເບ້ຍຊາເພາະລ້ຽງໃນສວນກ້າແມ່ນ 8-12 ເດືອນ ມີລວງສູງ 20 ຊຕມ, ຂຶ້ນໄປມີໃບ 6-8 ໃບ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນເງົ້າຕົ້ນ 3-4 ມມ ສ່ວນຂອງລຳຕົ້ນມີສີກະເບົາກວມ ເອົາຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ $\frac{1}{2}$ ຂອງລວງຍາວລຳຕົ້ນ. ໃບມີສີຂຽວສົດໃສ, ປອດພະຍາດ ບັງແມງ, ເບ້ຍຕ້ອງໄດ້ຕອນຍອດກ່ອນເຄື່ອນອອກສວນກ້າເພື່ອນຳເອົາໄປປູກຕາມພື້ນທີ່ ສວນປູກທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້.