

ບົດນຳ

ແມງແຄງຍາວເປັນແມງໄມ້ສັດຕູຜິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ທຳລາຍຕົ້ນເຂົ້າ. ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລະ ຕົກຕຳແມງແຄງຍາວມັກຢູ່ໃນສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດຢູ່ເຂດເຄິ່ງຮ້ອນ ແລະ ເຂດຮ້ອນຢູ່ໃນສປປລາວເຮົາແມງແຄງຍາວເຫັນວ່າເປັນແມງໄມ້ສັດຕູຜິດຕົວສຳຄັນ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ທຳລາຍເຂົ້າທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ແມງແຄງທຳລາຍເຂົ້າຫຼາຍຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງແຄງຍາວໃນນາເຂົ້າໃຫ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

I. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ

ໂຕແກ່ ລຳໂຕຍາວ, ຮຽວ, ຂາຍາວ, ສີຂຽວອ່ອນນ້ຳຕານ. ໂຕທີ່ໃຫຍ່ຍາວປະມານ 14—17 ມິລິແມັດ .

ໂຕອ່ອນ ມີສີຂຽວເຫຼືອງ, ບໍ່ມີປີກ ແລະ ສັ້ນກວ່າໂຕແກ່
ໄຂ່ ລັກສະນະການວາງໄຂ່ຂອງແມງແຄງ ຈະວາງລຽນກັນເປັນສອງແຖວດ້ວຍປະລິມານ 200—300 ໜ່ວຍ .
ໄຂ່ເປັນສີແດງເຫຼື້ອນ .

II. ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ອຸນນະພູມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແມງແຄງ 27—28 ອົງສາ, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປະມານ 80 —85 % RH . ຫ້ອງຟ້າມີເນກປົກຄຸມ ແລະ ຝົນຝອຍ ເຮັດໃຫ້ແມງແຄງຂະຫຍາຍຜິມຂຶ້ນ. ພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າໄກ້ປ່າ ແລະ ມີຫຍ້າເຂົ້າມີກຸ່ມມີແມງແຄງຫຼາຍ ເພາະເປັນບ່ອນລີ້ຊ້ອນ ແລະ ວາງໄຂ່ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວ .

III. ການທຳລາຍ

ແມງແຄງມີງວງດູດກິນອາຫານ. ແມງແຄງໂຕອ່ອນພາຍຫຼັງເບາະອອກມາໃໝ່ໆ ຈະດູດກິນນ້ຳໃນກາບຕົ້ນເຂົ້າໂຕເປັນບ່າວສາວ ແລະ ໂຕແກ່ຈະດູດກິນທາດອານຢູ່ໃນເມັດເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເຂົ້າເປັນ ນ້ຳນົມຈົນເຖິງໄລຍະເລີ້ມສຸກ .

3.1 ລັກສະນະຂອງການທຳລາຍ

- ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົ້າເປັນຈຸດສີນ້ຳຕານ
- ເມັດເຂົ້າຖືກທຳລາຍເປັນຮອຍຊ້ຳ ແລະ ສີດຳ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົ້າຫັກເນື້ອເອົາໄປຕຳ ຫຼື ສີ, ມີກິ່ນຂົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົ້າລົບ .

3.2 ໄລຍະເວລາການທຳລາຍ

ແມງແຄງຈະມັກທຳລາຍເມັດເຂົ້າເປັນນ້ຳນົມຫາເມັດເຂົ້າເປັນນ້ຳນົມຫາເມັດເຂົ້າສຸກ ແລະ ຈະຢູ່ໄລຍະຕອນເຊົ້າເວລາປະມານ 8—10 ໂມງ.

ວົງຈອນຊີວິດ ປະມານ 23—34 ວັນຮອບວຽນໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງແມງແຄງຍາວ .

III. ວິທີປ້ອງກັນ

3.1 ວິທີກຳຈັດ

ທຳລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງແມງແຄງເຊັ່ນ :ອະນາໄມຖາງຫຍ້າຄັນນາໃຫ້ແປນ ແລະ ບໍລິເວນໄກ້ຄຽງ, ອ້ອມແຄມຄັນນາ .

- ຄວນນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າຊະນິດດຽວກັນ, ຕົກກ້າ ແລະ ດຳພ້ອມກັນ. ເປັນແນວພັນທີ່ແຂງແຮງ. ນຳໃຊ້ເຕັກນິກກະເສດສຸກ. ໃສ່ອັດຕາຝຸ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມວິຊາການຄວບຸກຫຍ້າເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າແຂງແຮງຮັບການ

ສະໜອງຝຸ່ນ ໄດ້ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າອອກຮວງພ້ອມກັນ.

- ແນະນຳຕົກກ້າກ່ອນໝູ່ ແລະ ປັກດຳກ່ອນໝູ່ເປັນແປງນ້ອຍປະມານ 3x5 ແມັດ ໃນບໍລິເວນນາຕົວຢ່າງ ມີປະມານ 5—10 ຮຕ ແນະນຳໃຫ້ມີແປງນ້ອຍທີ່ດຳກ່ອນ 2—3 ຈຸດໃນບໍລິເວນແຄມປ່າ ຫຼືແຄມນາທີ່ດຳນຳຫຼັງເພື່ອລໍໃຫ້ແມງແຄງມາຕອນເຂົ້າທີ່ອອກດອກກ່ອນແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະງ່າຍ ໃນການປາບປາມແມງຈະໃຊ້ຢາ ສິດຖືກໂຕຕາຍຫຼືໃຊ້ສະຫວິງແກ່ງເອົາກໍ່ໄດ້ເພາະວ່າບໍລິເວນແຄບໃຊ້ວິທີການນຮ້າະຫຼຸດຜ່ອນປະຊາກອນແມງແຄງຫຼາຍທີ່ສຸດ .

3.2 ວິທີການເຕັກນິກຕ່າງໆ

- ຖ້າຫາກພົບເຫັນແມງແຄງຕາມທົ່ງນາບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ເຂົ້າອອກຮວງຈຶ່ງຈະຈຳກັດ. ຄວນເລີ່ມກຳຈັດແຕ່ຫົວທີ່ຄວນນຳໃຊ້ສະຫວິງແກ່ງໃນທຸກໆຕອນເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຂອງແມງແຄງຫຼຸດລົງ, ໃຊ້ວິທີການນີ້ແມ່ນມີປະສິດຖິຜົນສູງ. ແລ້ວຍັງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມດ້ຍອກ.
- ຖ້າພົບເຫັນໃນຊ່ວງໄລຍະເຂົ້າອອກຮວງແລ້ວຍັງນຳໃຊ້ເຫຍື່ອລໍ້ເພື່ອໃຫ້ແມງແຄງໄດ້ຮັບກິ່ນ ແລ້ວມາຕອນກະປູເນົ່າກົບເນົ່າ. ຫອຍເນົ່າ ຫຼື ສັດຕາຍມີກິ່ນມາສຽບໃສ່ຫຼັກໄມ້ສູງກວ່າຕົ້ນເຂົ້າເລັກນ້ອຍແລ້ວໄປປັກຕາມຄັນນາດ້ວຍໄລຍະຫ່າງກັນປະມານ 10—15 ບາດກ້າວຢ່າງ. ແຕ່ລະມື້ຈະຕ້ອງລົງໄປຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເບິ່ງ. ຖ້າພົບເຫັນແມງແຄງມາຕອນຕາມຫຼັກທີ່ປັກໄວ້ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສະຫວິງມາງວມເອົາແລ້ວທຳລາຍຖິ້ມ. ຖ້າບຳທຳລາຍຖິ້ມມັນຈະຂະຫຍາຍຕົວໄວເພາະມັນໄດ້ກິນອາຫານອີກ .

3.3 ການປ້ອງກັນທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ

ໃນເມື່ອຫາກພົບເຫັນໃນຊ່ວງເຂົ້າຖອກຮວງເປັນນ້ຳນົມປະມານ 4—5ໂຕ/ມ² ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາຟາສະແທກໃນອັດ

ຕາ 1 ບ່ວງແກງ/ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດໃນເວລາ 6—8 ໂມງເຊົ້າ
ແລະຕອນແລງ ຫຼື ນ້ຳໃຊ້ຢາວິດີໂອ 60 % ມາສິດດ້ວຍອັດຕາ
3—4 ບ່ວງແກງ/ນ້ຳ 20 ລິດ ຫຼື ຈະໃຊ້ເຊວິນ 85% ໃນອັດ
ຕາ 2 ກິໂລກຣາມ/ຮຕ .

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຂໍ້ແນະນຳ
ການປ້ອງກັນ ແລະ
ກຳຈັດແມງແຄງຍາວໃນນາເຂົ້າ



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CETAU
(ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ)



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ຮ່ວມກັບ:
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)