

ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຫອຍກິນເຂົ້າ

1. ຮູບຮ່າງການປະກອບສ້າງ ຂອງຫອຍ

ຫອຍກິນເຂົ້າ ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ : *Pomocea* SP.
ພົບເຫັນໃນລາວມີ 2 ຊະນິດຄື : ຊະນິດເປືອກຫຸ່ນສີຂຽວ
ເຂັ້ມປົນສີນ້ຳຕານ (*P. fuscescens*)
ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດ ຄ້າຍຄືຫອຍໂຂ່ງ, ຫອຍປັງ
ຖ້ຳສັງເກດໃຫ້ເຫັນວ່າຫອຍກິນເຂົ້າກວ້າງກວ່າ, ກິ້ນຂອດ
ແລະ ບໍ່ແຫຼມປານໃດ, ເປືອກບາງ ແລະ ຜ່ອຍເມື່ອທຸບຈະ
ແຕກງ່າຍ ລຳຕົວຫອຍຫຸ່ນດ້ວຍເປືອກທີ່ກ້ຽງດີ ມີຝາ ແລະ
ໂງດຽວຂ້ອນຂ້າງມົນ ແລະ ໃຫຍ່ ຫົວຂອງຫອຍຈະເປັນ
ແຜ່ນແຂງ ແລະ ລິ້ນອອກຈາກໂຕ ຫົວມີປາກ ແລະ ອະໂວ
ຍະວະຄ້າຍໝວດນຶ່ງຄູ່ ປາຍແຫຼມລິ້ນກວ່າໝວດໃຊ້ຮັບ
ຄວາມຮູ້ສຶກ, ມີໝວດນຶ່ງຄູ່ ແລະ ຕານຶ່ງຄູ່, ມີແຂ້ວນຶ່ງຄູ່
ເປັນດານແຂງ ໃຊ້ກັດຕື້ນໄມ້ໂປຫຍ້າ ຫອຍເຄື່ອນທີ່ໂດຍ
ໃຊ້ກ້າມຊີ້ນທີ່ເປັນແຜ່ນຍາວເອີ້ນວ່າ ຕີນຫອຍ ເພື່ອຄານໄປ
ຕາມໜ້າດິນ ຫຼື ພື້ນນ້ຳ



ຮູບ : ຫອຍ

2. ລັກສະນະການທຳລາຍ

ທຳລາຍຕົ້ນເຂົ້າໂດຍກັດກິນໃບ ແລະ ກິນໃບ ໂຕທີ່
ຢູ່ໄກໜ້ານ້ຳມັກທຳລາຍເຂົ້າທີ່ປັກດຳໃໝ່ ຫາເຂົ້າແຕກກໍ
ສູງສຸດ ແລະ ເມື່ອເຂົ້າແກ່ກໍກັດກິນຮາກເຂົ້າ. ມັກກິນພືດ
ອ່ອນ ແລະ ມີຢາງ .

3. ວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ການແຜ່ພັນ

ຈຳແນກເພດ ຂອງຫອຍກິນເຂົ້າຖ້ຳໂຕຜູ້ຝາ ແລະ
ໂງຈະໂນນຢູ່ຈຸດກາງຂອງຝາ ມີອະໂວຍະວະເພດ ເປັນຮູບ
ທໍ່ຍາວສີຂາວເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖ້ຳໂຕແມ່ກໍຈະຫຼຸບ
ລົງເລັກນ້ອຍ. ຫອຍໂຕເຕັມໂອຈະມີຍຸ 3 ເດືອນ ມີນ້ຳໜັກ
ປະມານ 5 ກຣາມ, ໂຕແມ່ມີໄຂ່ໃນທ້ອງກ່ອນຈິ່ງເລີ່ມປະ
ສົມພັນໂດຍຈັບຄູ່ກັນຢູ່ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນ 1—2 ວັນຕໍ່
ມາໂຕແມ່ໄຂ່ອອກ ຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເວລາກາງຄືນໂດຍ
ໄດ້ຂຶ້ນຕົ້ນພືດ ແລະ ຫຼັກໄມ້ທີ່ມີລະດັບສູງ ກວ່າໜ້ານ້ຳ ໄຂ່
ທີ່ອອກໃໝ່ຈະຫຸ້ມດ້ວຍຢາງ ຕໍ່ມາຈິ່ງກ້າມ ແລະ ແຂງຕົວ
ເຂົ້າໄຂ່ຈັບກັນເປັນກຸ່ມ ມີສີປົວ ກຸ່ມນຶ່ງຍາວປະມານ
1—5 ຊຸດ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມມີໄຂ່ປະມານ 400—3000 ໜ່ວຍ
ພາຍໃນ 7—12 ວັນໄຂ່ຈະເປັນສີຂາວ ແລະ ສີຂີ້ເທົ່າ
ກ່ອນຈະເປັນຕົວອ່ອນ ຫອຍນ້ອຍຂະໜາດເທົ່າຫົວ
ເຂັ້ມໝູດຈະກິນໂຮນ້ຳ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕວ່ອງໄວ. ເມື່ອ
ອາຍຸໄດ້ 3 ເດືອນ ຈະກາຍເປັນໂຕແກ່ເຕັມໂອ ແລະ ສາມາດ
ສືບພັນໄດ້ ຫອຍທີ່ອອກໄຂ່ແລ້ວປະມານ 4—10 ວັນສາ
ມາດປະສົມພັນ ແລະ ອອກໄຂ່ໄດ້ອີກ ໃນລະດູຝົນຈະໄຂ່ໄດ້
ເຖິງ 10—14 ຄັ້ງ / ເດືອນ ແລະ ອອກໄຂ່ໄດ້ຕະຫຼອດປີ,
ຕະຫຼອດຊົ່ວອາຍຸຂອງຫອຍແມ່ນ 2—3 ປີ .

4. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ

ວິທີດີທີ່ສຸດກໍຄືແບບ
ປະສົມປະສານໂດຍໃຊ້ຫຼາຍເຕັກນິກວິທີການ ຄື:

ເຕັກນິກການປ້ອງກັນ

- ຫຼີກເວັ້ນການເຄື່ອນຍ້າຍຫອຍໄປລ້ຽງ ຫຼື ປ່ອຍໃນທ້ອງ
ຖິ່ນອື່ນ .
- ເປັ່ງນ້ຳນາອອກຫຼັງຈາກປັກດຳ ຫຼື ຈິ່ງໄວ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ
1 ຊຸດ .
- ປ້ານຄັນນາໃຫ້ສູງດີ ແລະ ໝັ້ນອັດບ່ອນຮົ່ວໄຫຼ , ຢູ່ບ່ອນ
ເປັ່ງນ້ຳເຂົ້າອອກນາຕ້ອງໃສ່ຕາໜ່າງກັນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ຫອຍລັກລອດເຂົ້ານາ .

ວິທີການປາບ

- ເກັບກຸ່ມໄຂ່ ແລະ ໜ່ວຍຫອຍ ດ້ວຍມື ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ທິດລະຄັ້ງຢ່າງນ້ອຍ .
- ໃຊ້ດາງກວດໃນໂຮ່ນາທີ່ຄາດແລ້ວກ່ອນປັກດຳ ຫຼື ໃຊ້
ໃບໝາກຫຸ່ງ , ໃບຈຳປາ, ໃບມັນຕື້ນ, ເປືອກໝາກນັດ,
ໝາກແຕງ ແລະ ເສດອາຫານ ຢ່າງໃດນຶ່ງໄປວາງໄວ້
ເປັນຈຸດລຽບ ຕາມຄັນນາເພື່ອລໍ້ເກັບຫອຍແບບງ່າຍໆ .
- ທຳລາຍໄຂ່ເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບດີ .
- ເຮັດຮ່ອງລຽບຕາມຄັນນາຂະໜາດ 40 X 40 X 20 ເວ
ລາແດດກ້າຫອຍຈະນາທ້ອນກັນຢູ່ຮ່ອງສະດວກໃນການ
ເກັບ .
- ປ່ອຍຝຸງເປັດລົງນາກ່ອນການປັກດຳ ຫຼື ພາຍຫຼັງປັກດຳ
ໄດ້ 30 ວັນ .
- ໃຊ້ສານເຄມີປາບ ຄວນເປັນວິທີສຸດທ້າຍ , ຖ້າຫາກມີ

ການລະບາດຂອງຫອຍຫຼາຍເກີນຄວນ ໃນທັນທີຫຼັງ
ຈາກປັກດຳແລ້ວ .

ສານທີ່ຄວນໃຊ້ໄດ້ແກ່ :

- ນິໂຄສາມິດ (Niclosamide) ຫຼື ໂບລູດາຊ (bay
lucide) ໃຊ້ປະສົມນ້ຳສີດ ຫຼື ຫິດໃນອັດຕາ 5 ບ່ວງ ແກງ
(50 ກລ / ໄລ່) ປະສົມນ້ຳປະມານ 40 ລິດ ໃສ່ໃນລະດັບ
ນ້ຳນາບໍ່ເກີນ 5 ຊຸດ .
- ເມທອນດີໂຣ ຫຼື ແອງໂກຣສະລັກ ເປັນເນັດສີບົວໃຊ້
ຫ່ວານໃນອັດຕາ 0.5 ກິໂລ / ໄລ່ ໃນລະດັບນ້ຳບໍ່ເກີນ 5
ຊຸດ .
- ຄອບເປີຊິນເຟດ ເປັນຝຸ່ນສີຟ້າ ໃຊ້ປະສົມນ້ຳໃນອັດຕາ
1 ກລ / ໄລ່ ປະສົມນ້ຳ 80 ລິດ ສີດ ຫຼື ຫິດດ້ວຍບົວຫິດ
ຜັກ

ຂໍ້ຄວນຈຳ


ກ່ອນຈະໃຊ້ຢາຂ້າຫອຍ ຄວນເບິ່ງນ້ຳອອກໃຫ້ຈົ່ງ
ໄວ້ພໍຖ້ວມ ຂົ່ງຫົວໂຮ່ນາ ຍັງປະມານ 5 ຊຸດ ເພາະຖ້າ
ລະດັບນ້ຳໜ້ອຍ ຫອຍຈະເຂົ້າຝັງຕົວໃນດິນເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແລ້ວຈະບໍ່ຖືກຢາ ຫຼື ຖ້າລະດັບນ້ຳຫຼາຍໄພດຢາ
ຈະຈິດຈາງ ແລະ ກໍ່ສິ້ນເປືອງຢາອກດ້ວຍ. ດິແທ້ການ
ໃຊ້ຢາຄວນເປັນຕອນແລງ ໄກ້ຄຳຍາມອາກາດເຢັນ
ເວລານີ້ຫອຍຈະຂຶ້ນຈາກດິນ ມາກິນອາຫານທຸກຕົວ
ຖ້າບ່ອນໃດນ້ຳເລິກຕ້ອງສີດ ແລະ ຫ່ວານຢາເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫ້າມໃຊ້ຢາ ແອນໂດຊິນແຟນ ເພາະເປັນຢາອັນຕະ
ລາຍສູງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ .



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຂໍ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຫອຍສັດຕູເຂົ້າ



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CETDAU
(ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ)

ຮ່ວມກັບ:
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ (LEAP)