

ແມງບົ່ວ

1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ແມງບົ່ວມັກເກີດ ຫຼື ມັກລະບາດຢູ່ບ່ອນທີ່ເຮັດການຜະລິດ ໄກ້ກັບພູດອຍ ຫຼື ໄກ້ກັບປາດົງ, ບົ່ວເປັນແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍ ຊຶ່ງແມງກະບີຂອງບົ່ວ ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຕຍຸງຕ່າງແຕ່ຂາຂອງ ແມງບົ່ວຍາວກ່ອນຈັກໜ້ອຍ ແລະ ມີປີກເປັນສີຂາວ ລຳໂຕມີ ສີແດງ ສ່ວນຕົວຜູ້ລຳໂຕມີສີນ້ຳຕານ, ແມງກະບີຂອງບົ່ວ ມັກອອກຫຼິ້ນແສງໄຟຍາມກາງຄືນ, ແມງບົ່ວຈະວາງໄຂ່ຢູ່ ຕາມສູນ ຫຼື ກາບໃບເຂົ້າ..



ຮູບ : ແມງບົ່ວ

2. ໂລຍະລະບາດ

ແມງບົ່ວ ສາມາດທຳລາຍຕົ້ນເຂົ້າໄດ້ເກືອບຕະຫຼອດລະ ດູການ ແຕ່ຮ້າຍແຮງແມ່ນໂລຍະຕົ້ນເຂົ້າແຕກກໍ່ສູງສຸດ, ຖ້າປີໃດຫາກມີສະພາບດິນຟ້າອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ, ຝົນຕົກຕື່ມືນ ຕົກລົນຢູ່ຕະຫຼອດໂລຍະຕົດຕໍ່ກັນຫຼາຍ ມີແມ່ນເໝາະສົມກັບ ການແຜ່ລະບາດຂອງແມງບົ່ວ.

3. ລັກສະນະການທຳລາຍ

ແມງບົ່ວໄຂ່ໄດ້ 3 — 4 ມື້ ໄຂ່ກໍ່ຈະເບາະເປັນຕົວໜອນ ແລ້ວເຂົ້າໄປອາໄສເຈາະກິນ ສ່ວນທາງໃນຂອງຍອດອ່ອນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຟື້ນອອກມາ (ໃບທຸງ ຫຼື ໃບໃຈກາງຂອງຕົ້ນ). ໃບໃຈກາງຂອງຕົ້ນທີ່ຖືກບົ່ວທຳລາຍ ກໍ່ຈະກາຍເປັນຄືໃບ ຜັກບົ່ວ, ຕົ້ນໃດທີ່ຖືກບົ່ວທຳລາຍ ກໍ່ຈະບໍ່ອອກຮວງເລີຍ, (ຖ້າໃນພື້ນທີ່ນາ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນມີການໄລ່ຝຸ່ນວິທະ ຍາສາດຫຼາຍ ບົ່ວມັກເກີດຫຼາຍທີ່ສຸດ).

4. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ

- ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແມງບົ່ວໄດ້ດີ .
- ຖ້ານາມີລະບົບຊົນລະປະທານ ຖ້າການລະບາດບໍ່ ຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າຖ້ວມຍອດເຂົ້າ ປະໄວ້ປະ ມານ 12 ຊຸມ ແລ້ວຈຶ່ງເປັ່ງນ້ຳອອກ .
- ໃຊ້ຢາດີອາຊີນອນ 14 % ຊະນິດເມັດ ໜ່ວຍ 2 — 3 ເທື່ອ ເທື່ອລະ 8 — 10 ກລ/ຮຕ.
- ໃຊ້ຢາຟູຣາດານ 3 % ຊະນິດເມັດ ໜ່ວຍໃນອັດຕາ 25 — 30 ກລ/ຮຕ.

- ໃຊ້ຢາອາໂຊດຣິນ 65 % ຊະນິດນ້ຳ ໃນອັດຕາ 2 ບ່ວງ ແກງ ປະສົມກັບນ້ຳ 10 ລິດ ສິດໃຫ້ທົ່ວ.
- ໃຊ້ຢາເຊວິນ 85 % ຊະນິດຝຸ່ນ ໃນອັດຕາ 2 — 3 ບ່ວງ ແກງ ປະສົມກັບນ້ຳ 15 ລິດ ສິດໃຫ້ທົ່ວ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ເຕັກນິກການປ້ອງກັນ ແລະ
ກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູຜິດຕົ້ນຕໍຂອງເຂົ້າ
(ແມງບົວ)



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CETAU
(ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ)



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ຮ່ວມກັບ:
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)