

ວິທີການກຳເບີຍຫວາຍ

ການປູກຫວາຍກໍ່ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະນຳມາປະຕິບັດໄດ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຳເບີຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບພ້ອມທັງປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລົງທຶນ ເຊິ່ງວິທີທີ່ນັກວິຊາການ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ ທີ່ສົນໃຈນິຍົມນຳເອົາໄປໃຊ້ມີ 2 ວິທີຄື:

1. ວິທີກຳເບີຍດ້ວຍການກະຕຸ້ນແກ່ນດ້ວຍນ້ຳ

ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ

1.1 ການເກັບແກ່ນ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຮູ້ລະດູການເກັບແກ່ນ ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງ ສີຂອງໝາກຫວາຍວ່າໝາກສຸກເໝາະສົມທີ່ຈະນຳມາກຳ.



ຮູບ: ແກ່ນຫວາຍ

1.2 ການກະກຽມແກ່ນຫວາຍ


ເກັບໄວ້ໃນຮິມ ຫຼື ໃນຫ້ອງທີ່ມີລົມລ່ວງດີ, ບໍ່ໃຫ້ເກັບໄວ້ ເກີນ 1 ເດືອນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການງອກຕ່ຳ. ເມື່ອ ເກັບໝາກຫວາຍມາແລ້ວປະຕິບັດດັ່ງຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

- ☉ ນຳເອົາໝາກຫວາຍທີ່ສຸກມາແກະເປືອກ ແລະ ນວນຫຸ້ມ ແກ່ນອອກໃຫ້ໝົດ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ (ຕຳແກ່ນປະສົມຂີ້ ຊາຍ, ລ້າງແກ່ນໃນນ້ຳ)
- ☉ ນຳແກ່ນລົງແຊ່ນ້ຳເພື່ອກະຕຸ້ນການແຕກງອກ.

1.3 ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

ນຳແກ່ນທີ່ປອກເປືອກ ແລະ ແກະນວນອອກແລ້ວໄປ ແຊ່ນ້ຳໄວ້ປະມານ 7 ວັນ.

- ☉ ກະກຽມໜານໃສ່ ໜ້າດິນດ້ວຍການຂຸດ ແລະ ຍົງດິນ ໃຫ້ລະອຽດແລ້ວປະຕາກແດດໄວ້.
- ☉ ສ້າງຂອບໜານໃຫ້ສູງ ແລະ ເລິກ 10—20 ຊມ



- ☉ ນຳແກ່ນທີ່ແຊ່ແລ້ວໄປຫວ່ານໃສ່ໜານໃຫ້ສະເໝີກັນ ໜານກວ້າງ, ຍາວ ຂະໜາດ 1x4 ມ ໃຊ້ແກ່ນຫວາຍ ຈຳນວນ 10 ກກ. (ກິໂລກຼາມ)



ຮູບ: ການຫວ່ານແກ່ນໃສ່ໜານ


- ☉ ນຳໃຊ້ດິນ ຫຼື ຂີ້ຊາຍປົກດ້ານເທິງຂອງໜານຫຼັງຈາກ ຫວ່ານແກ່ນແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແກ່ນຢູ່ໃນໜານພູຂຶ້ນເທິງ ໜ້າດິນ ເວລາທົດນ້ຳຫຼື ເວລາຝົນຕົກໃສ່ໜານແຮງ. ທົດນ້ຳ ເຂົ້າແລະ ແລງຈົນກວ່າແກ່ນຫວາຍຈະເກີດ ຫຼື ແຕກງອກ (ຖ້າຝົນບໍ່ຕົກ).

2. ວິທີກຳແກ່ນດ້ວຍ ການແກະຕາຫວາຍ

ວິທີນີ້ມີໄລຍະການແຕກງອກສັ້ນກວ່າ ແລະ ເປັນວິທີ ທີ່ມີຜົນດີຕໍ່ການຄັດເລືອກແກ່ນທີ່ສົມບູນ ແລະ ບໍ່ສົມບູນ.

2.1 ກະກຽມວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້

- ຊາມຢາງຂະໜາດໜ້າຕັດ 30 — 40 ຊມ
- ມີດລ່າມທີ່ມີດ້າມ ແລະ ຄົມເຂົ້າດີເພື່ອແກະຕາ
- ຜ້າຢາງໃສເພື່ອໃຊ້ປົກຄຸມປາກຊາມ
- ເຊືອກມັດປາກຊາມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍອອກ
- ຍຸ້ງໝາກພ້າວທີ່ຈີກໃຫ້ເປັນຝອຍນ້ອຍໆລະອຽດ
- ນ້ຳສຳລັບແຊ່ເປືອກໝາກພ້າວ
- ແກ່ນຫວາຍທີ່ແກະຕາແລ້ວໃຫ້ໄດ້ປະມານ 2 ກກ / ຊາມຢາງ




ການແກະຫວາຍ

2.2 ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

- ບໍ່ໃຫ້ແກ່ນທີ່ແກະຕາອອກນັ້ນຖືກນ້ຳ
- ນຳຍຸ້ງໝາກພ້າວລົງແຊ່ນ້ຳໃຫ້ປຽກປະມານ 20 ນາທີ
- ປັ້ນນ້ຳຍຸ້ງໝາກພ້າວອອກໃຫ້ແຫ້ງສະມັ່ງ (ຊຸ່ມ)
- ນຳເອົາຍຸ້ງໝາກພ້າວລົງໂຮຍໃສ່ຊາມຢາງທີ່ກຽມໄວ້ ໜາປະມານ 5 —10 ຊມ.
- ນຳແກ່ນຫວາຍທີ່ແກະຕາແລ້ວຫວ່ານໃສ່ດ້ານເທິງ ຂອງຍຸ້ງໝາກພ້າວ.
- ເອົາຍຸ້ງໝາກພ້າວທີ່ປັ້ນໃຫ້ສະມັ່ງແລ້ວລົງປົກດ້ານເທິງ

ຂອງແກ່ນໃຫ້ໜາປະມານ 5—10 ຊມ.



- ປົກຊາມດ້ວຍຜ້າຢາງໃສ່ ແລະ ມັດດ້ວຍເຊືອກໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຂ້າງໃນລະເຫີຍອອກໄປນອກ.
- ນຳຊາມແກ່ນຫວາຍທີ່ເຮັດສຳເລັດແລ້ວເກັບໄວ້ຮິມປ່ອນທີ່ມີລົມລ່ວງດີ.
- ບໍ່ໃຫ້ໄຂຊາມກ່ອນກຳນົດການແຕກງອກ
- ໝໍ້ຫວາຍຈະແຕກງອກໃນ 15 ວັນ ຫຼັງຈາກການກຳແລ້ວ, ແຕ່ຈະໃຊ້ເວລາແຕກງອກໃນ 60 ວັນ ຫຼືເມື່ອເຫັນໝໍ້ເບ້ຍຫວາຍຂຽວຂຶ້ນໃນຊາມເກີນກວ່າ 50% ແມ່ນແກ່ນທີ່ກຳນົດແຕກງອກອອກມາເກືອບຄົບຖ້ວນ.

2.3 ການກຸ່ມໝານ ແລະ ການບົງເບ້ຍຫວາຍ

ໝານທີ່ຈະບົງເບ້ຍຕ້ອງຢູ່ໃນຮິມ ຫຼື ມຸງດ້ວຍຕານ່າງກັນ ແສງ 50%—70% ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍທີ່ຍັງນ້ອຍ (ຖ້າຮາກຂອງເບ້ຍຫວາຍຍາວເກີນໄປໃຫ້ຕັດຮາກອອກເຄິ່ງໜຶ່ງກ່ອນ).

ກ. ຂັ້ນຕອນການບົງເບ້ຍຫວາຍ

- ກ່ອນບົງຕ້ອງຫົດນ້ຳໃສ່ເບ້ຍດິນທີ່ກຸ່ມໄວ້
- ໃຊ້ໄມ້ຊີດິນເປັນຮູຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງຖົງ
- ຖອນເບ້ຍທີ່ຍູງໝາກພ້າວ ຫຼື ໝານກຳມາບົງໃສ່ເບ້ຍ

- ເມື່ອບົງແລ້ວໃຊ້ນ້ຳມືບີບອ້ອມຂ້າງເບ້ຍໃຫ້ແໜ້ນ
- ເມື່ອສຳເລັດການບົງເບ້ຍໃຫ້ຫົດນ້ຳໃສ່ເບ້ຍຈົນປຽກ

ຂ. ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ເມື່ອເວລາຈຶ້ມ ຫຼື ຖອນເບ້ຍອອກຈາກຊາມ ຢ່າໃຫ້ແກ່ນທີ່ຕິດຢູ່ກັບເບ້ຍລົ້ນອອກເດັດຂາດ, ເພາະວ່າເບ້ຍນ້ອຍແຕ່ລະຕົ້ນຕ້ອງການອາຫານຈາກແກ່ນທີ່ຕິດຢູ່ນັ້ນໄປລ້ຽງລຳຕົ້ນ.

3. ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ

- ເມື່ອເບ້ຍຫວາຍມີອາຍຸໄດ້ 45 ວັນຂຶ້ນໄປຄວນໃສ່ຝຸ່ນ
- ຝຸ່ນຄອກໃຫ້ໂຮຍໃສ່ດ້ານເທິງຂອງເບ້ຍໃນປະລິມານພໍຄວນ
- ຝຸ່ນວິທະຍາສາດສູດສະເໝີ NPK15—15—15 ໃສ່ໃນປະລິມານ 1 ປ່ວງແກງ / ນັ້ 20 ລິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມເດືອນໃດໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ວິທະຍາສາດໜຶ່ງຄັ້ງ (ກ່ອນຈະໃສ່ຝຸ່ນ ຫຼື ບຸຍໃຫ້ຢຸດຫົດນ້ຳກ່ອນ 1 ວັນ).



ໂທ: 021 216080
ຂໍ້ມູນເຕັກນິກຕິດຕໍ່
ທ່ານ ຄຳພອນ ແສງດາລາ
ໂທ: 020 6861101



ໂທ: 021 740253
ຫຼື 021 740252



ໂທ: 021 740544
ຫຼື 021 740543

ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື :

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ເຕັກນິກ—ວິທະຍາສາດ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP),
ກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF) & (SUFORD)

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ

ວິທີການກຳເບ້ຍຫວາຍ

