

ຈຸທິການ
ປຸກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ
ບ
ພັນເມືອງ



ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ : ອາຈານ ຄຳພັນ ພັນທະວົງ.

ກວດແກ້ໂດຍ: ອາຈານໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ.

ພິມໂດຍ: ນາງ ສອນມະນີ ພິມລະຫວັນ.

ແຕ້ມໂດຍ: ຫ້າວ ອຸທອງ.

ປີ 2005

ຄຳນຳ

ປຶ້ມຄູ່ມືຫົວມື້ເປັນຫຼັກສູດເພີ່ມເຕີມທົບທວນຄວາມຊຶ່ງຈຳຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍບຸກມອນລ້ຽງມ້ອນແບບພື້ນເມືອງມາກ່ອນ, ພື້ນພູສີໄມ້ລາຍມື ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ທີ່ບໍ່ເຄີຍລ້ຽງມາກ່ອນ.

ໃນປະຈຸບັນການລ້ຽງມ້ອນພື້ນເມືອງໃນປະເທດລາວແມ່ນຍັງເຫລືອໜ້ອຍເຕັມທີຍ້ອນມີໄພຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍ ກົງກັນຂ້າມພວກທີ່ຊົມໃຊ້ໄພຕ່າງປະເທດພັດສົນໃຈເລື່ອງໄພລາວມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານແລ້ວ ເມື່ອເບິ່ງຕົວຈິງແລ້ວ ເຫັນວ່າປະເທດເຮົາຍັງເປັນເຂດພັດທະນາ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການບຸກມອນລ້ຽງມ້ອນພື້ນເມືອງລາວໃນໝູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າອີກ.

ຄະນະວິຊາການພະແນກພັດທະນາເຕັກນິກ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາຄຳ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນເປັນຜູ້ຮວບຮວມ ແລະ ຈັດພິມຫຼັກສູດເພື່ອຮັບໃຊ້ການສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ຫວັງວ່າປຶ້ມຫຼັກສູດເພີ່ມເຕີມຫົວມື້ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍແກ່ທ່ານຜູ້ທີ່ສົນໃຈດຳເນີນການບຸກມອນລ້ຽງມ້ອນເພື່ອເປັນອາຊີບເສີມ, ຖ້າຫາກມີສິ່ງໃດຂາດຕົກບົກພ່ອງພວກເຮົາຍິນດີຮັບຄຳຕຳນິຕິຊົມຈາກທຸກໆທ່ານ.

ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ.

ສາລະບານ

ບົດທີ.	ໜ້າ
ບົດທີ 1: ມ້ອນພື້ນເມືອງລາວ.....	1
1.1 ຮູບຮ່າງລັກຊະນະ ແລະ ວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຕມ້ອນ.	
1.2 ພື້ນມ້ອນພື້ນເມືອງ.	
1.3 ການປັບປຸງແນວພັນໂຕມ້ອນ.	
ບົດທີ 2: ມອນ.....	3
2.1 ພື້ນຕົ້ນມອນ.	
2.2 ການເລືອກໃຊ້ພື້ນຕົ້ນມອນ.	
2.3 ການຂະຫຍາຍພື້ນມອນ.	
2.4 ການເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດສວນມອນ.	
2.5 ການວາງແຜນປູກຕົ້ນມອນ.	
2.6 ການກຽມດິນປູກມອນ.	
2.7 ລະດູການ - ການປູກຕົ້ນມອນ.	
2.8 ການດູແລຮັກສາສວນມອນ.	
2.9 ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນ.	
2.10 ການກຽມສວນມອນເພື່ອລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ - ອາຍຸແກ່.	
2.11 ສັດຕູມອນ ແລະ ວິທີກຳຈັດ.	
ບົດທີ 3: ການລ້ຽງມ້ອນ.....	13
3.1 ການກຽມອຸປະກອນການລ້ຽງມ້ອນ - ເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ.	
3.2 ການອະນາໄມອຸປະກອນການລ້ຽງມ້ອນ.	
3.3 ການປັດມ້ອນ.	
3.4 ດຳເນີນການລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ.	
3.5 ການກຳນົດໃບມອນເກືອມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ.	
3.6 ການເສຍຂີ້ມ້ອນ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່.	
3.7 ການດຳເນີນການລ້ຽງມ້ອນອາຍຸແກ່	
3.8 ມ້ອນນອນ - ມ້ອນຕື້ນ - ມ້ອນສຸກ.	
3.9 ການເກັບມ້ອນສຸກເຂົ້າຈີ່ ແລະ ດູແລ.	
3.10 ສາເຫດການເກີດພະຍາດ ແລະ ສັດຕູອື່ນໆຂອງໂຕມ້ອນ.	
3.11 ສູດຄິດໄລ່ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝໃນອັງຫລອກ ແລະ ເປີເຊັນໄໝຕົບ.	
3.12 ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການສາວໄໝ.	
3.13 ການເກັບຮັກສາແມ່ພັນມ້ອນເພື່ອລ້ຽງຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.	

ບົດທີ 1


ມ້ອນເມືອງລາວ

1. ຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຕມ້ອນ.

ກ. ມ້ອນແມ່ນສັດປະເພດແມງກະບີປ່ຽນແປງໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະເລີນເຕີບໂຕຜ່ານ

4 ໄລຍະຕາມວົງຈອນດັ່ງນີ້:

- ໄລຍະໄຂ່ ໃຊ້ເວລາ 9 -12 ວັນ
- ໄລຍະເປັນໂຕບົງ, ມີ 5 ອາຍຸ, ແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ອາຍຸ 1 - 3 ເປັນມ້ອນອອນ ອາຍຸ 4-5 ເປັນມ້ອນແກ່. ອາຍຸ 1 ກິນໂປມອນ 3-4 ວັນ, ອາຍຸ 2 ກິນໂປມອນ 2-3 ວັນ, ອາຍຸ 3 ກິນໂປມອນ 3-4 ວັນ, ອາຍຸ 4 ກິນໂປມອນ 4-5 ວັນ, ອາຍຸ 5 ກິນໂປມອນ 5-8 ວັນ.
- ໄລຍະເປັນດັກແດ້ ໃຊ້ເວລາ 7-9 ວັນ
- ໄລຍະແມງກະບີ ໃຊ້ເວລາ 2-3 ວັນ





2. ພັນມ້ອນພື້ນເມືອງ

ພັນມ້ອນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນປະເທດລາວມີ:

- ນາງຫລວງຝັກຫລອກສີຂາວ, ເຫລືອງ.
- ນາງທຸຍຝັກຫລອກສີຂາວ, ເຫລືອງ.
- ນາງຂາວຝັກຫລອກຂາວ, ເຫລືອງ.
- ນາງພ້າຝັກຫລອກຂາວ, ເຫລືອງ (ໄຂ່ແຕກເອງບິລະເຫຼືອ).

ໃນພັນມ້ອນນາງຝັກອາຍຸຍາວກວ່າໝູ່ (45 ຄັນ).

ພັນມ້ອນຂ້າງເທິງລ້ວນແຕ່ເປັນສາຍພັນພື້ນເມືອງຂອງແຮງທຶນທານຕໍ່ພະຍາດໄດ້ດີ ລາມາດຮັກສາຢັ້ງເອງໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຊື້ໂຂ່ມ້ອນ.



3. ການປັບປຸງແນວພັນໂຕມ້ອນ

ການປັບປຸງແນວພັນໂຕມ້ອນມີຄວາມສຳຄັນອັນໂຫຍຫລວງຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ. ມ້ອນເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຖ້າລົງພັນເກົ່າຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫລາຍປີຈະໃຫ້ໂຕມ້ອນມີບັນຫາ (ມ້ອນຕາຍ) ຫລື ຮັງຫລອກບາງລົງຕາມລຳດັບພາໃຫ້ໄດ້ເສັ້ນໄໝໜ້ອຍ.

ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ໂຕມ້ອນທີ່ຈະເຮັດແນວພັນຕ້ອງແຍກລົງຕ່າງຫາກໃຫ້ມ້ອນແຂງແຮງ.
- ເລືອກຮັງຫລອກທີ່ສົມບູນໄວ້ເຮັດແນວພັນຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
- ເຊົາພໍ່ພັນທີ່ແຂງແຮງຈາກເຂດນີ້ປະສົມພັນກັບແມ່ພັນທີ່ແຂງແຮງມາຈາກເຂດອື່ນແມ່ພັນເຂດນີ້ປະສົມພັນກັບແມ່ພັນເຂດອື່ນ, ແຊນສີ (ສີສັນ) ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແນວແມ່.

ບົດທີ 2

ມອນ

1. ພື້ນດິນມອນ:

ພື້ນດິນມອນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ (ດິນມອນພື້ນເມືອງລາວ) ມີ:

- ດິນມອນແກ້ວ.
- ດິນມອນຂີ້ຮີດ.
- ດິນມອນນ້ອຍໃບແວກ ແລະ ໃບບໍ່ແວກ.
- ດິນມອນຍອດກໍ່.
- ດິນມອນກິນໝາກ.



2. ການເລືອກໃຊ້ພື້ນດິນມອນ:

ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈນຳໃຊ້ພື້ນດິນມອນໃດໜຶ່ງໃຫ້ຄຳມື້ງເບິ່ງເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ກຶ່ງມອນທີ່ເອົາມາເຮັດໝວພັນ ຕ້ອງສົມບູນບໍ່ເປັນພະຍາດ.
- ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 1,5 cm ຂຶ້ນໄປ.
- ມີອາຍຸແຕ່ 6 ເດືອນ-1 ປີ.
- ຂະໜາດຂອງໄມ້ປ່າກາງຫາໃຫຍ່.
- ກຸ່ມຂອງຕາຕ້ອງຖີ່.
- ມີຄຸນຄ່າອາຫານສູງ.
- ຕັດໝາກແລ້ວແຕກກິ່ງກ່າຫລາຍ.
- ທົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ.
- ບຸກແລ້ວມີອາຍຸຍາວໃຫ້ພື້ນຜະລິດສູງ.

3. ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ມອນ:

ພື້ນມອນສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ໄດ້ງ່າຍ, ຂະຫຍາຍດ້ວຍ 2 ວິທີຄື: ການຊໍ້າ ແລະ ປູກງ່າຄື:


ຊໍ້າໃນຖິງຢາງປລາດສະຕິກໃນສ່ວນປະສົມດິນ 1 ສ່ວນ+ດິນຊາຍ 1 ສ່ວນ+ຜຸ້ນຄອກ $\frac{1}{2}$ ສ່ວນ
 ນີ້ທີ່ມີສະດວກສະບາຍເວລາເຮືອນຍ້າຍໄປປູກໃນສ່ວນເວລາບູກມີເປົ້າເຊັ່ນລອດຕາຍສູງໄດ້ເອົາ
 ໃຈໃສ່ດູແລຍົດນ້ຳຫລາຍກວ່າຊໍ້າໃນໝານໃຊ້ຕົ້ນຕີນສູງ.



- ການຊໍ້າໃນໝານກ້າເບີ້ຍເພາະລົມສຳລັບຊາວບ້ານສະດວກໃນການດູແລຍົດນ້ຳໃຊ້ຕົ້ນຕີນຕ່ຳ.



- ການປູກກິ່ງໃນສວນໂດຍກົງເປັນວິທີທີ່ງ່າຍສະດວກສະບາຍໃຊ້ແຮງງານໜ້ອຍແຕ່ເບື້ອງທ່ອນ
ພັນທຸລາຍບໍ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບເປີເຊັນລອດຕາຍຕ່ຳ (ຕ້ອງເບິ່ງສະພາບຂອງດິນທີ່ຈະປູກຖ້າດິນ
ແຫ້ງແລ້ງຫ້າມປູກກິ່ງ).



4. ເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດສວນມອນ:

ກອນອື່ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງສະພາບຂອງ ດິນຕ້ອງເປັນດິນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ດິນຊາຍປົນດົນໜຽວ (ດິນແຄມນ້ຳ) $pH > 5$ ມີໜ້າດິນເລິກບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1 m ເປັນດິນຊຸ່ມຊື່ນເໝາະສົມດີ (ບໍ່ແຫ້ງແລ້ງເກີນໄປ, ນ້ຳບໍ່ຂັງ).

- ສວນມອນຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຫລາຍຈົນເກີນໄປທີ່ສຸດບໍ່ຕວນເກີນ 1 Km ເພາະຈະບໍ່ສະດວກໃນການຂົນສົ່ງໃບມອນ.
- ສວນມອນບໍ່ຄວນຢູ່ໃກ້ເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຈົນເກີນໄປຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ 50 m.
- ຫລີກເປັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອການລ້ຽງມ້ອນ.

5. ການວາງແຜນປູກຕົ້ນມອນ:

- ກອນອື່ນຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານແຮງງານ (ຕ້ອງວາງແຜນ) ຈະລ້ຽງມ້ອນ. ລ້ຽງຊຸດໜຶ່ງຫລາຍປານໃດ, ຮູ້ແລ້ວວ່າແນວພັນ 1 ແມ່ນຕ້ອບສະໜອງໄຂ້ໄດ້ 300 ໜ່ວຍ. ຕ້ອງການໃບມອນປະມານ 5 Kg (ບໍ່ນັບງ່າ) ນັບຈາກປັດມ້ອນຈົນຮອດມື້ມ້ອນສຸກ.
- ຖ້າລ້ຽງມ້ອນ 20.000 ໂຕ/ເທົ່າ 65 ຄູ່ (ພໍ້ຍີ້+ແມ່ຍີ້) ຕ້ອງການໃບມອນປະມານ 320 Kg ຕ້ອງມີສວນມອນ 1 ໄລ່ (ມອນຂຶ້ນເມືອງ).
- ຕ້ອງການເນື້ອທີ່ລ້ຽງໂຕມ້ອນ 18-20 ຕາແມັດ (ອາຍຸ 5).
- ເນື້ອທີ່ແຕ່ລະໄລ່ຈໍ່ໃຫ້ມ້ອນເຮັດຂັງເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງເນື້ອທີ່ລ້ຽງອາຍຸ 5 ມື້ສຸດທ້າຍເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນຂອງຊັງຫລອກແຝດ, ດ້າມ, ຂີດຮູບປະຊັມ ແລະ ອື່ນໆ.
- 1 ແຮງງານສາມາດລ້ຽງມ້ອນໄດ້ 20.000 ໂຕ/ງວດລ້ຽງເປັນຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈ 3 ຢ່າງຄື:
 1. ແຮງງານ (ລ້ຽງມ້ອນ+ສາວໄໝ).
 2. ປະລິມານໃບມອນທີ່ມີສວນ.
 3. ອຸປະກອນສຳລັບເນື້ອທີ່ລ້ຽງໂຕມ້ອນ.

ກຳນົດການໃຊ້ແຮງງານຜະລິດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນມອນ

ໄລຍະການປູກ:

- ໄລຍະຕົ້ນ 0,75 ມ, ໄລຍະແຖວ 1,5 ມ (ໃຊ້ແຮງງານ).
- ໄລຍະຕົ້ນ 0,75 ມ, ໄລຍະແຖວ 2 ມ (ໃຊ້ລົດໂຖມຂຍ).
- ໄລຍະຕົ້ນ 0,75 ມ, ໄລຍະແຖວ 2,5 ມ (ໃຊ້ລົດໂຖກາງ).
- ໄລຍະຕົ້ນ 0,75 ມ, ໄລຍະແຖວ 3 ມ (ໃຊ້ລົດໂຖໃຫຍ່).

- ໄລຍະຕົ້ນ 1 ມ ໄລຍະແຖວ 1 ມ (ລຳລັບດິນຄ້ອຍຊັບ)

+ ສຸດຄິດໄລ່ເບີ້ຍມອນໃນສວນ:

$$\text{ຈຳນວນເບີ້ຍມອນໃນເນື້ອທີ່ຈະປູກ} = \frac{\text{ເນື້ອທີ່ (ຕາແມັດ)}}{\text{ໄລຍະຕົ້ນ (ແມັດ) \times ໄລຍະແຖວ (ແມັດ)}}$$

- ສວນມອນ 1 ໄລ່ສາມາດລົງມ້ອນໄດ້ 20.000 ໂຕ / ງວດລົງ ຫລື / (1 ບາງ). ຖ້າຢາກລົງ
ຫລາຍຮຸ່ນຕ່າງກັນໃນຈຳນວນ 20.000 ໂຕຕ້ອງມີສວນມອນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຮຸ່ນລົງ.
- ຖ້າມີສວນມອນ 1 ໄລ່ແຕ່ຢາກລົງຫລາຍຮຸ່ນຕ້ອງຫຼຸດຈຳນວນໂຕມ້ອນລົງ.

6. ການກຽມດິນປູກມອນ:

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖ້າມີຕ້ອງໄຂຕ້ອງໄຖ່ຄາດພວມດິນເລຍກ່ອນຈຶ່ງຊຸດຊຸມ ຫລື ຮ່ອງແລ້ວແຕ່ຄວາມ
ເໝາະສົມທີ່ຈະໄຖ່ຄາດພວມດິນຊຸດຮ່ອງ ຫລື ຊຸດຊຸມເລີຍ.

- ຊຸດຊຸມຂະໜາດ 40 ຊມ x 40 ຊມ, ເລິກ 40 ຊມ.
- ຊຸດຮ່ອງຂະໜາດກວ້າງ 40 ຊມ x 40 ຊມ ເລິກ 40 ຊມ. ຄວາມຍາວແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການ.
- ເອົາເສດພືດ, ເຍືອງເຂົ້າລົງໃນຊຸມ ຫລື ຮ່ອງທີ່ຊຸດກຽມໄວ້ນັ້ນຢູ່ບໃຫ້ໄດ້ກ້າງຊຸມ, ໂຮຍ
ປູນຂາວລົງໃສ່ອີກ (ຖ້າມີ) ຖິ້ມດິນໃຫ້ເຕັມຊຸມປະໄວ້.
- ຖ້າເປັນເສດພືດທີ່ແຫ້ງຕ້ອງຖິ້ມໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນຂຶ້ນໄປຕະຫລອດເວລາທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງ
ເປັນການລໍຖ້າການເຕົ້າເຍືອຍຂອງເສດພືດ, ໄລຍະນີ້ເສດພືດຈະອອກຮ້ອນຖ້າບູກກ່ອນກຳນົດ
ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນມອນຕາຍ.

7. ລະດູການ - ການປູກຕົ້ນມອນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດປູກຕົ້ນມອນໄດ້ທຸກລະດູຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນມີຊົນລະປະທານ
ນ້ຳສະດວກຕະຫລອດປີ.

- ຖ້າສະຖານະການທີ່ປູກມອນອາໄສແຕ່ກຳມະຊາດຕ້ອງປູກໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນໝາຍຄວາມວ່າ: ໄລ
ຍະຫລັງຈາກປີໃໝ່ລາວຄື: ເດືອນ 4-5 ຂອງທຸກປີ.
- ຖ້າບູກກຶງວ່າ ຕ້ອງປູກກ່ອນເດືອນ 4 ຂອງທຸກປີຖ້າສະພາບແຫ້ງແລ້ງບໍ່ຄວນປູກກຶງ.

- ເວລາເຄື່ອນຍ້າຍເບີ້ມມອນອອກຈາກໝານຊ້າຈະໄປປູກຕ້ອງຕັດແຕງກິ່ງ ແລະ ງ່າເສຍກ່ອນ.
- ຖ້າເບີ້ມມອນຫາກມີຫລາຍກິ່ງໃຫ້ເລືອກຮັກສາໄວ້ກິ່ງດຽວທີ່ສົມບູນກວ່າໝູ່ແລ້ວຕັດຈິ່ງໄວ້ປະມານ 8 -10 ຊມ ເທົ່ານັ້ນ



ບໍ່ຄວນຖອນຕົ້ນມອນອອກຈາກໝານປະໄວ້ຫລາຍມື້.

8. ການດູແລຮັກສາສວນມອນ:

- ຫລັງຈາກປູກຕົ້ນໄມ້ມອນໃນສວນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕັດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເຊັ່ນລອດຕາຍຫລາຍປານໃດ (ໃຫ້ມີໂອກາດປູກແທມ) ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ຫລື ນ້ຳຂັງ.
- ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເສຍຫຍ້າເວລາຕົ້ນມອນບໍ່ຕົ້ນແຂງແຮງ. ຖ້າເປັນເຂດທີ່ມີສັດລ້ຽງປ່ອຍຊະຊາຍ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮົ່ວເປັນພິເສດ.
 - ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ກຳຈັດວັດສະພຶດດ້ວຍວິທີເອົາເພືອງເຂົ້າ, ເສດຕ່າງໆຂອງຖົ່ວ ເທລືອງຖົ່ວຂຽວ, ແກບ, ຂີ້ເລັ່ຍ ແລະ ເສດພືດອື່ນໆຄຸມໜ້າດິນຕາມຫວ່າງຕົ້ນມອນ.




→ ໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນມອນມີ 3 ວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄື:

- ຕົ້ນມອນທີ່ຫາກໍ່ປູກປົກກິດໃຊ້ຈຳນວນຊຸດອ້ອມກິດຕົ້ນມອນທາງຈາກກົກປະມານ 25-30 ຊຸມ ໂຮຍຝຸ່ນຄອກໂສຮ່ອງທີ່ຊຸດແລ້ວຖິ້ມໄວ້.
- ຊຸດຊຸມລະຫວ່າງຕົ້ນຕໍຕົ້ນ, ບາ 1 ຫວ່າງຈຶ່ງຊຸດອີກຊຸມໜຶ່ງ, ເສຍຫຍ້າຕາມຫວ່າງຕົ້ນມອນນັ້ນ ລົງຊຸມແລ້ວ ຖິ້ມໄວ້ເຮັດປີລະຄັ້ງດ້ວຍວິທີສັບປ່ຽນບ່ອນຊຸດ.
- ຊຸດຮ່ອງລະຫວ່າງແຖວຕາມລວງຍາວຂະໜາດກວ້າງ 30 ຊຸມ ເລິກ 30 ຊຸມ ຍາວຢູ່ຕາມ ແຖວຂອງຕົ້ນມອນ (ບາແຖວຊຸດ) ເສຍຫຍ້າຕາມລະຫວ່າງຕົ້ນມອນລົງຮ່ອງໂຮຍຝຸ່ນຄອກລົງ ໄປອີກໂຮຍທັບດ້ວຍປູນຂາວ (ຖ້ຳມີ).

9. ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນ

ກ. ການຕັດຕໍ່:

- ຕັດ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພາະສົມລະຫວ່າງເດືອນ 12-3 ຂອງທຸກໆປີ.
- ວິທີຕັດຖ້ຳເປັນຕົ້ນມອນຢູ່ກາງດິນທີ່ອິດໃຫ້ຕັດຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 30 ຊມ ຖ້າເປັນຕົ້ນມອນປີທີສອງ ຂຶ້ນໄປໃຫ້ຕັດຫ່າງຈາກບ່ອນເກົ່າປະມານ 3-5 ຊມ ຫລັງຈາກຕັດແລ້ວໃຊ້ເວລາ 75-90 ວັນ ໄດ້ເກັບກຸ່ວໃບມອນໄປລ້ຽງມ້ອນ



ຕັດຕໍ່ປີທີ 1



ຕັດຕໍ່ປີທີ 2



ຕັດຕໍ່ປີທີ 3

ຂ. ຕັດກາງ:

- ແມ່ນຕັດຫລັງຈາກເກັບກຸ່ວໃບມອນໄປລ້ຽງມ້ອນຄັ້ງທີ 1 (ຜົນຈາກການຕັດຕໍ່) ຕັດກາງໃຊ້ເວລາ 60-75 ວັນຈຶ່ງໄດ້ຜົນ.

- ວິທີຕັດ: ສັງເກດເບິ່ງສີຂອງກິງ ຫລື ລຳຕົ້ນມອນຈະມີສີນ້ຳຕານເຊື່ອມຕໍ່ກັບສີຂຽວຕັດລະຫວ່າງກາງສີຂຽວກັບສີນ້ຳຕານ (ລະຫວ່າງກາງຂອງຕົ້ນ).


ຄ. ຕັດຫຼາ ຫລື ເດັດຍອດ:

- ວິທີນີ້ເໝາະສົມສຳລັບການກຽມໂບມອນລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ (ມີຫລາຍຍອດໂບອ່ອນຫລາຍ) ໃຊ້ເວລາ 35-40 ັ້ນສາມາດເກັບກຽວຕົ້ນໄດ້.

10. ການກຽມສວນມອນເພື່ອລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ - ອາຍຸແກ່

ກ. ມ້ອນອາຍຸອ່ອນກຳນົດແຕ່ອາຍຸ 1-3

- ອາຍຸ 1 ເກັບໃບທີ່ 1-3
- ອາຍຸ 2 ເກັບໃບທີ່ 4-6
- ອາຍຸ 3 ເກັບໃບທີ່ 7-9



ຖ້າຢາກໄດ້ໃບມອນຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຕ້ອງຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນໃຫ້ຖືກຕາມເຕັກນິກ. ໄລຍະນີ້ໃບມອນຍັງມີອຍຕ້ອງການໃບມອນທີ່ອ່ອນນຸ່ມມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຕັດແຕ່ງໂດຍສະເພາະຂອງມັນ.

- ແບ່ງລວມມອນ 20% ຕັດແຕ່ງເພື່ອລ້ຽງມ້ອນອາຍຸມ້ອຍດ້ວຍວິທີໄດ້ຕຍອດກ່ອນການລ້ຽງ 35-40 ວັນ.

ຂ. ມ້ອນແກ່ກຳນົດແຕ່ອາຍຸ 4 - 5

- ມ້ອນອາຍຸແກ່ສາມາດກິນໃບມອນໄດ້ທຸກປະເພດຍົກເວັ້ນໃບທີ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ແກ່ຈົນກອບ.


11. ສັດຕູມອນ ແລະ ວິທີກຳຈັດ

- ພະຍາດທີ່ທຳລາຍຕົ້ນມອນມີ: ຈຳພວກເພີຍ, ລາສມິນ, ບັງມ້ວນໃບ, ດ້ວງເຈາະລຳຕົ້ນຈຳພວກນີ້ເປັນຕົ້ນ.
- ວິທີກຳຈັດເມື່ອເຫັນພະຍາດເພີຍ, ລາສມິນ, ບັງມ້ວນໃບ ໃຫ້ຕັດຮວບຮວມໄປເຜົາໄຢ.
- ຈຳພວກດ້ວງເຈາະລຳຕົ້ນໃຫ້ແຕ່ງນ້ຳສະໝຸນໄພສິດເຂົ້າຕາມຮູເພື່ອຂັບໄລ່ ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອຂັບໄລ່ (ຫລືກເວັ້ນສານຕົກຄ້າງ).

ບົດທີ 3 ການລ້ຽງມ້ອນ

1. ການກຽມອຸປະກອນການລ້ຽງມ້ອນ - ເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ

- ກ່ອນການລ້ຽງມ້ອນຕ້ອງໄດ້ສຳຫລວດເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຳໃຊ້ມີທຽງພໍ ຫລື ຍັງຂາດອັນໃດ ເຊັ່ນ: ກະດິ່ງມອນ (ໂຫ່ມອນ), ຮ້າມມ້ອນ, ຜ້າປົກ, ຂົນໄກ່, ຊຽງ, ມີດ, ກະຕ່າ, ໄມ້ຊູ່, ຕາໜ່າງ ເສຍຂີ້ມ້ອນ, ແຕະໂສ່ໂມ້ມອນສຸກ, ຈຳໄຫ່ມ້ອນສາມຮັງຈຳພວກນີ້ເປັນຕົ້ນ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.




ກ. ການລ້ຽງມ້ອນຝັນລະບົບຕ້ອງມີເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຕ່າງໆທາງກະຕິສາມາດປ້ອງກັນລັດຕູໄກມ້ອນໄດ້ເຊັ່ນ:

ໝູ, ແມງຄົມລາຍ, ມົດ, ຈີໂກະ, ຈີກັງມ ແລະ ຂຶ້ນໆມີຫ້ອງລັກແບງລັກ.

ຂ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄື:


- ອາກາດປອດໄປ່ງ.
- ຫ່າງໄກຈາກສະຖານທີ່ໃຊ້ລາມເຄມີ.
- ຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນທີ່ແອອັດ



2. ການອະນາໄມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ:


ກ. ການທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນ:

- ລ້າງວັດຖຸອຸປະກອນໂດຍການລ້າງດ້ວຍສະບູຝຸ່ນ (ໃຊ້ແປງຖູ) ຕາກແດດໃຫ້ແທ້ງລ້າງທຸກຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ຫລັງການລ້ຽງມ້ອນ.
- ຫລັງຈາກລ້າງແລ້ວໃຫ້ແຊ່ນ້ຳຢາ ກລໍລິມ 60% ໃນອັດຕາສ່ວນກລໍ 100 ຄູ ປະສົມກັບນ້ຳ 10 ລິດ (ຖ້າມີ) ຈຶ່ງນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແທ້ງແລ້ວເກັບໄວ້ໃນເຮືອນລ້ຽງ.




ຂ. ການທຳຄວາມສະອາດເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ:

- ລ້າງຫຼັ້ນເຮືອນລ້ຽງ, ຮ້ານລ້ຽງ, ຝາບໍລິເວນພາຍໃນ ແລະ ຍາຍນອກດ້ວຍສະບູຝຸ່ນສີດນ້ຳລ້າງ ໃຫ້ສະອາດ ຫລັງຈາກນັ້ນສີດສ່ວນປະສົມຂອງຢາ ກລໍລິມ ໃຫ້ທົ່ວ ເຮືອກອນ ແລະ ຫລັງການລ້ຽງມ້ອນ.



3. ການປັດໂຕມ້ອນ


ໄຂ່ໂຕມ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະວາງໄຂ່ໃສ່ເຈ້ຍ ຫລື ແຜ່ນແພໄກ້ຈະຮອດກຳນົດແຕກໃຫ້ຕິດຕາມ.



- ເວລາໂຕມ້ອນແຕກອອກມາໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າຖ້າມ້ອນແຕກຈຳນວນຫລາຍໃຫ້ທຳການປັດໂຕມ້ອນ
ບໍ່ຄວນປະໄວ້ຂ້າມຄືນສ່ວນເຫລືອຈົ່ງໄວ້ປັດມື້ຕໍ່ໄປ.
- ບໍ່ຄວນເກືອໂຕມ້ອນທັບໄຂ່ໂດຍບໍ່ທຳການປັດມ້ອນທີ່ແຕກຕາມຫລັງຈະໃຫຍ່ບໍ່ທັນກັນເປັນສາຍເຫດ
ໃຫ້ໂຕມ້ອນນອນຕື່ນບໍ່ພ້ອມກັນ.

ກ. ວິທີປັດໂຕມ້ອນ:

- ຊອຍໂບມອນອ່ອນສີນ້ຳຕານໃຫ້ມຸ່ນໆ ໂຮຍໃສ່ຕາມບໍລິເວນໂຕມ້ອນນ້ອຍ.
- 10 ນາທີຕໍ່ມາທຳການປັດໂຕມ້ອນດ້ວຍຂົນໄກ່ໃສ່ກະຕິງທີ່ກຽມໄວ້.
- ຂະຫຍາຍເມື່ອທີ່ໄປໄໝາະສົມ.
- 10 ນາທີຕໍ່ມາທຳການເກືອມ້ອນເປັນຄາບທຳອິດ.



4. ດຳເນີນການລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ (ອາຍຸ 1-3):

- ໂຕມ້ອນນ້ອຍເພື່ອນເດັກມ້ອນທາງກໍ່ເກີດໃໝ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ດູແລເປັນພິເສດຂອງໄລຍະມ້ອນອາຍຸນ້ອຍໃຊ້ເວລາ: 10-11 ວັນ, ເກືອມ້ອນວັນລະ 3-4 ຄັ້ງ.

ຕາຕະລາງການລ້ຽງມ້ອນ 20.000ໂຕ.

ອາຍຸ	ຈຳນວນໂບມອນ	ອຸນະພູມ	ຄວາມຊຸ່ມ	ເວລາກິນໂບມອນ	ເວລານອນ	ເນື້ອທີ່
ອາຍຸ 1	1,8 – 1,9 kg	28°C	8-90%	2 ມື້ 3 ຊົ່ວໂມງ	1 ມື້	0,4-1,8 M ²
ອາຍຸ 2	5 kg	27°C	80-85%	2 ມື້	1 ມື້	1,6-3,2
ອາຍຸ 3	15 kg	26°C	70-80%	2,5 ມື້	1 ມື້	3,2-6,4

5. ການປິດໂບມອນ:

- ການປິດໂບມອນຄວນຫລີກເວັ້ນເວລາແດດຮ້ອນໄພດ ແລະ ເວລາກຳລັງຝົນຕົກ.
- ການຊອຍໂບມອນຊອຍເປັນຮູບສີ່ຫລ່ຽມລວງກ້ວາງເທົ່າກັບລວງຍາວຂອງໂຕມ້ອນ, ລວງຍາວເທົ່າຂອງເທິງຂອງລວງກ້ວາງ.

6. ການເສຍຂີ້ໂຕມ້ອນ:

ກ. ຈຸດປະສົງ:

- ຈຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມໃນກະດັງມ້ອນ.
- ໃຫ້ໂຕມ້ອນໄດ້ກິນໂບມອນໃໝ່ ແລະ ສົດສະເພີ.
- ນຳເອົາເສດໂບມອນທີ່ເຫລືອ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດໄປຖິ້ມ.
- ໃຊ້ຕາໜ່າງເສຍຂີ້ມ້ອນບໍ່ຄວນໃຊ້ມີຈັບໂຕມ້ອນນ້ອຍ (ໃຊ້ໄມ້ຖູ່).

ຂ. ຄວນເສຍຂີ້ມ້ອນອາຍຸນ້ອຍດັ່ງນີ້:

- ອາຍຸ 1 ເສຍຂີ້ 1 ເທື່ອ ກ່ອນມ້ອນນອນຄັ້ງທີ 1.
- ອາຍຸ 2 ເສຍຂີ້ 2 ເທື່ອ ຕົ້ນນອນຄັ້ງທີ 1 ແລະ ກ່ອນນອນຄັ້ງທີ 2.
- ອາຍຸ 3 ເສຍຂີ້ 2 ເທື່ອ ຕົ້ນນອນຄັ້ງທີ 2 ແລະ ກ່ອນນອນຄັ້ງທີ 3.

ຄ. ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່:

- ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໂຕມ້ອນຢູ່ຢ່າງແອອັດ.
- ຫລຸດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນກະດັງມ້ອນ.
- ໃຫ້ໂຕມ້ອນໄດ້ກິນໂບມອນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

7. ດຳເນີນການລ້ຽງມ້ອນອາຍຸແກ່:


ກ. ການຄວບຄຸມອຸນະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ:

- ຫລຸດຄວາມຮ້ອນ: ໄຂ່ປ່ອງຢ້ຽມ, ສີດນ້ຳໃສ່ພື້ນເຮືອນລ້ຽງ, ສີດນ້ຳໃສ່ຫລັງຄາມຸງສັງກະຂີ.
- ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ: ໄດ້ດອກໄຟ ຫລື ດັງຖ່ານໄຟໃສ່ເຕົາໂລໂນເຮືອນລ້ຽງ.
- ຫລຸດຄວາມຊຸ່ມ: ໄຂ່ປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ອາກາດຖ່າຍແກ ຫລື ໃຊ້ພັດລົມເຝົ້າ.
- ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ: ໃຊ້ກ້ອງສີດນ້ຳຝອຍ, ໃຊ້ແພຈຸ່ມນ້ຳພໍ້ໝາດໆອ້ອມຮ້ານລ້ຽງ ຫລື ຕິດພື້ນເຮືອນລ້ຽງ.

ຕາຕະລາງລ້ຽງມ້ອນແກ່ (ອາຍຸ 4-5).

ອາຍຸ	ຈຳນວນໃບ kg	ອຸນະພູມ	ຄວາມຊຸ່ມ	ເວລາກິນໃບມອນ	ເວລານອນ	ເນື້ອທີ່
ອາຍຸ 1	64,5 kg	25°C	75-80%	3 ມື້ 5 ຊົ່ວໂມງ	1 ມື້ 19 ຊົ່ວໂມງ	8,4-10
ອາຍຸ 5	235 kg	24°C	70-75%	6 ມື້	0	10-20

ການດູແລອີກັນກັບມ້ອນນ້ອຍ ຕ່າງກັບບ່ອນວ່າໂຕມ້ອນກິນໃບມອນຫລາຍຮອດອາຍຸ 5 ຕ້ອງໄດ້ເສຍຂີ້ທຸກມື້, ກວດກາເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງໂຕມ້ອນກ່ອນໃຫ້ອາຫານທຸກໆຄັ້ງມ້ອນຕາຍ ຫລື ມ້ອນເປັນພະຍາດໃຊ້ທຸ່ງຄັ້ງໂຕມ້ອນຕາຍໃສ່ກວດເຫລົ່າ 60.




- ການລ້ຽງມ້ອນລະດູຝົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຍ້ອນອາກາດຮ້ອນ ຄວາມຊຸ່ມສູງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເສຍຂີ້ບໍ່ລ້ຽງແໜ້ນກະຕຶງ, ເກືອໃບມອນບາງໃບໃບມອນຫລາຍເທື່ອຕໍ່ມື້ຖ້າໃບມອນປຸກຕ້ອງເຊັດ ຫລື ຟຶງຕາກໄວ້ໃນຮົມ.

8. ໂຕມ້ອນນອນ - ໂຕມ້ອນຕື່ນ - ໂຕມ້ອນສຸກ.


ກ. ມ້ອນນອນ ຫລືເອີ້ນວ່າ (ມ້ອນຫລອກຄາບ)

- ໂຕມ້ອນຕັ້ງຄົວຂຶ້ນ - ບໍ່ເກັ່ງຕັ້ງ - ບໍ່ກິນໂບນອນ.
- ທົ່ວໄຫຍ່, ປາກມ້ອຍ, ມີສີເທສົອງ, ຂາມີສີໃສງ



ຂ. ມ້ອນຕື່ນ


- ໂຕມ້ອນເລືອກກິນໂບນອນ - ກິນໂບນອນ - ຕົວມ້ອຍລົງ



ຄ. ມ້ອນສຸກ

- ໂຕມ້ອນທົດສັ້ນເຂົ້າ.
- ມີສີເທສົອງ (ມ້ອນພື້ນເມືອງສີເທສົອງ).
- ສີໃສງ (ມ້ອນພື້ນເມືອງສີຂາວ).
- ແກວ່ງທົດໄປບາເພື່ອຊອກຫາບ່ອນເຮັດສັງ (ເຮັດຜັກຫລອກ).
- ຂີ້ມ້ອນມີຂະໜາດໃຫຍ່ປົກຈະມຸ່ມມີສີຂຽວ.

- ປາກມື:ຊີ້ນໄຍພົ້ນອອກມາ



9. ການເກັບມ້ອນສຸກເຂົ້າຈີ່ ແລະ ການຕູແລຮັກສາ.

- ຕ້ອງເກັບມ້ອນສຸກໃຫ້ທັນເວລາຖ້າຊັກຊ້າມ້ອນຈະພົ້ນໄຍຖິ້ມເສຍລ້າງ.
- ເກັບມ້ອນສຸກເຂົ້າຈີ່ໃນອັດຕາສ່ວນປະມານ 600 ໂຕ / 1 π^2
- ຢຶດໃສ່ມ້ອນໃນແຕ່ລະຈໍ່ຜົບເທົ່າໃດຢັ້ງມີໂອກາດໄດ້ສັງແຝດ, ດ້ານ, ຜິດຮູບປະພັນຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
- ຖ້າໃສ່ມ້ອນໃນໄມ້ກໍ່ຈະສົ້ມເປືອງເນື້ອອີ່ແຕະ.
- ໃສ່ຈໍ່ແລ້ວເອົາຜັກປົກ



ກ. ການຄູແລອັກສາມັນອນເວລາເຮັດຝັກຫລອກ.

- ຄຸນນະພາບທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 23°C
- ຄວາມຊຸມທີ່ເໝາະສົມ 60 – 70%
- ມ້ອນເຂົ້າຮັງໄດ້ 3 ວັນຄວນເລີກຜ້າປົກໃຫ້ອາກາດລວງ ອາກາດແຫ້ງຮັງຫລອກຈະສາວງ່າຍ, ອາກາດຊຸ່ມຫລາຍຈະສາວຍາກເສັ້ນໄໝ້ກະຊາດ
- ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງຖານລຸດຄວາມຊຸ່ມເວລາຝົນຕົກໜ້າ.

10. ສາຍເຫດການເກີດພະຍາດ ແລະ ສັດຕູອື່ນໆຂອງໂຕມ້ອນ

ກ. ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ.

- ໄດ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ອາຍຸຂີດຈາກສານເຄມີຕ່າງໆ.
- ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານໂຍມອນ ຫລື ການບົວລະບັດຮັກສາການລ້ຽງເກືອພາໃຫ້ເກັດບາດແຜເປັນຕົ້ນ.

ຂ. ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

- ໄດ້ແກ່ຈຸລິນຊີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຊື້ອລາ, ແບກເຕີເຣຍ, ໂປໂລໂຕຊີວ, ໄວຣັດລວມເຖິງສັດອື່ນໆນຳຄື: ແມງວັນລາຍ, ມົດ, ໝູ, ຈີ່ໂກະ, ຈີ່ກຽມ ແລະ ອື່ນໆ.

11. ສູດຄິດໄລ່ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ້ໃນຮັງຫລອກ ແລະ ໄໝ້ດິບ

ກ. ສູດຄິດໄລ່ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ້ໃນຮັງຫລອກ

$$\text{ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ້} = \frac{\text{ນ້ຳໜັກປັດຝັກຫລອກເປົ່າ}}{\text{ນ້ຳໜັກຮັງຫລອກເຕັມ}} \times 100$$

ຂ. ສູດຄິດໄລ່ນ້ຳໜັກໄໝ້ດິບຫລັງຈາກຮູ້ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ້ແລ້ວ



$$\text{ນ້ຳໜັກດິບ} = \frac{\text{ນ້ຳໜັກຮັງຫລອກເກັມ} \times \text{ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ້}}{100}$$

12. ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການສາວໄໝ້

- ກ່ອນຈະປັດຮັງຫລອກນຳມາສາວໃຫ້ສັງເກດວ່າເປັນໂຕດັກແດ້ແລ້ວ ຫລື ຍັງ.
- ຫ້າມສາວໄໝ້ກ່ອນໂຕມ້ອນເປັນໂຕດັກແດ້
- ດັກແດ້ມ້ອນໃນຮັງຫລອກປົກກະຕິມີອາຍຸ 7-9 ວັນ.

ກ. ກຽມອຸປະກອນ

- ເຕົາ, ໝໍ້ຕົ້ມຮັງຫລອກ, ໝາກຄ້ວງ (ເຄື່ອງສາວໄໝ), ໄມ້ຄີບ, ບ່ວງຈອງ, ຊາມ, ອັກ, ເຄື່ອງເຮັດປອຍໄໝ, ຝ້າຍໄພໄໝ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ



ຂ. ຂັ້ນຕອນດຳເນີນກິດຈະກຳສາວໄໝ

- ການເລືອກຮັງຫລອກ: ຮັງຫລອກດີ, ແຝດ, ດ້ານ, ຜິດຮູບປະພັນ, ບາງ, ເບື້ອນນອກ ເບື້ອນໃນໃຫ້ແຍກສາວຄົນລະຢ່າງ.

- ຂະໜາດຂອງເສັ້ນໄໝ (ກຳນົດຮັງຫລອກໃນໝໍ້ສາວ). ການສາວໄໝອີງຕາມສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (ຕະຫລາດ) ຫລື ສາວຕາມວຽກຕົວຈິງທີ່ຕົນເອງຈະໃຊ້ນ້ອຍສຸດຈະເລີ່ມຈາກ 8 -10 ຮັງຫລອກ ຫລື ຕາມລູກຄ້າສັ່ງ.

ຄ. ການຕົ້ມຮັງຫລອກ

- ການຕົ້ມຮັງຫລອກແມ່ນອີງໃສ່ປະເພດຂອງຮັງຫລອກ.
- ຮັງຫລອກດີທຳມະດາຕົ້ມໃນອຸນະພູມ 70-80°C
- ຮັງແຝດຕົ້ມໃນອຸນະພູມ 80-90°C
- ຮັງຫລອກອົບແຫ້ງຕົ້ມໃນອຸນະພູມ 90-100°C
- ຖ້ານ້ຳໃນພື້ນທີ່ທາກເຢັນກ່ອນກຳນົດສາວໄໝຈະບໍ່ອອກ, ຖ້ານ້ຳໃນພື້ນຮ້ອນເກີນກຳນົດຮັງຫລອກໃນພື້ນຈະເປື້ອຍ.

ງ. ການທາວເງື່ອນໄໝ

- ການທາວເງື່ອນໄໝແມ່ນການຈັບສົ້ນ ຫລື ເງື່ອນໄໝໃນຮັງຫລອກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນໄມ້ຄັບເພື່ອຂີດເຂົ້າເງື່ອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ການຈັບສົ້ນໄໝສະໝໍ້າສະເໝີຈະໄດ້ເສັ້ນໄໝເລິງງາມ).

ຈ. ການສາວໄໝ

ມີສອງວິທີຄື: ວິທີທີ 1 ສາວແຕ່ຕົ້ນໄປເລີຍໂດຍບໍ່ໄດ້ແຍກໄໝເປືອກ ວິທີທີ 2 ສາວໄໝເປືອກອອກກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງສາວໄໝຕ່າງໄປຈົນພົດ.

ຂ. ການຮັກສາສີຂອງເສັ້ນໄໝ

- ແຍກຮັງຫລອກມ້ອນຕາຍອອກ, ປຸງນ້ຳໃນພື້ນສາວໄໝຖ້າເຫັນວ່ານ້ຳໃນພື້ນດຳ.

ຊ. ການສາວໄໝເປືອກນອກ

- ເປັນການຢືກຄຸມນະພາບເສັ້ນໄໝແບບກົດຈະກຳມີການສາວໄໝຍອດ (ແມ່ນການແຍກເສັ້ນໄໝທີ່ບໍ່ງາມອອກຕ່າງທາກ).

ຍ. ການສາວໄໝຍອດ

- ໄໝຍອດແມ່ນເສັ້ນໄໝທີ່ຢູ່ທາງກາງຂອງຮັງຫລອກເສັ້ນເລິງງາມຕະຫລາດນິຍົມໄດ້ລາຄາດີ.
- ການເຮັດປອຍໄໝຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄວບຄຸມຂະໜາດ ແລະ ລວງຮອບ, ນ້ຳໜັກບໍ່ເກີນ 100 g /1 ປອຍລວງຮອບ 1.33 ມ, ມົດໄໝ 3 ປ່ອນ (ປ່ອວນໃຊ້ຝ້າຍທີ່ມີສີມັດໄຂໄໝ).

13. ການເກັບຮັກສາແມ່ພັນມ້ອນເພື່ອລ້ຽງຮຸ່ນຕໍ່ໄປ

- ດີທີ່ສຸດມ້ອນກະດັງໃດທີ່ຈະລ້ຽງເຮັດແນວພັນຕ້ອງແຍກດູແລເປັນພິເສດ.
- ເລືອກຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່ໄວ້ສະເໝີກັນໃຫ້ໄດ້ກັບແຜນການທີ່ຈະລ້ຽງ.
- ແຍກຕົວຜູ້ແມ່ໄວ້ຄົນລະບ່ອນຮັກສາບໍ່ໃຫ້ມີດັດໝູ່ກິນ.