

ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ

1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ເຜີຍຈັກຈັນ ມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ພົບເຫັນຢູ່ບ້ານເຮົາ ເປັນ ສັດຕູຂອງເຂົ້າ ມີ 4 ຊະນິດຄື : ເຜີຍຈັກຈັນສີຂຽວ, ເຜີຍຈັກຈັນ ສີນ້ຳຕານ, ເຜີຍຈັກຈັນສີລາຍແຊກ ແລະ ເຜີຍຈັກຈັນຫຼັງ ຂາວແຕ່ທີ່ສຳຄັນມີ 2 ຊະນິດຄື : ເຜີຍຈັກຈັນສີຂຽວ ແລະ ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ ເພາະສອງຊະນິດນີ້ເປັນຕົວນຳເຊື້ອ ພະຍາດ ໄວຮັສ ມາສູ່ຕົ້ນເຂົ້າ. ເຜີຍຈັກຈັນເປັນແມງໄມ້ຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ເຕັ້ນເກັ່ງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕອາໄສການ ລອກຄາບຈາກໂຕອ່ອນເປັນໂຕແກ່ .



ຮູບ : ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ

2. ໂລຍະລະບາດ

ເຜີຍຈັກຈັນພວກນີ້ ຈະທຳລາຍເຂົ້າແຕ່ໂລຍະກ້າ ຈົນ ຮອດເຂົ້າສູກ ຖ້າຢຶດມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ອາກາດຮ້ອນອົບ ເອົາຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍອາທິດ ຖ້າສະພາບເຊັ່ນນີ້ ເໝາະສົມແກ່ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຜີຍຈັກຈັນ .

3. ລັກສະນະການທຳລາຍ

ເຜີຍຈັກຈັນທັງໂຕແກ່ ແລະ ໂຕອ່ອນ ດູດກິນນ້ຳລ້ຽງ ຈາກກາບໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນ ຂອງເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ເຜີຍຈັກຈັນສີຂຽວ ແລະ ສີນ້ຳຕານ.

ຢູ່ປະເທດລາວ ໃນໂລຍະຜ່ານມາ ເຜີຍຈັກຈັນທີ່ທຳ ລາຍໜັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍຫຼາຍ ແມ່ນເຜີຍ ຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈະເວົ້າເຖິງ ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ.

4. ລັກສະນະຮູບຮ່າງ ແລະ ວົງຈອນຊີວິດຂອງ ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ

ໂຕແກ່ຈະມີສີນ້ຳຕານອ່ອນ ແລະ ແກ່ປົນກັນລວງຍາວ ຂອງລຳໂຕແທກໄດ້ 3 — 4 ມິນລິແມັດ. ໂຕຜູ້ມີລຳໂຕນ້ອຍ ກວ່າໂຕແກ່, ໂຕແກ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ 10 — 20 ມື້ ໃນລະດູຝົນ, 30 — 40 ມື້ໃນລະດູແລ້ງ, ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານແມ່ນຶ່ງສາ ມາດວາງໄຂ່ໄດ້ 300 — 350 ໜ່ວຍ, ໄຂ່ມີລັກສະນະຄ້າຍ ຄືກັບຫົວໝາກກ້ວຍວາງເປັນຈຸດ ຢູ່ທາງໃນກາບໃບ ແລະ ເສັ້ນກາງຂອງໃບເຂົ້າ, ໄຂ່ຈະເບາະພາຍໃນ 5 — 7 ມື້. ໂຕແກ່ມີປົກຫຼີບໍ່ມີກໍ່ສາມາດທຳລາຍຕົ້ນເຂົ້າໄດ້ຄືກັນສ່ວນ ໃຫຍ່ແລ້ວໂຕແກ່ມີປົກຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າໄໝ້ ຫຼື ແຫ້ວຕາຍ ໂຕອ່ອນຂອງເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ ໂລຍະການຈະເລີນ

ເຕີບໂຕຂອງໂຕອ່ອນປະມານ 13 — 15 ມື້, ເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳ ຕານຈະຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດຕາມແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມັນນັກ (ຫຼື ຕາມແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ານທານ)



ຮູບ : ການວາງໄຂ່ໃສ່ກາບໃບເຂົ້າ

5. ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກຳຈັດ

- ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ຕ້ານທານມາ ປູກ.
- ໃຊ້ວິທີທາງເຂດຕະກຳ (ເຊັ່ນ : ປູກຜິດໝູນວຽນ ຫຼື ກ ຫຍ້າຂ້າຫຸ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນໂຮ່ນາ ຕາມຄຳນຳໃຫ້ກ້ຽງ ແລະ ແປນດີ).
- ໃຊ້ແມງໄມ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດທຳລາຍ.
- ໃຊ້ການສຳຫຼວດເພື່ອເກັບກຳ ສະພາບພະຍາດບັ້ງແຜງ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຜີຍຈັກຈັນສີນ້ຳຕານຢູ່ຕາມ ທົ່ງນາ.
- ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກຳຈັດດ້ວຍສານເຄມີເຊັ່ນ :

ກ. ຢາອາໂຊດຣິນ 65 % ຊະນິດນ້ຳ ສິດໃນອັດຕາ 3—4
ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນ້ຳ 15 — 20 ລິດ. ຫຼື ຢາເຊວິນ 85 %
ຊະນິດຝຸ່ນສິດໃນອັດຕາ 3 — 4 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນ້ຳ 20
ລິດ ຫຼື ໃຊ້ຢາໄມແຄັບ 50 % ຊະນິດຝຸ່ນສິດໃນອັດຕາ 4 ບ່ວງ
ແກງ ປະສົມກັບນ້ຳ 20 ລິດ.

ຂ. ຖ້າການລະບາດຢູ່ໃນນາເຂົ້າເປັນນ້ຳນົມ ໃຫ້ສິດແຕ່ຢາ
ເຊວິນ 85% ສ່ວນຢາ ອາໂຊດຣິນ ຫ້າມສິດເພາະຈະເປັນ
ອັນຕະລາຍ

- ຖ້າເພີ່ມຈັກຈັນລະບາດໃນໄລຍະເຂົ້າສຸກ ຫ້າມໃຊ້ຢາເຄ
ມີທຸກຊະນິດສິດເດັດຂາດ ຄວນເກັບກ່ຽວເອົາໂລດ.



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ການປ້ອງກັນ ແລະ
ກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູຜິດຕົ້ນຕໍຂອງເຂົ້າ
(ເພີ່ມຈັກຈັນສີນ້ຳຕານ)



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CETD ບ
(ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ)

ຮ່ວມກັບ:
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)