

ດ້ວງກໍ

1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ດ້ວງກໍຢູ່ໃນປະເທດເຮົາມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ດ້ວງກໍທີ່ທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ເຂົ້ານາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີ 4 ຊະນິດຄື : ດ້ວງກໍສີເຫຼືອງ, ດ້ວງກໍສີຊົນຟູ, ດ້ວງກໍສີລາຍແຊກ ແລະ ດ້ວງກໍສີເຫຼືອງ, ແມ່ດ້ວງກໍມັກອອກຫຼິ້ນແສງໄຟ ໃນຍາມກາງຄືນ, ຖ້າປະກົດເຫັນແມ່ດ້ວງກໍອອກຫຼິ້ນແສງໄຟ ຄວນລະມັດລະວັງໃນການບິວລະບັດຮັກສາຕົ້ນເຂົ້າ .



ດ້ວງກໍສີລາຍແຊກ



ດ້ວງກໍສີຊົນຟູ



ດ້ວງກໍສີຂາວ



ດ້ວງກໍສີເຫຼືອງ

2. ໂລຍະລະບາດ

ດ້ວງກໍລະບາດໃນນາເຂົ້າ ແຕ່ໂລຍະກ້າ ຫາ ເກັບກ່ຽວ ແຕ່ໂລຍະທີ່ລະບາດຮ້າຍແຮງ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນໃນໂລຍະຕົ້ນເຂົ້າເລີ່ມແຕກກໍ, ແຕກກໍສູງສຸດ ແລະ ເຂົ້າຖອກຮວງ ດ້ວງກໍທຳລາຍເຂົ້າໃນໂລຍະເຂົ້າແຕກກໍເອີ້ນວ່າ: ເຂົ້າຕາຍຍອດ ຫຼື ເຂົ້າຕາຍໃຈ ແຕ່ຖ້າດ້ວງກໍເຂົ້າທຳລາຍໃນໂລຍະເຂົ້າຖອກຮວງເອີ້ນວ່າ: ເຂົ້າຫົວຫງອກ ຫຼື ເຂົ້າຕາຍພາຍ.

3. ວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ລັກສະນະການທຳລາຍ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງດ້ວງກໍ ພວກນີ້ແມ່ນແບບບໍລິມະນິ 4 ໂລຍະຄື :

ໂລຍະ 6 — 7 ມື້ ໂຂ່ຈະຟັກ ຫຼື ເບາະອອກເປັນໂຕດ້ວງກິນອາຫານຢູ່ພາຍໃນລຳຕົ້ນ, ອາຍຸຂອງໂຕດ້ວງ 35 — 45 ມື້, ຈຶ່ງເຂົ້າດັກແຕ່ ໂລຍະນີ້ມັນບໍ່ກິນອາຫານ, ອາຍຸເປັນດັກແຕ່ 8 — 13 ມື້, ຈາກນັ້ນກໍຈະຟັກອອກເປັນແມງກະບີ້, ໂລຍະແມງກະບີ້ 4 — 7 ມື້ . ແມງກະບີ້ຂອງດ້ວງກໍແມ່ນຶ່ງຈະໂຂ່ໄດ້ 1—2 ໜ່ວຍ, ແມ່ແມງກໍຈະເລີ່ມກິນອາຫານໄດ້ໂລດຄືທຳອິດໂຕດ້ວງນ້ອຍ ກໍ່ເລັ່ງກິນສານສີຂຽວ ຢູ່ໃນໂກ້ງກັບບໍລິເວນໜ່ວຍໂຂ່ຢູ່ ຈາກນັ້ນໂຕດ້ວງນ້ອຍຈະຫາວໂຍລົງໄປຫາກາບໃບ ທີ່ລຳຕົ້ນຂອງຕົ້ນເຂົ້າ ແລ້ວເຂົ້າທຳລາຍຢູ່ກາບໃບນັ້ນເລີຍ.

4. ການປ້ອງກັນ

- ຄວນໃຊ້ໄຟຕະກຽງໄຕ້ໄວ້ ໃນເວລາກາງຄືນ ເພື່ອຂ້າແມ່ດ້ວງກໍ.
- ຄວນອະນາໄມນາ ເພື່ອທຳລາຍບ່ອນລີ້ຊ້ອນ ຫຼື ວາງໂຂ່ຂອງແມ່ດ້ວງກໍ.
- ກຳຈັດດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ ໂດຍໃຊ້ຢາ ເບທັດເຊ 12 % ໃນອັດຕາ 15 — 20 ກລ/ຮຕ.
- ໃຊ້ຢາ ດີອາຊິນອນ 14 % ໃນອັດຕາ 8 — 15 ກລ/ຮຕ.
- ໃຊ້ຢາໄຟຟູຣານ 3 % ແຊ່ຕົ້ນກ້າ ໃນອັດຕາ 250 ກຣາມປະສົມກັບນ້ຳ 20 ລິດ ແລ້ວແຊ່ມັດກ້າ 6 — 12 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປປັກດຳ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ການປ້ອງກັນ ແລະ
ກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູຜິດຕົ້ນຕໍຂອງເຂົ້າ
(ດ້ວງກໍ)



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CETAU
(ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ)



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ຮ່ວມກັບ:
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)