



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
----==00000==----

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ການສອນ ວິຊາ
ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
Fruit Tree Production

ຫຼັກສູດສຳລັບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ
ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີລາຊະມົງຄົນ ກາລະສິນ

ສາລະບານ

	ໜ້າ
ສາລະບານ	A
ສາລະບານຕາຕະລາງ	C
ບົດທົດສະດີທີ 1. ຄວາມສຳຄັນຂອງການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	1
1.1 ສະພາບລວມ	1
1.2 ຄວາມສຳຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກ	2
ບົດທົດສະດີທີ 2. ການເລືອກເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	4
2.1 ການເລືອກເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	4
ບົດທົດສະດີທີ 3. ການຈຳແນກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	7
3.1 ການຈຳແນກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	7
ບົດທົດສະດີທີ 4. ການກຽມເນື້ອທີ່ເພື່ອປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	9
4.1 ສະພາບເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	9
4.2 ລະບົບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ	11
4.3 ການຄິດໄລ່ຈຳນວນຕົ້ນຕໍເນື້ອທີ່	12
4.4 ການປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອກັນລົມ	13
4.5 ການໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນ	15
4.6 ການປູກພືດຄຸມດິນ	16
ບົດທົດສະດີທີ 5. ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ	16
5.1 ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ	16
5.2 ການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ໃຊ້ເພດ	19
ບົດທົດສະດີທີ 6. ການບົວລະບັດຮັກສາສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ	23
6.1 ການໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ	23
6.2 ການຕັດແຕ່ງກົງ	25
6.3 ຝຸ່ນ ແລະ ການໃຫ້ຝຸ່ນແກ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ	28

ສາລະບານ (ຕໍ່)

	ໜ້າ
6.4 ການໃຊ້ຮ໌ໂມນພືດກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ	33
6.5 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕູທີ່ມັກທຳລາຍໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນກຳຈັດ	34
ບົດທົດສະດີທີ 7. ການເກັບໝາກ ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັງການເກັບໝາກ	48
7.1 ການເກັບໝາກ	48
7.2 ການປະຕິບັດຫຼັງຈາກການເກັບໝາກ	50
ບົດທົດສະດີທີ 8 ເທັກນິກກະສິກຳຍືນນານໃນການປູກໄມ້ກິນໝາກ	52
8.1 ຝຸ່ນຊີວະພາບ	52
8.2 ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບກະສິກຳຍືນນານ	53
8.3 ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດໂດຍຊີວະວິທີ	54
8.4 ການໃຊ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸທຳມະຊາດໃນໄມ້ໃຫ້ໝາກ	54
8.5 ການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄມ້ໃຫ້ໝາກພື້ນເມືອງ	56
ເອກະສານອ້າງອີງ	58

ສາລະບານຕາຕະລາງ

	ໜ້າ
ຕາຕະລາງທີ	
1. ໄລຍະປຸກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໄມ້ໃຫ້ໝາກທົ່ວໄປ	13
2. ຄວາມເໝາະສົມໃນການເກັບເມັດ ແລະ ເວລາ ໃນການງອກຂອງເມັດ	18
3. ພະຍາດທີ່ສຳຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ແລະ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ	36
4. ແມງສັດຕູໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດແລະການປ້ອງກັນກຳຈັດ	42

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ການສອນ ວິຊາ
ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
Fruit Tree Production

ຫຼັກສູດສຳລັບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ
ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີລາຊະມົງຄົນ ກາລະສິນ

ບົດທົດສະດີທີ 1

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ບອກເຖິງສະພາບລວມກ່ຽວກັບການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
2. ອກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ກັບການປະກອບເປັນອາຊີບ
3. ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
4. ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ
5. ອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ກັບທາງດ້ານໂພຊະນາການ.

ເນື້ອໃນ

1.1 ສະພາບລວມ

ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ມີດິນດອນຕອນຫຍ້າອັນກ້ວາງຂວາງ ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການປຸກຝັງ ມີແມ່ນ້ຳລຳເຊ, ຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ ຜະລິດ. ເນື້ອທີ່ປຸກຝັງສໍາລັບພືດຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດມີ 800.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນມີນາປີ 45.000 ເຮັກຕາ, ນາແຊງ 17.000 ເຮັກຕາ ແລະ ພືດອື່ນໆ 110.400 ເຮັກຕາ (ຂໍ້ມູນຈາກ ກົມປຸກຝັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກໍາ ກະຊວງກະສິກໍາປ່າໄມ້ ປີ 1995), ທີ່ຫຍ້າ ມີປະມານ 750.000 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ສໍາລັບການລ້ຽງປາມີປະມານ 50.000 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ມີ ປະມານ 11.200.000 ເຮັກຕາ (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມພາກເໜືອ ປີ 1994) ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກທໍາ ລາຍແຕ່ລະປີ (ແຕ່ຊ່ວງປີ 1982 ຫາ1989) ປະມານ 67.000 ເຮັກຕາ/ປີ (ໂຄງການຊີດາ ບາດ ກ້າວທີ່ 4 ກົມປ່າໄມ້).

ວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າວຽກປຸກຝັງນອກຈາກການຜະ ລິດເຂົ້າໃຫ້ເປັນສະບຽງແລ້ວ ກິດຈະການໄມ້ໃຫ້ໝາກ ກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເຊິ່ງ ຈັດເຂົ້າເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ໃນວິທີການຫາລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ປະຈຸບັນ, ການປະ ກອບສ່ວນ ຂອງຂະແໜງປຸກຝັງ ເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ຢ່າງເຕັມເພີດເພີນໜ່ວຍ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນບາງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກໄພທໍາມະ ຊາດຄຸກຄາມ ຍັງໄດ້ເອື້ອຍອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ ຫລາຍສົມຄວນ ເຊັ່ນ : ໃນການລ່າສັດ, ການເກັບ ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຈາກປ່າ. ນອກນັ້ນ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນ

ການຫາເອົາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມາແລກປ່ຽນເພື່ອດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການກະສິກຳຕໍ່ຫົວຄົນ ແມ່ນເປັນຂໍ້ກຸນແຈສູ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ປ່າໄມ້ ໂດຍການສ່ວຍຖາງປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະແໜງກະສິກຳດ້ວຍການປູກເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ປີລະ 9,2 ເປີເຊັນ ແລະ ພືດອື່ນໆໂດຍສະເລ່ຍ 10 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ.

1.2 ຄວາມສຳຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກ

1.2.1 ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ

ປະຈຸບັນ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າແມ່ນຍຶດຖືເອົາເຂົ້າເປັນອາຫານຫລັກໃນການດຳລົງຊີວິດ. ພະລັງງານ ທີ່ໄດ້ຈາກເຂົ້າໄດ້ກວມເອົາປະມານ 80 ເປີເຊັນ, ພະລັງງານນຳໃຊ້ ເຊິ່ງນອນ ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 300 ກິໂລກຼາມ/ ຄົນ/ປີ ຫລືໄດ້ຮັບຈາກເຂົ້າສານຕົວຈິງປະມານ 180 ກິໂລກຼາມ/ຄົນ/ປີ. ສະນັ້ນ, ການດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານທາງດ້ານພະລັງງານແມ່ນຍັງຂາດຢູ່ຈຳນວນໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຄາບເຂົ້າມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຈະຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທາງດ້ານວຽກງານການກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດຕ່າງໆທີ່ປູກນັ້ນ ໄດ້ມີການຄັດພັນໃຫ້ເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກພັນດີ ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຕະຫລາດຈຶ່ງສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາດີທັງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງລາຍຮັບແກ່ຊາວສວນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

1.2.2 ຄວາມສຳຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ

ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເປັນການປູກປ່າຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມຮີ່ມເຢັນອາກາດສົດໃສ ເພາະຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນທີ່ມີສີຂຽວຕະຫລອດປີ ເປັນແຫລ່ງຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ສຳຄັນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພື່ອເປັນການປະດັບອາຄານສະຖານທີ່ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມອີກດ້ວຍ.

1.2.3 ຄວາມສຳຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກຕໍ່ກັບທາງດ້ານໂພສະນາການ

ໝາກໄມ້ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ເປັນອາຫານຫລັກ ແຕ່ກໍ່ເປັນອາຫານເສີມທີ່ດີມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການສູງ ມີວິຕາມິນຕ່າງໆ ຫາກໄດ້ຮັບປະທານໝາກໄມ້ວັນລະ 80-100 ກຼາມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. ໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດມີປະລິມານຂອງວິຕາມິນໃນປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ :

- ວິຕາມິນເອ ມີຫລາຍໃນໝາກມ່ວງ 4.800 ມິລີກຼາມ /100 ກຼາມ
- ວິຕາມິນ ເອ ໃນໝາກຫຸ່ງ 2.000 ມິລີກຼາມ /100 ກຼາມ
- ວິຕາມິນບີ ມີຫລາຍໃນໝາກກ້ວຍ 50 ມິລີກຼາມ/100 ກຼາມ
- ວິຕາມິນ ບີ ໃນໝາກກ້ຽງ 120 ມິລີກຼາມ/100 ກຼາມ

- ວິຕາມິນ ຊີ ມີຫລາຍໃນໝາກສີດາ 70 ມິລິກຼາມ/100 ກຼາມ
- ວິຕາມິນ ຊີ ມີຫລາຍໃນໝາກນາວ 65 ມິລິກຼາມ/100 ກຼາມ
- ວິຕາມິນ ຊີມີຫລາຍໃນໝາກກ້ຽງ 70 ມິລິກຼາມ/100 ກຼາມ
- ທາດຊີ້ນ ມີຫລາຍໃນໝາກອາໂວກາໂດ ແລະ ທຸລຽນ
- ທາດເທລັກມີຫລາຍໃນໝາກກ້ວຍ, ທຸລຽນ
- ທາດເທລັກ, ຟອສຟໍຣັສ, ແຄລຊຽມ ມີຫລາຍໃນໝາກອິນທະພະລຳ
- ໝາກໄມ້ ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຫລາຍ ແມ່ນ : ທຸລຽນ, ກ້ວຍ ແລະ ໝາກຂຽບ.

ບົດທົດສະດີທີ 2

ການເລືອກເນື້ອທີ່ປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍສະພາບດິນປຸກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສ້າງສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
2. ອະທິບາຍເຖິງສະພາບຟ້າອາກາດທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
3. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຕໍ່ການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
4. ອະທິບາຍເຖິງແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນສວນປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
5. ອະທິບາຍເຖິງສະພາບທາງສັງຄົມທີ່ມີຕໍ່ການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
6. ອະທິບາຍເຖິງການປົວລະບົດຮັກສາສວນປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ເນື້ອໃນ

2.1 ການເລືອກເນື້ອທີ່ປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການເລືອກເນື້ອທີ່ເພື່ອປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຫລາຍປັດໃຈປະກອບກັນເພື່ອໃຫ້ການປຸກນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງເຕັມທີ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ. ປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ຈະກ່າວເຖິງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນໄດ້ນຳມາປະກອບການພິຈາລະນາປະກອບ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກສະເໝີ ໄດ້ແກ່:

2.1.1 ສະພາບດິນປຸກທີ່ເໝາະສົມ

ການເລືອກບ່ອນສຳລັບປຸກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກນັ້ນ ນັບວ່າເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນອັນດັບທຳອິດທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງໃຫ້ຫລາຍ ຫາກເລືອກເນື້ອທີ່ໄດ້ເໝາະສົມຈະເປັນການປະຢັດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍັງກ່ຽວຂ້ອງໄປເຖິງບັນຫາຕ່າງໆອີກ. ສຳລັບການເລືອກດິນເພື່ອປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກນັ້ນຄວນພິຈາລະນາດັ່ງນີ້ :

1. **ເປັນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ** : ຄວນເປັນດິນທີ່ມີແຮ່ທາດອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ້ອງການຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນເປັນດິນທີ່ມີອິນຊີວັດຫລາຍໂດຍທຳມະຊາດເຊິ່ງຈະເປັນຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຜຸຟຸ້ຍ, ລະບາຍນ້ຳແລະຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີເໝາະສົມ ແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ຮາກ .

2. **ເປັນດິນທີ່ມີສະພາບຄວາມເປັນກົດ - ຕ່າງ ທີ່ຢູ່ໃນລະດັບເປັນກາງ** : ຄືບໍ່ເປັນກົດຫລືຕ່າງຫລາຍເກີນໄປຈະບໍ່ເໝາະຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ . ການປັບປຸງດິນ ທີ່ເປັນກົດ ຫລືຕ່າງຫລາຍໆໃຫ້ມາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນກາງນັ້ນ ຈະເຮັດໄດ້ຍາກ ແລະລົງ

ທຶນຫລາຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປັບປຸງດິນທີ່ເປັນກົດ ຫລືດ່າງນີ້ ອາດກ່າວໄດ້ຄື : ການປັບປຸງດິນ ທີ່ເປັນກົດໃຫ້ກາຍເປັນກາງ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍກ່ວາການແກ້ໄຂດິນທີ່ເປັນດ່າງໃຫ້ເປັນກາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຫລີກລ້ຽງ ບໍ່ເລືອກດິນທີ່ເປັນດ່າງຫລາຍ. ສຳລັບດິນອີກລັກສະນະໜຶ່ງບໍ່ເໝາະຕໍ່ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ວາງໄປກໍຄືດິນເຄັມໂດຍສະເພາະດິນທີ່ເຄັມໆ ມີເກືອຢູ່ໃນດິນຫລາຍ ເຊິ່ງດິນດັ່ງກ່າວຈະແກ້ໄຂຂ້ອນຂ້າງຍາກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ທຶນສູງ.

3. ເປັນດິນທີ່ມີຄວາມເລິກຂອງໜ້າດິນພຽງພໍຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແຕ່ລະຊະນິດ : ໜ້າດິນປູກທີ່ເລິກພຽງພໍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໝັ້ນຄົງ, ແຂງແຮງ, ບໍ່ໂຄ່ນລົ້ມງ່າຍ ແລະ ສາມາດຫາອາຫານມາລ້ຽງຕົ້ນໄດ້ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ .

2.1.2 ແຫລ່ງນ້ຳ

ເນື້ອທີ່ໆ ຈະປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຄວນຢູ່ໃກ້ແຫລ່ງນ້ຳ ຫລືສາມາດຫານ້ຳໃຫ້ແກ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ໄດ້ລົງທຶນບໍ່ຫລາຍ ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກສ່ວນໃຫຍ່ ຈະອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ, ຖ້າຂາດນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ດອກລົ້ນ, ໝາກທີ່ຕິດໃໝ່ໆ ຈະລົ້ນຫລາຍ ຫລືລົ້ນເກືອບໝົດຕົ້ນໄດ້, ໄມ້ໃຫ້ໝາກຈຶ່ງຕ້ອງການນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ຫລາຍ ນອກຈາກຊ່ວງນີ້ແລ້ວຊ່ວງທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກກໍຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍເຊັ່ນກັນ.

2.1.3 ສະພາບຟ້າອາກາດ

ໝາຍເຖິງປະລິມານນ້ຳຝົນ, ການກະຈາຍຂອງນ້ຳຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມສຳພັນ, ອຸນຫະພູມ ເຊິ່ງສະພາບຟ້າອາກາດນີ້ ຈະເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ເປັນຕົວກຳນົດຊະນິດຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຈະນຳມາປູກໃນບ່ອນຕ່າງໆກ່າວຄື : ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຈະປູກນັ້ນຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະພາບຟ້າອາກາດແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນສະເໝີການປູກຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນຢ່າງເຕັມທີ່.

2.1.4 ການຄົມມະນາຄົມ

ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກຄວນໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫລາດຫລືແຫລ່ງຊຸມຊົນພໍສົມຄວນຈະສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ວຽກງານຕ່າງໆ, ການຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດ, ການເດີນທາງໄປດູແລກິດຈະການ. ການຄົມມະນາຄົມທີ່ສະດວກສະບາຍ ຍັງມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດອີກດ້ວຍ .

2.1.5 ແຮງງານ

ແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ນອກຈາກຈະເສຍຄ່າແຮງງານແລ້ວຍັງຕ້ອງເປັນແຮງງານທີ່ມີຝັມຝັອກດ້ວຍເພາະຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ້ອງການຄວາມພິຖິພິຖັນພໍສົມຄວນ ຖ້າຫາກປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ກໍຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ງ່າຍ.

2.1.6 ສະພາບທາງສັງຄົມ

ໝາຍເຖິງສະພາບການເປັນຢູ່ການປະກອບອາຊີບ ຕະຫລອດຮອດນິໄສຂອງປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນນັ້ນ ເຊິ່ງຈະມີຜົນຕໍ່ການສ້າງສວນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະມັກເກີດມີປະກົດການການແກ້ງທຳລາຍ ຫລືຂີ້ລັກຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະມີຜົນສະທ້ອນເຖິງການສ້າງສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ .

2.1.7 ການບົວລະບັດຮັກສາສວນ

ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກຜູ້ປູກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດູແລຕະຫຼອດປີເຊິ່ງມີບາງຊ່ວງບາງລະດູການກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຖ້າປ່ອຍປະລະເລີຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ປູກຄວນໄດ້ມີເວລາໃຫ້ກັບສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກຢ່າງເຕັມທີ່.

ບົດທົດສະດີທີ 3 ການຈຳແນກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນເຂດຮ້ອນ
2. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດເຄິ່ງຮ້ອນ
3. ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດໜາວໄດ້

ເນື້ອໃນ

3.1 ການຈຳແນກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການຈຳແນກໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຫລາຍລະບົບດ້ວຍກັນເຊັ່ນ : ການແບ່ງໂດຍອາໄສຂະໜາດຂອງຊົງພຸ່ມ, ການແບ່ງໂດຍອາໄສອາຍຸການໃຫ້ໝາກເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນການແບ່ງອີກລັກສະນະໜຶ່ງເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ປຸກຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຄືການຈຳແນກໂດຍ ອາໄສຄວາມຕ້ອງການສະພາບດິນ ພ້ອມທັງອາກາດທີ່ເໝາະສົມຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແຕ່ລະຊະນິດເປັນຫລັກ. ການຈຳແນກໃນລັກສະນະນີ້ສາມາດແບ່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກເປັນ 3.ພວກໃຫຍ່ດັ່ງນີ້ :

3.1.1 ໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດຮ້ອນ

ຄືພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກພວກນີ້ ນອກຈາກຈະຕ້ອງການອຸນຫະພູມສູງແລ້ວ ຍັງສາມາດແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໄດ້ ຄື :

1. ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ ຄື : ອຸນຫະພູມອາກາດສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດອາກາດສູງດ້ວຍ ໄດ້ແກ່ : ຖົ່ວລຽນ, ລາງສາດ, ລອງກອງ ເປັນຕົ້ນ .
2. ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມັກ ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ຄື : ອຸນຫະພູມສູງ ແຕ່ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດໃນອາກາດຕ່ຳ ໄດ້ແກ່ : ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ, ໝາກນັດ, ໝາກຂຽບ, ໝາກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນ .

ການເລືອກເນື້ອທີ່ເພື່ອປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງ ໆ ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນຢ່າງເຕັມທີ່ ເຊັ່ນ : ຖ້າເອົາພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມໄປປຸກໃນບໍລິເວນທີ່ມີອາກາດຮ້ອນແຫ້ງແລ້ງກໍ່ຈະສົ່ງເກດໄດ້ແຕ່ເລີ່ມປຸກ ເຊັ່ນ : ໃບຈະໄໝ້, ອາດໄໝ້ສະເພາະປາຍໃບ ຫລືໄໝ້ໝົດທັງໃບ, ຕົ້ນເຕີບໂຕຊ້າ ຈະແຕກໃບໃໝ່ ຫລືເຕີບໂຕດີໃນຊ່ວງທີ່ຝົນຕົກຫລາຍໆ ເທົ່ານັ້ນ ພໍເຂົ້າລະດູແລ້ງກໍ່ສະຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕໄປເທິງນານຫລາຍເດືອນ ຫລືຕາຍໄປເລີຍ.

3.1.2 ໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດເຄິ່ງຮ້ອນ

ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກນີ້ ຄື ຕ້ອງການອຸນຫະພູມສູງ ໃນຊ່ວງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງໃບລຳຕົ້ນ ແລະ ຕ້ອງການອຸນຫະພູມຕ່ຳອີກຊ່ວງໜຶ່ງ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການພັກຕົວ ຕຽມຕົວອອກດອກໂດຍອຸນຫະພູມນັ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳຫລາຍເກີນໄປ ຈົນເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກນີ້ຈະປູກກັນລະຫວ່າງເສັ້ນຂະໜານ ທີ່ 20 - 35 ອົງສາ ຂອງຊີກໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້, ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນບ້ານເຮົາທີ່ຈັດໃນກຸ່ມນີ້ ຄື : ພວກຕະກູນສັມ, ລັ້ນຈີ່, ລຳໄຍ, ອາໂວກາໂດ ເປັນຕົ້ນ.

3.1.3 ໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດໜາວ

ໄມ້ໃຫ້ໝາກພວກນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນພວກໄມ້ໃບລົ່ນ ນອກຈາກຕ້ອງຜ່ານຊ່ວງມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ອຸນຫະພູມຕ່ຳນີ້ ຈະເປັນຕົວທຳລາຍການພັກຕົວຂອງຕາດອກດ້ວຍ ເມື່ອຜ່ານຊ່ວງໜາວເຂົ້າສູ່ຊ່ວງທີ່ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ດອກກໍ່ຈະເລີ່ມບານ, ປົ່ງໃບໃໝ່, ຕິດໝາກ ແລະ ໝາກຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກກັນຕັ້ງແຕ່ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 35 ອົງສາເຊລຊຽດສ ຂຶ້ນໄປທັງເພື່ອງໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້. ໄມ້ໃຫ້ໝາກພວກນີ້ ໄດ້ແກ່ : ແອບເບິ້ນ, ທໍ້ (ພິຊ), ສາລີ້, ພລຳ ແລະ ເຊລີ ເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກແຕ່ລະຊະນິດ ຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະພາບຟ້າອາກາດ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຈຶ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກສະພາບຟ້າອາກາດບໍ່ເໝາະສົມກັບຊະນິດຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແລ້ວກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕາມມາພາຍຫລັງ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກສະພາບຟ້າອາກາດບໍ່ເໝາະສົມແລ້ວ ຍັງມີອີກຫລາຍປະການດ້ວຍກັນ ຄືນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກນ້ອຍໆ ນັ້ນເສຍຫາຍ ຫລືຕາຍໄປແລ້ວ ໃນກໍລະນີທີ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກນັ້ນບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນເຖິງໄລຍະອອກດອກໃຫ້ໝາກໄດ້. ສະພາບຟ້າອາກາດ ຍັງມີຜົນຕໍ່ກັບການອອກດອກ, ການຕິດໝາກ ລວມທັງຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ : ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດຕ້ອງການຊ່ວງອາກາດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ສະພາບດິນແຫ້ງໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຕຽມຕົວສະສົມອາຫານສຳລັບອອກດອກ ແຕ່ຖ້າໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວເກີດຝົນຕົກ ຫລືໄດ້ຮັບນ້ຳຫລາຍເກີນໄປດິນມີຄວາມຊຸ່ມຫລາຍຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກນັ້ນຈະແຕກໃບອ່ອນ ແທນທີ່ຈະເກີດຕາດອກ. ສ່ວນໃນດ້ານຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍແກ່ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໄດ້ ເຊັ່ນ : ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍໆຊະນິດ ຖ້າຝົນຕົກມາໃນຊ່ວງເວລາໝາກໃກ້ຈະແກ່ ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກແຕກແລ້ວເໝົາເສຍຫາຍ ຫລືຄຸນນະພາບຂອງໝາກເສຍໄປ. ນອກນີ້ ສະພາບຟ້າອາກາດຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດທຳລາຍຂອງແມງໄມ້ສັດຕູຕ່າງໆ ຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກອີກດ້ວຍ.

ບົດທົດສະດີທີ 4

ການກຽມເນື້ອທີ່ເພື່ອປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍເຖິງການກຽມເນື້ອທີ່ປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ເປັນບ່ອນຕ່ຳ
2. ອະທິບາຍເຖິງການກຽມເນື້ອທີ່ປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ເປັນບ່ອນສູງ
3. ບອກຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດລະບົບການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
4. ບອກສູດການຄິດໄລ່ເພື່ອຊອກຫາຈຳນວນຕົ້ນຕໍ່ເນື້ອທີ່ປຸກ
5. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງໄມ້ທີ່ປຸກໄວ້ເພື່ອກັນລົມ
6. ບອກຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ນິຍົມປຸກເພື່ອເປັນຕົ້ນໄມ້ກັນລົມ
7. ອະທິບາຍຂໍ້ດີ ຂອງການໃຊ້ວັດຖຸປົກຄຸມດິນ
8. ບອກວັດຖຸທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການປົກຄຸມດິນ
9. ອະທິບາຍປະໂຫຍດຂອງພືດທີ່ປຸກເພື່ອຄຸມດິນ

ເນື້ອໃນ

4.1 ສະພາບເນື້ອທີ່ປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ສະພາບເນື້ອທີ່ປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແບ່ງເປັນ 2 ລັກສະນະໃຫຍ່ ໆ ດັ່ງນີ້ :

4.1.1 ສະພາບເນື້ອທີ່ປຸກເປັນບ່ອນທີ່ຕ່ຳ

ໄດ້ແກ່ທີ່ຮາບພຽງລຸ່ມແມ່ນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນນາມາກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ໂດຍກົງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອດຍົກຮ່ອງປູກກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ພື້ນຈາກນ້ຳຖ້ວມ ສຳລັບເນື້ອທີ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍປູກມາກ່ອນ ຄວນເລີ່ມຕົ້ນກຽມເນື້ອທີ່ ດ້ວຍການວາງຜັງໃນແຜ່ນເຈ້ຍເສຍກ່ອນເພື່ອກຳນົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ແນ່ນອນເສຍກ່ອນ ໄດ້ແກ່ : ການວັດແທກຂະໜາດຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງ, ຄວາມຍາວ, ຮູບຮ່າງຂອງເນື້ອທີ່, ທິດທາງຂອງລົມ, ຮ່ອງສຳລັບສິ່ງນ້ຳ, ຫີນທາງ ແລ້ວກຳນົດຂະໜາດຂອງຄັນຄູ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມເນື້ອທີ່. ສຳລັບພາຍໃນຄັນຄູທັງໝົດ ໃຫ້ແບ່ງອອກເປັນໜານປູກ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳລະຫວ່າງໜານປູກຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຫາກມີເນື້ອທີ່ເຫຼືອກໍດັດແປງໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນ : ເຮັດເປັນຄອກສັດ, ເຮືອນກ້າເບ້ຍ, ໜອງ ຫລືບ່ອນສຳລັບກັກຂ້າງນ້ຳເປັນຕົ້ນ.. ການກຳນົດທິດທາງຂອງໜານປູກ ຄວນໃຫ້ຮ່ອງປູກຢູ່ໃນລັກສະນະຂວາງຕາເວັນ ຄືໃຫ້ຫົວຮ່ອງ ແລະ ທ້າຍຮ່ອງຢູ່ໃນແນວທິດເໜືອຫາທິດໃຕ້ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຮັບແສງຢ່າງເຕັມ

ທີ່. ຂະໜາດຂອງຄັນຄູນຈຳນວນນີ້ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມນັ້ນ ໃຫ້ກຳນົດໂດຍອາໄສລະດັບສູງສຸດຂອງນ້ຳແຕ່ລະປີເປັນຫຼັກ ເພື່ອໃຫ້ສູງພຽງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມໄດ້. ຂະໜາດຂອງຄັນຄູອາດຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊັ່ນ : ກ້ວາງ 2 ແມັດ ສູງ 1 ແມັດ ຫລື ກ້ວາງ 3 - 4 ແມັດ ແລະ ສູງເຖິງ 2 ແມັດ ຫລືຫລາຍກ່ວານີ້ກໍໄດ້. ສຳລັບຂະໜາດຂອງຮ່ອງປູກໂດຍທົ່ວໄປຈະມີຂະໜາດກ້ວາງ 4 - 6 ແມັດ ແລ້ວແຕ່ລະຊະນິດຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຈຳນວນແຖວທີ່ຕ້ອງການປູກຮ່ອງນ້ຳ ລະຫວ່າງຮ່ອງປູກກ້ວາງປະມານ 1 - 1,5 ແມັດ ເລິກປະມານ 1- 1,5 ແມັດ , ເມື່ອກຳນົດຜັງສວນ ແລ້ວກໍໃຫ້ລາງມີຊຸດໂດຍຮອບສວນກ່ອນຈະໃຊ້ແຮງງານຄົນ ຫລືລົດກໍໄດ້ ຈາກນັ້ນກໍຂຸດຮ່ອງປູກຕາມແຖວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

1. **ການປັບປຸງດິນກ່ອນປູກ :** ເນື່ອງຈາກດິນທີ່ຂຸດອອກມານັ້ນ ເປັນຊັ້ນດິນລຸ່ມ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະປູກໄດ້ໂດຍກົງ ຄວນມີການປັບປຸງໃຫ້ມີສະພາບທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດເສຍກ່ອນ ຄືປະດິນທີ່ຂຸດຂຶ້ນມານັ້ນ ຕາກແດດຈົນແຫ້ງ ໂຮຍດ້ວຍປູນຂາວ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຝຸ່ນປົ່ມໃຫ້ຫລາຍ, ຫິດນ້ຳແລ້ວທັບດິນໃຫ້ເປັນກ້ອນນ້ອຍລົງ, ເວລາດຽວກັນນັ້ນ ກໍປັບລະດັບດິນຫລັງຮ່ອງປູກໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີທົ່ວໜານ. ການປັບປຸງດິນປູກນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດຫລາຍໆເທື່ອຈົນກະທັ້ງດິນນັ້ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມທັງໜານ, ສະພາບຂອງດິນທີ່ເໝາະສົມຄືມີຄວາມຜຸພູຍ ບໍ່ຈັບຕົວກັນແໜ້ນ ສາມາດລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຊຶມນ້ຳໄດ້ດີສີຂອງດິນສະໝໍ່າສະເໝີກັນທັງໜານ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຄວາມເປັນດ່າງເກີນໄປ. ໃນຊ່ວງທຳການປັບປຸງດິນນີ້ ອາດຈະປູກພືດອາຍຸສັ້ນໄປກ່ອນກໍໄດ້ເມື່ອເກັບກຽວຜົນຜະລິດແລ້ວກໍຂຸດ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນຈົນກະທັ້ງດິນມີຄວາມເໝາະສົມດີແລ້ວຈຶ່ງປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ຕໍ່ໄປ .

2. **ການຂຸດຊຸມປູກ :** ຄວນຂຸດຂະໜາດ ກ້ວາງ - ເລິກ ປະມານ 50 - 60 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວແຕ່ລະຊະນິດຂອງພືດ ແລະສະພາບຂອງດິນ. ດິນທີ່ຂຸດອອກຈາກຊຸມນັ້ນ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງຈຶ່ງທັບໃຫ້ໝູ່ນ ປະສົມດ້ວຍຝຸ່ນຊີວະພາບ (ຈະໃສ່ປູນຂາວອີກກໍໄດ້), ຝຸ່ນຟອສເຟດ ຫລືກະດູກປົ່ມລວມທັງເສດໄປໄມ້ທີ່ເໝົາເປື້ອຍ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ກໍເອົາລົງຊຸມປູກຄືເກົ່າໂດຍໃຫ້ສູງຈາກປາກຊຸມເລັກນ້ອຍ ຈົນວ່າດິນຍຸບຕົວດີເສຍກ່ອນຈຶ່ງລົງມືປູກ ຫລືອາດຈະຫິດນ້ຳຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ດິນຍຸບຕົວໄວຂຶ້ນ .

4.1.2 ສະພາບເນື້ອທີ່ປູກເປັນບ່ອນທີ່ສູງ

ເນື້ອທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງນ້ຳຖ້ວມຂັງອາດຈະເປັນບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນໄຮ່ເກົ່າ, ສວນເກົ່າຫລືເປັນບ່ອນໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍປູກພືດມາກ່ອນກໍຕາມ, ການກຽມການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກກໍຈະເລີ່ມວາງຜັງສວນເຊັ່ນກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຢູ່. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງລົງມືປັບເນື້ອທີ່ໂດຍການການຖາກຖາງພວກໄມ້ໃຫຍ່ຫລືນ້ອຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກ ຫລືຖ້າບໍ່ກົດຂວາງໃນການປະຕິບັດວຽກງານກໍຄວນຈຶ່ງປະໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງຈະເປັນໄມ້ທີ່ມີຄ່າຫລືບໍ່ກໍຕາມເພາະຈະໄດ້ເປັນບ່ອນໃຫ້ຮົມເງົາແກ່ໄມ້ໃຫ້ໃຫ້ໝາກທີ່ເຮົາປູກໃໝ່ໆ. ໃນກໍລະນີທີ່ເນື້ອທີ່ປູກສູງໆຕ່າງໆບໍ່

ສະເໝີກັນນັ້ນ ຄວນແບ່ງເນື້ອທີ່ອອກເປັນສ່ວນໆຕາມສະພາບຂອງເນື້ອທີ່ເພື່ອສະດວກໃນການ ປັບ ແລະ ການປົວລະບັດຮັກສາສວນຕ່າງ ໆ ສ່ວນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊັນຫລາຍນັ້ນ ຄວນປັບລະ ດັບໃຫ້ເປັນລັກສະນະຄືຂັ້ນໄດ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດເຊາະໜ້າດິນ ແລະ ຊ່ວຍເກັບຊັບພະຍາກອນໄວ້ ໄດ້ດ້ວຍ, ສ່ວນບ່ອນຕ່ຳ ກໍ່ຕ້ອງຕຽມເຮັດບ່ອນລະບາຍນ້ຳອອກຈາກເນື້ອທີ່ດ້ວຍ .

1. **ການຂຸດຂຸມປູກໃນເນື້ອທີ່ດິນສູງ :** ເມື່ອຕຽມດິນໝານປູກແລ້ວໆໃຫ້ວາງ ແຖວສຳລັບປູກຕາມໄລຍະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍໃຊ້ໄມ້ຮວກປັກເຮັດເປັນເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃຫ້ສຳເລັດ ສັງເກດເບິ່ງແຖວທີ່ໄດ້ໝາຍແລ້ວນັ້ນຊື່ກັນຫລິ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງລົງມືຂຸດ, ສຳລັບຂຸມປູກນັ້ນ ຈະຂຸດໃຫ້ມີ ລັກສະນະກົມ ຫລືສີ່ລ່ຽມກໍ່ໄດ້ຂະໜາດຂອງຂຸມກ້ວາງ - ເລິກ - ຍາວ ປະມານ 50 - 100 ຊັງຕີ ແມັດ ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ສະພາບເນື້ອທີ່ປູກ (ຖ້າດິນບໍ່ດີປານໃດຄວນຂຸດ ໃຫ້ກ້ວາງໃຫຍ່ ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງດິນໃນຂຸມໃຫ້ດີຂຶ້ນ)ການຂຸດຂຸມໃນສະພາບເນື້ອທີ່ດິນສູງນີ້ໃຫ້ ຂຸດໂດຍແຍກດິນຊັ້ນເທິງໄວ້ກອງໜຶ່ງ ແລະ ດິນຊັ້ນລຸ່ມໄວ້ກອງໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ປົນກັນປະຕາກແດດໄວ້ ຈົນດິນແຫ້ງ ແລ້ວປະສົມດ້ວຍຝຸ່ນຊີວະພາບເຊັ່ນ : ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນປົ່ມ, ຝຸ່ນໝັກຕ່າງ ໆ ຫລື ເສດ ໃບໄມ້ຜຸພັງ , ກະດູກປິ່ນ ເມື່ອປະສົມກັນໃຫ້ເຂົ້າດີແລ້ວໃຫ້ເອົາດິນຊັ້ນເທິງລົງກ່ອນສ່ວນກອງດິນ ຊັ້ນລຸ່ມເອົາລົງຕາມຫລັງ ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວຈະສັງເກດເຫັນດິນໃນຂຸມປູກສູງກ່ວາບໍລິເວນຮອບໆ ຂຸມເລັກນ້ອຍແລະ ປ່ອຍຖິ້ມໄວ້ຈົນດິນຍຸບຕົວດີເສຍກ່ອນຈຶ່ງຄ່ອຍປູກໄດ້ .

2. **ການປູກໃນເນື້ອທີ່ສູງ :** ການປູກໃນເນື້ອທີ່ແບບນີ້ ອາດຈະປູກພືດຊະນິດ ອື່ນໄປກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກຕາມຫລັງ, ນິຍົມປູກກ້ວຍເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນກ້ວຍເປັນຮົ່ມໃຫ້ແກ່ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກໃຫຍ່ແລ້ວກໍ່ເອົາກ້ວຍອອກ.

4.2 ລະບົບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

4.2.1 ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດລະບົບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການຈັດລະບົບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີຄວາມສຳຄັນ ດັ່ງນີ້ :

1. ສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນສວນ ເຊັ່ນ : ການໄຖ, ການ ຄາດ, ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການໃຫ້ນ້ຳ ຕະຫລອດຮອດການເກັບກ່ຽວຕ່າງ ໆ.

2. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ເພາະວ່າບໍ່ມີການຍາດ ແຍ່ງນ້ຳ, ທາດອາຫານ ອາກາດ ແລະ ແສງແດດ .

3. ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສວຍງາມດີ

4. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໝີ

5. ປະຢັດເວລາ, ແຮງງານ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນການປະຕິບັດງານ.

4.2.2 ການວາງລະບົບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ລະບົບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີຢູ່ດ້ວຍກັນ 5 ແບບດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ:

1. ແບບສີ່ຫລ່ຽມຈະຕຸລັດແບບນີ້ມີໄລຍະປຸກທີ່ເທົ່າກັນທຸກດ້ານເຊັ່ນ : 4 x 4 ແມັດ, 6 x 6 ແມັດ ແລະ 8 x 8 ແມັດ ເປັນຕົ້ນ .
2. ແບບສີ່ຫລ່ຽມຍາວ : ແບບນີ້ມີໄລຍະປຸກບໍ່ເທົ່າກັນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ຈະໜ້ອຍກ່ວາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ ເຊັ່ນ : 4 x 6 ແມັດ , 6 x 8 ແມັດ, 8 x 10 ແມັດ ເປັນຕົ້ນ.
3. ແບບສີ່ຫລ່ຽມຊ້ອນ : ເປັນການປຸກແບບ ສີ່ຫລ່ຽມຈະຕຸລັດ ແຕ່ເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນຂຶ້ນອີກທີ່ຈຸດຕັດກັນ, ສາມາດປຸກໄມ້ອື່ນແຊມໄດ້ອີກ, ມີຈຳນວນຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ການປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ສະດວກ .
4. ແບບສາມຫລ່ຽມ ຫລືຫົກຫລ່ຽມດ້ານເທົ່າ : ຄືຈະປະກອບເປັນ 3 ຫລ່ຽມດ້ານເທົ່າ 6 ຮູບໃນ 6 ຫລ່ຽມ ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ເທົ່າກັນທຸກດ້ານ, ບໍ່ສະດວກໃນການປະຕິບັດງານ .
5. ແບບຕາມແນວລະດັບ:ເປັນການປຸກໃນເນື້ອທີ່ໆ ມີຄວາມສູງຊັນ, ມີການປັບລະດັບຂອງເນື້ອທີ່ໃຫ້ເປັນຂັ້ນໄດ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການຟັງທະລາຍຂອງດິນ.

4.3 ການຄິດໄລ່ຈຳນວນຕົ້ນຕໍເນື້ອທີ່

4.3.1 ສູດການຄິດໄລ່ເພື່ອຫາຈຳນວນຕົ້ນຕໍເນື້ອທີ່

$$\text{ຈຳນວນຕົ້ນທີ່ຈະປຸກ} = \frac{\text{ເນື້ອທີ່ປຸກ}}{\text{ໄລຍະປຸກ}}$$

ເຊັ່ນໃນເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່ (1.600 ຕາແມັດ) ຕ້ອງການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ 6 ແມັດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 6 ແມັດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກມາປຸກເທົ່າໃດ ?

$$\text{ອີງຕາມສູດ : ຈຳນວນຕົ້ນທີ່ຈະປຸກ} = \frac{1 \text{ ໄລ່} \times 1.600 \text{ ຕາແມັດ}}{6 \text{ (ໄລຍະຕົ້ນ)} \times 6 \text{ (ໄລຍະແຖວ)}} = 44 \text{ ຕົ້ນ}$$

ຈາກຕົວຢ່າງ ເປັນເນື້ອທີ່ ໆ ປຸກຕົວຈິງ ໂດຍບໍ່ລວມທັງເນື້ອທີ່ໆ ຕ້ອງເວັ້ນຮອບໜານປຸກ ແລະ ອື່ນໆອີກດ້ວຍ .

ຕາຕະລາງທີ 1. ໄລຍະປູກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໄມ້ໃຫ້ໝາກທົ່ວໄປ

ລ/ດ	ຊື່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ	ໄລຍະຫ່າງ (ແມັດ)	ລ/ດ	ຊື່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ	ໄລຍະຫ່າງ (ແມັດ)
1.	ກ້ວຍ :		11.	ໝາກມ່ວງ:	
	- ປູກຕົ້ນດຸ່ງວ	2-3		- ໄລຍະທົ່ວໄປ	10-12
	- ປູກເປັນສຸມ	4-6		- ໄລຍະໃກ້	2,5-4
2.	ໝາກນ້ຳ	8-10	12.	ໝາກຫຸ່ງ	2-3
3.	ພິລາ	3	13.	ມັງຄຸດ	10
4.	ໝາກຂຽບ :		14.	ລຳໄຍ	10-12
	- ຂຽບຝ້າຍ	3	15.	ລີ້ນຈີ່	8-12
	- ຂຽບພັນ	5-6	16.	ລີ້ມຂຽວຫວານ	4-6
5.	ສີດາ	4-6	17.	ໝາກຕ້ອງ	10-12
6.	ໝາກທັນ	6	18.	ໝາກນັດ	0,75
7.	ໝາກຂາມ	10-14	19.	ອະນຸນ	2-3
8.	ໝາກນາວ	4-6	20.	ລີ້ມໂອ (ໝາກພຸກ)	8
9.	ໝາກພ້າວ :		21.	ອາໂວກາໂດ	10-12
	- ຊະນິດເຕ້ຍ	5	22.	ທຸລຽນ	6-8
	- ຊະນິດກາງ	6	23.	ເງາະ	10-14
	- ຊະນິດໃຫຍ່	8			
10.	ສະຕໍເບີຣີ	0,3 - 0,5			

ໄລຍະປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກດັ່ງກ່າວເປັນໄລຍະປູກທົ່ວໄປສາມາດດັດແປງໄປຈາກນີ້ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ສະພາບຂອງດິນປູກ.

4.4 ການປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອກັນລົມ

4.4.1 ຄວາມສຳຄັນຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອກັນລົມ

ໄມ້ກັນລົມເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນອີກຢ່າງໜຶ່ງໃນການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ໂລ່ງແລະມີລົມພັດຜ່ານເປັນປະຈຳ ເນື່ອງຈາກລົມມີຜົນເສຍຫາຍປະການ ເຊັ່ນ :

1. ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໂຄ່ນ ຫລືຫັກຈົກຂາດ, ໃບລົ່ນ, ຕົ້ນ ແລະ ຮາກຄອນມີຜົນກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ .

2. ເຮັດໃຫ້ການປະສົມເກສອນຂອງຕົ້ນໄມ້ ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊັ່ນ : ເຮັດໃຫ້ເກສອນປົວໄປຕາມລົມໝົດ ຫລືເຮັດໃຫ້ພວກແມງໄມ້ທີ່ຊ່ວຍປະສົມເກສອນ ປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ໄດ້ ດີ ເຮັດໃຫ້ການຕິດໝາກບໍ່ດີ.

3. ເຮັດໃຫ້ດອກ ແລະ ໝາກລົ້ນຫລາຍຜົນຜະລິດຫລຸດລົງ

4. ເຮັດໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍໄປຈາກດິນຢ່າງໄວມີຜົນເຮັດໃຫ້ພືດຂາດນ້ຳ ຫລືຕ້ອງໄດ້ຫົດນ້ຳຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ລົມທີ່ພັດຜ່ານຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດລຸດລົງອີກດ້ວຍ .

4.4.2 ຕົ້ນໄມ້ທີ່ນິຍົມປຸກເພື່ອກັນລົມ

ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອເປັນຕົ້ນໄມ້ກັນລົມ ຄວນມີລັກສະນະ ຄື :

1. ເປັນຕົ້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພວກໄມ້ໃບລົ້ນ ຄືມີສີຂຽວຕະຫລອດປີເພື່ອໃຫ້ສາມາດປ້ອງກັນລົມໄດ້ທຸກລະດູການ.

2. ເປັນຕົ້ນທີ່ມີລະບົບຮາກ ຫລືມີລະບົບຮາກທີ່ແຂງແຮງ, ສ່ວນກົງ ແລະ ລຳຕົ້ນມີລັກສະນະໜຽວ ແລະ ບໍ່ຈົກຫັກງ່າຍ .

3. ມີຄວາມສູງພຽງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຄື ມີຄວາມສູງກ່ວາຕົ້ນໄມ້ທີ່ປຸກໄວ້ .

4. ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກງ່າຍ ,ໃຫຍ່ໄວ, ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ .

5. ສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ເຊັ່ນ:ໃຫ້ກົງ,ລຳຕົ້ນ, ໜໍ່ ຫລືສ່ວນຕ່າງໆ ເປັນອາຫານແລະ ອື່ນໆໄດ້ດ້ວຍ .

ພວກໄມ້ທີ່ນິຍົມປຸກ ເປັນໄມ້ກັນລົມ ໄດ້ແກ່ :ສິນ, ກັນຖິນຍັກ, ຢູ່ຄາລິບຕັດ, ໄຜ່ຊະນິດຕ່າງ ໆ ເປັນຕົ້ນ . ການປຸກໄມ້ກັນລົມ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍລັກສະນະ ເຊັ່ນ : ຖ້າເນື້ອທີ່ບໍ່ກ້ວາງຂວາງ ອາດຈະປຸກອ້ອມຮອບເນື້ອທີ່, ສ່ວນເນື້ອທີ່ກ້ວາງ ຄວນປຸກເປັນແຖວຫ່າງກັນພໍສົມຄວນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ຂໍ້ສຳຄັນ ຄື :ແຖວຂອງພວກໄມ້ກັນລົມ ຄວນຂວາງທິດທາງຂອງລົມຢູ່ສະເໝີ .

4.5 ການໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນ

4.5.1 ຂໍ້ຕິຂອງການໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນ

ການໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນໃນໝານປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຂໍ້ຕິຫລາຍປະການຄື :

1. ສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ, ປ້ອງກັນການລະເຫີຍນ້ຳຈາກດິນຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດຂອງຫຍ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີຖ້າຄຸມໜາພຽງພໍ.

2. ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ຄຸມດິນນັ້ນ ເມື່ອລະລາຍຕົວກໍ່ກາຍເປັນຝຸ່ນອິນຊີໃຫ້ແກ່ດິນປູກ ເຮັດໃຫ້ດິນປູກມີ ຄວາມພຸ່ງຮູ້ ສາມາດດູດນ້ຳໄວ້ໄດ້ ແລະ ຍັງເພີ່ມທາດອາຫານໃຫ້ແກ່ດິນອີກ ດ້ວຍ .

4.5.2 ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ຄຸມດິນ

ວັດຖຸທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການຄຸມດິນ ມີຄື: ແກບ, ເພືອງ, ຫຍ້າແຫ້ງ, ໃບໄມ້ລົ່ນ, ຕົ້ນສາ ລີ ແລະ ອື່ນ ໆທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

4.6. ການປູກພືດຄຸມດິນ

4.6.1 ປະໂຫຍດຂອງພືດຄຸມດິນ

ການປູກພືດຄຸມດິນໃນໝານປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກມີປະໂຫຍດຫລາຍປະການຄື :

1. ພືດຄຸມດິນສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ທາດອາຫານແກ່ດິນປູກ ໂດຍພືດຄຸມດິນນັ້ນຈະໃຊ້ພວກພືດຕະກູນຖົ່ວເປັນຫລັກ.
2. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຊະລ້າງໜ້າດິນ
3. ຊ່ວຍປ້ອງກັນວັດຊະພືດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການປູກພືດຄຸມດິນກໍ່ສ້າງບັນຫາແກ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກເຊັ່ນກັນ ໃນເວລາປະຕິບັດງານໃນສ່ວນເນື່ອງຈາກຄວາມຮີກເຮື້ອລຸງລັງຂອງພືດທີ່ປູກເປັນພືດຄຸມດິນ. ພືດຄຸມດິນທີ່ນິຍົມປູກ ຄວນເປັນພວກພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ເຕີບໂຕໄວແຜ່ຄຸມເນື້ອທີ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ປູກງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງດູແລຮັກສາຍາກ ເຊັ່ນ : ຖົ່ວລາຍເປັນຕົ້ນ ຈະປູກພຽງຊະນິດດຽວ ຫລືຫລາຍຊະນິດກໍ່ໄດ້.

ບົດທົດສະດີທີ 5

ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍວິທີການຄັດເລືອກຕົ້ນພັນເພື່ອນຳແກ່ນມາກ້າ
2. ອະທິບາຍວິທີການເລືອກໝາກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບນຳມາກ້າ
3. ອະທິບາຍວິທີການເລືອກແກ່ນທີ່ດີເພື່ອນຳມາກ້າ
4. ອະທິບາຍວິທີການກ້າແກ່ນໄດ້ຖືກຕ້ອງ
5. ບອກຫລັກ ແລະ ວິທີການໂທມກິ່ງ
6. ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການຕິດຕາ
7. ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນຂອງການທາບກິ່ງ

ເນື້ອໃນ

5.1 ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ

ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການນຳແກ່ນມາກ້ານັ້ນ ຈະປະຕິບັດຢູ່ 2 ກໍລະນີດ້ວຍກັນຄື :

1. ການກ້າແກ່ນເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົ້ນຕໍໃນການຂະຫຍາຍພັນແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ໃນການຕິດຕາ, ການທາບກິ່ງ . . . ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍ ໃນການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກທົ່ວໆໄປ ເພາະວ່າມີຂໍ້ດີຫລາຍປະການ ເຊັ່ນ : ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກ ຕົ້ນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຈະໃຫ້ໝາກໄວ ຖືກຕ້ອງຕາມພັນເດີມເປັນຕົ້ນ.

2. ການກ້າແກ່ນເພື່ອນຳໄປປູກໂດຍກົງ ແຕ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດບໍ່ນິຍົມຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີນີ້ ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ເສຍຫລາຍປະການ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີໄມ້ໃຫ້ໝາກອີກຫລາຍຊະນິດກໍ່ຍັງໃຊ້ວິທີການນີ້ຢູ່ເນື່ອງຈາກວິທີອື່ນຍັງບໍ່ເໝາະສົມ ຫລືຕ້ອງລົງທຶນສູງເກີນໄປ .

5.1.1 ການຄັດເລືອກຕົ້ນພັນເພື່ອນຳມັດມາກ້າ

1. ເລືອກຕົ້ນທີ່ເຄີຍໃຫ້ໝາກມາແລ້ວແລະໃຫ້ໝາກດີກສະໝໍ່າສະເໝີ, ໝາກມີຄຸນນະພາບເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ, ຄວນເປັນຕົ້ນທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສົມບູນແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດແມງໄມ້ລົບກວນ.

2. ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຈະນຳແກ່ນໄປປູກໂດຍກົງ ແລະ ເປັນພວກທີ່ປະສົມເກສອນຂ້າມຕົ້ນ ຂ້າມດອກ ຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນເລື່ອງການປະສົມເກສອນດ້ວຍ ເພາະຈະເຮັດ

ໃຫ້ຕົ້ນທີ່ໄດ້ນັ້ນກາຍພັນໄດ້ ເຊິ່ງຕົ້ນທີ່ກາຍພັນໄປນັ້ນອາດມີລັກສະນະດີກ່ວາຕົ້ນພັນເດີມ ຫລືມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ດີກ່ວາຕົ້ນແມ່ກໍໄດ້ .

5.1.2 ການເລືອກໝາກທີ່ຈະນຳໄປກຳ

ເມື່ອເລືອກຕົ້ນໄດ້ຕາມຕ້ອງການແລ້ວໃຫ້ເລືອກລັກສະນະຂອງໝາກກ່ອນນຳໄປກຳດັ່ງນີ້ :

1. ເລືອກສະເພາະໝາກທີ່ສົມບູນ, ຮູບຊົງໝາກສວຍງາມ ຖືກຕ້ອງຕາມພັນ, ໝາກມີຂະໜາດປານກາງຄືບໍ່ໃຫຍ່ ຫລື ນ້ອຍເກີນໄປ .
2. ເປັນໝາກທີ່ແກ່ດີ ຫລືສຸກຄາຕົ້ນ, ຖ້າໝາກບໍ່ແກ່ດີ ຈະກຳບໍ່ອອກ ຫລືຖ້າອອກ ກໍຈະໄດ້ຕົ້ນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສົມບູນແຂງແຮງດີ .
3. ເປັນໝາກທີ່ບໍ່ມີແມງໄມ້ລົບກວນໂດຍສະເພາະແມງໄມ້ທີ່ເຈາະເຂົ້າໄປໃນໝາກໃນເມັດ .

5.1.3 ການເລືອກແກ່ນທີ່ຈະນຳໄປກຳ

ເມື່ອເລືອກໝາກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ກໍມີການຄັດເລືອກເລືອກແກ່ນອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແກ່ນທີ່ດີໄປກຳ ແກ່ນທີ່ດີຄວນມີລັກສະນະ ຄື :

1. ມີຄວາມສົມບູນ ເນື້ອເມັດບໍ່ເປັນແປ້ວ ບໍ່ລົບ, ຫລືເປັນຮູບຊົງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ເປັນແກ່ນທີ່ບໍ່ແຕກຫັກ .
2. ເປັນແກ່ນທີ່ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນ ເຊັ່ນ : ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍກັດ ແຫ້ນຂອງແກ່ນ ສ່ວນພະຍາດທີ່ຕິດມາກັບເມັດນັ້ນບາງຄັ້ງຈະສັງເກດເຫັນຍາກ ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈຄວນກຳຈັດພະຍາດໂດຍການແຊ່ແກ່ນໃນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດເສຍກ່ອນຈຶ່ງນຳໄປກຳ.

5.1.4 ການກຳແກ່ນ

ເມື່ອຄັດເລືອກແກ່ນໄດ້ແລ້ວ ກ່ອນກຳແກ່ນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

1. ທຳຄວາມສະອາດແກ່ນ ໂດຍການລ້າງເອົາເນື້ອ ຫລືເມືອກທີ່ຕິດມາກັບແກ່ນອອກໃຫ້ໝົດ .
2. ພວກແກ່ນທີ່ມີປືອກແຂງ ແລະ ໜາຈົນນ້ຳ ແລະ ອາກາດເຂົ້າໄປໃນເມັດໄດ້ຍາກ ເຮັດໃຫ້ແຕກງອກຊ້າ ຄວນຊ່ວຍໃຫ້ເມັດແຕກງອກໄດ້ໄວຂຶ້ນໂດຍການປະຕິບັດບາງຢ່າງແກ່ແກ່ນ ຄື : ແກ່ນໝາກມ່ວງໃຫ້ຕັດປາຍເມັດ ຫລືແກະເອົາເປືອກຫຸ້ມແກ່ນອອກໝົດ, ແກ່ນໝາກທັນຄວນທູບໃຫ້ເປືອກແຕກເສຍກ່ອນ, ສ່ວນໝາກພ້າວຄວນປາດເປືອກດ້ານຂຶ້ນອອກ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ .
3. ການເກັບຮັກສາແກ່ນໄມ້ໃຫ້ໝາກສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອທຳຄວາມສະອາດແກ່ນແລ້ວຄວນນຳໄປກຳໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກແກ່ນທີ່ມີອາຍຸສັ້ນບໍ່ສາມາດເກັບໄວ້ດົນໄດ້ຖ້າປະໄວ

ດົນກໍ່ຈະແຕກງອກເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ຫລືບໍ່ແຕກງອກເລີຍຫລືບາງຄັ້ງຖ້າແຕກງອກ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງ .

ຕາຕະລາງ 2. ສະແດງຄວາມເໝາະສົມໃນການເກາດເມັດ ແລະ ເວລາໃນການງອກຂອງເມັດ

ຊະນິດໄມ້ໃຫ້ໝາກ	ບໍ່ຄວນເກັບໄວ້ເກີນ (ມື້)	ເມັດແຕກງອກຫລັງກ້າ (ມື້)
ໝາກມີ້	3	10 - 15
ທຸລຽນ	5	20
ໝາກຜາງ, ລາງສາດ	7	10 - 15
ມັງຄຸດ	3	30
ລຳໄຍ, ລີ້ນຈີ່	1 - 2	15
ເງາະ	5	15
ໝາກກຽງ	5	20
ໝາກໄມ້ຕະກູນລີ້ມຕ່າງ ໆ	30	10 - 20
ໝາກຂຽບ	2 - 3 ເດືອນ	15 - 20
ໝາກມ່ວງ (ບໍ່ແກະເປືອກຫຸ້ມ)	7	20
ໝາກມ່ວງ (ແກະເປືອກອອກ)	1 - 2	10
ໝາກຫຸ່ງ (ເມັດສິດ)	1 - 3	10
ໝາກຫຸ່ງ (ເມັດແຫ້ງ)	2 - 3 ເດືອນ	10

4. ການກ້າແກ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍລັກສະນະດັ່ງນີ້ :

- ການກ້າແກ່ນເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົ້ນຕົ້ນໃນການທາບກິ່ງ : ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມີແກ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີອາຫານສຳຮອງຫລາຍ ເຊັ່ນ : ໝາກມ່ວງ, ທຸລຽນ ຈະກ້າແກ່ນໃນວັດຖຸທີ່ໃຊ້ສຳລັບປັກຂຳກ່ອນ ເຊັ່ນ : ຊາຍຫຍາຍ ປະສົມຂີ້ເທົ່າແກບຊະນິດລະ 1 ສ່ວນ ຫລືກ້າໃນດິນທີ່ຜຸພູຍກໍ່ໄດ້ເມື່ອແກ່ນງອກຈົນໃບຊຸດທຳອິດແກ່ແລ້ວຈຶ່ງຖອນຕົ້ນກ້າມາບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງໃສ່ກາບພ້າວທີ່ແຊ່ນຈຳແລະທັບມຸ່ນລະອຽດດີແລ້ວນັ້ນໃຫ້ເຕັມຖົງ, ມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນກໍ່ສາມາດນຳໄປທາບກິ່ງໄດ້ . ສ່ວນແກ່ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ອາຫານສຳຮອງມີໜ້ອຍຈະກ້າໃນພາຊະນະບັນຈຸດິນປູກ ຈົນກະທັ້ງຕົ້ນເຕີບໂຕໄດ້ຂະໜາດກໍ່ສາມາດນຳໄປທາບກິ່ງໄດ້ .

- ການກ້າແກ່ນເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາ : ວິທີນີ້ຈະກ້າແກ່ນ ໃນພາຊະນະທີ່ບັນຈຸດິນປູກ ຈົນກະທັ້ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍຈຶ່ງຕິດຕາ ແລະ ເມື່ອຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການຕິດຕານັ້ນເຕີບໂຕພຽງພໍແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປປູກ ວິທີນີ້ຈະສະດວກໃນການປະຕິບັດ .

- ການກ້າແກ່ນໃນພາຊະນະ ເພື່ອນຳຕົ້ນໄປປູກໂດຍກົງຄ້າຍກັບວິທີທີ່ 2 ຄືເມື່ອຕົ້ນກ້າເຕີບໂຕໄດ້ຂະໜາດກໍ່ນຳໄປປູກ ບໍ່ມີການຕິດຕາ ຫລືປ່ຽນຍອດໃໝ່ ເປັນການສະດວກ ກ່ວາການກ້າແກ່ນໃນໝານປູກໂດຍກົງ .

- ການກ້າແກ່ນໃນພາຊະນະ ເພື່ອນຳຕົ້ນໄປປູກໂດຍກົງ : ອາດຈະເພື່ອການຕິດຕາ ຫລືປ່ຽນຍອດໃນພາຍຫລັງເພື່ອການປູກເລີຍກໍ່ໄດ້ ວິທີການກ້າແກ່ນໃນໝານປູກໂດຍກົງຈະມີຂໍ້ດີທີ່ບໍ່ຕ້ອງຊຸດຍ້າຍກ້າເລື້ອຍໆ ລະບົບຮາກຈຶ່ງບໍ່ ກະທົບກະເທືອນເໝືອນວິທີອື່ນໆ.

5.2 ການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ໃຊ້ເພດ

5.2.1 ການໂທມກຶ່ງ

ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການໂທມກຶ່ງນິຍົມໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງພໍຈະແບ່ງອອກໄດ້ຈຳພວກທີ່ໂທມແລ້ວອອກຮາກງ່າຍ ເຊັ່ນ : ໝາກນາວ, ລີ້ມໂອ, ອະງຸ່ນ, ໝາກກຽງ, ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນພວກທີ່ໂທມແລ້ວອອກຮາກຍາກ ຫລືຂ້ອນຂ້າງຍາກ ໄດ້ແກ່ : ມັງຄຸດ, ຖົ່ວລຽນ, ລະມຸດ ເປັນຕົ້ນ.

1. ຫລັກ ແລະ ວິທີການໂທມກຶ່ງ :

- ລະດູທີ່ເໝາະສົມໃນການໂທມກຶ່ງ : ຄວນເປັນລະດູທີ່ຕົ້ນໄມ້ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ ຄືປະມານ ກາງລະດູຝົນ ເຖິງປາຍລະດູຝົນ ຈະເຮັດໃຫ້ກຶ່ງອອກຮາກງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ອອກຮາກຍາກ ສ່ວນພວກທີ່ອອກຮາກງ່າຍອາດຈະໂທມນອກລະດູຝົນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນໂທມໃນລະດູໜາວເຊິ່ງເປັນລະດູທີ່ກຶ່ງໂທມອອກຮາກໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ .

- ການເລືອກຕົ້ນທີ່ຈະໂທມ : ເປັນຕົ້ນທີ່ໃຫ້ໝາກແລ້ວໝາກມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສຳຄັນອີກປະການໜຶ່ງຄືອາຍຸຂອງຕົ້ນບໍ່ຄວນເລືອກຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸຫລາຍເພາະຈະອອກຮາກໄດ້ຍາກກ່ວາຕົ້ນອ່ອນ

- **ການເລືອກກຶ່ງໂທມ** : ຄວນເປັນກຶ່ງທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ, ກຶ່ງອວບສົມບູນດີ, ກຶ່ງມີລັກສະນະກົມບໍ່ບົດບັ້ງວ, ຂະໜາດຂອງກຶ່ງພໍດີບໍ່ໃຫຍ່ ຫລືນ້ອຍເກີນໄປ, ກຶ່ງບໍ່ຍາວເກີນໄປ ແລະບໍ່ມີພະຍາດແມງທຳລາຍເປັນກຶ່ງທີ່ບໍ່ອ່ອນຫລືແກ່ເກີນໄປເຊິ່ງສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການລອງແກະເບື້ອກອອກເບິ່ງ ຖ້າເບື້ອກບໍ່ລ່ອນອອກມາໂດຍງ່າຍ ສະແດງວ່າກຳລັງພໍດີເໝາະ ຖ້າກຶ່ງອ່ອນຫລືແກ່ເກີນໄປເບື້ອກຈະບໍ່ລ່ອນອອກໄດ້ງ່າຍໆ ຄວນເປັນກຶ່ງທີ່ຕັ້ງຊື່ຫລືງຽງໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະກຶ່ງພວກນີ້ເມື່ອໂທມແລ້ວຈະອອກຮາກງ່າຍ ແລະໄດ້ຮາກທີ່ສົມບູນແຂງແຮງກ່ວາກຶ່ງທີ່ຂະໜານກັບພື້ນ ຫລືກຶ່ງທີ່ປາຍເດ່ລົງລຸ່ມບໍ່ຄວນໂທມ ເພາະຈະອອກຮາກໄດ້ຍາກ.

2. ການໃຊ້ສານຮໍໂມນເຂົ້າໃນການໂທມກຶ່ງ :

ການໃຊ້ສານຮໍໂມນຊ່ວຍໃນການອອກຮາກຂອງກຶ່ງອາດໃຊ້ສານຮໍໂມນຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ອອກຮາກໄວຂຶ້ນ ພວກສານຮໍໂມນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໄດ້ແກ່ : ໃຊ້ N A A ຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນ 10.000 - 15.000 ພິພິເອັມ ໃຊ້ກັບມັງຄຸດ,

ໃຊ້ 16.000 ພິພິເອັມ ໃຊ້ກັບໝາກມ່ວງ, ໃຊ້ 7.500 - 10.000 ພິພິເອັມ ໃຊ້ກັບໝາກລະມຸດ, ໃຊ້ 7.500 - 12.000 ພິພິເອັມ ກັບໝາກມ້, ໃຊ້ 7.500 - 10.000 ພິພິເອັມ ກັບໝາກທຸລຽນ ເປັນຕົ້ນ .

3. ວິທີການໂທມກິ່ງ :

- ໃຊ້ມີດປາດເປັນຮອຍ 2 ຮອຍ ຫ່າງກັນເທົ່າກັບຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນຮອບວົງຂອງກິ່ງແລ້ວ ລອກ ເອົາເປືອກອອກໃຫ້ໝົດ .
- ໃຊ້ມີດຂູດເນື້ອເຍື່ອຈະເລີນອອກໃຫ້ໝົດ
- ໃຊ້ປາຍມີດຂີດທີ່ເປືອກຊື່ຮອຍປາດດ້ານເທິງ 1 - 4 ຮອຍອ້ອມກິ່ງ .
- ທາດ້ວຍສານຮໍໂມນທີ່ຮອຍປາດດ້ານເທິງ ແລະຮອຍແຜທີ່ປາດ
- ຫຸ້ມກິ່ງດ້ວຍກາບພ້າວທີ່ແຊ່ນຖີ້ ແລະ ຟັກມຸ່ນດີແລ້ວນັ້ນ ແລ້ວຫໍ່ດ້ວຍຜ້າຢາງ, ມັດຫົວ ແລະ ທ້າຍໃຫ້ແໜ້ນ .

4. ການຕັດກິ່ງໂທມ :

- ຄວນຖ້າໃຫ້ກິ່ງນັ້ນອອກຮາກດີເສຍກ່ອນ ແລະ ຮາກຊຸດທຳອິດນັ້ນແຕກເປັນຮາກແໜງເປັນຈຳນວນຫລາຍແລ້ວຈຶ່ງຕັດໄດ້ .
- ເມື່ອຕັດແລ້ວ ຄວນສັງເກດເບິ່ງຈຳນວນໃບ ແລະ ຮາກໃຫ້ສົມດູນກັນຖ້າມີໃບມີກິ່ງຫລາຍເກີນໄປໃຫ້ຕັດອອກເລັກນ້ອຍ ເພາະຖ້າໃບຫລາຍເກີນໄປຈະຄາຍນ້ຳຫລາຍ .
- ກິ່ງທີ່ຕັດອອກມານັ້ນ ຍັງບໍ່ຄວນນຳໄປປູກທັນທີຄວນນຳໄປຊຳໄວ້ຈົນກ່ວາຈະແຂງແຮງ ຕົ້ນຕັ້ງຕົວດີແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປປູກ ຖ້າປູກເລີຍກິ່ງອາດຈະຕາຍໄດ້ງ່າຍ .

5.2.2 ການຕິດຕາ

ການຕິດຕາ ເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ສຳຄັນອີກວິທີໜຶ່ງ ເປັນວິທີທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ. ການຕິດຕາໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນການຕິດຕາເທິງຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການກຳເນີດເຊິ່ງປູກໃນໝານແລ້ວ ຫລືໃນພາຊະນະກໍຕາມສ່ວນການຕິດຕາໃນລັກສະນະອື່ນໆກໍມີເຊັ່ນ : ການຕິດຕາໃນຕົ້ນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ແລ້ວເພື່ອຕ້ອງການຈະປ່ຽນຍອດພັນເກົ່າໃຫ້ເປັນຍອດພັນໃໝ່ ຫລືເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນດຽວມີຫລາຍແນວພັນ .

1. ວິທີການຕິດຕາ

- ການຕິດຕາແບບຕົວທີ (T- budding) ເປັນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຕະກູນສົ້ມ, ໝາກມ່ວງ ເປັນຕົ້ນ .
- ການຕິດຕາແບບເພລດ : ເປັນວິທີການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຕົ້ນຕໍທີ່ມີເປືອກໜາ ຫລືຕົ້ນຕໍທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີວິທີການປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

ຫລັງຈາກຕິດຕາແລ້ວປະມານ 7 - 10 ມື້ ໃຫ້ກວດເບິ່ງແຜ່ນຕາ ຖ້າຍັງຂຽວຢູ່ສະແດງວ່າການຕິດຕານັ້ນໄດ້ຜິນ ໃຫ້ແກະແຜ່ນຕາອອກ ແລ້ວຈຶ່ງພັນເຂົ້າໄປໃໝ່ໂດຍເວັ້ນແຜ່ນຕາ

ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຕານັ້ນສາມາດຈະເລີນອອກມາໄດ້ ຈາກນັ້ນໃຫ້ບາກກິ່ງເໜືອຮອຍຕິດຕາ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ຕາເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ ເມື່ອກິ່ງໃໝ່ແຂງແຮງດີແລ້ວກໍ່ຕັດຍອດຕົ້ນຕໍເດີມອອກ .

5.2.3 ການທາບກິ່ງ

1. ວິທີການທາບກິ່ງ : ການທາບກິ່ງ ເປັນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈະເໝືອນເດີມໃຫ້ໝາກໄວ ແລະ ຍັງມີຮາກແກ້ວທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນຕໍອີກດ້ວຍ ວິທີການຂະຫຍາຍພັນແບບນີ້ ມີ 2 ວິທີ ຄື :

- ການທາບແບບຕັດຕົ້ນຕໍອອກ : ວິທີນີ້ນິຍົມກັນໃນການຂະຫຍາຍພັນທຸລຸນ, ໝາກມ່ວງ ເປັນຕົ້ນ .

- ການທາບກິ່ງແບບປະກົບ : ວິທີນີ້ຈະບໍ່ຕັດຍອດຕົ້ນຕໍອອກ ແຕ່ຈະປາດທີ່ຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍອດພັນໃຫ້ຮອຍທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນແລ້ວປະກົບປາກບາດທັງສອງເຂົ້າກັນ ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແທ້ໆເມື່ອຕິດດີແລ້ວຈຶ່ງຕັດອອກຈາກກັນ. ວິທີນີ້ເໝາະສົມກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມີເມັດຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ສາມາດນຳຕົ້ນກ້າມາທາບກິ່ງແບບວິທີທຳອິດໄດ້ ເພາະຕົ້ນກ້າມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງປະໃຫ້ຕົ້ນກ້າໃຫຍ່ຈົນມີຂະໜາດທີ່ພໍຈະນຳມາທາບກິ່ງໄດ້ເສຍກ່ອນ .

2. ການຕັດກິ່ງທາບ : ມີວິທີການປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

- ຄວນໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອເຊື່ອມປະສານຕິດກັນດີກ່ອນ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 40-50 ວັນ ຫລັງທາບ ຖ້າຕັດໄວເກີນໄປກິ່ງທີ່ຕັດມານັ້ນຈະຕາຍ ຫລືຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ .

- ສັງເກດຈຳນວນໃບ ແລະ ຮາກໃຫ້ສົມດູນກັນ ຖ້າມີໃບຫລາຍເກີນໄປໃຫ້ຕັດໃບຕັດກິ່ງອອກ ເນື່ອງຈາກຮາກມີໜ້ອຍບໍ່ສາມາດດູດນ້ຳມາລ້ຽງຕົ້ນໃຫ້ພຽງພໍໄດ້ .

- ແຜ່ນຢາງທີ່ພັນໄວ້ນັ້ນ ບໍ່ຄວນແກະອອກເທື່ອຄວນປ່ອຍໃຫ້ເປື້ອຍໄປເອງ ຫລືປະໄວ້ໄລຍະໃດໜຶ່ງຈຶ່ງຕັດອອກ .

ກິ່ງທາບທີ່ຕັດອອກມານັ້ນຢ່າຟ້າວເອົາໄປປູກເລີຍເທື່ອ ຄວນປູກໃນພາຊະນະບັນຈຸດິນຈົນກະທັ້ງຕົ້ນຕັ້ງຕົວດີແລ້ວ ຈຶ່ງນຳໄປປູກໄດ້ .

ວິທີການທາບກິ່ງດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະໃຊ້ເພື່ອການຂະຫຍາຍພັນແລ້ວ ຍັງສາມາດດັດແປງວິທີການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປະໂຫຍດຫລາຍດ້ານດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ :

- ການເສີມຮາກ : ເປັນການນຳເອົາວິທີການທາບກິ່ງມາດັດແປງໃຊ້ກັບ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ປູກໄປແລ້ວມີລະບົບຮາກຫລາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍຄຳຕົ້ນບໍ່ໃຫ້ໂຄ່ນລົ້ມງ່າຍ ຫລືຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບຮາກຂອງຕົ້ນເດີມຖືກທຳລາຍເສຍຫາຍເປັນຕົ້ນ. ວິທີການເສີມຮາກສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການປູກຕົ້ນຕໍໄວ້ໃກ້ກັບຕົ້ນເດີມແລ້ວ ໂນ້ມປາຍເຂົ້າໄປປະກົບກັບຕົ້ນເດີມດ້ວຍວິທີການຂອງການທາບກິ່ງດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ .

- ການປ່ຽນຍອດ : ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນຍອດສ່ວນຂອງຕົ້ນພັນເດີມ ໃຫ້ເປັນພັນອື່ນ ຫລືປ່ຽນຍອດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຫລາຍພັນໃນຕົ້ນດຽວກັນ .

3. ການຕຽມຕົ້ນຕໍ : ໃນການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີການທາບກິ່ງ ແລະ ຕິດ ຕານັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລະບົບຮາກ ຫລືສ່ວນລຸ່ມຂອງຕົ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພັນດີ ນັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສ່ວນກິ່ງ, ໃບ, ຕົ້ນ ຫລືສ່ວນເທິງທັງສອງນີ້ຈະຕ້ອງຢູ່ດ້ວຍກັນຕະຫລອດໄປ ໂດຍ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕ່າງໆໃນພາຍຫລັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ຈະນຳຕົ້ນຕໍມາໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍ ພັນຈຶ່ງຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ .

ບົດທົດສະດີທີ 6

ການບົວລະບັດຮັກສາສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ບອກວິທີການໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
2. ບອກວິທີການຕັດແຕ່ງກິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ
3. ອະທິບາຍວິທີການໃຫ້ຝຸນແກ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
4. ບອກວິທີການໃຫ້ຮັໂມນແກ່ພືດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ .
5. ອະທິບາຍເຖິງການປ້ອງກັນກຳຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ມັກທຳລາຍໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້.

ເນື້ອໃນ

6.1 ການໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

6.1.1 ຄວາມສຳຄັນຂອງການໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຜູ້ປຸກຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈວິທີການໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ແບບຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງມີໄສຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແຕ່ລະພັນຈຶ່ງຈະສາມາດໃຫ້ນ້ຳແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ການໃຫ້ນ້ຳບໍ່ຖືກຕາມວິທີ ລວມທັງການເກີດຜົນຜິດລະດູການ ຫລືການປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຂາດນ້ຳໃນຊ່ວງທີ່ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງການນ້ຳ ຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫລາຍປະການກ່າວຄື :

1. ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ອອກດອກ ຕິດໝາກຕະຫລອດປີ ເຊັ່ນ : ໝາກຫຸ່ງ, ສີດາ, ກ້ວຍ. ຫາກເກີດການຂາດນ້ຳການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຈະຊະຽກໃຫ້ດອກໜ້ອຍ , ດອກລົ້ນ,ຕິດໝາກໜ້ອຍ ແລະ ໝາກມີຂະໜາດນ້ອຍຄຸນນະພາບຂອງໝາກບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານ .

2. ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ອອກດອກເປັນລະດູ : ຊ່ວງການໃຫ້ນ້ຳ ລວມທັງປະລິມານນ້ຳທີ່ໃຫ້ຈະສຳຄັນຫລາຍ ຕົ້ນໄມ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບນ້ຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມດັ່ງນີ້ :

- ຊ່ວງທີ່ຕົ້ນຢູ່ໃນຢູ່ໃນໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕທາງກິ່ງ ແລະ ໃບຊ່ວງນີ້ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍ ແຕ່ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ລະດູຝົນພໍດີ ການໃຫ້ນ້ຳຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຝົນຖີ້ມຊ່ວງເປັນເວລາເທິງນານກໍຄວນໃຫ້ນ້ຳ ເພື່ອຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນສະຽກການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫລືຊຸດໂຊມເກີນໄປ ເຊິ່ງຈະມີຜົນຕໍ່ການອອກດອກຕິດໝາກ .

- ຊ່ວງທີ່ຕົ້ນຕຽມຕົວອອກດອກ : ຊ່ວງນີ້ຈະຕ້ອງການນ້ຳໜ້ອຍ ຫລືບໍ່ຕ້ອງການຫົດນ້ຳເລີຍປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນສະສົມອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະອອກດອກ ຖ້າໄດ້ຮັບນ້ຳຫລາຍໃນໄລຍະນີ້ຫລືເກີດມີຜົນຕົກໜັກຈະເຮັດໃຫ້ແຕກໃບອ່ອນແທນການອອກດອກ ແລະ ປີນນີ້ຈະບໍ່ອອກດອກເລີຍ ເພາະໃບແກ່ນນ້ຳບໍ່ທັນ ອາການເປັນເຊັ່ນນີ້ຈະພົບເຫັນກັບລຳໂຍ, ລິ້ນຈີ້, ໝາກມ່ວງເປັນຕົ້ນ ສຳລັບເງາະ, ທຸລຽນ, ມັງຄຸດ ນັ້ນກໍ່ຕ້ອງການຊ່ວງແລ້ງ ດິນແຫ້ງ ເພື່ອຕຽມຕົວອອກດອກເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນບາງປີອາກາດແຫ້ງແລ້ງເກີນໄປ ຫລືຊ່ວງແລ້ງຍາວນານເນື່ອງຈາກຝົນຕົກຊ້າກ່ວາປົກກະຕິກໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ນ້ຳຊ່ວຍເລັກນ້ອຍ ຖ້າໃຫ້ນ້ຳຫລາຍເກີນໄປກໍ່ຈະແຕກຍອດໃໝ່ເຊັ່ນດຽວກັນ .

- ຊ່ວງແຫງຊ່ອກປະສົມເກສອນ ແລະ ຕິດໝາກອ່ອນເປັນຊ່ວງທີ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຖ້າຂາດນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ ດອກຈະລົ້ນ, ໝາກອ່ອນຈະລົ້ນ ຫລືບໍ່ຕິດໝາກເລີຍ, ການໃຫ້ນ້ຳໃນຊ່ວງນີ້ ຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ຄືໃຫ້ນ້ຳເທື່ອລະນ້ອຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຖ້າໃຫ້ຫລາຍໂລດຈະເຮັດໃຫ້ດອກທີ່ປະສົມເກສອນແລ້ວ ຫລືໝາກທີ່ຕິດໃໝ່ ໆ ລົ້ນໄດ້ງ່າຍ.

- ຊ່ວງທີ່ໝາກກຳລັງພັດທະນາຈົນເຖິງໄລຍະພັດທະນາເຕັມທີ່ : ເປັນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງການນ້ຳຫລາຍ ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊ່ວງແລ້ງ ຈຶ່ງມີບັນຫາເລື່ອງນີ້ຫລາຍ ຕ້ອງມີນ້ຳຢ່າງພຽງພໍການຕິດໝາກ, ການພັດທະນາໝາກຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ສ່ວນໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ໝາກຈະພັດທະນາໃນຊ່ວງທີ່ເຂົາລະດູຝົນແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາ ໃນການໃຫ້ນ້ຳ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງເລື່ອງຝົນຖີ່ມຊ່ວງດິນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຂາດນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ໝາກລົ້ນ ໝາກມີຂະໜາດນ້ອຍ.

3. ພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ອອກດອກໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ : ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດຖ້າປ່ອຍໃຫ້ເຕີບໂຕໄປຕາມປົກກະຕິຈະອອກດອກໜ້ອຍ ຫລືອອກດອກຫຍອຍກັນໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນການຫຍຸ້ງຍາກຮັກສາ ກໍ່ໃຊ້ວິທີການບັງຄັບໃຫ້ອອກດອກຈຳນວນຫລາຍໆພ້ອມກັນ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ວິທີການງົດການໃຫ້ນ້ຳແລະການໃຫ້ນ້ຳຮ່ວມກັບການຕັດແຕ່ງກິ່ງກໍ່ຈະສາມາດບັງຄັບໃຫ້ອອກດອກໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະສາມາດຄິດໄລ່ເວລາການໃຫ້ໝາກຜະລິດອອກສູ່ຕະຫລາດ ໃນຊ່ວງທີ່ມີລາຄາແພງໄດ້ເຊັ່ນ :

- ພວກຕະກູນລື້ມ : ຈະໃຊ້ວິທີບັງຄັບຕົ້ນໃຫ້ອອກດອກພ້ອມໆກັນ ໂດຍການງົດການໃຫ້ນ້ຳຫລືລະບາຍນ້ຳອອກຈາກຮ່ອງສວນໃຫ້ໝົດ ປ່ອຍໃຫ້ດິນແຫ້ງໃຫ້ຕົ້ນອິດນຳຈົນໃບແຫວ່ ຈຶ່ງໃຫ້ນ້ຳໃໝ່ 'ຕົ້ນລື້ມກໍ່ຈະແຕກໃບອ່ອນ ແລະ ເກີດດອກອອກໝາກຕໍ່ໄປ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ນ້ຳເປັນປົກກະຕິ ຈົນໝາກໃກ້ຈະແກ່ຈຶ່ງງົດການໃຫ້ນ້ຳອີກເພື່ອໃຫ້ໝາກມີຄຸນນະພາບດີ

- ນອກຈາກພວກລື້ມແລ້ວ ຍັງໃຊ້ວິທີນີ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ : ໝາກທັນ, ໝາກຂຽບ ເປັນຕົ້ນ.

6.1.2 ວິທີການໃຫ້ນ້ຳໃນແກ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

1. ການໃຫ້ນ້ຳໃນການປຸກແບບຍົກຮ່ອງ : ສຳລັບການປຸກແບບຍົກຮ່ອງເຊິ່ງມີນ້ຳຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ອາດຈະໃຊ້ວິທີກົກທົດ ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນໄມ້ຍັງນ້ອຍຢູ່ ເມື່ອຕົ້ນໃຫຍ່ແລ້ວນິຍົມວິທີການໃຊ້ເຮືອຫົດນ້ຳພົ້ນຂຶ້ນມາໝານປຸກ . ສຳລັບການໃຫ້ນ້ຳແບບເນື້ອທີ່ສູງ ຈະມີວິທີການໃຫ້ນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເຊິ່ງແຕ່ລະວິທີຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍຕະຫລອດຈົນຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ນ້ຳດ້ວຍສະເໝີ ແລ້ວເລືອກໃຊ້ວິທີທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເປັນການປະຢັດວິທີການໃຫ້ນ້ຳແບບນີ້ມີຄື :

- ການໃຫ້ນ້ຳໂດຍປ່ອຍນ້ຳໄປຕາມຮ່ອງນ້ອຍໆລະຫວ່າງແຖວປູກ ຕັ້ງແຕ່ຫົວໜານເຖິງຫ້າຍໜານໃນທິດທາງດຽວກັນ. ວິທີນີ້ເໝາະສົມ ສຳລັບປ່ອຍນ້ຳທີ່ມີນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຫລາຍ ແລະ ເນື້ອທີ່ມີຄວາມຊັນໜ້ອຍ ຫລືປັບເນື້ອທີ່ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໄຫລຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີບໍ່ຂັງເປັນຈຸດໆ .

- ການໃຫ້ນ້ຳແບບອ້ອມຮອບຕົ້ນ : ຄ້າຍກັບວິທີທຳອິດ ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຮ່ອງສົ່ງນ້ຳທີ່ຊື່ ກໍ່ມາດັດແປງເປັນວລີງຮອບຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄດ້ຮັບນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີກ່ວາ .

- ການໃຫ້ນ້ຳດ້ວຍສາຍຢາງ : ເຊິ່ງເປັນການໃຫ້ນ້ຳໂດຍຕໍ່ມາຈາກເຄື່ອງສູບນ້ຳ ຫລືລົດ ວິທີນີ້ຈະເປື້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເສຍແຮງງານຫລາຍ ແຕ່ອາດຈຳເປັນສຳລັບບາງແຫ່ງທີ່ມີເນື້ອທີ່ສູງຕ່ຳປ່ອຍສະໝໍ່າສະເໝີກັນ .

- ການໃຫ້ນ້ຳແບບຢອດ ຫລືແບບປະຢັດ : ໂດຍການວາງທີ່ສົ່ງນ້ຳໄປຕາມແຖວປູກ ແລ້ວມີທີ່ຂະໜາດນ້ອຍຕໍ່ຈາກທີ່ສົ່ງນ້ຳ ໄປສູ່ແຕ່ລະຕົ້ນເປັນຈຸດໆ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ນ້ຳຈະຄ່ອຍໄຫລ ຫລືຢອດອອກມາເທື່ອລະໜ້ອຍຈາກທີ່ນ້ອຍເທື່ອລະຢອດຕະຫລອດເວລາ. ການໃຫ້ນ້ຳແບບນີ້ປະຢັດນ້ຳ, ແຮງງານແຕ່ຕ້ອງລົງທຶນສູງ ເພາະມີອຸປະກອນຫລາຍຢ່າງ .

- ການໃຫ້ນ້ຳດ້ວຍຫົວຊີດພົ້ນນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍຫລືແບບສະປຶງເກີ: ໂດຍຕິດຕັ້ງສະປຶງເກີນ້ອຍໆໄວ້ຕາມໂຄ້ນຕົ້ນ ເມື່ອປ່ອຍນ້ຳຫົວສະປຶງເກີກໍ່ຈະພົ້ນນ້ຳກະຈາຍອອກໄປຮອບ ຕົ້ນ .

6.2 ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ

6.2.1 ຈຸດປະສົງຂອງການຕັດແຕ່ງກິ່ງ

ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ ຄືການຕັດເອົາກິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກ ການຕັດແຕ່ງຈຶ່ງຕ້ອງສຶກສາ ເຖິງນິໄສຂອງຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດເປັນຢ່າງດີເສຍກ່ອນ ເພາະໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດຕັດແຕ່ງກິ່ງ ອອກບໍ່ໄດ້ຫລາຍ ບາງຢ່າງກໍ່ຕັດອອກໄດ້ຫລາຍ . ການຕັດແຕ່ງກິ່ງມີຈຸດປະສົງຄື :

1. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊົງພຸ່ມທີ່ເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ການສົດ ພົ້ນຢາ, ການໄຖ, ການຄາດ, ການເກັບໝາກ . ການຕັດແຕ່ງ ໃນລັກສະນະນີ້ ຈະຕ້ອງເຮັດຕັ້ງແຕ່ ຕົ້ນຍັງນ້ອຍຢູ່ ຈົນກະທັ້ງໄດ້ຮູບຊົງທີ່ຕ້ອງການ .

2. ການຕັດແຕ່ງເພື່ອ ສ້າງຄວາມສົມບູນແຂງແຮງໃຫ້ກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຕົ້ນ ໄມ້ໃຫ້ໝາກນັ້ນ ຖ້າປ່ອຍປະຈະເລີນຕາມທຳມະຊາດນັ້ນ ກໍ່ຈະແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງກິ່ງສ່ວນໜຶ່ງຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຄືບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຖ້າປ່ອຍປະໄວ້ກໍ່ສິ້ນເບື້ອງອາຫານ ໄປລ້ຽງກິ່ງພວກນີ້ ຈຶ່ງຄວນຕັດແຕ່ງອອກໃຫ້ເຫລືອແຕ່ກິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ. ກິ່ງທີ່ຕ້ອງຕັດ ອອກຄື : ກິ່ງທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ , ກິ່ງທີ່ອ່ອນແອ, ກິ່ງຄົດງໍ, ກິ່ງໃນພຸ່ມທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກແດດ, ກິ່ງທີ່ເປັນພະ ຍາດ ຫລື ແມງໄມ້ລົບກວນ, ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ຈະເປັນການຕັດແຕ່ງແບບນ້ອຍໆ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດ ເລື້ອຍໆ ແຕ່ຕົ້ນຍັງນ້ອຍຢູ່ຈົນເຖິງໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງເຮັດທຸກໆ ປີ.

3. ການຕັດແຕ່ງເພື່ອໃຫ້ອອກດອກ : ໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດຖ້າບໍ່ຕັດແຕ່ງ ຈະບໍ່ອອກດອກຫລືອອກໜ້ອຍຈົນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ. ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຕ້ອງອາໄສການຕັດແຕ່ງເພື່ອໃຫ້ອອກ ດອກໄດ້ແກ່ : ໝາກທັນ, ໝາກຂຽບ, ສີດາ ເຊິ່ງອາດຈະຕັດແຕ່ງພຽງເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ : ຕັດແຕ່ງ ກິ່ງທີ່ໃຫ້ໝາກແລ້ວ ຫລືອາດຈະຕັດແຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ເຫລືອແຕ່ຕໍ່ ຫລືໂຄນກິ່ງໃຫຍ່ໆໄວ້ເພື່ອໃຫ້ ແຕກກິ່ງໃໝ່. ການຕັດແຕ່ງເພື່ອໃຫ້ອອກດອກນີ້ ຍັງໝາຍລວມເຖິງການຕັດແຕ່ງ ເພື່ອໃຫ້ອອກ ດອກທຸກໆປີດ້ວຍເພາະໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ : ໝາກມ່ວງ, ລຳໄຍ, ລີ້ນຈີ່ ... ມີນິໄສ ອອກດອກເວັ້ນປີ ຖ້າປີໃດອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກປີຖັດໄປ ຈະບໍ່ອອກດອກ ຫລືອອກໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກອາຫານສະສົມໃນຕົ້ນບໍ່ພຽງພໍການຕັດແຕ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງການຕັດແຕ່ງເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ຕິດໝາກຫລາຍເກີນໄປ ໃຫ້ມີປະລິມານການຜະລິດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍລຸດ ບັນຫາການອອກດອກເວັ້ນປີ .

4. ການຕັດແຕ່ງເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ການ ຕັດແຕ່ງໃນລັກສະນະນີ້ອາດຕັດແຕ່ງເລັກໆນ້ອຍໆ ເອົາສ່ວນທີ່ເປັນພະຍາດ ຫລືແມງໄມ້ທຳລາຍ ອອກ ຫລືອາດຕັດແຕ່ງຈຳນວນໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຊົງພຸ່ມປອດໂປ່ງເປັນການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ ພະຍາດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ : ພະຍາດຮາກເໝົາ ເປັນຕົ້ນ.

6.2.2 ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການຕັດແຕ່ງກິ່ງ

ກ່ອນການຕັດແຕ່ງກິ່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຄວນຄຳນຶງເຖິງສິ່ງດັ່ງນີ້ :

1. ຕ້ອງຮູ້ນິໄສຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ຈະທຳການຕັດແຕ່ງກິ່ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ໄມ້ ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ສາມາດທຳການຕັດແຕ່ງໄດ້ຫລາຍ ແຕ່ບາງຊະນິດບໍ່ສາມາດຕັດແຕ່ງໄດ້

ຫລາຍ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດອອກດອກຕິດໝາກທີ່ຍອດແລະບາງຊະນິດກໍ່ອອກດອກຕິດໝາກທີ່ກົງແກ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕັດຈຶ່ງບໍ່ເໝືອນກັນ.

2. ຕ້ອງຕັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບລະດູການເຊັ່ນ : ໝາກມ່ວງ,ລິ້ນຈີ່,ລຳໄຍ, ເງາະຕ່າງໆຈະຕັດແຕ່ງກົງເມື່ອເກັບຜົນຜະລິດແລ້ວ ຄືເປັນການບຳລຸງຕົ້ນໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ ໂດຍການພວນດີນ, ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຫິດນ້ຳໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນສະສົມອາຫານໄວ້ໃນຕົ້ນໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະໄດ້ອອກດອກໃຫ້ໝາກໃນປີຕໍ່ໄປ ແຕ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດກໍ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນສະສົມອາຫານໄປເລື້ອຍໆກ່ອນເມື່ອເຖິງລະດູການອອກດອກ ຈຶ່ງຈະຕັດແຕ່ງກົງເພື່ອໃຫ້ແຕກຍອດແຕກໃບໃໝ່ ແລະ ອອກດອກ ເຊັ່ນ : ອະງຸ່ນ, ໝາກຂຽບ, ໝາກທັນ .

3. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຕັດແຕ່ງກົງຕ້ອງເໝາະສົມ ເຊັ່ນ : ພວກກົງທີ່ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງບໍ່ເກີນເຄິ່ງນິ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ມີດສຳລັບຕັດແຕ່ງກົງຕັດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເປັນກົງໃຫຍ່ກ່ວານີ້ຄວນໃຊ້ເລື້ອຍຕັດ. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຕ້ອງສະອາດ, ການຕັດກົງຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ຊັ້ນມຫລາຍ.

4. ການຕັດແຕ່ງກົງ ຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ກົງທີ່ເຫລືອໄວ້ ກະຈາຍຢູ່ຮອບໆ ຕົ້ນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນອອກດອກ, ໝາກກະຈາຍທົ່ວຕົ້ນ, ຕົ້ນຈະໄດ້ຮັບອາຫານເທົ່າກັນເຮັດໃຫ້ໝາກມີຄຸນນະພາບດີ .

5. ການຮັກສາຮອຍທີ່ຕັດແຕ່ງ ການຕັດກົງໃຫຍ່ຫລັງຈາກຕັດແລ້ວຄວນທາຮອຍແຜດ້ວຍປູນແດງ ຫລືຢາທາບາດແຜກົງໄມ້ຢ່າປະໄວ້ເພາະພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ບາງຢ່າງຈະເຂົ້າທຳລາຍທາງຮອຍແຜໄດ້ .

6.2.3 ວິທີການຕັດແຕ່ງກົງ

ການຕັດແຕ່ງກົງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີວິທີການ ດັ່ງນີ້ :

1. ກົງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຕ້ອງການຕັດສ່ວນປາຍອອກ (ລວມທັງການຕັດຊໍ່ໝາກ) ໃຫ້ຕັດຫ່າງຈາກຕາທີ່ເຫລືອໄວ້ພໍສົມຄວນ ຄືບໍ່ຫ່າງຕາເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກົງແຫ້ງຕາຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ຄວນຕັດໃກ້ຕາເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕາທີ່ເຫລືອນັ້ນກະທົບກະເທືອນເກີນໄປຫລື ແຕກເປັນກົງໃໝ່ທີ່ມີລັກສະນະບໍ່ແຂງແຮງຈົກຂາດງ່າຍ. ສຳລັບຮອຍທີ່ຕັດນັ້ນ ຄວນໃຫ້ຕັ້ງສາກກັບກົງສະເໝີ ຢ່າຕັດເຈັ້ຍເພາະບາດແຜຈະກ້ວາງ ແລະ ນານດີ .

2. ກົງແໜງທີ່ຕ້ອງການຕັດອອກ ໃຫ້ຕັດຕິດກັບກົງໃຫຍ່ສະເໝີ ຢ່າໃຫ້ເຫລືອດ້ານກົກຂອງກົງໄວ້ເພາະຈະແຕກກົງໃໝ່ຈະເສຍເວລາຕັດໃໝ່.

3. ການຕັດກົງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ຈົກຂາດໂດຍຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ທີ່ກົງດ້ານລຸ່ມກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕັດກົງໃຫ້ຂາດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຕັດກົງໃຫ້ສັ້ນລົງຕາມທີ່ຕ້ອງການ .

6.2.4 ລະບົບການຕັດແຕ່ງກົງໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ແບ່ງເປັນ 3 ລະບົບດ້ວຍກັນ ຄື :

1. ການຕັດແຕ່ງແບບຊົງປີຣາມິດ : ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ຈະເໝາະກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ມີຊົງພຸ່ມສູງ ເຊັ່ນ : ທຸລຽນ, ໝາກມີ້, ໝາກມ່ວງ ໂດຍຈະຈົ່ງຍອດກາງໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ແລ້ວເລືອກກິ່ງໃຫຍ່ໆ ທີ່ແຕກອອກມາຈາກລຳຕົ້ນໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍແຕ່ລະກິ່ງນັ້ນຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງວຽນຮອບຕົ້ນ ຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງໂດຍໃຫ້ທັບຊ້ອນກັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ , ຂໍ້ດີຂອງຊົງນີ້ຄືມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ, ມີເນື້ອທີ່ອອກດອກຫລາຍ ແຕ່ມີຂໍ້ເສຍ ເຊັ່ນ : ໃບລຸ່ມ ໆ ຈະໄດ້ຮັບແສງແດດໜ້ອຍ ແລະ ຊົງຕົ້ນທີ່ສູງອາດເກັບໝາກຍາກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາລຳບາກ .

2. ການຕັດແຕ່ງແບບຕັດຍອດກາງອອກ (ຊົງໂຖດອກໄມ້) ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ ບໍ່ຄ່ອຍເໝາະສົມກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດຮ້ອນ ມີວິທີການຕັດແຕ່ງຄື : ຈະປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນສູງໄປໄລຍະໜຶ່ງ ເມື່ອສູງເທົ່າທີ່ຕ້ອງການກໍ່ຕັດຍອດກາງອອກ ແລ້ວເລືອກກິ່ງໃຫຍ່ໆ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ຮອຍຕັດໄວ້ປະມານ 3 - 4 ກິ່ງ ໃຫ້ກະຈາຍຢູ່ຮອບຕົ້ນນອກນັ້ນຕັດອອກໝົດ.ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ມີຜົນດີຄືໄດ້ຊົງພຸ່ມຕຳ, ເຮັດໃຫ້ການກະຈາຍຂອງດອກແລະໝາກສະໝໍ່າສະເໝີດີ, ໄດ້ຮັບແສງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ໝາກມີຄຸນນະພາບດີ ແຕ່ມີຂໍ້ເສຍຢູ່ບ່ອນວ່າ ເນື້ອທີ່ ໆ ອອກດອກແລະຕິດໝາກໜ້ອຍລົງ ແລະ ໂຄງສ້າງແບບນີ້ຈະບໍ່ແຂງແຮງ ຈົກຫັກໄດ້ງ່າຍ .

3. ການຕັດແຕ່ງແບບຊົງປີຣາມິດກາຍ : ເປັນແບບທີ່ປະສົມປະສານທັງແບບທີ່ 1 ແລະ ທີ່ 2 ເຂົ້າກັນ ເຮັດໃຫ້ຊົງຕົ້ນບໍ່ສູງຫລືຕ່ຳເກີນໄປ, ໄດ້ໂຄງສ້າງຂອງຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງມີເນື້ອທີ່ອອກດອກຫລາຍໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ການບົວລະບັດຮັກສາງ່າຍແຕ່ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຊຳນານພິສິດຄວນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍກ່ວາຈະໄດ້ຮູບຊົງ. ການຕັດແຕ່ງຊົງນີ້ ໃຊ້ໄດ້ດີກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ : ໝາກມ່ວງ, ພວກລື້ມ, ທຸລຽນບາງພັນ, ໝາກມີ້, ໝາກຂຽບ ເປັນຕົ້ນ .

6.3 ຝຸ່ນ ແລະ ການໃຫ້ຝຸ່ນແກ່ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ຝຸ່ນທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຢູ່ 2 ພວກໃຫຍ່ດ້ວຍກັນເຊັ່ນ : ຝຸ່ນອິນຊີ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ .

6.3.1 ຝຸ່ນອິນຊີ

ໄດ້ແກ່ : ຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກການສະລາຍຕົວເໝົາເປື້ອຍພຸ້ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນພືດສິດ ຕະຫລອດຈົນເສດພືດ ແລະ ສັດ ໃນລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ເສດເຫລືອຂອງພວກຖົ່ວ, ກະດູກປ່າແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເມື່ອສະລາຍຕົວເໝົາເປື້ອຍ ກໍ່ຈະກາຍເປັນອິນຊີວັດຖຸ ໃນດິນ .

1. ປະໂຫຍດຂອງຝຸ່ນອິນຊີແລະອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ : ມີປະໂຫຍດຕໍ່ດິນປູກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ດັ່ງນີ້ :

- ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຜຸພູ່ຍສາມາດອູ້ມນ້ຳ ແລະ ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຊ່ວຍໃນການທ່າຍເທອາກາດໃນດິນ ເຮັດໃຫ້ຮາກພືດເຕີບໂຕແຂງແຮງ .

- ອິນຊີວັດຖູໃນດິນ ເປັນຕົວດູດຊັບຜຸ່ນເຄມີ ຫລືທາດອາຫານທີ່ໃສ່ລົງໄປໃນດິນ ແລະ ປົດປ່ອຍອອກມາໃຫ້ພືດໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເຮັດໃຫ້ຜຸ່ນເກີດປະໂຫຍດເຕັມທີ່ .

- ອິນຊີວັດຖູ ຊ່ວຍລູດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດມາຈາກການປ່ຽນແປງປະຕິກິລິຍາຂອງດິນກ່າວຄື ຖ້າດິນມີອິນຊີວັດຖູໃນດິນຢ່າງພຽງພໍ ປະຕິກິລິຍາຕ່າງ ໆ ໃນດິນ ເຊັ່ນ : ຄວາມເປັນກົດ - ດ່າງໃນດິນຈະບໍ່ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ພືດໄດ້ .

- ອິນຊີວັດຖູໃນດິນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທາດອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນດິນ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພືດຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະມີທາດອາຫານຢູ່ແລ້ວຕາມທຳມະຊາດ ແຕ່ຖ້າດິນນັ້ນມີສະພາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມພວກທາດອາຫານຕ່າງໆ ຈະຖືກດິນຈັບຍຶດໄວ້ ເຮັດໃຫ້ພືດນຳໄປໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເກີດການຂາດທາດອາຫານໄດ້ .

- ຊ່ວຍເພີ່ມທາດອາຫານໃຫ້ແກ່ດິນຜຸ່ນອິນຊີນັ້ນ ຈະມີທາດອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພືດຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອໃສ່ຜຸ່ນອິນຊີກໍ່ເທົ່າກັບໃສ່ທາດອາຫານໃຫ້ແກ່ດິນປູກດ້ວຍໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຄືພວກທາດອາຫານສຳຮອງເຊິ່ງພືດຈະຂາດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງການໃນປະລິມານໜ້ອຍ ພວກຜຸ່ນອິນຊີຈະມີທາດອາຫານສຳຮອງຢ່າງພຽງພໍ ການໃສ່ຜຸ່ນອິນຊີ ເພື່ອບຳລຸງດິນປູກເປັນປະຈຳນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພືດບໍ່ຂາດທາດອາຫານສຳຮອງ .

2. ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ຜຸ່ນອິນຊີ

- ຜຸ່ນອິນຊີທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ ຄວນເປັນຜຸ່ນທີ່ສະລາຍຕົວດີແລ້ວ ຫລືສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆວ່າຄືບໍ່ເຫັນສະພາບຂອງເດີມນັ້ນເອງ .

- ບໍ່ຄວນໃສ່ຜຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ດິນປູກເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດິນປູກຍິ່ງຂຶ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາກພືດ ຫລືເຮັດໃຫ້ພະຍາດໃນດິນບາງຊະນິດລະບາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ .

6.3.2 ຜຸ່ນເຄມີ

ຜຸ່ນເຄມີທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີຄື :

1. ຜຸ່ນດຽວ : ໝາຍເຖິງ ຜຸ່ນທີ່ມີທາດອາຫານຫລັກພຽງທາດດຽວ ຫລືສອງທາດ ເຊັ່ນ : ຜຸ່ນຢູເລຍ ທີ່ທາດໄນໂຕຣເຈນ 40 - 45 ເປີເຊັນ, ຜຸ່ນແອມໂມນຽມຊັນເຟດ ມີທາດໄນໂຕຣເຈນ 20 ເປີເຊັນ, ຜຸ່ນຊຸບເປີຟອສເຟດ ມີທາດຟອສຟັຣັດ (P_2O_5) 18 - 20 ເປີເຊັນ ເປັນຕົ້ນ . ພວກຜຸ່ນດຽວຈະໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນກໍລະນີເຊັ່ນ :

- ໃນກໍລະນີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຕ້ອງການທາດອາຫານພຽງທາດດຽວ ເຊັ່ນ : ການໃສ່ຜຸ່ນຊຸບເປີຟອສເຟດ ຮອງກັນຊຸມປູກເພື່ອການເລັ່ງຮາກ ຫລືການໃສ່ຜຸ່ນຢູເລຍ ຫລັງຈາກປູກໃໝ່ໆ ເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນ ຫລືການໃສ່ຜຸ່ນໂປແຕັສຊຽມຊັລເຟດ ໃນຂະນະທີ່ໝາກໃກ້ຈະແກ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໝາກມີຄຸນນະພາບດີ ເປັນຕົ້ນ .

- ປົກກະຕິທາດໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ທາດໂປແຕັສຊຽມ ເປັນທາດທີ່ສູນເສຍໄປຈາກດິນໄດ້ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃສ່ຜຸນພວກນີ້ຈຶ່ງໃສ່ເທື່ອລະໜ້ອຍແຕ່ໃສ່ຫລາຍຄັ້ງ .

- ໃນກໍລະນີທີ່ຊື້ຜຸນສູດທີ່ຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຫາຊື້ຜຸນດຸ່ງວມາແທນກັນໄດ້ ຫລືຊື້ມາປະສົມໃຫ້ເປັນສູດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ .

2. ຜຸນປະສົມ : ໝາຍເຖິງຜຸນທີ່ປະສົມກັນມາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ຜຸນປະສົມມີສູດຕ່າງໆກັນອອກໄປຈະມີທາດຫຼັກພຽງ 2 ທາດ ເຊັ່ນ : ສູດ16-20-00 ຫລືມີຄືບ 3 ທາດ ເຊັ່ນ : ສູດ 15-15-15 ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກມີທາດອາຫານຫລັກ 3 ໂຕທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ ຍັງມີບາງສູດຈະມີທາດອາຫານສຳຮອງຢູ່ດ້ວຍ ເຊັ່ນ : ສູດ 5-10-5-2 (Mn) ເຊິ່ງ Mn ນັ້ນໝາຍເຖິງທາດແມງກາກນິສ ເຊິ່ງມີຢູ່ຮ້ອຍກິໂລກຣາມ ຂອງຈຳນວນຜຸນດັ່ງກ່າວ ຈະມີທາດແມງກາກນິສ 2 ກິໂລກຣາມຢູ່ໃນນັ້ນເອງ .

3. ຜຸນນຳ້ ຫລືຜຸນທາງໃບ : ເປັນຜຸນທີ່ລະລາຍນຳ້ໄດ້ດີເປັນຜຸນທີ່ສຳເລັດຮູບສາມາດປະສົມນຳ້ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ເມື່ອຊົດພົ້ນໄປທີ່ໃບພືດ ໃບພືດກໍ່ຈະດູດເອົາທາດອາຫານໄປໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ໄວກ່ວາການໃຫ້ທາງຮາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜຸນນຳ້ ຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ ແລະ ຫລາຍກໍລະນີດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ໃນການບຳລຸງຕົ້ນ, ໃບ, ກິ່ງ ໝາກ ໃຫ້ສົມບູນ. ນອກນີ້ ຍັງໃຊ້ແກ້ໄຂອາການຂາດທາດອາຫານຂອງພືດອີກດ້ວຍ ຫລືໃນກໍລະນີຕ້ອງການເພີ່ມທາດອາຫານບາງຢ່າງໃຫ້ແກ່ຕົ້ນພືດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພວກຜຸນທາງໃບ ກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນຜຸນທາງດິນໄດ້ຕະຫລອດໄປ ເພາະພືດຍັງອາໄສທາດອາຫານຕ່າງ ໆ ໃນດິນເປັນຫລັກ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຜຸນທາງໃບຈະມີລາຄາແພງກ່ວາຜຸນທາງດິນອີກດ້ວຍ ຄວນໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ .

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຫ້ຜຸນທາງໃບ :

- ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳທີ່ຂຽນໄວ້ໃນສະຫລາກບັນຈຸ ຢ່າໃຊ້ເກີນຂະໜາດທີ່ບັນຈຸໄວ້.

- ການໃຊ້ຜຸນທາງໃບ ທີ່ໄດ້ຜິດຕ້ອງສົດພົ້ນໃຫ້ຖືກທາງ ດ້ານໃຕ້ໃບສະເໝີ ເພາະພືດຈະດູດອາຫານ ໂດຍຜ່ານປາກໃບ.

- ຄວນໃຊ້ຢ່າຈັບໃບປະສົມລົງໄປດ້ວຍສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຜຸນຈັບໃບໄດ້ດີຢັ້ງຢືນ.

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ເລື້ອຍໆ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ເພາະນອກຈາກຈະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລ້ວ ຍັງເກີດຜົນເສຍແກ່ຕົ້ນພືດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

6.3.3 ທາດອາຫານ

ທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ພືດມີຢູ່ນຳ້ກັນທັງໝົດ 16 ທາດ ແຕ່ມີຢູ່ 3 ທາດທີ່ພືດສາມາດຫາໄດ້ຈາກອາກາດ ແລະ ນຳ້ ພືດຈຶ່ງບໍ່ຂາດແຄນທາດພວກນີ້ ອີກ 13 ທາດທີ່ເຫລືອພືດ

ໄດ້ຈາກດິນ ແລະ ຝຸ່ນທີ່ໃສ່ໃຫ້ .

ສຳລັບທາດອາຫານທີ່ພືດຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ໃນຈຳນວນຫລາຍມີຢູ່ 3 ທາດ ຄື : ໄນໂຕຣເຈນ, ຟອສຟໍຣັດ ແລະ ໂປແຕສຊຽມ, ທາດດັ່ງກ່າວນີ້ດິນຈະມີບໍ່ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະດິນທີ່ໃຊ້ປຸກພືດມາເທິງນານແລ້ວສ່ວນທາດອາຫານທີ່ເຫລືອນັ້ນ ຈັດເປັນທາດອາຫານສຳຮອງ ຄືມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບພືດເຊັ່ນດຽວກັບພວກທຳອິດ ແຕ່ຕົ້ນພືດຈະໃຊ້ໜ້ອຍກ່ວາ ແລະ ດິນປຸກທີ່ໄປຈະມີທາດເຫລົ່ານີ້ຢູ່ພຽງພໍແລ້ວ ນອກຈາກດິນປຸກນັ້ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ : ດິນເປັນກົດຫລືດ່າງເກີນໄປ ຕົ້ນໄມ້ຈະສະແດງອາການຂາດທາດພວກນີ້ ພວກທາດອາຫານທີ່ພົບວ່າເປັນບັນຫາໃນການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ແກ່ : ທາດເຫລັກ, ສັງກະສີ, ແມກນີຊຽມ, ແມງກາມິສ ແລະ ແຄລຊຽມ ເປັນຕົ້ນ . ທາດອາຫານຕ່າງໆ ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພືດ ດັ່ງນີ້ :

1. ທາດໄນໂຕຣເຈນ : ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທົ່ວໄປ, ການສ້າງກົງ, ໃບ, ດອກ ແລະ ໝາກ ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງສ່ວນທີ່ເປັນສີຂຽວຂອງພືດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າພືດຂາດທາດໄນໂຕຣເຈນ ຈະສະແດງອາການໃບເຫລືອງຊືດ, ບໍ່ສົດໃສ, ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ໃບລົ່ນ, ຕົ້ນສະຫງົບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ດອກໝາກລົ່ນກ່ອນກຳນົດ. ແຕ່ຖ້າພືດໄດ້ຮັບໄນໂຕຣເຈນຫລາຍເກີນໄປກໍສະແດງອາການຄືມີໃບຫລາຍເກີນໄປ, ໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກົງກຳນົດມີຫລາຍ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງອ່ອນແອຕໍ່ພະຍາດໄດ້ງ່າຍ. ປົກກະຕິຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຈະຕ້ອງການທາດໄນໂຕຣເຈນສູງທຸກຊ່ວງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຕ່ກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ໄດ້ຮັບຫລາຍເກີນໄປໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ກ່ອນຈະອອກດອກ .

2. ທາດຟອສຟໍຣັດ : ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນຫລາຍປະການດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຕີບໂຕຂອງຮາກ ເມື່ອຮາກສົມບູນແຂງແຮງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນສົມບູນແຂງແຮງໄປດ້ວຍ ຈຶ່ງນິຍົມໃສ່ຮອງກັນຊຸມປຸກ ຫລືປະສົມດິນປຸກ ຖ້າພືດຖ້າພືດຂາດທາດຟໍສຳຮອງຈະເຕີບໂຕຊ້າ, ຜົນຜະລິດລຸດລົງ, ອອກອອກດອກຕິດໝາກໜ້ອຍ, ເມັດລົບ ການປ່ຽນແປງເປັນນ້ຳຕານຈະຊ້າ ເຮັດໃຫ້ໝາກສຸກຊ້າ ໝາກສຸກບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຄຸນນະພາບຂອງໝາກຫລຸດລົງ. ທາດຟອສຟໍຣັດ ນອກຈາກຈະໃຫ້ໃນຮູບຂອງຝຸ່ນເຄມີແລ້ວພວກກະດູກປົ່ນ, ເຂົ້າສັດປົ່ນ, ແລະ ເລືອດແຫ້ງ ກໍມີທາດພວກນີ້ຢູ່ຫລາຍ.

3. ທາດໂປແຕສຊຽມ : ຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຂງແຮງແກ່ຕົ້ນພືດ ສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ແກ່ເນື້ອໄມ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນແຂງແຮງ ບໍ່ຈົກຫັກງ່າຍ ຊ່ວຍສ້າງເນື້ອຂອງໝາກ ຊ່ວຍໃນການສ້າງອາຫານຂອງລູກຕົ້ນຕະຫລອດຈົນການຄ້ອນຍ້າຍທາດອາຫານພາຍໃນຕົ້ນເຮັດໃຫ້ໝາກມີຄຸນນະພາບດີ ມີນົດຊາດດີ ຫລືຫວານຂຶ້ນ . ຖ້າຂາດທາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພືດອ່ອນແອ ເຕີບໂຕຊ້າ ຫລືຊະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ, ກົງຫັກງ່າຍ ການຕັ້ງຕົວຂອງຈຸລັງລູດລົງເຮັດໃຫ້ແຫ້ວໄດ້ງ່າຍ. ທາດໂປແຕສຊຽມເປັນທາດທີ່ຊະລ້າງໄດ້ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃສ່ຝຸ່ນພວກນີ້ຄວນໃສ່ຄັ້ງລະໜ້ອຍ ແຕ່ໃສ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ພືດສາມາດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງໄວ ເຊັ່ນ :

ໃສ່ແຖວປາຍຮາກແຕ່ຢ່າຕິດຮາກເກີນໄປ . ທາດໂປແຕສຊຽມ ນອກຈາກຈະມີໃນດິນ ຫລືໄດ້ຈາກ ຝຸ່ນເຄມີແລ້ວ ພວກຂີ້ເຖົ່າທີ່ໄດ້ຈາກການເຜົາໄໝ້ ກໍ່ໃຫ້ທາດໂປແຕສຊຽມໄດ້ ເຊັ່ນ : ຂີ້ເຖົ່າແກບ, ຂີ້ເຖົ່າໄມ້, ຫຍ້າ ຫລືເພື່ອງເຜົາ ເປັນຕົ້ນ .

6.3.4 ຫລັກການໃສ່ຝຸ່ນ

ການໃສ່ຝຸ່ນໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຫລັກການກ່ວາໆ ດັ່ງນີ້ :

1. ກ່ອນປຸກ ຫລືຊ່ວງຕຽມຊຸມປຸກ ຊ່ວງນີ້ຈະໃຫ້ພວກຝຸ່ນອິນຊີຫລາຍ ຍິ່ງດິນ ປຸກບໍ່ຄ່ອຍດີກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຫລາຍ ການໃສ່ຝຸ່ນອິນຊີໃນຊ່ວງນີ້ຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍກ່ວາຫລັງຈາກທີ່ປຸກໄປ ແລ້ວ . ສຳລັບຝຸ່ນເຄມີອາດຍັງບໍ່ຕ້ອງໃສ່ໃນຊ່ວງນີ້ກໍ່ໄດ້ ນອກຈາກປະສົມກັບດິນໃນຊຸມປຸກເພື່ອ ເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນໃນໄລຍະທຳອິດ ເຊັ່ນ : ໃສ່ຝຸ່ນຊຸບເປີຟອສເຟສ ຫລືກະດູກປິ່ນ ປະສົມດິນໃນຊຸມປຸກ ຫລືຮອງກັນຊຸມປຸກ

2. ຫລັງປຸກແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ທັນໃຫ້ໝາກ ຊ່ວງນີ້ອາດໃສ່ຝຸ່ນສູດທີ່ມີສັດສ່ວນຂອງ ທາດອາຫານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ສູດ 15- 15-15 ເປັນຕົ້ນ ການໃສ່ຝຸ່ນໃນຊ່ວງນີ້ ແມ່ນຕ້ອງການບຳລຸງ ໃຫ້ຕົ້ນເຕີບໂຕແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫາກພົບວ່າດິນຂາດທາດອາຫານຢ່າງໃດ ຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ຄວນໃສ່ເພີ່ມໃຫ້ .

3. ຊ່ວງທີ່ໃຫ້ດອກໃຫ້ໝາກແລ້ວ : ໄມ້ໃຫ້ໝາກມີທັງພວກໃຫ້ດອກອອກໝາກ ທັງປີ ແລະ ພວກທີ່ໃຫ້ດອກອອກໝາກເປັນລະດູ, ສຳລັບພວກທີ່ອອກດອກໃຫ້ໝາກຕະຫລອດ ທັງປີຄວນໃຫ້ທາດອາຫານຕ່າງ ໆ ຕະຫລອດທັງປີ ເຊັ່ນ ປີລະ 3 - 4 ຄັ້ງ ຫລືໃສ່ທຸກໆ 2 - 3 ເດືອນເພື່ອບຳລຸງຕົ້ນໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງແລະບຳລຸງໝາກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີດ້ວຍ. ສ່ວນພວກໄມ້ ໃຫ້ໝາກທີ່ອອກດອກໃຫ້ໝາກປີລະຄັ້ງຫລືເປັນລະດູນັ້ນຄວນໃສ່ຝຸ່ນ ດັ່ງນີ້ :

- ໄລຍະສ້າງໃບ : ຫລືໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຫລັງ ຈາກການເກັບໝາກແລ້ວຕ້ອງບຳລຸງດ້ວຍການໃສ່ຝຸ່ນ ໃຫ້ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນແຕກໃບໃໝ່ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງການທາດ ໂນໂຕຣເຈນສູງເປັນພິເສດຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນທີ່ມີສັດສ່ວນ 1:1:1 ແລ້ວເພີ່ມຝຸ່ນ ໂນໂຕຣເຈນຕື່ມອີກລວມທັງການໃສ່ຝຸ່ນຄອກກໍ່ຈະເຮັດໃນຊ່ວງນີ້ .

- ໄລຍະສ້າງດອກຫລັງຈາກທີ່ໃບໃໝ່ແກ່ : ຕົ້ນສ້າງອາຫານ ແລະ ສະ ສົມອາຫານພຽງພໍແລ້ວກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃຫ້ດອກໃຫ້ໝາກເຊິ່ງຊ່ວງນີ້ຕົ້ນຈະຕ້ອງການທາດຟໍສຟໍ ຮັດສູງກ່ວາປົກກະຕິ ຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ຄວນເປັນສູດທີ່ມີສັດສ່ວນ ເຊັ່ນ 1:2:1 ຫລືໃຊ້ສູດທຳມະດາແລ້ວ ເພີ່ມທາດຟໍສຟໍຮັດອີກ .

- ໄລຍະຕິດໝາກຈົນຮອດໝາກແກ່ : ໃນໄລຍະທີ່ຕິດໝາກໃໝ່ໆ ນັ້ນຈະຕ້ອງການທາດໂນໂຕຣເຈນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິເລັກນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງໝາກ ແຕ່ລະວັງຢ່າໃຫ້ຫລາຍເກີນໄປໝາກຈະລົ້ນ ຖ້າດິນມີທາດນີ້ຫລາຍແລ້ວກໍ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ ຫລັງຈາກທີ່ຕິດໝາກ ໝາກຈະເລີນໄປຈົນກະທັ້ງໝາກແກ່ ເປັນໄລຍະທີ່ຕ້ອງການທາດໂປແຕສ

ຊຽມສູງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໝາກແກ່ເປັນປົກກະຕິ ຊ່ວງນີ້ຄວນໃຫ້ຝຸ່ນທີ່ມີສັດສ່ວນ 2 : 2 : 3 ຫລືໃສ່ ສູດທຳມະດາ 1 : 1 : 1 ແລ້ວເພີ່ມທາດໂປແຕສຊຽມຢ່າງດຽວໃນຕອນໃກ້ຈະແກ່ .

6.3.5 ວິທີການໃສ່ຝຸ່ນ

ວິທີການໃສ່ຝຸ່ນໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຫລາຍວິທີຄື :

1. ວິທີພວນດິນອ້ອມຕົ້ນແລ້ວໂຮຍຝຸ່ນ : ການພວນດິນອ້ອມຕົ້ນຕ້ອງໃຫ້ຫ່າງ ຈາກຕົ້ນພໍສົມຄວນ ແລະ ລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ຮາກຂາດເມື່ອໂຮຍຝຸ່ນແລ້ວຖ້າມີນ້ຳກໍ່ໃຫ້ນ້ຳເພື່ອລະ ລາຍຝຸ່ນຖ້າລະມັດລະວັງຄວນພວນດິນເບົາໆອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຝຸ່ນເຂົ້າກັບດິນເພື່ອເປັນການ ປ້ອງກັນການສູນເສຍຝຸ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ .
2. ວິທີການເຮັດຮ່ອງອ້ອມຕາມລັດສະໝີຂອງຊິງພຸ່ມ ແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນໃນຮ່ອງ ແລ້ວເອົາດິນຖິ້ມ ໃນໄລຍະນີ້ອາດໃສ່ຝຸ່ນຄອກໄປດ້ວຍກໍ່ຍິ່ງດີ ຈາກນັ້ນກໍ່ຫົດນ້ຳ .
3. ວິທີຫວ່ານຝຸ່ນໂດຍກົງ : ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຂຸດດິນ ຫລືເຮັດຮ່ອງເພື່ອໃສ່ ຝຸ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນລົງດິນໂດຍກົງໂດຍກ່ອນຈະຫວ່ານຝຸ່ນຄວນຫົດນ້ຳເສຍກ່ອນແລະເມື່ອຫວ່ານ ແລ້ວຄວນຫົດນ້ຳອີກຄັ້ງໜຶ່ງເພື່ອເປັນການລະລາຍຝຸ່ນລົງດິນ .
4. ວິທີການໃສ່ຝຸ່ນເປັນຈຸດ ຫລືເຈາະດິນເປັນຮູອ້ອມຕົ້ນ ແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນລົງໄປໃນ ຮູ ແລ້ວຖິ້ມ, ຈຸດທີ່ຈະໃສ່ນັ້ນຄວນກະຈາຍຢູ່ອ້ອມໆ ຕົ້ນ ໃນບໍລິເວນທີ່ຮາກພັດຕູດເອົາໄປໃຊ້ ໄດ້ ງ່າຍ ແລະ ສະລັບກັນໄປທຸກຄັ້ງທີ່ໃສ່ຝຸ່ນເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໄດ້ຮັບຝຸ່ນຢ່າງທົ່ວເຖິງທຸກດ້ານ ວິທີນີ້ຈະປ້ອງ ກັນການສູນເສຍຝຸ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ .

6.4 ການໃຊ້ນໍໂມນພືດກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ສານຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຫລືທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ຂອງສານນໍໂມນພືດ ຫລື ນໍໂມນນັ້ນໄດ້ນຳມາໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນດ້ານຕ່າງໆມາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະປະຈຸບັນໄດ້ມີຜູ້ສົນ ໃຈສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງໃຊ້ກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍເນັ້ນໄປໃນເລື່ອງຂອງການບັງຄັບໃຫ້ພືດ ອອກດອກຕິດໝາກ ຕະຫລອດຮອດຄຸນນະພາບຂອງໝາກເປັນຫລັກສຳລັບການໃຊ້ສານນໍໂມນ ນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາທີ່ສຸດ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ຈະເກີດຜົນດີ ກັບເກີດຜົນເສຍຢ່າງງ່າຍດາຍໄດ້ . ນໍໂມນທີ່ນຳມາໃຊ້ກັນກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກແບ່ງໄດ້ຄື :

6.4.1 ສານອອກຊິນ (Auxins)

ມີສານສັງເຄາະຢູ່ຫລາຍໂຕທີ່ຈັດຢູ່ໃນພວກນີ້ທີ່ນຳມາໃຊ້ແລະຮູ້ຈັກກັນດີໄດ້ແກ່ :

1. ເອັນເອເອ (NAA) : ໃຊ້ກັນຫລາຍໃນການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊັ່ນ : ການໂທມກິ່ງ, ການປັກຊຳກິ່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກທົ່ວໆ ໄປໂດຍສະເພາະພວກໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ ອອກຮາກຍາກເຊັ່ນ : ມັງຄູດ, ທຸລຽນ, ລະມຸດ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານຕົວນີ້ຊ່ວຍສະເໝີ ໂດຍໃຊ້ໃນອັດ ຕາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 10.000 -15.000 ພີພີເອັມ (= ສ່ວນໃນລ້ານ) ຈະເຮັດໃຫ້ອອກຮາກດີຂຶ້ນ .

ນອກນີ້ຍັງໃຊ້ໃນການຕິດຕາ ແລະ ທາບກິ່ງດ້ວຍ ຫລືໃຊ້ເລັ່ງຕາທີ່ຕິດແລ້ວໃຫ້ແຕກເປັນກິ່ງໄວຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ . ນອກຈາກໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນແລ້ວສານ ເອັນເອເອ ຍັງໃຊ້ປ້ອງກັນການລົ່ນຂອງ ໝາກອີກດ້ວຍ .

2. ໄອບີເອ (IBA) : ເປັນສານທີ່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ ເຊັ່ນ : ການ ໂທມກິ່ງ, ການປັກຊຳ ໂດຍໃຊ້ເປັນສານຊ່ວຍເລັ່ງໃຫ້ການອອກຮາກດີຂຶ້ນ, ສານນີ້ເປັນພືດກັບ ໃບໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຄວນນຳໄປໃຊ້ໃນກໍລະນີອື່ນ ໆ ສານດັ່ງກ່າວທີ່ຜະລິດໃນທ້ອງຕະຫລາດໄດ້ແກ່ ເຊຣາ ດິກ (seradix), ຣູທ-ໂກຣ (Root- gro)ເປັນຕົ້ນ .

3. ທູ-ໂຟ-ດີ (2-4-D) ສ່ວນໃຫຍ່ນຳມາໃຊ້ໃນຮູບຂອງສານກຳຈັດວັດສະ ພືດໃນໝານໄມ້ໃຫ້ໝາກສ່ວນປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆຍັງບໍ່ທັນມີຫລາຍເທື່ອ ເຊັ່ນ ໃຊ້ໃນຄວາມເຂັ້ມ ຂຸ້ນຕ່າງໆ ກັບຕົ້ນໝາກນາວ ແລະ ພວກຕະກູນສົ້ມບາງຊະນິດ ເພື່ອປ້ອງກັນໝາກລົ່ນກ່ອນເກັບ ໝາກ ເປັນຕົ້ນ .

6.4.2 ສານຈິບເບີເຣນລິນ (Gibberellines)

ສານໂຕນີ້ຄຸນສົມບັດຫລາຍປະການດ້ວຍກັນ ແຕ່ທີ່ນຳມາໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຄື ໃຊ້ໃນສວນອະງຸ່ນເພື່ອຢຶດຊໍໝາກ, ຂະຫຍາຍໝາກ ເຮັດໃຫ້ໝາກຢຶດຍາວຂຶ້ນຮູບຊົງສວຍງາມ ຊວນຊື້ແລະເຮັດໃຫ້ເນື້ອກອບອີກດ້ວຍ .

6.4.3 ເອທິລິນ

ເປັນຮໍໂມນພືດທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງທາດອາຍ ທາດດັ່ງກ່າວ ນຳມາໃຊ້ກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຫລາຍຈຸດປະສົງດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ໃນການປົ່ມໝາກກ້ວຍ, ໝາກລະມຸດ, ໝາກມ່ວງ ເປັນຕົ້ນ .

6.4.4 ທາດຊະລໍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ

ທາດພວກນີ້ ຈັດໃນພວກຮໍໂມນເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍມີຄຸນສົມບັດທົ່ວໆໄປຄື ເປັນ ທາດຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການອອກດອກຂອງພືດເປັນຕົ້ນ.

6.4.5 ທາດຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ

ມີຄຸນສົມບັດ ໃນການຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ່ນ ຂອງໃບ ແລະ ໝາກ.

6.5 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕູທີ່ມັກທຳລາຍໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນກຳຈັດ

6.5.1 ພະຍາດທີ່ທຳລາຍໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນກຳຈັດ

1. ຫລັກການປ້ອງກັນພະຍາດໄມ້ໃຫ້ໝາກ

- ການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ເຂົ້າສູ່ໝານປູກກ່າວ ຄື : ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ ໝາກທີ່ຈະນຳມາປູກນັ້ນ ຕ້ອງປາສະຈາກພະຍາດເສຍກ່ອນກ່ອນຈະນຳມາປູກ ຄວນພັກໄວ້ໄລ ຍະໃດໜຶ່ງເພື່ອກຳຈັດພະຍາດແລະແມງໄມ້ທີ່ຕິດມາກັບຕົ້ນພັນ ເມື່ອແນ່ໃຈແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປປູກໄດ້.

- ການປັບປຸງດິນປຸກ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຕີ ການເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຜຸຟຸ່ຍ ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີ ລວມທັງສະພາບເປັນກິດ ເປັນຕ່າງອີກດ້ວຍ .

- ການບຳລຸງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີຈະຊ່ວຍລຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ການບຳລຸງຕົ້ນດ້ວຍການໃຫ້ນ້ຳ, ໃຫ້ຝຸ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍ ການສົດຢາປ້ອງກັນກຳຈັດພະຍາດເປັນຄັ້ງຄາວ ລວມທັງການປະຕິບັດຢ່າງອື່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນແຂງແຮງເຕັມທີ່ແລະ ອີກປະການໜຶ່ງການຈົ່ງໝາກບໍ່ຄວນໃຫ້ຫລາຍເກີນໄປຈົນເກີນກຳລັງຂອງຕົ້ນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊຸດໂຊມເຮັດໃຫ້ພະຍາດເຂົ້າລົບກວນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ .

- ຫລືກລ້ຽງການປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງມາກ່ອນໂດຍສະເພາະພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນດິນ ເພາະພະຍາດພວກນີ້ ຈະກຳຈັດຍາກຫາກຮູ້ວ່າບ່ອນໃດເຄີຍເກີດພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກໍ່ບໍ່ຄວນປຸກໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດເກົ່າໃສ່ອີກ ຫລືປຸກພວກທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານພະຍາດໄດ້ດີກ່ວາ .

- ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ຄວນເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເຊັ່ນ: ບໍ່ຄວນຫົດນ້ຳໃຫ້ປຸກເກີນໄປຈົນຮາກຟຸຂຶ້ນ, ການຊຸດພວນດິນ, ການກຳຈັດວັດສະພຶດ ລະວັງຢ່າໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົ້ນຫລືເຮັດໃຫ້ຮາກຂາດເກີດບາດແຜທີ່ກົງຫລືຕົ້ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດເຂົ້າທຳລາຍທາງບາດແຜໄດ້ ຫາກເກີດມີບາດແຜຄວນຮີບຮັກສາຢ່າປ່ອຍປະໄວ້.

- ຄວນບົວລະບັດຮັກສາໜານປຸກຢູ່ສະເໝີຢ່າປະໃຫ້ຮິກເຮື້ອ ເພາະຈະເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງພະຍາດໄດ້ຖ້າໜານປຸກຮິກເຮື້ອເກີນໄປ ເມື່ອເກີດພະຍາດກໍ່ຈະປ້ອງກັນກຳຈັດໄດ້ຍາກ.

- ຄວນຕັດແຕ່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຄວນປະຕິບັດເປັນປະຈຳ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພາະຈະເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ .

- ຄວນກວດກາ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຕະຫລອດທັງປີເມື່ອພົບເຫັນອາການຜິດປົກກະຕິກໍ່ຄວນສຶກສາໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນວ່າເກີດຈາກອັນໃດແທ້ ແລະ ຮີບແກ້ໄຂຢ່າງໄວ.

- ການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ທີ່ເປັນພາຫະນະຂອງພະຍາດ ເນື່ອງຈາກພະຍາດຫລາຍຊະນິດຈະແຜ່ລະບາດໄປບ່ອນອື່ນໆໄດ້ ຕ້ອງມີພວກແມງໄມ້ເປັນຕົວພາໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງມີການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ດັ່ງກ່າວ.

- ການປ້ອງກັນກຳຈັດດ້ວຍສານເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງສະເໝີ ຕ້ອງຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດອັນໃດແທ້ ແລະ ຈະໃຊ້ຢາອັນໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນດີ ຖ້າໃຊ້ບໍ່ຖືກກັບພະຍາດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຫລືບໍ່ເກີດຜົນເລີຍ.

ຕາຕະລາງທີ 3. ພະຍາດທີ່ສຳຄັນຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ແລະ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ

ລ/ດ	ຊື່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ	ຊື່ພະຍາດ	ອາການ	ການປ້ອງກັນກຳຈັດ
1	ກ້ວຍ	1. ພະຍາດຕາຍພາຍ	- ເກີດກັບກ້ວຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 2-4 ເດືອນຂຶ້ນໄປຫລືໄລຍະເລີ່ມແທງໜ້າໃບລຸ່ມຈະເຫລືອງຈາກຂອບໃບເຂົ້າມາຈົນເຫຼືອງໝົດໃບ ໃບຫັກພັບສີເຫຼືອງຫຼືສີນ້ຳຕານຢູ່ຕາມທ່ວນນ້ຳຫລືກາບໃບ.	1. ຊຸດທຳລາຍຕົ້ນທີ່ເປັນຖົ່ມ. 2. ບໍ່ປູກໃນບ່ອນເກົ່າ 3. ປ່ອຍນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ດິນເພື່ອທຳລາຍເຊື້ອ .
		2. ພະຍາດແອນແທຣກໂນສ	- ເຮັດໃຫ້ໝາກເໝົາ ອາດສະແດງອາການຕັ້ງແຕ່ຢູ່ເທິງຕົ້ນ ຫລືຫລັງຈາກການເກັບກ່ຽວມາແລ້ວເກີດບາດແຜສີດຳໆທີ່ຜິວກ້ວຍແລ້ວລຸກລາມຕິດຕໍ່ກັນຈົນເປັນແຜໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ໝາກເໝົາ, ຂຶ້ນເນົາ ໝາກລົ້ນ .	1. ສົດພົ້ນດ້ວຍຢາປ້ອງກັນກຳຈັດເຊື້ອຣາ ເຊັ່ນ ບີໂນມິລ ຂະນະທີ່ໝາກຍັງນ້ອຍຢູ່ 2. ເກັບໝາກໃນໄລຍະທີ່ເໝາະສົມ ຢ່າເກັບແກ່ເກີນໄປ 3. ເມື່ອເກັບມາແລ້ວໃຫ້ຈຸ່ມນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອກ່ອນປົ່ມຫລືກ່ອນຈຳໜ່າຍເຊັ່ນ : ເບນເລດ ເປັນຕົ້ນ .
2	ໝາກມື້	1. ພະຍາດໝາກເນົາ	ໝາກອ່ອນເປັນຈຸດສີເທົາກ່ອນແລ້ວລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຈົນທົ່ວໝາກ ເຫັນເປັນເງິນໄຍສີເທົາຟູທົ່ວໝາກ, ໝາກໃຫຍ່ກໍ່ເປັນໄດ້ເຊັ່ນກັນແຕ່ອາການບໍ່ຄ່ອຍຮຸນແຮງ.	1. ຢ່າໃຫ້ໝາກເປັນບາດແຜເພາະພະຍາດຈະແຜ່ລະບາດໄດ້ໄວຂຶ້ນ . 2. ປ້ອງກັນກຳຈັດເຊື້ອຣາໂດຍຢາ ມາເນບ ສົດພົ້ນທີ່ໝາກອ່ອນປ້ອງກັນໄວກ່ອນ.
		2. ພະຍາດແອນແທຣກໂນສ	- ໃບເປັນຈຸດກົມໆ ກະຈາຍທົ່ວໄປມີຮູບຮ່າງຂອງແຜບໍ່ແນ່ນອນ ແຜເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມຫລືດຳຖ້ເປັນຫລາຍໃບຈະລົ້ນ .	1. ເກັບກວາດໃບທີ່ລົ້ນເຜົາໄຟຖິ້ມ. 2. ຢ່າຫົດນ້ຳໃຫ້ປຸກທັງຕົ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດລະບາດ. 3. ສົດພົ້ນດ້ວຍ ໄດເທນເອັມ 45, ຄູປາວິດ, ແຄບແທນ, ບີໂນມິລ .
3.	ໝາກຂຽບ	1. ພະຍາດມຳມີຂອງໝາກຂຽບ	ເກີດຈາດເຊື້ອຣາຊະນິດໜຶ່ງ ເກີດກັບໝາກຂອງໝາກຂຽບ ເຮັດໃຫ້ໝາກເປັນສີດຳແທ້ໆ ແຕ່ໝາກບໍ່ລົ້ນ .	1. ອາດປ້ອງກັນກ່ອນດ້ວຍການສົດພົ້ນຢາປ້ອງກັນກຳຈັດເຊື້ອຣາຕັ້ງແຕ່ໄລຍະໝາກຍັງ

				ອ່ອນ ເຊັ່ນ: ຢາ ຄູບາວິດ, ໄດເທນ ເອັມ 45 ເປັນຕົ້ນ.
4	ໝາກມ່ວງ	1. ພະຍາດແອນແທຣກໂນສ.	ເກີດກັບໝາກມ່ວງທຸກຊ່ວງຄື : - ຖ້າເປັນທີ່ດອກ ເຮັດໃຫ້ດອກແຫ້ງລົ້ນ ບໍ່ຕິດໝາກ . - ໝາກອ່ອນເນົາດຳແຫ້ງ . - ໝາກແກ່ເກີດບາດແຜເປັນສີດຳບຸ້ມ ເລິກລົງໄປໃນເນື້ອໝາກ - ໃບ ທັງໃບອ່ອນ ແລະ ແກ່ຈະເກີດບາດແຜລັກສະນະກົມຫລືເປັນສີລຽມສີດຳ ແຜລຸດເປັນຮູ ຖ້າເປັນຫລາຍເຮັດໃຫ້ໃບລົ້ນ .	1. ສິດພົ້ນດ້ວຍ ໄດເທນ ເອັມ 45 , ແຄບແທນ, ບີໂນມິລ, ຄູບາວິດ ເປັນຕົ້ນ ເປັນໄລຍະຕະຫລອດປີຈະປ້ອງກັນໄດ້ ຫລາຍເນື່ອງຈາກເຊື້ອຣາເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້ກັບທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນ .
		2. ພະຍາດຢາງໄຫລ	- ເກີດຢາງໄຫລຕາມກົງແກ່ ຢາງທີ່ໄຫລອອກມາໃໝ່ໆ ຈະເປັນສີຂຸ່ນຂາວ ແລ້ວແຫ້ງເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ ເປືອກປ່ອນທີ່ຢາງໄຫລ ຈະມີຮອຍແຕກ ຖ້າຖາກເປືອກໄດ້ແຜຈະເຫັນສີນ້ຳຕານແດງ ຖ້າເປັນຫລາຍກົງຈະແຫ້ງຕາຍ ແລະຕົ້ນຕາຍໄດ້ .	1. ປ້ອງກັນດ້ວຍການທາຕົ້ນຫລືກົງໃຫຍ່ໆ ດ້ວຍຢາກັນຣາຫລື ປູນແດງ . 2. ປ່ອນທີ່ຊີ້ກັບຮອຍບາດແຜ ໃຫ້ຖາກເປືອກອອກແລ້ວທາດ້ວຍຢາກັນຣາ ເຊັ່ນ ເບນເລດ, ໄດເທນ ເອັມ 45 , ໄດພໍລາເທນ .
		3. ພະຍາດຣາແປ້ງ	- ພົບເຊື້ອຣາເປັນຜົງສີຂາວຄ້າຍກັບແປ້ງທີ່ຊຸດອກແລະກົງອ່ອນເຮັດໃຫ້ຊຸດອກແຫ້ງແຫ້ງ, ລົ້ນຖ້າເປັນຢູ່ໝາກເຮັດໝາກລົ້ນຫລືເກີດມີຮອຍທີ່ໝາກ .	1. ສິດພົ້ນດ້ວຍມາດຜົງຊະນິດລະລາຍນ້ຳໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະແຫ່ງຊຸດອກ . 2. ການສິດພົ້ນຢາປ້ອງກັນພະຍາດແອນແທຣກໂນສ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດນີ້ໄດ້.
		4. ພະຍາດຣາດຳ	- ເຊື້ອຣາເປັນສີດຳໆ ປົກຄຸມຊຸດອກ ແລະໃບຈົນດຳ ໂຕຣາເອງບໍ່ໄດ້ທຳລາຍແຕ່ປົກຄຸມເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເກີດຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະແສງໜ້ອຍລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເປື້ອນເປີ .	1. ເຊື້ອຣາເຕີບໂຕດ້ວຍການອາໄສນ້ຳຫວານຈາກດອກໄມ້ແລະສິ່ງທີ່ແມງຂັບຖ່າຍອອກມາ ຈຶ່ງປ້ອງກັນກຳຈັດໂດຍການສິດພົ້ນຢາຂ້າແມງດ້ວຍ . 2. ພວກຢາທີ່ສິດປ້ອງກັນພະຍາດແອນແທຣກໂນສ ຈະທຳລາຍເຊື້ອຣາດຳໄດ້ .

5.	ໝາກຫຸ່ງ	1. ພະຍາດ ໃບດ່າງ ເຫລືອງ .	- ເກີດໄດ້ທັງຕົ້ນອ່ອນະແລະ ແກ່ໂດຍໃບຈະມີອາການດ່າງ ເຫລືອງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃບທີ່ອອກມາ ໃໝ່ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ, ຍອດນ້ອຍລົງມີອາການດ່າງເຫລືອງ ບົດບັງວຊີ້ຕັ້ງ ,ໝາກມີຂະໜາດນ້ອຍ ນານສຸກ ແລະ ແຂງມີລາຍກົມໆ ທີ່ ໝາກ .	1. ເພີ່ມອ່ອນເປັນຕົວນຳເຊື້ອ ຄວນກຳຈັດເພີ່ມອ່ອນ . 2. ຕັດຕົ້ນທີ່ເປັນຖິ້ມ .
		2. ພະຍາດຮາກ ເໝົາຕົ້ນເໝົາ	- ຕົ້ນອ່ອນ ຫລືຕົ້ນກ້າຈະເປັນພະຍາດ ນີ້ໄດ້ຮຸນແຮງກ່ວາຕົ້ນແກ່ ຖ້າເປັນໃນ ຕົ້ນກ້າໃບຈະເຫລືອງ, ໃບລົ່ນ, ຕົ້ນບໍ່ ເຕີບໂຕ, ຮາກເນົາ ບໍລິເວນໃກ້ໆກັບ ຕົ້ນຕິດຜິວດິນ, ຕົ້ນຫັກພັບລົງແຫ້ງ ຕາຍຈົນເຫລືອແຕ່ຍອດເທິງສຸດ ແລະ ຍືນຕົ້ນຕາຍໃນທີ່ສຸດ .	1 ດິນທີ່ຈະໃຊ້ກ້າເບີຍຄວນ ປາສະຈາກເຊື້ອ . 2. ຫລືກລັງປູກໃນບ່ອນທີ່ ເຄີຍລະບາດພະຍາດນີ້ມາ ກ່ອນ ເພາະເປັນພະຍາດທີ່ຢູ່ ໃນດິນປ່ອງກັນຍາກ.
6.	ໝາກລຳ ໃຍ	1. ພະຍາດ ຍອດໄມ້ ຍູກວາດ	- ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງແຕ່ບໍ່ພົບ ເຫັນຫລາຍ ອາການຂອງພະຍາດນີ້ຄື ໃບອ່ອນຍອດອ່ອນທີ່ແຕກໃມ່ນັ້ນຈະ ຮຽວນ້ອຍ, ຂໍ້ປ້ອງຖິ້ສິ້ນ ເຮັດໃຫ້ຍອດ ອັດຕົວກັນແໜ້ນເໝືອນໄມ້ຍູກວາດ ຍອດທີ່ຈະປ່ອຍກອກ .	1. ພະຍາດນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອ ໄວຣັດໂດຍມີແມງເປັນຕົວ ນຳມາຖ້າພົບອາການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຕັດກົງທີ່ເປັນເຜົາໄຟຖິ້ມ.
7	ໝາກໄມ້ ຕະກຸນສົ້ມ	1. ພະຍາດກຣີນ ນິງ (ພະຍາດໃບ ເຫຼືອງຕົ້ນຊຸດ ໂຊມ)	- ໃບ, ຍອດອ່ອນ ມີຂະໜາດ ນ້ອຍ,ປາຍໃບຮຽວແຫລມຊີ້ຂຶ້ນ ເກີດ ອາການດ່າງເຫລືອງທີ່ໃບ ໝາກທີ່ແກ່ມີ ສີຂຽວດ່າງສະລັບເຫລືອງທົ່ວໝາກ, ຍອດແຫ້ງຕາຍເທື່ອລະກົງຈົນໃບລົ່ນ ຍືນຕົ້ນຕາຍ .ສົ້ມຂຽວຫວານຈະມັກ ເປັນພະຍາດນີ້ .	1. ໃຊ້ກົງພັນທີ່ປອດພະຍາດ, ປ້ອງກັນພະຍາດແຕ່ທຳອິດ . 2. ແມງທີ່ເປັນຕົວນຳເຊື້ອຄື ເພີຍກະໂດດສົ້ມ. 3. ຊຸດຕົ້ນທີ່ເປັນເຜົາໄຟຖິ້ມ .
		2. ພະຍາດ ຕຣິດເຕຊາ (ພະຍາດຕົ້ນຊຸດ ໂຊມ)	- ໃບເຫລືອງຊືດ ຄ້າຍຂາດທາດອາ ຫານ ສຸດທ້າຍໃບຈະເຫລືອງແຫ່ວໃບ ລົ່ນຊຸດໂຊມຢ່າງໄວ ຖ້າດຶງເບືອກໄມ້ ອອກຈະເຫັນຮູນ້ອຍໆທີ່ເນື້ອໄມ້ຫລວງ ຫລາຍຫລືເປັນຮ່ອງຍາວເປັນຂີດໆທີ່ ເນື້ອໄມ້ . ສົ້ມຂຽວຫວານຈະມັກເປັນ ສ່ວນສົ້ມໂອ ເປັນໜ້ອຍ .	1. ໃຊ້ກົງພັນທີ່ປອດພະຍາດ, ປ້ອງກັນພະຍາດແຕ່ທຳອິດ . 2. ແມງທີ່ເປັນຕົວນຳເຊື້ອຄື ເພີຍກະໂດດສົ້ມ. 3. ຊຸດຕົ້ນທີ່ເປັນເຜົາໄຟຖິ້ມ .

		3. ພະຍາດແຄງເກີ (ພະຍາດຂີ້ທູດ)	- ເກີດບາດແຜທີ່ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົ້ນ ແຜແກ່ເປັນສີນ້ຳຕານ ອາດລຸກລາມໄປ ເຊື່ອມເຂົ້າກັນເປັນແຜໃຫຍ່ ຖ້າເປັນ ຫລາຍໃບລົ່ນໄດ້ ກິ່ງແຫ້ງຕາຍ ເກີດມີ ຮອຍຕຳນິທີ່ແຜ. ມັກເກີດກັບສົ້ມເກືອບ ທຸກຊະນິດໂດຍສະເພາະໝາກນາວຈະ ເປັນຫລາຍທີ່ສຸດ	1. ກິ່ງພັນຄວນປາສະຈາກ ພະຍາດ ໂດຍການແຂ່ງນ້ຳໄປປູກ . 2. ຕັດສ່ວນທີ່ເປັນຖິ້ມ . 3. ກຳຈັດແມງພາຫະນະ ເຊັ່ນ ແມງກັດໃບ, ແມງຊອນໃບ ເປັນຕົ້ນ . 4. ຢາທີ່ໃຊ້ຄືພວກ ປະຕິຊີ ວະນະ ເຊັ່ນ : ສະເຕັບໂຕໂມ ຊິນ ໃນຮູບຂອງເກືອຊັລເຟດ .
		4. ພະຍາດຮາກເໝົ້າຫລືຕົ້ນເໝົ້າ	- ເມື່ອຊຸດເບິ່ງຮາກ ຈະພົບຮາກຝອຍ ເໝົ້າລຸກລາມເຂົ້າໂຄນຕົ້ນ ເປືອກຮາກ ເໝົ້າເປັນສີນ້ຳຕານແຕ່ບໍ່ເປື້ອຍຢູ່ ດຶງ ອອກເປັນເສັ້ນໄດ້ ເນື້ອໄມ້ຂອງຮາກຍັງ ຂາວຢູ່ (ຖ້າຮາກເນົ່າຈາກນ້ຳຖ້ວມ ເປືອກຂອງຮາກຈະເນົ່າແລະເປື້ອຍ ເນື້ອຂອງໄມ້ເປັນສີນ້ຳຕານ) ພະຍາດ ນີ້ອາດເກີດຂຶ້ນທີ່ດ້ານໂຄນຕົ້ນຕິດກັບ ດິນ ໂດຍບໍ່ເກີດທີ່ຮາກກໍໄດ້ ຖ້າບາດ ແຜຍາວໄປອ້ອມຕົ້ນ ຕົ້ນຈະຕາຍ	1. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຂັງ 2. ປັບປຸງດິນໃຫ້ມີຄວາມຜຸ ພຸ່ຍຢູ່ສະເໝີ 3. ບຳລຸງຕົ້ນໃຫ້ສົມບູນແຂງ ແຮງ . 4. ທາຍາທີ່ໂຄນຕົ້ນໄວ້ກ່ອນ ດ້ວຍປູນແດງ . 5. ບາດແຜທີ່ໂຄນຕົ້ນປ້ອງ ກັນດ້ວຍປູນແດງ . 6. ຊຸດຕົ້ນທີ່ຊຸດໂຊມຫລາຍ ນັ້ນເຜົາໄຟຖິ້ມ .
		5. ອາການຜິດປົກກະຕິຈາກການຂາດທາດອາຫານ	- ຕົ້ນສົ້ມມັກຈະສະແດງອາການຂາດ ທາດອາຫານໃຫ້ເຫັນຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ : ຂາດທາດສັງກະສີ, ແມງການິສ, ທາດ ເຫລັກ, ແມງນີຊຽມ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການໃບດ່າງຕົ້ນບໍ່ຈະເລີນເຕີບ ໂຕຕິດໝາກໜ້ອຍ ໝາກມີຂະໜາດ ນ້ອຍແລະ ຂາດຄຸນນະພາບ .	- ດິນທີ່ຂາດທາດອາຫານ ມັກ ເປັນດິນກົດຫລືດ່າງເກີນໄປ ຈຶ່ງຕ້ອງປັບສະພາບຂອງດິນ ໃຫ້ເໝາະສົມລວມທັງການໃສ່ ຝຸ່ນອິນຊີ ຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ ໄຂບັນຫາການຂາດທາດອາ ຫານເຫລົ່ານີ້ໄດ້
8	ໝາກນັດ	1. ພະຍາດຮາກເນົ່າ ຕົ້ນເນົ່າ	ໃບອອກສີແດງໆ ເຫລືອງໆ ກົກໃບເນົ່າ ດຶງຫລຸດອອກ ຫລືຫົກພັບລົງ ຖ້າເຊື່ອ ພະຍາດລຸກລາມໄປທີ່ຮາກກໍຈະເຮັດ ໃຫ້ຮາກເປື້ອຍເປັນສີດຳຕົ້ນຕາຍໄປໃນ ທີ່ສຸດ	1. ຢ່າປູກໃນຊ່ວງທີ່ມີຝົນຕົກ ໜັກ, ໜ້າທີ່ມາປູກຄວນລອກ ກາບລຸ່ມໆອອກໃຫ້ເຫັນຮາກ 2. ຂວ້າໜ້າຕາກແດດໄວ້ໄລ ຍະໜຶ່ງ ເພື່ອທຳລາຍເຊື້ອພະ ຍາດຫລືຈຸ່ມໜ້າໃນນ້ຳຢາກັນ ຣາ ເຊັ່ນ : ໄດຟໍລາເທນ, ແຄບ ແທນ ເປັນຕົ້ນ

		2. ພະຍາດໝາກແຂງ .	ເນື້ອໝາກມີລັກສະນະແຂງ ພ່ອຍ ຣົດ ຊາດຈິດຊຶດ, ເນື້ອມີສີນ້ຳຕານອ່ອນຫລືເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມເກືອບດຳ .	ຍັງບໍ່ຮູ້ສຶກເຫດແນ່ນອນ ຈະມັກເກີດອາການນັ້ນຫລາຍຖ້າອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ ການບຳລຸງຕົ້ນໃຫ້ແຂງແຮງຈະລຸດຜ່ອນອາການຂອງພະຍາດນີ້ດ້ວຍ .
--	--	------------------	---	--

6.5.2 ແມງສັດຕູໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ

1. ຫລັກການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງສັດຕູໄມ້ໃຫ້ໝາກ :

- ໝັ້ນກວດກາເບິ່ງແຍງສວນຢູ່ສະເໝີ ຖ້າພົບເຫັນມີແມງໄມ້ລະບາດໃຫ້ຮີບປ້ອງກັນກຳຈັດ ຢ່າປ່ອຍຖິ້ມໄວ້ ລວມທັງການຈົດບັນທຶກຊ່ວງການລະບາດຂອງແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນໄດ້ທ່ວງທັນ ເຊັ່ນ : ເພີ່ມຈັກຈັນຊ່ວງກວມວ່າງ ຈະລະບາດຫລາຍໃນຊ່ວງທີ່ແຫງຊຸ່ດອກ, ໜອນຊອນໃບສົ້ມຈະລະບາດຫລາຍໃນຊ່ວງທີ່ໃບສົ້ມຍັງອ່ອນຢູ່ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

- ການປະເມີນ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການທຳລາຍຂອງແມງໄມ້ ຫາກຍັງບໍ່ເຖິງຈຸດທີ່ຈະທຳຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍ ກໍບໍ່ຄວນໃຊ້ສານເຄມີ ເພາະຈະບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນເສຍຕາມມາດ້ວຍ. ຄວນໃຊ້ວິທີການຕັດແຕ່ງກິ່ງຖິ້ມ, ການໄລ່, ການລ້ແມງໄມ້ມາທຳລາຍດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ .

- ການປ້ອງກັນກຳຈັດພວກແມງທີ່ເປັນພາຫະນະ ເຊັ່ນ : ມົດ ຈະເປັນຕົວນຳພວກເພີ່ມແບ້ງ ເພີ່ມຫອຍ ໄປຍັງບ່ອນຕ່າງໆ ຂະນະດຽວກັນກໍອາໄສສິ່ງທີ່ພວກເພີ່ມຂັບຖ່າຍອອກມາເປັນອາຫານ ດັ່ງນັ້ນ ການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງສັດຕູ ຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງພວກແມງທີ່ເປັນພາຫະນະດ້ວຍ .

- ການທຳຄວາມສະອາດໜານປູກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນອາໄສຂອງແມງໄມ້ລວມທັງການທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນອ້ອມຮອບໜານປູກດ້ວຍ ກຳຈັດວັດສະພືດ ແລະ ພືດອາໄສອອກໃຫ້ໝົດ. ນອກນີ້ ພວກໃບໄມ້ທີ່ລົ້ນຕາມກ້ອງຕົ້ນ ກໍເກັບກວາດເຜົາໄຟຖິ້ມ.

- ການກຳຈັດຜົນຜະລິດທີ່ເສຍຫາຍ : ພວກໝາກໄມ້ທີ່ເໝົາລົ້ນຢູ່ຕາມກ້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ເກັບລວມກັນເອົາໄປຝັງດິນ ເພາະອາດມີໄຂ່ ຫລືໜອນຂອງແມງໄມ້ຢູ່ .

2. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງໄມ້ : ຄວນໃຊ້ຫລາຍວິທີຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ :

- ການຈັບມາທຳລາຍ : ໃຊ້ມືຈັບພວກໜອນຕ່າງໆ, ໃຊ້ຫວິງຕັກແມງພວກແມງກະເບື້ອ, ມວນ ລຳໄຍເປັນຕົ້ນ ຫລືຮີນຕົ້ນໃຫ້ແມງລົ້ນລົງ ເຊັ່ນ ແມງຄ່ອມທອງ (ຊ້າງຄ່ອມ).

- ການລ້ໃຫ້ມາວາງໄຂ່ : ກອງຝຸ່ນຄອກຫລືກອງຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ເພື່ອລ້ໃຫ້ແມງປົກແຂງ ເຊັ່ນ : ດ້ວງແຮດ, ດ້ວງກຸຫລາບ, ດ້ວງໄຟ ໃຫ້ມາວາງໄຂ່ແລ້ວທຳລາຍຖິ້ມ .

- ການລໍໂຕແກ່ມາທຳລາຍ ໃຊ້ເມທຟີລຢູຈີນອລ ລໍ້ແມງວັນທອງໂຕຜູ້ມາທຳລາຍ, ການໃຊ້ໝາກໄມ້ສຸກລໍ້ແມງກະເບື້ອມວນຫວານໃຫ້ມາຕິດກັບ ຫລືປະສົມເຫຍື້ອພິດໃນອາຫານທີ່ໃຊ້ລໍ້ ເມື່ອແມງມາກິນກໍຈະຕາຍໄປ .
- ການໃຊ້ແສງໄຟລໍ້ໂຕແກ່ຂອງແມງໃຫ້ມາຫລິ້ນໄຟແລ້ວຕົກລົງໄປໃນນ້ຳຫລືນ້ຳມັນທີ່ວາງໄວ້ ສຳລັບແສງໄຟ ແສງສະຫວ່າງຕ່າງໆ ນັ້ນສາມາດລໍ້ແມງໄດ້ຫລາຍຊະນິດ.
- ການໄລ່ໃຫ້ໜີໄປ : ໂດຍການຈູດໄຟສຸມຄ້ວນ, ການເຜົາສຢາງລົດເພື່ອໃຫ້ເກີດຄ້ວນເປັນຕົ້ນ .
- ການໃຊ້ນ້ຳສົດພິ່ນແຮງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມງສະເດັນອອກໄປໃຊ້ໄດ້ດີໃນພວກທີ່ບໍ່ຄ່ອຍບິນເຊັ່ນ : ເພັຍໄຟ, ເພັຍອ່ອນ ແລະ ເພັຍແປ້ງ ເປັນຕົ້ນ .
- ການປ້ອງກັນໂດຍການຫໍ່ໝາກ : ເຊັ່ນ ຫໍ່ໝາກກຽງ, ໝາກລຳໄຍ, ລິ້ນຈີ່, ໝາກມ່ວງ. ການຫໍ່ໝາກເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນແມງແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ໝາກມີຄວາມສວຍງາມອີກດ້ວຍ .
- ການປ້ອງກັນດ້ວຍຊີວະວິທີ : ໂດຍການບໍ່ທຳລາຍໂຕຫໍ່ ແລະ ໂຕບຽນເຊິ່ງເປັນສັດຕູທຳມະຊາດຂອງພວກທີ່ທຳລາຍພືດ ແມງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແກ່ ແມງບໍ່, ແມງຊ້າງ, ດ້ວງເຕົາລາຍ, ແມງວັນຫົວບຸບ, ແມງວັນກິນຂົນ, ຕໍ່, ແຕນ, ແຕນບຽນ ແມງພວກນີ້ຈະຄອຍຄວບຄຸມແມງສັດຕູຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ມີຫລາຍເກີນໄປ
- ການໃຊ້ສານເຄມີຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍການໃຊ້ສານເຄມີໃຫ້ຖືກກັບຊະນິດຂອງແມງສັດຕູທາກບໍ່ກົງກັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໜ້ອຍ ຫລືບໍ່ເກີດເລີຍ . ການໃຊ້ສານເຄມີໃນຊ່ວງທີ່ແມງສັດຕູອ່ອນແອທີ່ສຸດເຊັ່ນ ຫລັງຈາກຟັກອອກມາຈາກໄຂ່ໃໝ່ໆ ຫລືຍັງເປັນຕົວອ່ອນຢູ່ຈະໄດ້ຜົນກ່ວາ ແລະ ການໃຊ້ຢາປະສົມລົງໃນຢາຂ້າແມງເພື່ອໃຫ້ຕິດໃບຫລາຍຂຶ້ນ . ນອກນີ້ການໃຊ້ສານເຄມີຍັງຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກອີກດ້ວຍ .
- ການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງສັດຕູຈຳເປັນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຜູ້ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ : ຊ່ວຍກຳຈັດຫຍ້າແລະ ແມງທີ່ຢູ່ຮອບໆ ໝານປູກ ການຊ່ວຍກັນໃຊ້ເຄື່ອງດັກຈັບແມງ , ເຄື່ອງລໍ້ແມງ ຕະຫລອດຈົນການສົດພິ່ນຢາຄວນເຮັດພ້ອມກັນເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຜົນດີຂຶ້ນ ຫາກຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດບໍ່ພ້ອມກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ແມງສັດຕູຄື້ອນຍ້າຍໄປມາເຮັດໃຫ້ການກຳຈັດບໍ່ໄດ້ຜົນເຕັມທີ່ .

ຕາຕະລາງທີ 4. ແມງສັດຕູໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ແລະ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ

ລ/ດ	ຊື່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ	ຊື່ພະຍາດ	ລັກສະນະອາການ	ການປ້ອງກັນກຳຈັດ
1.	ໝາກກ້ວຍ	1. ດ້ວງງວງເຈາະລຳຕົ້ນ ແລະດ້ວງງວງເຈາະເຫງົ້າກ້ວຍ.	- ເປັນຕົວດ້ວງປົກແຂງ ຕົວເຕັມໄວຈະເຈາະເຂົ້າເຫງົ້າແລະຕົ້ນເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ສົ່ງໄປສ່ວນຍອດບໍ່ສະດວກເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຕີບໂຕຊ້າຜົນຜະລິດລຸດລົງຖ້າເປັນຫລາຍອາດຕາຍໄດ້ .	1. ບໍ່ຄວນປຸກໃສ່ບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນ. 2. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນກ້ວຍກ່ອນປຸກ ຫລືແຂ່ງໃນນ້ຳຢາຂ້າແມງເຊັ່ນ : ດິລດຣິນ 1 ຄືນກ່ອນປຸກ . 3. ໃຊ້ຢາຂ້າແມງສັດພື້ນຕາມກາບໃບ ແລະ ຮວາດອ້ອມຕົ້ນປ້ອງກັນການມາວາງໄຂ່ .
		2. ບັງມ້ວນໃບຕອງ	- ໂຕບັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຝຸ່ນຜົງເປັນສີຂາວຫຸ້ມໂຕ ກັດກິນໃບຕອງແລ້ວມ້ວນໃບຕອງຫຸ້ມໂຕໄວ້	ເກັບໃບຕອງທີ່ມ້ວນນັ້ນຝັງຫລືເຜົາໄຟ ສັດພື້ນດ້ວຍສານເຄມີ ເຊັ່ນ ດິລດຣິນ
2.	ໝາກມ້	1. ບັງຊອນລຳຕົ້ນ	- ໂຕບັງເຈາະເຂົ້າໄປໃນເນື້ອໝາກເຮັດໃຫ້ບ່ອນທີ່ເຈາະເປັນບາດແຜແຫ້ງບິດບັງເປັນແປ້ວ .	1. ສັດພື້ນດ້ວຍຢາຂ້າແມງໃນຂະນະທີ່ໝາກອ່ອນປ້ອງກັນການວາງໄຂ່. 2. ແຍກໝາກຢ່າໃຫ້ຕິດກັນ ຫລືຕິດກັບລຳຕົ້ນ ເຊັ່ນ : ເອົາໄມ້ວາງຂັ້ນ . 3. ຖ້າພົບຫລາຍຄວນຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍໜັງສີພິມຕັ້ງແຕ່ໝາກຍັງນ້ອຍຢູ່..
		2. ບັງເຈາະໝາກ.	- ໂຕບັງເຈາະເຂົ້າໄປໃນຕົ້ນ ຫຼືກົງໃຫຍ່ໆ ເບິ່ງເຫັນຢາງຂາວໆໂຫລອອກມາຕາມຮູທີ່ບັງເຈາະ .	1. ຖ້າເຈາະເຂົ້າໃນແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ເຫລັກແຫລມແທງເຂົ້າໃນຮູ ຫລືໃຊ້ຢາຂ້າແມງສັດອັດເຂົ້າໃນຮູແລ້ວອັດປາກຮູດ້ວຍດິນນ້ຳມັນ . 2. ສັດຢາຂ້າແມງຕາມໂຄນຕົ້ນແລະກົງໃຫຍ່ຫລືໃຊ້ບູນຂາວທາປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ

3.	ໝາກຂຽບ	1. ບົ່ງກິນໃບອ່ອນ ດອກອ່ອນ.	- ເປັນບົ່ງແມງກະເບື້ອ ມັກລະບາດ ໃນຊ່ວງທີ່ໝາກຂຽບກຳລັງແຕກໃບ ອ່ອນ ໂຕບົ່ງທີ່ກັດກິນໃບອ່ອນ, ດອກອ່ອນ ບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດໃຫ້ໃບລົ່ນ ທັງຕົ້ນ.	1 ສົດພົ້ນດ້ວຍຢາຂ້າ ແມງ ເຊັ່ນ : ພາຣາໄທອອນ, ເຊຟ ວິນ ຊ່ວງແຕກໃບອ່ອນເມື່ອ ໃບແກ່ແລ້ວຈະໝົດບັນຫາ .
		2. ເພັຍອ່ອນ, ເພັຍ ແປ້ງ.	- ທຳລາຍໂດຍການດູດກິນນ້ຳລ້ຽງ ຈາກໃບ, ໝາກ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊຸດ ໂຊມພາໃຫ້ຮາດຳປົກຄຸມເປັນຮອຍ ຕິທິໝາກ.	1 ກຳຈັດມົດທີ່ເປັນພາຫະ ນະນຳແມງພວກນີ້ມາ 2 ຊີດນ້ຳແຮງໆໃຫ້ແມງສະ ເດັ່ນອອກໄປ 3 ສົດພົ້ນດ້ວຍຢາຂ້າແມງ ເຊັ່ນ : ໄດອາຊິນອນ .
		3. ແມງວັນທອງ.	- ໂຕແມງວັນທອງຈະໃຊ້ກິນແທງ ເຂົ້າທີ່ໝາກແລ້ວວາງ ໄຂ່ໂຕບົ່ງທີ່ຟັກຈາກໄຂ່ຈະ ກັດກິນຢູ່ພາຍໃນໝາກ ເຮັດໃຫ້ ໝາກເໝົາແລະລົ່ນ .	1. ເກັບໝາກທີ່ລົ່ນໄປຝັງ ເລິກໆ . 2. ຫໍ່ໝາກປ້ອງກັນແມງວັນ ທອງ .
4.	ໝາກມ່ວງ	1. ເພັຍຈັກຈັນ ໝາກມ່ວງ.	- ມັກລະບາດຫລາຍໃນຊ່ວງທີ່ເລີ່ມ ແທງຊຸ່ທັງໂຕອ່ອນ ແລະ ຕົວເຕັມ ໄວດູດກິນນ້ຳລ້ຽງຈາກຊີ້ດອກເຮັດ ໃຫ້ດອກ ໝາກອ່ອນລົ່ນແລະ ໂຕ ແມງເອງຍັງຂັບມູນອອກມາເປັນອາ ຫານຂອງຮາດຳເຮັດໃຫ້ຮາດຳເຕີບ ໂຕພາໃຫ້ຊີ້ດອກແລະໃບດຳ .	1. ການຂັບໄລ່ແມງໂດຍ ການສຸມຄ້ວນໄຟທີ່ກ້ອງຕົ້ນ. 2. ສົດຢາກຳຈັດຕັ້ງແຕ່ໄລ ຍະຕົວອ່ອນຈະກຳຈັດໄດ້ ງ່າຍ ຢາທີ່ໃຊ້ຄື: ເອນດຣິນ, ມາລາໄທອອນ ເປັນຕົ້ນ.
		2. ບົ່ງກະທູ້ດອກ.	- ໂຕບົ່ງສີນ້ຳຕານຍາວປະມານ 2,5 ຊັງຕີແມັດ ສີເຫຼືອງປົນນ້ຳ ຕານ ໂຕອ່ວນສັ້ນໂຕບົ່ງກັດກິນຊີ້ ດອກ ແລ້ວເຮັດຮັງຍາວທີ່ຊີ້ດອກ ໂຕໜອນຢູ່ທາງໃນແລ່ນໄປມາໃນ ຮັງ	1. ຈັບຕົວມາທຳລາຍ 2. ໃຊ້ໄຟລໂຕແມ່ແມງມາ ຫລິ້ນໄຟ 3. ຢາທີ່ໃຊ້ໄດ້ດີເຊັ່ນ : ພາ ລາໄທອອນ, ເອນດຣິນ ເປັນ ຕົ້ນ .

		3. ເພີ່ມໄຟໝາກ ມ່ວງ	ໂຕສີເຫລືອງມີຂະໜາດ 2-3 ມິລິ ແມັດ ດູດກິນນ້ຳລ້ຽງທີ່ໃບອ່ອນ, ຍອດອ່ອນ ແລະທີ່ສຳຄັນຄືທຳລາຍ ຕາດອກ, ຕາໃບ ແລະ ຊຸ່ດອກເຮັດ ໃຫ້ດອກລົ້ນບໍ່ຕິດໝາກຫລື ຕິດ-ໜ້ອຍໝາກລົ້ນໄດ້ .	1. ລະບາດໃນຊ່ວງອາກາດ ຮ້ອນແລະແລ້ງ ຖ້າພົບໜ້ອຍ ຄວນຕັດຍອດທີ່ເປັນເຜຢາ ໄຟຖິ້ມ . 2. ສິດພົ້ນດ້ວຍ ໄດເມທໂທ ເອທ, ມາລາໂທອອນ, ເຊຟ ວິນ ເປັນຕົ້ນ .
		4. ເພີ່ມໄຟໝາກ ມ່ວງ	- ບັງແມງກະເບື້ອຫລາຍຊະນິດທຳ ລາຍໃບມ່ວງ ແລະ ສ່ວນຫລາຍຈະ ທຳລາຍໃບອ່ອນກ່ວາໃບແກ່ເຊັ່ນ ບັງທີ່ໃບກັດກິນໃບອ່ອນແລ້ວທີ່ໃບ ໃຫ້ຕິດກັນ . (ບັງຫານກິນໃບເຮັດ ໃຫ້ໃບແວ່ງ,ບັງຂົນແຜງ ໗0໐ກິນ ໃບ	ຖ້າພົບຫລາຍສິດ ພົ້ນດ້ວຍຢາເຊຟວິນເປັນຕົ້ນ
5.	ໝາກຫຸ່ງ	1. ເພີ່ມຫອຍ	- ເປັນແມງຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍ ເຄື່ອນຍ້າຍ ດູດກິນນ້ຳລ້ຽງຈາກ ສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ :ໝາກ,ລຳຕົ້ນ ແລະກ້ານໃບ .	1. ຖ້າເປັນຫລາຍຄວນຕັດ ຕົ້ນ ຫລືສ່ວນທີ່ເປັນເຜົາໄຟ ຖິ້ມ . ຢາຂ້າແມງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ ເຊັ່ນ: ມາລາໂທອອນ, ໄດອາ ຊິນອນ .
		2.ເພີ່ມອ່ອນ	- ມັກດູດກິນນ້ຳລ້ຽງຈາກສ່ວນ ຕ່າງໆຂອງຕົ້ນເຊັ່ນ : ໃບອ່ອນ, ຍອ ດອ່ອນ ນອກນີ້ຍັງອາດນຳພະຍາດ ສູ່ຕົ້ນດ້ວຍເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເກີດພະຍາດ ຕ່າງເຫລືອງ .	1. ໃຊ້ນ້ຳຊີດໃສ່ແຮງໆໃຫ້ ເພີ່ມຫລຸດອອກໄປ . 2. ທຳລາຍມິດ ເຊິ່ງເປັນ ຕົວນຳເພີ່ມແປ້ງມາ . 3. ຢາທີ່ໃຊ້ໄດ້ດີເຊັ່ນ: ມາລາ ໂທອອນ, ໄດອາຊິນອນ ເປັນ ຕົ້ນ .
		3.ເພີ່ມແປ້ງ	- ເປັນແມງຂະໜາດນ້ອຍໂຕມີສີ ຂາວຄ້າຍແປ້ງທຳລາຍໂດຍການ ດູດນ້ຳລ້ຽງຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ຕົ້ນເຊັ່ນ:ໃບ,ໝາກ,ກ້ານໃບ ແລະ ຍອດ	1. ໃຊ້ນ້ຳຊີດໃຫ້ສພເດັ່ນ ໄປ 2. ສິດພົ້ນດ້ວຍຢາຂ້າ ແມງເຊັ່ນ :ລິນເດນ,ໂທ ໂອດານ,ໄດອາຊິນອນ ເປັນຕົ້ນ

		4. ໂຮ່ແດງ ຫລື ແມງມຸມແດງ.	- ເປັນແມງມຸມຂະໜານນ້ອຍເບິ່ງເກືອບບໍ່ເຫັນ ໂຕສີແດງດູດກິນນ້ຳລ້ຽງທີ່ໃບ ເຮັດໃຫ້ໃບຊືດເປັນຈຸດໆ ຫົວເຫລືອງທັງໃບ, ໃບລົ່ນ ຖ້າດູດກິນນ້ຳລ້ຽງທີ່ໝາກເຮັດໃຫ້ໝາກປ່ຽນເປັນສີເທົາເຫລືອງແກ່ກ່ອນກຳນົດ ຣົດຊາດປ່ຽນໄປ .	1. ຕັດໃບທີ່ພົບແມງມຸມແດງ ເຜົາໄຟຖິ້ມ ຊືດພົ້ນດ້ວຍຢາປ້ອງກັນກຳຈັດໄຮ ໂດຍສະເພາະ ເຄລເທນ
6.	ໝາກລະມຸດ	1. ໜອນເຈາະກິ່ງເຈາະຕົ້ນ.	- ໂຕໜອນຊອນເຂົ້າໄປໃນກິ່ງໃຫຍ່ໆ ຫລືລຳຕົ້ນ ຮູຂອງໜອນເບິ່ງເຫັນໄດ້ຍາກສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບໃນຕົ້ນລະມຸດທີ່ອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ແລະຂາດການເອົາໃຈໃສ່ .	1. ເມື່ອໂຕໜອນເຈາະເຂົ້າໄປແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າແມງຊືດອັດເຂົ້າໃນຮູ ອັດຮູດ້ວຍດິນນ້ຳມັນ ຫລືໃຊ້ຢາທາໂຄນຕົ້ນໄວ້ . 2. ຊືດຢາຂ້າແມງຕາມກິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໂຄນຕົ້ນ .
		1. ໜອນເຈາະໝາກ	- ໂຕໜອນຈະເຈາະເຂົ້າໃນໝາກເຮັດໃຫ້ໝາກລົ່ນຫລືເຈາະເຂົ້າໄປຈົນເຖິງເມັດກັດກິນເມັດດ້ວຍໝາກລະມຸດຈະລົ່ນ ຫລືບໍ່ກໍໄດ້	1. ຊືດຢາຂ້າແມງ ເຊັ່ນ: ເຊຟວິນ, ມາລາທອນ ໃນຊ່ວງທີ່ໝາກກຳລັງເຕີບໂຕປະມານ 15 ວັນ/ຄັ້ງ ໃນກໍລະນີພົບເຫັນເລື້ອຍໆ .
7.	ໝາກລິ້ນຈີ່	1. ໜອນຄືບກິນໃບ.	- ໂຕໜອນກັດກິນໃບອ່ອນ ລະບາດຫລາຍໃນຊ່ວງໃນຊ່ວງລິ້ນຈີ່ ແຕກໃບອ່ອນ ບາງຄັ້ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍເຊັ່ນກັນຄືກັດກິນໃບອ່ອນ, ຍອດອ່ອນທີ່ແຕກໃໝ່ຈົນໝົດ .	1. ຫົ່ນກິ່ງໂຕໜອນຈະຕົກລົງມາແລ້ວເກັບກວາດຖິ້ມ . 2. ສິດພົ້ນດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ ເຊຟວິນ, ມາລາໂທອນ ໃນຊ່ວງທີ່ແຫງຍອດອ່ອນ ຫລື ພົບວ່າລະບາດຫລາຍ
		2. ໜອນເຈາະຂີ້ວນໝາກ	- ໂຕໜອນຈະເຈາະເຂົ້າທີ່ຂີ້ວນ ເຮັດໃຫ້ໝາກລົ່ນ ເຂົ້າທຳລາຍຫລາຍໃນຊ່ວງທີ່ໝາກໃກ້ຈະແກ່ ແລະ ຍັງຕິດມາກັບໝາກຈົນເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກອີກດ້ວຍ .	1. ເກັບໝາກທີ່ລົ່ນໄປຝັງ . 2. ຊ່ວງໝາກໃກ້ຈະແກ່ ສິດພົ້ນດ້ວຍຢາຂ້າແມງທີ່ມີອາຍຸການສະລາຍຕົວສັ້ນ
		3. ໂຮ່ລິ້ນຈີ່	- ເປັນພວກໂຮ່ ຫລືແມງມຸມ ໂຕມີຂະໜາດນ້ອຍທຳລາຍໂດຍການດູດກິນນ້ຳລ້ຽງທີ່ໃບອ່ອນເຮັດໃຫ້ໃບຊືດເຫຼືອງ, ລົ່ນ ແລະ ຍັງທຳລາຍດອກ ແລະໝາກດ້ວຍ ລະບາດຫລາຍໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ແລະແຫ້ງແລ້ງ	1. ສິດພົ້ນດ້ວຍຢາປ້ອງກັນກຳຈັດໄຮ ເຊັ່ນ : ເຄລເທນ ຫລື ໂຕເມທໂທເອທ ເປັນຕົ້ນ .

8.	ໝາກລຳໂຍ	1. ເພັຍອ່ອນ, ເພັຍ ຫອຍ, ເພັຍແປ້ງ	- ບໍ່ຄ່ອຍລະບາດ ແມງເຫລົ່ານີ້ດູດ ກິນນ້ຳລ້ຽງຈາກຍອດອ່ອນເຮັດໃຫ້ ຍອກງົກບໍ່ອອກດອກໝາກໄດ້ .	1. ຖ້າບໍ່ຫລາຍຄວນຕັດກິ່ງທີ່ ມີແມງໄມ້ເຜົາໄຟຖິ້ມ . 2. ສິດພິນດ້ວຍຢາຂ້າແມງ ໄມ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ .
		2. ໝອນເຈາະກິ່ງ ເຈາະຕົ້ນ	- ອາດເປັນໝອນຂອງດ້ວງປົກແຂງ ຫລືໝອນແມງກະເບື້ອກໍ່ໄດ້ ໂຕ ໝອນຈະຊອນເຂົ້າໄປພາຍໃນກິ່ງ ກັດກິນເນື້ອໄມ້ເຮັດໃຫ້ກິ່ງແຫ້ງ ຕາຍຢ່າງໄວ .	ຖ້າພົບຂວຍທີ່ໂຕໝອນຂັບ ອອກມາ ໃຫ້ໃຊ້ເຫຼັກແຫຼມ ແທງເຂົ້າໃນຮູແລ້ວອັດຮູ ດ້ວຍດິນນ້ຳມັນ
		3. ໝອນຊອນກິ່ງ	ໂຕໝອນມີຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາ ໝອນເຈາະກິ່ງ ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ຕາມ ເປືອກທີ່ລຳຕົ້ນແລະກິ່ງ ໂຕໝອນ ຈະຊອນເຂົ້າກັດກິນຢູ່ລະຫວ່າງ ເປືອກກັບເນື້ອໄມ້ ຖ້າເປັນຫລາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊຸດໂຊມໄວກ່ວາປົກ ກະຕິ .	1 ທາກິ່ງດ້ວຍປູນແດງ, ປູນ ຂາວ ບ້ອງກັນການວາງໄຂ່ . 2. ຖ້າພົບຫລາຍໃຫ້ຖາກ ເປືອກບາງໆ ແລ້ວໃຊ້ຢາຂ້າ ແມງ ເຊັ່ນ : ດີນດຣິນ, ເຂັມ ຊຸ້ນສິດເຂົ້າໄປທີ່ຕົ້ນແລະ ກິ່ງ ກະຕິ .
9.	ໝາກໄມ້ຕະ ກູນສີ່ມ	1. ໝອນຊອນໃບ ສີ່ມ	- ໂຕໝອນມີຂະໜາດນ້ອຍສີ ຂາວເຫລືອງທຳລາຍໂດຍການ ຊອນເຂົ້າໄຕ້ຜິວໃບເຫັນເປັນຍທາງ ສີຂາວທັງໃບ ລະບາດຫລາຍໃນ ຊ່ວງແຕກໃບອ່ອນສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍແກ່ໃບອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ໃບຍິກງໍ ໃຝ່ແຫ້ງ ແລະຍັງພະຍາດແຄງເກີ ໄດ້ອີກດ້ວຍ .	1. ຕັດກິ່ງທີ່ພົບເຫັນເຜົາໄຟ ຖິ້ມ . 2. ໃຊ້ໄຟລັໂຕແມ່ແທງກະ ເບື້ອມາຫລິ້ນໄຟ 3. ສິດພິນດ້ວຍຢາຂ້າແມງ ໄມ້ຊ່ວງແຕກໃບອ່ອນ ເຊັ່ນ : ໄດເມທໂທເອທ, ຊູບີຊີດິນ.
		2. ໝອນແກ້ວສີ່ມ	- ເປັນໝອນຂະໜາດໃຫຍ່ ໂຕສີ ຂຽວ ກັດກິນໃບອ່ອນ ຍອດອ່ອນ ຖ້າລະບາດຫລາຍເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍ.	1. ຈັບໂຕມາທຳລາຍເພາະ ເຫັນໄດ້ງ່າຍ. 2. ສິດພິນດ້ວຍຢາຂ້າແມງ ເຊັ່ນ : ທາມາລອນ, ທີໂອ ດານ ເປັນຕົ້ນ.
		3. ເພັຍອ່ອນ, ເພັຍ ໄຟ, ເພັຍແປ້ງ.	- ດູດກິນນ້ຳລ້ຽງຕາມສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ໃບ, ຍອດ, ກິ່ງ ເຮັດໃຫ້ ໝາກມີຮອຍຕິມີຄາບດຳຕິດທີ່ ໝາກ	ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍມີບັນ ຫາໂດຍສະເພາະໃນສ່ວນທີ່ ສິດພິນສານເຄມີທຳລາຍສັດ ຕູອື່ນໆເປັນປະຈຳພວກນີ້ກໍ່ ຈະຖືກທຳລາຍໄປດ້ວຍ.

		4. ເພັຍຫອຍ	- ທຳລາຍໂດຍການດູດກິນນ້ຳລ້ຽງຕາມກິ່ງ, ໃບ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ວເກີດຮອຍຕິ ເກີດຮາດຳຂຶ້ນຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ໝາກມີຮອຍຕິດຳໆ ດ່າງໆ	1. ຖ້າພົບຫລາຍຄວນຕັດກິ່ງເຜົາໄຟຖິ້ມ . 2. ຢາຂ້າແມງທີ່ໃຊ້ ຄື : ໄວຫອຍ (ຖ້າສິດພົ້ນໄວຫອຍແລ້ວບໍ່ຄວນສິດແຄບແທນພາຍໃນ 3 ເດືອນ ບໍ່ຄວນສິດພວກກຳມະຖັນພາຍໃນໜຶ່ງເດືອນເພາະຈະເກີດອັນຕະລາຍແກ່ສົມໄດ້).
		5. ແມງກະເບື້ອມວນຫວານ	- ເປັນແມງກະເບື້ອກາງຄືນຂະໜາດໃຫຍ່ ທຳລາຍໂດຍໃຊ້າປາກແທງເຂົ້າໄປໃນໝາກ ເຮັດໃຫ້ໝາກເນົາລົ້ນ	1. ໃຊ້ຫວີງຈັບໂຕມາທຳລາຍ 2. ໃຊ້ກົງລໍ້ໃຫ້ມາຕິດກັບ ຫລືໃຊ້ໄຟລໍ້ 3. ໃຊ້ເຍື່ອພິດເຊັ່ນ : ໃຊ້ໝາກນັດຈຸ່ມຢາເຊຟວິນ ຫ້ອຍໄວ້ໃຫ້ແມງມາກິນ .
		6. ແມງວັນທອງ	- ໂຕແມ່ວາງໄຂ່ໃນໝາກແລ້ວຟັກເປັນໂຕໜອນເຈາະເຂົ້າຂ້າງໃນ ເຮັດໃຫ້ໝາກເນົາ ແລະ ລົ້ນ	1. ເກັບໝາກທີ່ເນົາລົ້ນຕາມພື້ນຝັງໃຫ້ເລິກ . 2. ໃຊ້ກັບດັກແມງວັນທອງໂຕຜູ້ໂດຍໃຊ້ສານ ເມທິລຍູຈີນອລ ເປັນສານລໍ້ສິດພົ້ນດ້ວຍຢາຂ້າແມງພວກ ໄພເຮຫຮອຍ .
10.	ໝາກສີດາ	ແມງວັນທອງ	ໂຕແມ່ຈະໃຊ້ກິນແທງເຂົ້າທີ່ໝາກແລ້ວວາງໄຂ່ ໂຕບັ້ງທີ່ຟັກອອກມາຈາກໄຂ່ຈະກັດກິນພາຍໃນໝາກ ເຮັດໃຫ້ໝາກເໜົາແລະລົ້ນ.	1. ເກັບໝາກທີ່ລົ້ນຝັງເລິກໆ 2. ຫໍ່ໝາກປ້ອງກັນແມງວັນທອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝາກມີຄຸນນະພາບ.

ບົດທົດສະດີທີ 7

ການເກັບໝາກ ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັກການເກັບໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍເຖິງການສຸກຂອງໝາກໄມ້ທັງສອງແບບ
2. ອະທິບາຍຄວາມແກ່ຂອງໝາກ
3. ບອກຕົວປຶ້ງຊື້ຄວາມແກ່ຂອງໝາກ
4. ອະທິບາຍວິທີການເກັບໝາກທີ່ຖືກຕ້ອງ
5. ບອກວິທີການຄັດໝາກອອກ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດໝາກໄມ້ກ່ອນຈຳໜ່າຍ
6. ອະທິບາຍວິທີການປ້ອງກັນກຳຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ຕິດມາກັບໝາກໄມ້
7. ບອກວິທີການປິ່ມໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ
8. ບອກວິທີການເກັບຮັກສາໝາກໄມ້ຫຼັງຈາກປິ່ມສຸກແລ້ວ
9. ບອກວິທີການບັນຈຸຫີບຫໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.

ເນື້ອໃນ

7.1 ການເກັບໝາກ

ການເກັບໝາກໄມ້ເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະມັດລະວັງ ເພາະຈະມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດເປັນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ ຈົນກະທັ້ງເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນການເກັບກ່ຽວໝາກໄມ້ມີສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ດັ່ງນີ້ :

7.1.1 ການສຸກຂອງໝາກ

ໝາກໄມ້ທົ່ວໄປນັ້ນຫຼັງຈາກທີ່ເກັບອອກມາຈາກຕົ້ນແລ້ວ ພໍຈະແບ່ງອອກຕາມສະພາບການຫາຍໃຈ ການປ່ຽນແປງພາຍໃນຂອງໝາກ ຫຼືເອີ້ນວ່າການສຸກຂອງໝາກ ໄດ້ເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ ໆດັ່ງນີ້ :

1. ພວກໝາກໄມ້ທີ່ສາມາດປິ່ມໃຫ້ສຸກໄດ້ : ໝາກໄມ້ພວກນີ້ ເມື່ອເກັບມາຈາກຕົ້ນແລ້ວອັດຕາການຫາຍໃຈຂອງໝາກຈະລຸດລົງເລື້ອຍໆຈົນກະທັ້ງເຖິງຈຸດໜຶ່ງອັດຕາການຫາຍໃຈຈະກັບສູງເພີ່ມຂຶ້ນຄືເລີ່ມ ມີການສຸກເກີດການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ພາຍໃນໝາກໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກະທັ້ງໝາກສຸກງອມ ແລະ ເໝົາໄປໃນທີ່ສຸດ. ໄມ້ໃຫ້ໝາກພວກນີ້ ສາມາດເກັບໝາກໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ໝາກຍັງບໍ່ທັນແກ່ຈັດ ຈົນກະທັ້ງສຸກຄາຕົ້ນ .

2. ພວກໝາກໄມ້ທີ່ບົ່ມໃຫ້ສຸກບໍ່ໄດ້ ຫລືບົ່ມບໍ່ສຸກ : ໄມ້ໃຫ້ໝາກພວກນີ້ ເມື່ອເກັບຈາກຕົ້ນແລ້ວ ອັດຕາການຫາຍໃຈຂອງໝາກຈະລຸດລົງເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ມີການສູງຂຶ້ນອີກ. ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆພາຍໃນໝາກມີໜ້ອຍຫລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບຄວນເກັບໃນໄລຍະທີ່ໝາກຢູ່ໃນໄລຍະແກ່ຈັດແລ້ວ ຫລືມີຄຸນນະພາບທີ່ຕະຫລາດຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ .

7.1.2 ຄວາມແກ່ຂອງໝາກ

ຄວາມແກ່ຂອງໝາກເປັນສິ່ງສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງໂດຍສະເພາະພວກທີ່ສາມາດບົ່ມໄດ້ ຖ້າເກັບອ່ອນເກີນໄປ ກໍ່ຄົງສະພາບຢູ່ຄືແນວນັ້ນ; ຈະສົມເພາະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນໝາກອີກແລ້ວຫລືມີກໍ່ໜ້ອຍຫລາຍ . ສ່ວນພວກທີ່ບົ່ມໄດ້ຖ້າເກັບອ່ອນເກີນໄປ ແມ້ຈະເອົາບົ່ມໃຫ້ສຸກໄດ້ແຕ່ຄຸນນະພາບບໍ່ດີ ເຊັ່ນ : ໝາກແຫ້ວ, ສີບ່ຽວ, ຮົດຊາດບໍ່ດີ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຖ້າເກັບແກ່ເກີນໄປໝາກກໍ່ຈະເນົາເສຍງ່າຍ . ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບໝາກຕ້ອງເກັບໃນໄລຍະທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໃຈຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຄວາມໃກ້-ໄກຂອງຕະຫລາດ, ສະພາບການຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາ, ການແປຮູບ ຕະຫລອດຈົນການສະພາບການປຸກ ແລະ ພະຍາດແມງໄມ້ອີກດ້ວຍ .

7.1.3 ຕົວບົ່ງຊີ້ຄວາມແກ່ຂອງໝາກແລະວິທີການເກັບໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ

1. ກ້ວຍ : ຈະສັງເກດເຫັນລຸ່ມທີ່ໝາກຫາຍໄປ ໝາກຕຶງ, ກົມຈະເກັບເມື່ອອາຍຸ 55 ວັນ ຫລັງຕັດໝາກປີກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມແກ່ 75 ເປີເຊັນ ຈະສຸກພາຍໃນ 3 ອາທິດ ເໝາະສຳລັບສົ່ງໄປໄກ ແຕ່ຖ້າເອົາໄວ້ບໍລິໂພກເອງ ຫລືໃກ້ຕະຫລາດຄວນປະໃຫ້ແກ່ເຕັມທີ່ ປະມານ 70 ວັນຫລັງຈາກຕັດໝາກປີ .

2. ໝາກມ້ : ໝາກທີ່ແກ່ສັງເກດໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ ໝາກຈະແຍກທ່າງກັນອອກໄປ ໃບສຸດທ້າຍທີ່ຢູ່ກ້ານໝາກຈະເປັນສີເຫຼືອງ ຫລືສີສົ້ມແກ່ຫລາຍຂຶ້ນ ຢ່າງທີ່ກ້ານຂ້ວນມີລັກສະນະຊຸ້ນ ຖ້າແກ່ຈັດ ຈະມີກິ່ນຫອມ ອາດເກັບເມື່ອໝາກ ເລີ່ມອ່ອນຕົວກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າສົ່ງໄປໄກ ຄວນເກັບເວລາໝາກຍັງແຂງຢູ່ .

3. ໝາກທຸລຽນ : ສັງເກດຄື ນອກຈາກອາຍຸຂອງໝາກແລ້ວ ຍັງອາໄສການຟັງສູງ ຮ່ອງໝາກເລີ່ມແຍກຕົວ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຊັດເຈນ ສີຂອງໝາກປ່ຽນແປງອອກສີຂາວນວນຂຶ້ນ ເຫຼືອງ ຫລືນ້ຳຕານຫລາຍຂຶ້ນ ກ້ານຂ້ວນມີຮອຍແຕກ. ທຸລຽນ ຄວນເກັບກ່ອນທີ່ກ້ານຂ້ວນຈະລຸດອອກ .

4. ໝາກມ່ວງ : ໝາກທີ່ແກ່ແລ້ວຈະມີນວນທີ່ໝາກໜາເປັນມັນວາວ ໝາກຕຶງ ຫລືຖ້ານຳໄປແຊ່ນ້ຳໝາກຈະຈົມປະມານເຄິ່ງໜ່ວຍ . ການເກັບໝາກຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ໝາກຊຳນຸມ ແລະ ຢ່າໃຫ້ນວນທີ່ຜິວໝາກລຸດອອກຫລາຍຈະບໍ່ສວຍງາມ .

5. ໝາກຫຸ່ງ : ຖ້າເປັນໝາກທີ່ປຸກໄວ້ບໍລິໂພກເອງ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ເປັນສີເຫຼືອງ ຫລືແດງຫລາຍກ່ອນຈຶ່ງເກັບ ຖ້າຈະສົ່ງໄປໄກຄວນໃຫ້ເກັບເມື່ອດ້ານກ້ານໝາກ ເລີ່ມປ່ຽນສີເປັນແຖວຍາວ ໝາກດັ່ງກ່າວຈະສຸກພາຍໃນ 7- 10 ມື້ .

6. ລຳໄຍ, ລີ້ນຈີ່ : ພວກນີ້ຈະເກັບກັນທັງຊໍ່ (ພົ້ວ) ຈຶ່ງຕ້ອງຖ້າໃຫ້ທັງພົ້ວແກ່ສະໝໍ່າສະເໝີເສຍກ່ອນ ໝາກທີ່ແກ່ຈະຕຶງ , ສີຂອງໝາກປ່ຽນໝາກລຳໄຍມີສີນ້ຳຕານອ່ອນ ລີ້ນຈີ່ມີສີແດງເຂັ້ມ ຫລືທົດສອບດ້ວຍການຊົມເບິ່ງ .

7. ພວກສົ້ມ : ໃຊ້ວິທີນັບອາຍຸ ແລະ ວິທີອື່ນໆປະກອບກັນ ພວກສົ້ມໂອ ສີຂອງໝາກຈະຈາງລົງຜິວສີອອກເຫລືອງ ຫລືຂຽວອົມເຫລືອງ ສົ້ມຂຽວຫວານ ສີອາດປ່ຽນເປັນເຫລືອງເຂັ້ມ, ສີສົ້ມ, ສີເຫລືອງປົນແດງ ຄວາມແຂງຂອງໝາກລຸດລົງ ເມື່ອບົດໝາກຈະລຸດຈາກຂ້ວນໄດ້ງ່າຍ.ການເກັບໝາກຄວນໃຊ້ມົດຕັດອອກມາທັງກ້ານໝາກລົງມາກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງເດັດອອກຕາມຫລັງ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຊຳ້ນູມ.

7.2 ການປະຕິບັດຫລັງຈາກການເກັບໝາກ

7.2.1 ການຄັດໝາກອອກ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດ

ໝາກທີ່ເກັບມາແລ້ວຄວນມີການຄັດອອກເພື່ອເອົາໜ່ວຍທີ່ບໍ່ດີອອກເຊັ່ນ :ໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ, ໜ່ວຍທີ່ບໍ່ສົມບູນ ມີຮອຍຕີຈຶ່ງໄວ້ແຕ່ໜ່ວຍທີ່ໄດ້ມາດຖານເພື່ອຈະຈຳໜ່າຍໄດ້ດີ. ນອກນີ້ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ຈຳເປັນຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ.

7.2.2 ການຄັດຂະໜາດ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີມາດຖານດຽວກັນ ສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ການຄັດຂະໜາດຂອງໝາກອາດໃຊ້ຂະໜາດຄວາມກ້ວາງ,ຍາວຂອງໝາກ ຫລືໃຊ້ນ້ຳໜັກຂອງໝາກກໍໄດ້ຕາມມາດຖານຂອງໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດທີ່ປະຕິບັດກັນມາ .

7.2.3 ການປ້ອງກັນກຳຈັດພະຍາດ - ແມງໄມ້ທີ່ຕິດມາກັບໝາກ

ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ບາງຊະນິດ ທີ່ຕິດມາກັບໝາກ ແລະ ລະບາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ຫລືການເກັບຮັກສາ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງກຳຈັດອອກເສຍກ່ອນ ໂດຍສະເພາະຕະຫລາດຕ່າງປະເທດຈະເຂັ້ມງວດເລື່ອງນີ້ ເພາະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໄປລະບາດໃນປະເທດຂອງເຂົາ. ການປ້ອງກັນອາດເຮັດໄດ້ຫລາຍວິທີ ເຊັ່ນ : ການຮົມຄວັນ, ການເຄືອບຜິວ, ການແຊ່ນ້ຳຮ້ອນ, ການຈຸ່ມສານເຄມີ, ການສາຍລັງສີ ເປັນຕົ້ນ. ເຊິ່ງແຕ່ລະວິທີຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເຖິງຄວາມຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າອີກດ້ວຍ. ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ຕິດມາກັບໝາກ ເຊັ່ນ : ບີໂນມີລ, ເບນເລດ ເຊິ່ງປ້ອງກັນພະຍາດເໜົ່າຂອງໝາກມ່ວງ, ໝາກຫຸ່ງ ແລະ ກ້ວຍ .

7.2.4 ການປົ່ມໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ

ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດຈຳເປັນຕ້ອງປົ່ມເພື່ອໃຫ້ສຸກພ້ອມໆ ກັນຫລືໃຫ້ມີສີສວຍງາມຂວນຊື້ ການປົ່ມອາດວາງໄວ້ໃນຫ້ອງທຳມະດາ ຫລືໃນຫ້ອງທີ່ປິດແຈບດີ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ຜົນດີຄວນມີຕົວຊ່ວຍປົ່ມເພື່ອເລັ່ງການສຸກ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ຖ່ານຫີນ ວາງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປົ່ມ .

7.2.5 ການເກັບຮັກສາໝາກໄມ້ຫຼັງຈາກປົ່ມໃຫ້ສຸກແລ້ວນັ້ນ

ຫຼັງຈາກທີ່ປົ່ມສຸກແລ້ວຄວນມີການຮັກສາເພື່ອ ໃຫ້ໝາກໄມ້ນັ້ນບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍດ້ວຍ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ : ໝາກມ່ວງ ຈະເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມປະມານ 10 ອົງສາເຊລຊຽດສ ແຕ່ຖ້າເຢັນຈົນເຖິງ 7 ອົງສາເຊລຊຽດສ ໝາກມ່ວງບາງພັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ .

7.2.6 ການບັນຈຸຫີບຫໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ໝາກໄມ້ຫລາຍຊະນິດທົນທານຕໍ່ການຂົນສົ່ງໄດ້ດີ ເພາະມີເປືອກທີ່ໜາ ບໍ່ຊຳ້ນູມໄດ້ງ່າຍ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນບັນຈຸໃນຫີບຫໍ່ກໍໄດ້ ເຊັ່ນ : ໝາກເງາະ, ໝາກນັດ, ທຸລຽນ, ສົ້ມໂອ ຢ່າງໃດກໍຕາມການຂົນສົ່ງ ກໍ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ໜົບເຕັງກັນຫລາຍເກັ້ນໄປ. ສຳລັບພວກໝາກໄມ້ມີເປືອກບາງຊັ້ນູມງ່າຍ ຄວນມີການບັນຈຸຫີບຫໍ່ກ່ອນຂົນສົ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໝາກໄມ້ມີສະພາບທີ່ດີຈົນເຖິງປາຍທາງ.

ບົດທົດສະດີທີ 8

ເທັກນິກກະສິກຳຍືນນານໃນການປູກໄມ້ກິນໝາກ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍວິທີການເຮັດນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ
2. ອະທິບາຍວິທີການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບແຫ້ງ
3. ອະທິບາຍວິທີການວິທີການເຮັດນ້ຳໝັກຊີວະພາບຮໍໂມນພືດ
4. ອະທິບາຍວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບກະສິກຳຍືນນານ
5. ອະທິບາຍວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດໂດຍຊີວະວິທີ
6. ບອກວິທີການໃຊ້ຝຸ່ນ ຫລືວັດຖຸທຳມະຊາດກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ
7. ບອກວິທີການອານຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກພື້ນເມືອງ

ເນື້ອໃນ

ການປູກໄມ້ກິນໝາກ ສາມາດນຳໃຊ້ເທັກນິກບາງຢ່າງທີ່ເປັນພູມບັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ຫລືເທັກນິກທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜະລິດໝາກໄມ້ປອດສານພິດເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຜູ້ບໍລິໂພກ.

8.1 ຝຸ່ນຊີວະພາບ

ຝຸ່ນຊີວະພາບທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການປູກໄມ້ກິນໝາກມີ 3 ຊະນິດ ຄື :

8.1.1 ຝຸ່ນຊີວະພາບນ້ຳ

ຝຸ່ນຊີວະພາບນ້ຳ ຫຼືບາງຄົນເອີ້ນວ່ານ້ຳສະກັດຊີວະພາບ ຫລືນ້ຳບີອີ (Bio - Extract BE) ເປັນການນຳເອົາພືດຜັກ ຫລືໝາກໄມ້ສົດ 3 ກິໂລກຼາມ ບົ່ມກັບນ້ຳຕານ ຫລືກາກນ້ຳຕານ1 ກິໂລກຼາມ ໃນຖັງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າ , ບົ່ມປະໄວ້ເປັນເວລາ 7 - 10 ມື້ ກໍຈະໄດ້ຂອງແຫຼວສີນ້ຳຕານ ເອີ້ນວ່ານ້ຳສະກັດຊີວະພາບ. ເຮົາສາມາດນຳມາໃຊ້ ໂດຍນຳເອົາ ນ້ຳສະກັດ 1 ລິດ ຕໍ່ 100 - 200 ລິດນ້ຳ ມາປະສົມເຂົ້າກັນ ແລ້ວທົດລົງໃນດິນໄລຍະກຽມດິນ ປູກຝັງ ໃນເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່ ຈະເປັນການເພີ່ມຈຸລິນຊີໃນດິນເຮັດໃຫ້ມີການຍ່ອຍລະລາຍອິນຊີວັດຖຸເຮັດໃຫ້ພືດຈະເລີນງອກງາມເພີ່ມຜົນຜະລິດ ຫລືອາດສົດໃສ່ພືດໂດຍກົງ ເດືອນລະ 1 - 2 ເທື່ອ ກໍໄດ້ຜົນເຊັ່ນດຽວກັນ.

8.1.2 ຝຸ່ນຊີວະພາບແຫ້ງ

ເປັນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບນ້ຳ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຂ້າງເທິງ (8.1.1) ໄປເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ໂດຍໃຊ້ຂີ້ສັດແຫ້ງ 1 ສ່ວນ ໃສ່ຮຳພໍສົມຄວນ ເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ້ຈຸລິນຊີ ຫລືອາດຈະໃຊ້ແບ່ງ ເຂົ້າຈຳນວນພໍເໝາະສົມກໍໄດ້ ປະສົມນ້ຳຊີວະພາບໝັກໄວ້ໃຫ້ຊຸມ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າຢາງບົກຄຸມໄວ້ 7- 10 ມື້ ເມື່ອຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງແລ້ວ ເປີດຜ້າອອກແລ້ວຕາກລົມໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວນຳໄປໃຊ້ ໂດຍອັດຕາ 200 ກິໂລກຼາມຕໍ່ໄຮ່.

8.1.3 ນ້ຳໝັກຊີວະພາບຮໍໂມນພືດ

ນ້ຳໝັກຊີວະພາບໃຊ້ໝາກກ້ວຍສຸກ 1 ກິໂລກຼາມ, ໝາກຮຸ່ງສຸກ 1 ກິໂລກຼາມ, ໝາກອິສຸກ 1 ກິໂລກຼາມ ຝັກໃຫ້ໝຸ່ນສົມຄວນໝົດທັງແກ່ນ ໝັກກັບນ້ຳຕານ ຫຼືກາກນ້ຳ ຕານ 1 ກິໂລກຼາມ ປະໄວ້ 10 - 15 ມື້ ລັກສະນະຄ້າຍຄືຝຸ່ນຊີວະພາບນ້ຳຈາກໝາກໄມ້ ສິດ ນ້ຳໝັກທີ່ໄດ້ຈະປະກອບໄປດ້ວຍແຮ່ທາດຫຼາຍ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຄື : ວິຕາມິນ ແລະຮໍໂມນ ພືດ. ໃຊ້ນ້ຳໝັກຮໍໂມນ ນີ້ 2 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 10 ລິດ ສິດໃນໄລຍະໃບຍອດແກ່ຈັດ ເພື່ອເລັ່ງຕາ ດອກ ໂດຍສິດອາທິດລະເທື່ອຈົນເຖິງໄລຍະອອກດອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການຕິດໝາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຫຼົ້ນ ແລະຍັງສາມາດໃຊ້ໃນການແຊ່ແກ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແກ່ນແຕກງອກໄດ້ດີ ໂດຍໃຊ້ນ້ຳ ໝັກຊີວະພາບ 1 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 1 ລິດ ກ່ອນກ້າແກ່ນ.

8.2 ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບກະສິກຳຍືນຍານ

8.2.1 ການນຳໃຊ້ຕົ້ນຕໍພືດພື້ນເມືອງ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກມ່ວງ, ໝາກໄຟ, ຖົ່ວລຽນ ຖ້າເຮົາໃຊ້ຕົ້ນຕໍພືດພື້ນເມືອງ ຈະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕານທານໃນລະບົບຮາກໄດ້ດີ, ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແລະ ອາຍຸຍືນ.

8.2.2 ການໃຊ້ສານສະກັດຈາກພືດ

ການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຄວນສຶກສາລະອຽດໃນປຶ້ມກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງນີ້ເພາະຈະ ມີລາຍລະອຽດຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ນີ້ ຈະຂໍແນະນຳສານສະກັດທີ່ມີຍົມໃຊ້ຄື ໝາກເຜັດສຸກ 200 ກຼາມ, ຕຳໝຸ່ນ ລະລາຍໃນນ້ຳ 10 ລິດ ແລ້ວຕອງເອົາກາກອອກໃຫ້ໝົດ ສິດຂ້າໜອນ ຫຼືເພີ້ຍໄດ້ດີ ລວມ ທັງແມງໄມ້ປົກແຂງ, ໃບຂົມກະເດົາ ໃຊ້ໃບສິດ 5 ກິໂລກຼາມ ຫຼືແກ່ນແຫ້ງ 1 ກິໂລກຼາມ ຕຳໝຸ່ນ ໃສ່ນ້ຳ 10 ລິດ ຕອງເອົາກາກອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວນຳໄປສິດ ຈະເຮັດໃຫ້ໜອນ ແລະ ດ້ວງບໍ່ລອກ ຄາບ, ບໍ່ກິນອາຫານ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ໂດຍກົງ.

8.2.3 ການກຳຈັດແມງໄມ້ໝາກໄມ້ (Fruit - Fly)

ແມງໄມ້ໝາກໄມ້ຖືວ່າແມ່ນສັດຕູສຳຄັນຊະນິດໜຶ່ງເພາະຈະວາງໄຂ່ໃນໝາກ ໄມ້ ເມື່ອໝາກໄມ້ສຸກຈະເປັນຕົວໜອນເຈາະໝາກໄມ້ ເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ເໝົາເສຍບໍ່ສາມາດນຳມາ

ບໍລິໂພກໄດ້. ຮໍໂມນ ຢຸຈິນອລ (Eugenal) ເຊິ່ງເປັນ ຮໍໂມນດຶງດູດທາງເພດລໍ່ຖ້າໃຫ້ໂຕຜູ້ເຂົ້າມາ ໃນກັບດັກ ແລ້ວຂ້າໃຫ້ຕາຍເທັກນິກນີ້ເຮົາຍັງໃຊ້ພືດພື້ນເມືອງບາງຊະນິດແທນສານ Eugenal ໄດ້, ເປັນຕົ້ນໂປພູປ່າ, ດອກສະເລເຕ ກໍ່ສາມາດລໍ່ແມງໄມ້ໄດ້ ຫຼືສັງເກດພືດອື່ນ ໆ ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ ມີແມງໄມ້ມັກຈັບ ຫຼືຕອມ ກໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ. ການເຮັດກັບດັກ ນິຍົມໃຊ້ກວດຢາງຕັດ ຄໍກວດສູບປາກເຂົ້າໄປທາງໃນ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ສານລໍ່ໃນກວດແກ້ວແລ້ວແມງໄມ້ຈະເຂົ້າໄປ ແລະ ອອກບໍ່ໄດ້. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງນຳໄປຂ້າຖິ້ມ.

8.3 ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດໂດຍຊີວະວິທີ

ເປັນການນຳເອົາສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼືຈຸລິນຊີ ເຂົ້າໄປປ້ອງກັນກຳຈັດສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນພະຍາດ ຫລື ສັດຕູພືດ.

8.3.1 ການນຳເອົາຈຸລິນຊີໄປປ້ອງກັນພະຍາດໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ວິທີການນີ້ ປະຈຸບັນກຳລັງນິຍົມໃຊ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສັດຈຸລິນຊີ EM ຫຼື ນ້ຳໝັກຊີວະພາບເປັນປະຈຳໃນທຸກອາຫິດ ການໃຊ້ເຊື້ອຮາ (Ketonium) ປ້ອງກັນພະຍາດ ຮາກເໝົາ, ກົກເໝົາ ການໃຊ້ເຊື້ອຈຸລິນຊີ ບີທີ (BT) ກຳຈັດໂຕບຶ້ງ.

8.3.2 ການໃຊ້ໂຕຫຳໂຕບຽນ

ແມງໄມ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຕຫຳ ຄືເປັນແມງໄມ້ທີ່ກິນແມງໄມ້ ຫຼື ບັງທີ່ເປັນສັດຕູພືດ ເປັນອາຫານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ : ແຕນ, ຕໍ່. ແມງໂຕບຽນ ເປັນແມງໄມ້ນ້ອຍໆ ທີ່ຄອຍລົບກວນ ຫຼືເປັນພະຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດໃຫ້ແກ່ແມງໄມ້ທີ່ເປັນສັດຕູພືດ.

8.3.3 ຂີ້ກະເດືອນຝອຍ

ຂີ້ກະເດືອນຝອຍ ເປັນ ຂີ້ກະເດືອນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນໂທດ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດກັບຮາກພືດ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຈະເລີນງອກງາມ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ. ແຕ່ບາງຊະນິດມັນຈະເປັນສັດຕູຄອຍກິນຂີ້ກະເດືອນຝອຍທີ່ເປັນໂທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິຊາການຈະເອົາຂີ້ກະເດືອນຝອຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດມາເພາະພັນໃຊ້ກຳຈັດຂີ້ກະເດືອນຝອຍທີ່ ເປັນໂທດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນຮາກພືດ.

8.4 ການໃຊ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸທຳມະຊາດໃນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ມີຝຸ່ນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດຖຸທຳມະຊາດບາງຊະນິດສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການປຸກໄມ້ໃຫ້ ໝາກເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດດີ.

8.4.1 ຂີ້ເຈຍ

ເປັນອາຈົມຂອງເຈຍຊະນິດທີ່ກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ, ເປັນເຈຍຂະໜາດ ນ້ອຍ ທີ່ອາໄສໃນຖ້ຳຫີນປູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຂີ້ເຈຍເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກສາສົມໃນຖ້ຳດິນຫຼາຍຮ້ອຍ ປີບາງ

ເທື່ອມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັນ ຈະມີປະລິມານທາດອາຫານຂອງພືດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ທາດຟອສຟໍຣັດ (P) ແລະ ໂປແຕັສຊຽມ (K) ອາດຈະມີເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະໝາກໄມ້ກຳລັງແກ່ ຫລືກ່ອນເກັບກ່ຽວປະມານ 1 ເດືອນ. ການໃຊ້ຂີ້ເຈຍ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ຄວາມກ້ວາງຊຸມພູມ 1 ແມັດ ແລະ ຫົດນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ມີໜ່ວຍໃຫຍ່ເປື້ອນກຸ້ມຮີດຊາດດີ, ກອບ ເພາະສິດທິຜົນຂອງທາດໂປແຕັສຊຽມ.

8.4.2 ຫີນຟອສເຟສ

ເປັນຫີນທຳມະຊາດທີ່ມີສູດຝຸ່ນ 0 - 3 - 0 ຄືມີທາດ ຟອສຟໍຣັດ ເປັນຕົວຊ່ວຍບຳລຸງຮາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດຂອງດິນ. ຫີນຟອສເຟດ ຈຶ່ງນິຍົມນຳມາໃຊ້ເປັນວັດຖຸຮອງກັນຊຸມປູກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮາກລົງເລິກ, ຫີນແລ້ງໄດ້. ໃນໄລຍະທີ່ກົກໄມ້ເປັນໝາກຫຼືກຸ້ມອອກດອກ ນິຍົມໃຊ້ຟອສເຟສ 1 - 2 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ຊຸມ ພູມກ້ວາງ 1 - 2 ແມັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ສົມບູນດີ .

8.4.3 ໂດໂລໄມດ

ເປັນຫີນປູນຊະນິດທີ່ມີຄວາມເປັນກາງ ແຕ່ບໍ່ເທົ່າປູນຂາວ ໃຫ້ແຄລຊຽມແກ່ຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ແຂງແຮງດີ ເຊິ່ງມີຈຸດພິເສດ ຄື : ທາດ ແມັກນີຊຽມ(Mg),ແມັກການນິດ(Mn)ຢູ່ນຳເຮັດໃຫ້ພືດສ້າງຄຣ໌ໂລຟິນໄດ້ດີມີສີຂຽວເຂັ້ມ.ໃນການກຽມໜອງປາກໍ່ຈະໃຊ້ ໂດໂລໄມ້ ເພາະເກີດນ້ຳຂຽວໄດ້ດີ.

8.4.4 ດິນ ຫຼືຫີນພູເຂົາໄຟ

ໃນບໍລິເວນພູເຂົາໄຟເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດທ່າແຕງແມືອງປາກຊ່ອງໃນພາກໃຕ້ ດິນເຫລົ່ານີ້ ມີທາດອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພືດສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທາດຊີລິກາ ທີ່ຢູ່ໃນຮູບທີ່ພືດສາມາດດູດເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ພືດມີຈຸລັງແຂງແຮງຕ້ານກັບພະຍາດໄດ້ດີ. ແຮ່ທາດເຫລົ່ານີ້ຈະສາມາດ ເຮັດໃຫ້ພືດແຂງແຮງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ. ຫີນພູເຂົາໄຟ ທີ່ມີປະໂຫຍດຈະມີສີແດງ ຫຼື ຂາວມົ້ນ, ນ້ຳໜັກເບົາ, ມີຮູອາກາດນ້ອຍ ໆ ຢູ່ໃນກ້ອນຫີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຈະບໍ່ມີການປະຕິກິລິຍາກັບກົດ ຕົວຢ່າງ : ຖ້າເອົານ້ຳສົ້ມ ຫຼືໝາກໜາວໃສ່ຈະບໍ່ມີຟອດເກີດຂຶ້ນ ຖ້າມີຟອດເກີດຂຶ້ນສະແດງວ່າເປັນຫີນປູນບໍ່ແມ່ນດິນຫີນພູເຂົາໄຟ ເຂດດິນພູເຂົາໄຟເໝາະສົມສຳລັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຫຼືອາດນຳເອົາດິນນີ້ໄປໃຊ້ຄືກັນກັບຫີນຟອສເຟດ.

8.4.5 ກະດູກສັດ

ກະດູກສັດ ໃຫ້ທາດ ແຄລຊຽມ (Ca) ແລະ ຟອສເຟດ (P) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍນຳມາເຜົາ, ຕຳໃຫ້ມຸ່ນ ນຳໃຊ້ເປັນຝຸ່ນທຳມະຊາດ ໃຫ້ທາດ ແຄລຊຽມ(Ca) ແລະ ຟອສເຟດ (P) ແລະ ແຮ່ທາດ ອີກຫຼາຍຊະນິດ. ວິທີໃຊ້ຄືກັນກັບຫີນຟອສເຟດ.

8.5 ການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄມ້ໃຫ້ໝາກພື້ນເມືອງ

ໃນປະຈຸບັນປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງກຳມະພັນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ເຮົາຈຶ່ງຄວນມີການອານຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຄື :

8.5.1 ກ້ວຍ

ກ້ວຍໃນປະເທດເຮົາ ມີເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຊະນິດ ທີ່ສາມາດນຳມາພັດທະນາເປັນຜະລິດຕະພັນໝາກໄມ້ສົດ, ແປຮູບ, ເສັ້ນໃຍ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຫັດຖະກຳ, ໃບຕອງ ນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປີກ້ວຍ ກໍ່ເປັນອາຫານ, ສ່ວນຢວກກ້ວຍ, ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ສ່ວນອື່ນໆ ກໍ່ເປັນອາຫານສັດໄດ້ດີບາງຊະນິດກໍ່ນຳມາເປັນພືດສວຍງາມ ຫຼືໄມ້ປະດັບຢ່າງດີທາງເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິຊາການຄວນມີການພັດທະນາໝາກໄມ້ພື້ນເມືອງຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເພື່ອຈຸດປະສົງພັດທະນາໃຫ້ເປັນໄມ້ເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ.

8.5.2 ໝາກມ່ວງ

ຖືວ່າເປັນໝາກໄມ້ພື້ນເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງລາວ ມີຄວາມສຳຄັນຄື :

1. ໝາກມ່ວງປ່າ ເປັນກິກໄມ້ໃຫ່ຍໄວ ສາມາດພັດທະນາເປັນໄມ້ສວນເສດຖະກິດໄດ້.
2. ໝາກມ່ວງບ້ານ : ຄວນນຳມາເປັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຜະລິດໝາກມ່ວງແຕ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ໝາກມ່ວງປ່າມາເປັນຕົ້ນຕໍ ເພາະມັກມີກິ່ນຂົວ. ຄວນມີການຄັດເລືອກປະສົມພັນ ເພື່ອຍົກຄຸນນະພາບໃຫ້ມີຄ່າທາງເສດຖະກິດ.

8.5.3 ໝາກໄຟ

ເປັນໝາກໄມ້ປ່າຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄັດເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ມີວິດຊາດດີ, ໝາກໃຫ່ຍ, ສີໝາກງາມ ນຳມາຂະຫຍາຍພັນເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກເສດຖະກິດ.

8.5.4 ໝາກເຟືອງ

ເປັນໝາກໄມ້ກຳລັງມີຊື່ສຽງໃນຢູໂລບ ເພາະວ່າໝາກ ມີຮູບຮ່າງທີ່ສວຍງາມ ເຊິ່ງຢູໂລບເອີ້ນວ່າ (Star fruit) ເພາະວ່າຫາກຜ່າຕັດລວງຈະເຫັນເປັນລັກສະນະຮູບດາວປະເທດມາເລເຊຍສາມາດຜະລິດເປັນໝາກໄມ້ສົ່ງອອກ ໝາກເຟືອງມີທັງສີ່ມ ແລະ ຫວານແຕ່ລິດທີ່ຄົນຕ່າງປະເທດມັກຄຶດລິດສີ່ມຫວານນັກວິຊາການຄວນມີການຄັດເລືອກແນວພັນເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນ ໄມ້ໃຫ້ໝາກເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ, ໝາກເຟືອງສີ່ມກໍ່ສາມາດນຳມາຜະລິດນ້ຳສີ່ມໄດ້ດີ

8.5.5 ໝາກໄມ້ພື້ນເມືອງອື່ນໆ

ມີໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດຂອງລາວ ທີ່ມີຄວາມອາສາມາດພັດທະນາເປັນໄມ້ເສດຖະກິດຂອງລາວ ເຊັ່ນ ໝາກຈອງນ້ອຍ ເປັນໝາກທີ່ມີສານເຍື່ອໃຍສູງ. ສາມາດນຳໄປຜະລິດເປັນສານອາຫານຫຼຸດຄວາມອ້ວນທີ່ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ເຊັ່ນ : ໝາກໝ້າ, ຫວ້າ ແປຮູບເປັນນ້ຳໝາກໄມ້, ເຫຼົ້າວາຍ ມີລິດຊາດດີ ແລະ ອາດຈະມີໝາກໄມ້ອື່ນໆອີກ ເພາະຍັງບໍ່ທັນມີການຄົ້ນຄ້ວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈະຄວນຈະສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາພັນໄມ້ພື້ນເມືອງຕື່ມອີກ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

1. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້. 1993. ເອກະສານປະກອບການສຶດສອນ ວິຊາການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ຫຼັກສູດເອກະພາບສຳລັບ 4 ໂຮງຮຽນກະສິກຳຊັ້ນກາງ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກ ອົງການຊົດເຊ ແລະ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຢີລາຊະມົງຄົລ ປະເທດໄທ. ພິມທີ່ສະຫວັນນະເຂດ. 50 ນ.
2. ສະຖານີ ກະສິກຳທາດດອກແກ້ວ. 1996. ຄູ່ມືກ່ຽວກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ກົມປູກຝັງ ແລະ ສິ່ງເສີມການກະເສດ.ກະຊວງກະສິກຳ - ປ່າໄມ້. 128 ນ.
3. ສັມລິດ ເພື່ອງຈັນ. ພສ 2523. ຫຼັກກຳໄມ້ຜົນ. ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ. 122 ນ.
4. ວັດທະນາ ສະວັນຍາທິປັດ. ພສ 2536. ການປູກໄມ້ຜົນ. ສຳນັກງານສິ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ. ນ 4 - 97.