



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
---==00000==---

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ ວິຊາ

ການຜະລິດກາເຟ

Coffee Production

ຫຼັກສູດສຳລັບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ
ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີລາຊະນິຄົນ ກາລະສິນ

ສາລະບານ		ໜ້າ
ສາລະບານ		A
ບົດທົດສະດີທີ 1	ລັກສະນະພຶກສາດຂອງກາເຟ	1
	1.1 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງກາເຟ	1
	1.2 ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກາເຟ	2
ບົດທົດສະດີທີ 2	ພັນກາເຟ ແລະການຂະຫຍາຍພັນ	4
	2.1 ພັນກາເຟ	4
	2.2 ການຂະຫຍາຍພັນກາເຟ	6
ບົດທົດສະດີທີ 3	ການເລືອກສະຖານທີ່ປູກກາເຟ	13
	3.1 ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກກາເຟ	13
	3.2 ການເລືອກສະຖານທີ່	15
	3.3 ການຕັ້ງແລະ ການປູກໄມ້ເປັນຮົ່ມ	16
ບົດທົດສະດີທີ 4	ການຜະລິດກາເຟ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາກາເຟ	19
	4.1 ການກຽມເນື້ອທີ່ ແລະ ການປູກ	19
	4.2 ການໃສ່ຜຸ່ນກາເຟ	22
	4.3 ການໃສ່ວັດຖຸຄຸມດິນ	24
	4.4 ການຕັດແຕ່ງກິ່ງກາເຟ	25
	4.5 ພະຍາດ ແລະ ສັດຕູຂອງກາເຟ	26
ບົດທົດສະດີທີ 5	ການເກັບກ່ຽວກາເຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກາເຟ	32
	5.1 ການເກັບກ່ຽວກາເຟ	32
	5.2 ຜະລິດຕະພັນກາເຟ	33
ບົດທົດສະດີທີ 6	ການປູກຊາ	36
	6.1 ປະໂຫຍດ ແລະ ປະຫວັດຂອງການປູກຊາ	36
	6.2 ພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ	38
	6.3. ການປູກ ແລະ ການຈັດການສວນຊາ	45
ເອກະສານອ້າງອີງ		56

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ ວິຊາ

ການຜະລິດກາເຟ

Coffee Production

ຫຼັກສູດສຳລັບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ
ທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີລາຊະນິຄົນ ກາລະສິນ

ບົດທົດສະດີທີ 1

ລັກສະນະພຶກສາດກາເຟ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍ ລັກສະນະພຶກສາດຂອງກາເຟ
2. ບອກ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກາເຟ

ເນື້ອໃນ

1.1 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງກາເຟ

ກາເຟ ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ *Coffea sp.* ຈັດເປັນປະເພດໄມ້ຟຸ່ມ ຂະໜາດກາງ ສູງປະມານ 3-5 ແມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກາເຟແຕ່ລະພັນ.

1.1.1 ລັກສະນະຮາກ (Root)

ກາເຟເປັນພືດທີ່ມີລະບົບຮາກແກ້ວ ແລະ ຮາກຝອຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ມີຮາກດູດອາຫານ ຢູ່ພາກສ່ວນຕົ້ນໆ ປະມານ 60-80% ຂອງຈຳນວນຮາກຈະແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນຄວາມເລິກປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຈົນເຖິງປະມານ 1 ແມັດ ເປັນສ່ວນນ້ອຍ, ຄວາມເລິກສຸດເຖິງ 3 ແມັດ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໃນລັດສະໝີ 1-5 ແມັດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ ຈະຢູ່ໃນ 120 ຊັງຕີແມັດ. ໂດຍອ້ອມຮອບຕົ້ນກາເຟ.

1.1.2 ລັກສະນະລຳຕົ້ນ

ກາເຟເປັນຕົ້ນໄມ້ປະເພດຍືນຕົ້ນ ແລະ ຊົງຟຸ່ມຂະໜາດກາງ ຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວກາເຟມີລັກສະນະລຳຕົ້ນຕັ້ງຊື່. ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຈະບໍ່ມີການແຕກງ່າ ແຕ່ມີໃບແຕກອອກ ຢູ່ຕາມຂໍ້ຢູ່ກົງກັນຂ້າມ ກັນເປັນຄູ່ໆ. ຕໍ່ມາເມື່ອມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍມີການແຕກງ່າອອກຈາກລຳຕົ້ນ ໃນລັກສະນະທີ່ແຍກກັນອອກຈາກກັນແລະຢູ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບງ່າທີ່ແຕກອອກມາໃໝ່ ຈະມີໃບແຕກອອກເປັນຄູ່ໆຢູ່ຕາມຂໍ້ເຊັ່ນດຽວກັບລຳຕົ້ນ. ງ່າຈະຂະໜານໄປກັບຜືນດິນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນເກີດຂອງດອກ ແລະ ໝາກຕໍ່ໄປ.

ນອກຈາກການແຕກງ່າແລ້ວ ຍັງມີການແຕກໜ່ວຍຈາກຕາຂອງລຳຕົ້ນອີກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ບຽດກັບຕົ້ນເດີມ ຖ້າຫາກປອຍໄວ້ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ມີການຕັດແຕ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ກາເຟມີຊົງຟຸ່ມແໜ້ນຕືບໜາ ອັນເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງແມງໄມ້, ສະສົມເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າ.

1.1.3 ລັກສະນະໃບ

ງ່າກາເຟຈະມີໃບອອກເປັນຄູ່ໆ ກົງກັນຂ້າມກັນ ທີ່ບໍລິເວນປາຍໃບຈະມ້ວນເຂົ້າ ໃບມີຄວາມກວ້າງປະມານ 4-7 ຊັງຕີແມັດ , ຍາວປະມານ 10-20 ຊັງຕີແມັດ, ປາຍໃບແຫລມ ໃບແກ່ຈະເປັນທີ່ສະສົມທາດອາຫານ.ກາເຟພັນອາລັບບີກາ ມີໃບປະມານ 9-10 ຄູ່, ສ່ວນພັນໂລບັດສະຕາມິເສັ້ນໃບປະມານ 11-13 ຄູ່ຕໍ່ໃບ.

1.1.4 ລັກສະນະດອກ

ກາເຟເປັນພືດວັນສັ້ນ ຈະອອກດອກໃນຊ່ວງທີ່ແສງນານ 8-12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ດອກກາເຟ

ມີສີຂາວບໍ່ລົງສຸດ ກິ່ນຫອມຄ້າຍດອກຊ້ອນ ຄ້າຍຮູບດາວ ມີກ້ານສັ້ນ ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ຈະເກີດຕາມຂໍ້ຂອງ ຕົ້ນກາເຟເປັນສ່ວນນ້ອຍ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍດອກກາເຟຈະອອກຈາກຂໍ້ຂອງງ່າກາເຟ ໂດຍເລີ່ມຈາກຂໍ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ ລຳຕົ້ນອອກໄປຫາປາຍງ່າ. ກາເຟມີລັກສະນະພິເສດຄືຂໍ້ຂອງງ່າສັ້ນສາມາດທີ່ຈະເກີດດອກ ແລະ ຕິດໝາກ ໄດ້ຫຼາຍ. ດອກກາເຟເປັນດອກສົມບູນເພດ ມີທັງເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ລວມຢູ່ໃນດອກດຽວກັນ. ເກສອນແມ່ຈະມີຢູ່ສອງສ່ວນ ແຕ່ເກສອນຜູ້ມີຢູ່ເທົ່າກັບຈຳນວນຂອງກິບດອກ ຄື ປະມານ 2-4 ອັນ, ດັ່ງນັ້ນ ເກສອນແມ່ ຈະມີປະມານ 4-8 ອັນ.

ກາເຟບາງພັນອາດຈະມີການປະສົມພັນຂ້າມກັນໂດຍງ່າຍ ຫາກຢູ່ໃກ້ກັນ ເວລາການ ອອກດອກຂອງກາເຟຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານນ້ຳ ຖ້າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຝົນຕົກເປັນລະດູ ດອກຈະອອກຫຼັງຈາກຝົນ ຕົກປະມານ 1 ເດືອນ ແຕ່ຖ້າຫາກອາກາດຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ຕະຫລອດປີ ຫລື ມີນ້ຳຈາກຊົນລະປະທານຢ່າງພຽງພໍ ກາເຟຈະອອກດອກສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫລອດປີ.

1.1.5 ລັກສະນະໝາກກາເຟ

ເຖິງແມ່ນວ່າດອກຂອງກາເຟ ຈະອອກເປັນຈຳນວນຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ການຕິດໝາກຈະມີ ພຽງແຕ່ 16-26% ຖ້າຕິດເຖິງ 20% ຖືວ່າຫຼາຍແລ້ວ. ຫຼັງຈາກດອກໄດ້ຮັບການປະສົມພັນສົມບູນແລ້ວ, ຕົ້ນກິບດອກຈະລົ້ນ ຫຼັງຈາກກິບດອກລົ້ນແລ້ວ ກາເຟກໍຈະຕິດເປັນໝາກ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບໝາກຫວ້າ ເຊິ່ງພາຍໃນໝາກກາເຟແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ ສ່ວນໜຶ່ງມີແກ່ນກາເຟ 1 ແກ່ນ ເຊິ່ງມີລັກສະນະແບນ ຍາວໄປຕາມຮູບຂອງເປືອກຫຸ້ມ ຖ້າຫາກແກ່ນໜຶ່ງແກ່ນໃດລົບ ເພາະການປະສົມພັນບໍ່ດີ ແກ່ນທີ່ເຫຼືອຢູ່ຈະມີ ຮູບກົມ ສ່ວນຍາວຈະມີຮູບໂຄ້ງເປັນຮູບກະບອກຕັດ. ໝາກກາເຟທີ່ສຸກເຕັມທີ່ ແລ້ວຈະມີສີແດງເປັນສ່ວນ ຫຼາຍປົນສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານເລັກນ້ອຍ.

ໄລຍະການສ້າງເປັນໝາກ ນັບແຕ່ອອກດອກຈົນເຖິງໝາກສຸກ ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ປະມານ 8-9 ເດືອນ ແລະ 9-11 ເດືອນ ແລ້ວແຕ່ແນວພັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ. ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຄວາມງອກຂອງແກ່ນກາເຟ 30-35 ອົງສາເຊລຊຽສ, ອັດຕາຄວາມງອກຈະຫລຸດລົງໄວ ຖ້າ ຫາກປະໄວ້ ຫລື ເກັບຮັກສາໄວ້ດົນ. 2 ເດືອນຫຼັງການເກັບກ່ຽວຈະມີຄວາມງອກຢູ່ປະມານ 70% ເຖິງ 80% . ຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປແລ້ວກໍຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ແຕ່ເປີເຊັນຄວາມງອກຕໍ່າລົງເລື້ອຍໆ.

ແກ່ນກາເຟເປັນສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນກາບໃນ ເຊິ່ງຫຸ້ມທີ່ດ້ວຍເຫຍື່ອບາງໆອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ສ່ວນເນື້ອ ຊັ້ນທີ່ຫຸ້ມພາຍໃນ ເນື້ອສຸກເຕັມທີ່ ຈະມີລົດຫວານເລັກນ້ອຍ ລັກສະນະເປັນຢ່າງໜຽວໆ ໝາກກາເຟສີດທີ່ ເກັບມາເຮັດເປັນສານກາເຟແຫ້ງ ຈະສູນເສຍນ້ຳໜັກໄປປະມານ 80% ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກນຳໄປຂົ້ວ ເຮັດເປັນກາເຟທີ່ໃຊ້ຊົງຕົ້ມ ກໍ່ຄົງຈະມີເນື້ອກາເຟແຫ້ງພຽງແຕ່ 13,6% ຂອງນ້ຳໜັກສີດ ໃນຂະນະທີ່ເກັບ ມາຈາກຕົ້ນໃໝ່ໆ.

ກາເຟຂໍ້ໜຶ່ງໆ ທີ່ໃຫ້ໝາກກາເຟແລ້ວ ໃນປີຕໍ່ໄປຈະບໍ່ໃຫ້ໝາກອີກ ແຕ່ໝາກກາເຟຈະອອກ ຕໍ່ໄປໃນຂໍ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນອອກໝາກ ເຊິ່ງປົກກະຕິກາເຟຈະອອກໝາກຈາກຂໍ້ທີ່ໃກ້ລຳຕົ້ນອອກໄປສູ່ປາຍກິ່ງ ສ່ວນວ່າຈະອອກຈາກຂໍ້ນັ້ນ ສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຕົ້ນກາເຟ ໃນປີນັ້ນໆ.

1.2 ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກາເຟ

1.2.1 ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກາເຟ

ກາເຟສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຕົ້ມເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ປະຊາກອນເກືອບ ທຸກຊາດ ທຸກພາສາໃນທົ່ວໂລກ ຕົ້ມກາເຟເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເພາະສ່ວນປະກອບໃນແກ່ນກາເຟ ມີທາດກາເຟ

ອິນ ເຊິ່ງ ມີຢູ່ປະມານ 0,85-2,5% ສຳລັບທາດກາຟອິນ ທີ່ກ່າວມານີ້ ບໍ່ມີແຕ່ຢູ່ໃນແກ່ນກາຟເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີຢູ່ໃນຜິດອື່ນໆເຊັ່ນ ໃບຊາ, ທາດກາຟອິນໃນໃບຊານັ້ນ ຊາວໂລກຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ ເວລານານແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຈີນ ມັກມີຍົນຕົ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໃນດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ ກາຟ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນຜິດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າໃບຊາ.

ທາດກາຟອິນ ນອກຈາກຈະບັນຈຸຢູ່ໃນແກ່ນກາຟເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຍັງບັນຈຸຢູ່ໃນ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງກາຟ ດັ່ງນີ້:

- ໃນໃບຈະມີທາດກາຟອິນຢູ່ປະມານ 1,5%
- ໃນດອກຂອງຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸປະມານ 20 ປີ ຈະມີທາດກາຟອິນຢູ່ປະມານ 0,9%
- ໃບແຫ້ງໂດຍເບີຍໄວ້ຮົ່ມ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ມີທາດກາຟອິນປະມານ 0,82%
- ໃນລຳຕົ້ນກາຟ ຈະມີທາດກາຟອິນ ຢູ່ປະມານ 0,087%
- ເປືອກຂອງແກ່ນກາຟ ຈະມີທາດກາຟອິນ ຢູ່ປະມານ 0,88%

ຫຼັງຈາກເຮົາຕື່ມກາຟລົງໄປແລ້ວ ທາດກາຟອິນຈະເຮັດໃຫ້ ສະໝອງຖືກກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ ຮູ້ສຶກໄດ້ທັນທີບໍ່ເຫງົານອນ ສະໝອງປອດໂປ່ງ ຄວາມຈຳຕິຂຶ້ນ ການຕັດສິນໃຈແນ່ນອນ ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນ ພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ມະນຸດເຮົາຈຶ່ງຕິດກາຟ ແລະ ຕື່ມກາຟເປັນປະຈຳ. .

ທາດກາຟອິນ ເຮັດໃຫ້ຈິ່ງຫວະ ຂອງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວ ກ້ອງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການໝູນ ວຽນເລືອດໃນຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ.

ທາດກາຟອິນ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດໃນຮ່າງກາຍຕິງຂຶ້ນ .

ທາດກາຟອິນ ເຮັດໃຫ້ເດັກໃນທ້ອງທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 3 ເດືອນ ຝືການໄດ້ ດັ່ງນັ້ນກາຟໃຫ້ທັງ ປະໂຫຍດໃຫ້ທັງໂຫດ.

ບົດທົດສະດີທີ 2

ພັນກາເຟ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ບອກລັກສະນະ ຂອງພັນກາເຟທີ່ປູກໃນປະເທດລາວ
2. ບອກວິທີການຂະຫຍາຍພັນກາເຟ ທີ່ປູກໃນປະເທດລາວ

ເນື້ອໃນ

2.1 ພັນກາເຟ

ໃນປະຈຸບັນໃນທົ່ວໂລກມີກາເຟຢູ່ປະມານ 50 ພັນ ແຕ່ໃນນັ້ນພັນທີ່ນິຍົມປູກ ເພື່ອການຄ້າທົ່ວໂລກ ໃນປະຈຸບັນມີ ພັນອາຣາບິກາ ເຊິ່ງຊາວສວນເອີ້ນວ່າ ກາເຟນ້ອຍ, ພັນໂຣບັດສະຕາ ຊາວສວນເອີ້ນວ່າ ກາເຟກາງ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາ ການປູກກາເຟ ສັນນິຖານໄດ້ວ່າ ຊາວຝຣັ່ງເສດ ໄດ້ນຳເຂົ້າມາປູກປະມານປີ 1940 ໃນສະໄໝຝຣັ່ງຍຶກຄອງ ໂດຍນຳໄປປູກຢູ່ສະຖານີປູກຝັງ ຫລັກ 42 ເສັ້ນທາງ ປາກເຊ-ປາກຊ່ອງ ແລະ ມີຢູ່ 5 ຊະນິດນຳເຂົ້າມາປູກ

- ພັນອາຣາບິກາ
- ພັນໂຣບັດສະຕາ
- ພັນເອັກແຊນຊາ
- ພັນລິເບີຣິກາ
- ພັນຊາລີ

ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ ກາເຟທີ່ປູກໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ມີ 3 ສາຍພັນເທົ່ານັ້ນ ຄື:

ສາຍພັນອາຣາບິກາ (ກາເຟນ້ອຍ) ປະມານ 20% ຂອງເນື້ອທີ່

ສາຍພັນໂຣບັດສະຕາ (ກາເຟກາງ) ປະມານ 70% ຂອງເນື້ອທີ່

ສາຍພັນລິເບີຣິກາ (ກາເຟໃຫຍ່) ປະມານ 10% ຂອງເນື້ອທີ່

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປູກຢູ່ໃນ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ມີ ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ເຂດພູຜຽງບໍລະເວນ ເພາະເປັນເຂດທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເໝາະສົມດີ. ມີເນື້ອທີ່ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບປູກກາເຟທັງໝົດ.....ເຮັກຕາ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທີ່ປູກແລ້ວທັງໝົດ.....ເຮັກຕາ (2003).

2.1.1 ພັນອາຣາບິກາ

ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ *Coffea arabica* ກາເຟພັນນີ້ ເປັນພັນທີ່ນິຍົມປູກກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມີຜົນຜະລິດເຖິງ 90% ຂອງປະລິມານກາເຟທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດທົ່ວໂລກ ມີຖິ່ນກຳເນີດຕັ້ງເດີມຢູ່ແຖບບໍລິເວນປະເທດ ເອທິໂອເປຣ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບທີ່ມີອາກາດຂ້ອນຂ້າງເຢັນຈັດເປັນພືດເມືອງໜາວ ແລະ ຕ້ອງການລະດູແລ້ງຂ້ອນຂ້າງຍາວນານຄືປະມານ 3 ເດືອນ ຈະເລີນໄດ້ດີໃນດິນທີ່ສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລຕັ້ງແຕ່ 800-1800 ແມັດ ອາດຈະສູງກວ່ານີ້ກໍໄດ້ ແຕ່ເຫັນວ່າຖ້າປູກກາເຟ

ພັນອາຣາບິກາ ໃນສະພາບປາ ຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕງອອກງາມດີ ແກ່ນມີຄຸນນະພາບສູງທັງກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດ.

ລັກສະນະປະຈຳພັນຂອງກາເຟພັນນີ້ ຄື: ມີຊີວິດຢູ່ເປັນຮູບປີລະມິດ (ຮູບທາດສາມຫຼ່ຽມ) ວັດແທກຄວາມສູງ ເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບປ່າມີຄວາມສູງເຖິງ ປະມານ 10 ແມັດ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ນຳມາປູກຈະມີ ຄວາມສູງປະມານ 1,8-4,8 ແມັດ. ກິ່ນກ້ານປົກຄຸມດ້ວຍໃບສີຂຽວເປັນມັນຕະຫລອດປີ ດອກສີຂາວມີກິ່ນ ຫອມຄ້າຍດອກຊ້ອນ, ຮູບຮ່າງຄ້າຍດາວ ມີກິບດອກ 5 ກິບ ດອກຢູ່ຮ່ວມກັນ ເປັນກຸ່ມ ແລະ ກ້ານດອກສັ້ນ ຈະອອກດອກຫຼາຍຄັ້ງໃນລະດູໜຶ່ງ (ຢູ່ບ້ານເຮົາປະມານ 3 ເທື່ອ ເກັບໝາກ). ດອກບານຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນ ປະ ມານ 2 ມື້ ກໍ່ແຫ້ວ ສ່ວນໝາກຈະມີຮູບຮ່າງຂ້ອນຂ້າງແປ. ພາຍໃນມີແກ່ນ 2 ຊິກ ຊິກໜຶ່ງມີໜຶ່ງແກ່ນ. ສ່ວນ ແບນຂອງແກ່ນ ຈະແນບຕິດກັນ ແກ່ນຍາວໄປຕາມ ຮູບຂອງເປືອກຫຸ້ມ, ຖ້າແກ່ນໜຶ່ງຫາກລົບໄປ ແກ່ນທີ່ ເຫຼືອຈະມີຮູບກົມກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະມີສ່ວນຍາວໂຄ້ງ ເປັນຮູບຊິງບັ້ງຕິດ ມີຮ່ອງຮອຍ ຕາມຍາວຂອງແກ່ນ. ຈະເລີ່ມອອກດອກ ຕິດໝາກຫຼັງຈາກປູກປະມານປີທີ 2 ຫລື ປີທີ 3, ໄລຍະເລີ່ມອອກດອກ ຈົນເຖິງໝາກ ເລີ່ມແກ່ເຕັມທີ່ໄຊ້ເວລາປະມານ 6-8 ເດືອນ ໝາກເມື່ອແກ່ເຕັມທີ່ແລ້ວຈະເປັນສີແດງ.

2.1.2 ພັນໂຣບັສຕາ

ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ *Coffea robusta* ກາເຟພັນນີ້ ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະ ພາບ ແວດລ້ອມໄດ້ດີຫຼາຍ ທັງຍັງເປັນພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມໜາວໄດ້ດີ ກ່ວາພັນອາຣາບິກາ ປູກໄດ້ຕັ້ງ ແຕ່ລະດັບນ້ຳທະເລ ຈົນເຖິງລະດັບສູງ 1300 ແມັດ. ເປັນພັນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຕ້ອງການ ຝົນຕົກສະໝໍ່າສະເໝີ. ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີທັງໃນຮົມ ແລະ ກາງແຈ້ງ ແຕ່ມີນິດໃສ່ຊອບຮົ່ມເຖົ້າຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອປຽບທຽບຜົນຜະລິດຕໍ່ຕົ້ນ ຈາກອາຍຸການໃຫ້ຜົນຜະລິດຕົ້ນທີ່ແລ້ວ ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າ ພັນອາຣາບິກາເລັກນ້ອຍ. ມີປະລິມານການຜະລິດປະມານ 1/4 ຂອງປະລິມານກາເຟທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງ ໝົດທົ່ວໂລກ.

ລັກສະນະປະຈຳພັນຂອງກາເຟພັນນີ້ ຄື ມີກິ່ນກ້ານສາຂາຫຼາຍກວ່າພັນອື່ນໆ ຕົ້ນສູງປະ ມານ 2,1-4,87 ແມັດ. ໃບໃຫຍ່ກ່ວາພັນອາຣາບິກາ ມີສີຂຽວ ແຕ່ບໍ່ເປັນມັນ ດອກເກີດບໍລິເວນຂໍ້ເປັນກຸ່ມໆ ມີສີຂາວໂດຍກ້ານດອກຍ່ອຍ ຊຸດອກອອກມາຈາກແກນຂອງດອກແບບສະຫລັບ ໃຫ້ດອກຍ່ອຍຢູ່ໃນລະດັບ ດຽວກັນໝົດໃນຂໍ້ໜຶ່ງຈະມີ 5-6 ດອກ ດອກບານຢູ່ບໍ່ດົນ ປະມານ 2-3 ມື້ ກໍ່ແຫ້ວ ໃນລະດູໜຶ່ງຈະອອກ ດອກປະມານ 2-3 ຄັ້ງ ເມື່ອໝາກສຸກ ຮູບຊິງຂອງໝາກມີລັກສະນະນ້ອຍກວ່າ ພັນອາຣາບິກາ ຢູ່ຮ່ວມກັນ ເປັນຊໍ່ ຊໍ່ມີລັກສະນະກົມເກີດຢູ່ກົງຂໍ້ແຕ່ລະຂໍ້ ໝາກສຸກ ຜົວເປືອກເປັນສີແດງເຂັ້ມ ໝາກນ້ອຍກວ່າພັນອາ ຣາບິກາເລັກນ້ອຍ ໃຊ້ໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ອອກດອກ ຈົນເຖິງໝາກແກ່ເຕັມທີ່ເກັບກຽວໄດ້ ປະມານ 10- 11 ເດືອນ ກາເຟພັນນີ້ມີຂໍ້ເສຍຢ່າງໜຶ່ງຄື ຫຼັງຈາກໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງໃນປີໜຶ່ງໆ ຈະແຫງນັກຈະແຫ້ງຕາຍ ເປັນ

ຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນປີຕໍ່ໄປຕ່ຳລົງ.

2.1.3 ກາເຟພັນອື່ນໆ

1. ພັນເອກແຊນຊາ (ກາເຟມົກ) ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ *Coffea esculsa* ມີ ຖິ່ນກຳເນີດແຖບອາຟະຣິກາຕາເວັນອອກ ເປັນພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ ປູກໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບນ້ຳທະເລຈົນເຖິງລະດັບຄວາມສູງ 1524 ແມັດ. ກາເຟພັນນີ້ມີລັກສະນະລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ໝາກຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ໝາກມີຮູບຊິງຄ້າຍຮູບໄຂ່ ຂ້ອນຂ້າງແປ ລົດຊາດນຸ່ມນວນບໍ່ຂົນ ໄລຍະເວລາຕັ້ງ ແຕ່ເລີ່ມອອກດອກຈົນເຖິງໝາກແກ່ເຕັມທີ່ ປະມານ 11-12 ເດືອນ ເມື່ອໝາກສຸກຈະມີຜົວໜັງສີແດງ.

2. **ພັນລິເມີຣິກາ** ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ *coffea liberica* ກາເຟພັນນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເທົ່າໃດໃນດ້ານການຜະລິດ ເນື່ອງຈາກຄຸນນະພາບຂອງແກ່ນກາເຟນ້ອຍກວ່າມາດຕະຖານ ກາເຟພັນນີ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ ແລະ ຍັງປູກໄດ້ໃນທີ່ຮາບຕ່ຳທີ່ມີການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຈົນເຖິງລະດັບຄວາມສູງຈາກນ້ຳທະເລ 487,68 ແມັດ.

ລັກສະນະປະຈຳພັນກາເຟພັນນີ້ຄື: ມີຊົງຜຸ່ນເປັນຮູບປີລະມິດຕົ້ນສູງປະມານ 6-15 ແມັດ ຖ້າບໍ່ມີການຕັດຍອດ ລັກສະນະໃບຕັ້ງດຶງກັບວ່າ ດອກໃຫຍ່ມີກີບດອກປະມານ 6-8 ກີບ ອອກດອກຕິດໜາກເກືອບຕະຫລອດປີ ໝາກສຸກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຄ້າຍຮູບໂຂ່ ຫລື ຊົງກົມ ເປືອກໜາ ເຮັດໃຫ້ການອ້ອເປືອກຂ້ອນຂ້າງຍາກລຳບາກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືຊະນິດຟິເສດ ລະຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມອອກດອກ ຈົນເຖິງໝາກແກ່ເຕັມທີ່ ປະມານ 12-14 ເດືອນ ເມື່ອໝາກສຸກຈະມີຜິວໜັງສີແດງ.

2.2 ການຂະຫຍາຍພັນກາເຟ

ກາເຟສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ມີທັງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ເພດ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ໃຊ້ເພດ. ໃນການຂະຫຍາຍພັນນີ້ຈະເລືອກວິທີການໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານ.

2.2.1 ການຂະຫຍາຍພັນແບບໃຊ້ເພດ

1. **ການກັ້ນແກ່ນ:** ເປັນການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ແກ່ນມາກັ້ນເສຍກ່ອນ ແກ່ນກາເຟທີ່ຈະໃຊ້ເຮັດພັນ ນັ້ນຄວນຄັດເລືອກຈາກຕົ້ນກາເຟ ທີ່ມີອາຍຸປະມານ 8-12 ປີ ບໍ່ຄວນໃຊ້ແກ່ນທີ່ໄດ້ຈາກ ຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່ານີ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ພັນບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ເປີເຊັນການງອກກໍ່ຕ່ຳດ້ວຍ ຄວນຈະໄດ້ມີການຄັດພັນມາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ມີປະຫວັດສາດພັນດີ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແກ່ນພັນທີ່ຈະເຮັດແນວພັນຕ້ອງໃໝ່ ພໍສົມຄວນ ຄືຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ບໍ່ດົນນານຈົນເກີນໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ເກັບກ່ຽວຈາກຕົ້ນແມ່ພັນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 2-3 ເດືອນ ປົກກະຕິແກ່ນພັນຈະມີເປີເຊັນຄວາມງອກສູງ ຫລື ຕ່ຳນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸຂອງແກ່ນ ຄືຖ້າເກັບແກ່ນກາເຟໄວ້ນານເທົ່າໃດ ເປີເຊັນຄວາມງອກຂອງແກ່ນກໍ່ ຈະຕ່ຳລົງ ເລື້ອຍໆ ການທີ່ ຈະຕຽມ ແກ່ນພັນຫຼາຍນ້ອຍ ເທົ່າໃດນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນຂອງເນື້ອທີ່ ເຊິ່ງແກ່ນພັນກາເຟຈຳນວນ 1 ກິໂລກຣາມ ຈະສາມາດກັ້ນເບ້ຍກາເຟໄດ້ປະມານ 3.500 ເຖິງ 4.000 ຕົ້ນ.

2. **ການຕຽມເມັດພັນ:** ຫຼັງຈາກເກັບໝາກກາເຟທີ່ສຸກເຕັມທີ່ແລ້ວ ຖ້າມີຈຳນວນນ້ອຍກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ມືນວດເອົາເປືອກ ແລະ ຊັ້ນມັນອອກ ຖ້າຫາກໝາກກາເຟມີຈຳນວນຫຼາຍ ຈະນວດດ້ວຍມືກໍ່ຄົງເຮັດດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຄວນໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍໃນການເອົາເປືອກ ແລະ ຊັ້ນອອກ ເຊັ່ນໃຊ້ຄົກຕຳໃຫ້ເປືອກ ແລະ ຊັ້ນຫລຸດອອກມາ ຫລື ຈະໃຊ້ເຄື່ອງນວດກາເຟ ກໍ່ຈະເປັນການດີຂຶ້ນ ແຕ່ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ຄົກຕຳ ຫລື ໃຊ້ເຄື່ອງນວດກາເຟກໍ່ດີ ຄວນຈະປັບເຄື່ອງໃຫ້ຟັດ ກັບຂະໜາດຂອງໝາກກາເຟ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແກ່ນໝາກກາເຟແຕກ ຫຼັງຈາກເອົາເປືອກ ແລະ ຊັ້ນ ອອກແລ້ວ ນຳເອົາແກ່ນໝາກກາເຟໄປແຊ່ນ້ຳ ໄວ້ປະມານ 1 ຄືນ ຖ້າຫາກມີແກ່ນກາເຟເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງແຊ່ໄວ້ໃນຖັງໃຫຍ່ ແກ່ນໃດທີ່ຟູນ້ຳ ໃຫ້ຄັດເລືອກອອກຖິ້ມເສຍ ຢ່າປະໄວ້ ເພາະເປັນແກ່ນທີ່ລົບບໍ່ສົມບູນ ຫລື ມີແມງທຳລາຍ ຈິ່ງເອົາໄວ້ແຕ່ແກ່ນທີ່ຈົບນ້ຳ ໃຊ້ມືຄັ້ນຍ່ອງຖູເອົາເມືອກອອກໃຫ້ໝົດ ຖ້າແກ່ນໃດຍັງບໍ່ໝົດເມືອກ ໃຫ້ແຊ່ນ້ຳຖິ້ມໄວ້ອີກ 1 ຄືນ ອາດຈະໃຊ້ຊາຍຫລື ຂີ້ເຖົ້າແກບປືນໃນນ້ຳເພື່ອຍ່ອງຄັ້ນໃຫ້ໝົດເມືອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລ້າງຈົນສະອາດດີແລ້ວ ຖ້າຈະນຳໄປກັ້ນ ກໍ່ນຳໄປກັ້ນໄດ້ເລີຍ ຫລື ຈະນຳໄປເບີຍຕາກລົມໃຫ້ແກ່ນແຫ້ງດີກ່ອນປະມານ 5-7 ມື້ ການເບີຍຕາກລົມລະວັງຢ່າໃຫ້ຖືກແສງແດດກັ້ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແກ່ນ

ແຫ້ງໄວໄພດ ແລະ ອີກປະການໜຶ່ງແສງແດດທີ່ແຮງກ້າເກີນໄປ ອາດຈະທຳລາຍຄວາມງອກຂອງແກ່ນໄດ້ ແລ້ວທຳການຄັດເລືອກແກ່ນທີ່ດີເອົາໄວ້ ແກ່ນຄວນມີລັກສະນະແບບໃຫຍ່ ບໍ່ມີແມງໄມ້ເຈາະທຳລາຍ ສ່ວນ ແກ່ນທີ່ນ້ອຍ ແລະ ມັນຄວນຄັດອອກ ແກ່ນທີ່ຄັດເອົາໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນເອົາຄົນກັບຢາປ້ອງກັນ ເຊື້ອລາເສຍກ່ອນ ອາດຈະໃຊ້ພວກແຄບເທນ ຫລື ໂດໂຟລາແທນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນກ່ອນກໍໄດ້ ສຳລັບແກ່ນຜັນ ກາເຟທີ່ຍັງບໍ່ຜ່ອນທີ່ຈະກ້າຫລື ກໍລະນີທີ່ຍັງກະກຽມເນື້ອທີ່ໜານກ້າຍັງບໍ່ສຳເລັດ ກໍສາມາດທີ່ຈະນຳມາເກັບ ຮັກສາອົກໄວ້ກ່ອນກໍໄດ້ແຕ່ບໍ່ຄວນເກັບເອົາໄວ້ເກີນ 2 ເດືອນແຕ່ຖ້າຫາກເກັບເອົາໄວ້ໃນຫ້ອງເຢັນທີ່ມີອຸນຫະ ພູມ 1 ອົງສາເຊລຊຽສ ສາມາດເກັບເອົາໄວ້ໄດ້ດົນເຖິງ 6 ເດືອນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເປີເຊັນຄວາມງອກ ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວນພະຍາຍາມ ຮັກສາ ຄວາມຊຸ່ມຂອງແກ່ນກາເຟໄວ້ຢ່າໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 18 ເປີເຊັນ.

3. ການເລືອກຜົນທີ່ສຳລັບເຮືອນກ້າ:

ສະຖານທີ່ຕັ້ງເຮືອນກ້ານັ້ນເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການປູກກາເຟຖ້າເລືອກສະຖານທີ່ ເໝາະສົມແລ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດເວລາແຮງງານ ແລະ ດົນທຶນໃນການຜະລິດ ການເລືອກຜົນທີ່ຄວນ ພິຈາ ລະນາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ເນື້ອທີ່ຄວນຄ້ອຍຊັ້ນເລັກນ້ອຍ ບໍ່ເປັນບ່ອນຊຸ່ມຫຼືນ້ຳຂັງ ເປັນດິນທີ່ບໍ່ ເປັນດິນຊາຍຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ເປັນດິນໜຽວຫຼາຍ ຄວນມີດິນຜູ້ຜູ້ບໍ່ຄວນເລືອກເລືອກເນື້ອທີ່ຢູ່ສູງກວ່າ 4000 ຟຸດ.
- ຄວນໃກ້ເສັ້ນທາງເປັນບ່ອນທີ່ສາມາດໄປ ບິວລະບັດໄດ້ສະດວກ ຫຼືສະ ດວກໃນການຂົນສົ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນກ້າຊ້າ.
- ຄວນເປັນເນື້ອທີ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳໄດ້ຕະຫຼອດປີ ເຊິ່ງ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນ ການ ກ້າແກ່ນກາເຟ
- ຄວນເປັນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ
- ຄວນເປັນບ່ອນທີ່ຈັດຫາວັດຖຸ ອຸປະກອນງ່າຍ

4. ການກຽມໜານກ້າ: ຫຼັງຈາກເລືອກເນື້ອທີ່ກ້າແລ້ວ ກໍລົງມືຂຸດດິນໃຫ້ເລິກປະ

ມານ 40-50 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວພວນດິນໃຫ້ແຕກລະອຽດ ເກັບເສດວັດຊະຟິດ ຫີນ ຮາກ ອອກໃຫ້ໝົດ ຂໍ້ສຳ ຄັນບໍ່ຄວນຂຸດເອົາດິນ ຊັ້ນລຸ່ມ ຂຶ້ນມາໄວ້ຂ້າງເທິງ ຄວນໃຫ້ໜານຮັບແສງແດດ ສະໜ້າສະເໝີ ຕະຫຼອດມື້ ໜານຄວນມີຄວາມກວ້າງ 1 ແມັດ ສູງຈາກໜ້າດິນ 15 ຊັງຕີແມັດ ຄວາມຍາວ ຂອງໜານແລ້ວແຕ່ຄວາມ ເໝາະສົມ ທາງຢ່າງລະຫວ່າງໜານ 1 ແມັດ ຄວນຂຸດເອົາໜ້າດິນທາງຢ່າງ ຂຶ້ນ ມາໃສ່ໜານ ແລະ ຄວນ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ໃນອັດຕາຝຸ່ນຄອກ 3 ປີ ຕໍ່ໜານທີ່ມີຄວາມ ກວ້າງ 1 ແມັດ ຍາວ 5 ແມັດ. ໜານກ້າຄວນມີການບັງແດດ.

5. ວິທີການກ້າແກ່ນ: ການກ້າແກ່ນຄວນກ້າໃນຊ່ວງເດືອນກຸມພາສາມາດກ້າແກ່ນ

ໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:

- ວິທີກ້າເພື່ອຍ້າຍຊຳ: ການກ້າວິທີນີ້ ໜານກ້າຄວນຍົກໃຫ້ສູງຢ່າງນ້ອຍ 10 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ມີການລະບາຍນ້ຳໄດ້ສະດວກ ດິນຈະຕ້ອງຜູ້ຜູ້ ບໍ່ມີເສດໄມ້ ຫຼື ກ້ອນ ຫີນປົນຢູ່ ໄລຍະ ຫ່າງລຫວ່າງແຖວ 10 ຊັງຕີແມັດ ໃຊ້ແກ່ນກາເຟ ໂຮຍໃຫ້ແກ່ນຫ່າງກັນປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຊ້ດິນ ຜູ້ຜູ້ປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກໂຮຍປົກ ໃຫ້ໜາປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຊ້ ເຜືອງປົກໜາ ປະມານ 1-2 ນິ້ວ ໝັ້ນຫົດນ້ຳທຸກມື້ ຖ້າຝົນບໍ່ຕົກ. ໜານກ້າ ຄວນເຮັດຮ້ານບັງແດດຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກກ້າ ແກ່ນປະມານ 45-

60 ມື້ ແກ່ນກໍຈະແຕກງອກພ້ອມທີ່ຈະນຳໄປຊຳ ຕໍ່ໄປໄດ້ ສຳລັບໝານກວ້າງ 1 ແມັດ ຍາວ 5 ແມັດ ຈະໃຊ້ ແກ່ນກາເຟປະມານ 1-1,5 ກິໂລກຣາມ.

- ວິທີການກຳແກ່ນໂດຍກົງ: ການກຳແກ່ນວິທີນີ້ ໝາຍເພາະຊຳຕ້ອງກຽມຄືວິທີທີ່ ໜຶ່ງແຕ່ການໂຮຍເມັດຕ້ອງໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ 4 ນິ້ວ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວຫ່າງກັນປະມານ 5-6 ນິ້ວ ຂະ ໜາດໝານກວ້າງ 1 ແມັດ ຍາວ 5 ແມັດ ຈະກຳເບີ້ໄດ້ປະມານ 330-400 ຕົ້ນໄລຍະ ດັ່ງກ່າວບໍ່ໜາແໜ້ນ ເກີນໄປ ວິທີນີ້ຄວນເຮັດຮື່ມ ເງົາດ້ວຍ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຮື່ມເງົາທີ່ຖາວອນກວ່າ ວິທີທຳອິດ ເພາະຈະເປັນບ່ອນ ລ້ຽງຕົ້ນກຳກາເຟເປັນເວລາດົນນານກວ່າ.

- ວິທີການກຳໂດຍການທົດສອບຄວາມງອກຂອງແກ່ນ: ວິທີນີ້ປະຕິບັດບໍ່ຍຸ່ງ ຍາກພຽງແຕ່ເມື່ອ ມີແກ່ນພັນກາເຟແລ້ວ ເມື່ອຕ້ອງການຈະກຳກະກຽມກະເປົາປານທີ່ສະອາດ ກັບເຜືອງ ຄວນເລືອກຜົນທີ່ມີຮື່ມເງົາພໍຄວນ ນຳເອົາກະເປົາປານ 1 ໜ່ວຍ ມາປຸກັບຜົນດິນທີ່ພຽງດີແລ້ວ ນຳເອົາ ແກ່ນກາເຟ ມາໂຮຍໃຫ້ກະຈາຍສະໝໍ່າສະເໝີແລ້ວໃຊ້ກະເປົາປານອີກໜ່ວຍໜຶ່ງ ຫຼື ສອງໜ່ວຍມາປົກຫັບໄວ້ ຈາກນັ້ນໃຊ້ເຜືອງປົກຫັບອີກຕື່ມໜາປະມານ 45 ນິ້ວ ເພື່ອເກັບຄວາມຊຸ່ມວິທີນີ້ອາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍໆຊັ້ນ ໂດຍ ການເຮັດແບບດຽວກັນ ໝັ້ນທົດນ້ຳເລື້ອຍໆ ຢາປ່ອຍໃຫ້ ກະເປົາປານແຫ້ງ ແກ່ນຈະບໍ່ອອກສະໝໍ່າສະເໝີ ກະເປົາປານ 1 ໜ່ວຍ ສາມາດ ກຳແກ່ນໄດ້ 1-1,5 ກິໂລກຣາມ ຫຼັງຈາກກຳໄດ້ 3-4 ອາທິດ ແກ່ນຈະ ແຕກງອກເມື່ອຮາກຍາວບໍ່ເກີນ 3 ມິລິແມັດ ຄວນນຳໄປຊຳ ໃນ ພາຊະນະ ຫຼື ຖົງຢາງ ໂດຍໄວ ຖ້າ ປ່ອຍ ໃຫ້ຮາກຍາວ ຮາກຈະຕິດກັນ ການກຳແບບນີ້ ປະຢັດເວລາ ແລະ ແຮງງານ ປະຢັດຜົນທີ່ ແກ່ນຈະ ງອກໄວ ກວ່າກຳໄປໃນດິນ 1 ເດືອນ ສ່ວນຈຸດອ່ອນ ແມ່ນ ຄືເຊື້ອລາ ຈະເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ກະເປົາປານ ມາດໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ.

❖ ວິທີກຳແກ່ນກາເຟທີ່ມີຢືນປະຕິບັດກັນຢູ່ໃນລາວ

ການກຽມດິນ

ເມື່ອເຮົາຈະທຳການກຳແກ່ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເຊັ່ນ : ໄມ້ປ້ອງໝານກ້າ, ດິນຊາຍ ຫລື ດິນທຳມະດາທີ່ຜຸຜຸຍດີ, ຂີ້ແກບທີ່ເໝົາເປື່ອຍດີກະກຽມໄວ້.

ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ນຳໄມ້ປ້ອງມາເຮັດເປັນຄອກ ລວງກວ້າງ 1 ແມັດ ສ່ວນລວງສູງຂອງ ຄອກແມ່ນ 30-40 ຊັງຕີແມັດ, ນຳດິນທຳມະດາມາເທລົງ ໃນຄອກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ນຳດິນຊາຍ ຫລື ດິນທຳມະດາທີ່ດີນັ້ນມາຮ່ວມໃຫ້ລະອຽດບໍ່ມີເສດຫຍ້າ ແລະ ກ້ອນຫີນເຈືອປົນ. ແລ້ວ ເອົາແກບມາປະສົມ ໃນອັດຕາ 1/1 ໝາຍຄວາມວ່າ ແກບໜຶ່ງຄູ່ ດິນຊາຍ ຫລື ດິນທຳມະດາ 1 ຄູ່ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີໃຫ້ດີແລ້ວເທລົງຄອກໃຫ້ໜາ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນຳແກ່ນມາກຳໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ຂໍ້ຄວນລະວັງບໍ່ຄວນເຮັດໝານກຳແກ່ນ ໂດຍປະສະຈາກເຄື່ອງມຸງ ເຊັ່ນ ປະໄວ້ກາງແຈ້ງ ເພາະມັນຈະ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມງອກຂອງກາເຟຫຼຸດລົງ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບໍ່ໄດ້ດີ .

ການກຳແກ່ນ: ແກ່ນທີ່ນຳມາກຳຕ້ອງເປັນແກ່ນທີ່ມີເປີເຊັນຄວາມງອກສູງບໍ່ເປັນແກ່ນທີ່ປະ ໄວ້ໄລຍະດົນນານຫຼາຍເດືອນ ແກ່ນກາເຟທີ່ດີນັ້ນຕ້ອງມີເປີເຊັນຄວາມຊຸ່ມ 17 % ຂຶ້ນໄປ ອາຍຸເກັບຮັກສາບໍ່ ໃຫ້ກາຍ 2-3 ເດືອນ ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນແກ່ນທີ່ເກັບອອກມາຈາກຕົ້ນໄດ້ 1 ອາທິດ ທີ່ໄດ້ຕາກຜິ່ງລົມໄວ້ ນຳມາ ກຳແກ່ນມີຄວາມງອກສູງທີ່ສຸດ. ຂັ້ນຕອນໃນການກຳແກ່ນ ນຳແກ່ນກາເຟມາກະກຽມເຊັ່ນ ຖ້າວ່າມີເວລາ ໃຫ້ແກະກາບນອກຂອງແກ່ນອອກເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ແກ່ນງອກໄວ ກ່ອນກຳ ຖ້າວ່າເປັນແກ່ນທີ່ຮັກ ສາໄວ້ດົນ ຕ້ອງນຳແກ່ນໄປແຊ່ນ້ຳກ່ອນ 12 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງນຳມາກຳ ຈາກນັ້ນທົດນ້ຳໝານກຳທີ່ກະກຽມໄວ້ ນັ້ນໃຫ້ປຽກດີ ແລ້ວໃຊ້ໄມ້ບັນທັດວາງລົງໝານ ໃຊ້ໄມ້ ຫລື ນິ້ວມືຂີດໃຫ້ເລິກລົງ 1 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ລະແຖວ

ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງກັນ 5 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນຳແກ່ນທີ່ກະກຽມໄວ້ມາວາງລົງຕາມແຖວທີ່ຂີດໄວ້ນັ້ນ ໃນການວາງແກ່ນໃນໝານຫຸກຄັ້ງ ຕ້ອງຂວ້າມໝາກພຽງຂອງແກ່ນລົງລຸ່ມ ແຕ່ລະແກ່ນໃຫ້ຫ່າງກັນ 2 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດແນວນີ້ເຮົາຈະສາມາດກຳແກ່ນໃສ່ໃນ 1 ຕາແມັດ ສາມາດກຳແກ່ນໄດ້ 1000 ແກ່ນ ຫຼັງຈາກຈັດວາງແກ່ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ດິນປະສົມກັບຂີ້ແກບ 50 % ໂຮຍປົກບາງໆ ໃຫ້ແກ່ນກາເຟມີຄວາມເລິກຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນ 1 ຊັງຕີແມັດ ຫຼັງຈາກໂຮຍດິນຖິ້ມແລ້ວ ໃຊ້ເສດຫຍ້າຫລືເຟືອງມາປົກໃຫ້ໜາປະມານ 1 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ໝານກຳເບີຍມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພໍ ແລະ ໃນເວລາທີ່ດຳ ຫລື ຝົນຕົກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແກ່ນຝັງຂຶ້ນມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງທຳການຫົດນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມພໍດີ ບໍ່ຄວນຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມເກີນໄປ ເພາະຈະຜ່າໃຫ້ແກ່ນເໝົາໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 30-50 ມື້ ເບີຍກາເຟຈະຜັນຂຶ້ນສົມບູນສາມາດນຳໄປບິງໃສ່ຖົງໄດ້.

6. ການຊຳກັກ: ກຳກາເຟທີ່ຈະນຳໄປຊຳນັ້ນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື:

- ໄລຍະຫົວກັບຂີດ: ໄລຍະນີ້ກຳກາເຟຈະບໍ່ທັນແຕກໃບມີລັກສະນະຄືຫົວກັບໄຟ ແລະມີຄວາມສູງບໍ່ເກີນ 2 ມື້.
- ໄລຍະປົກແມງກະເບື້ອ: ໄລຍະນີ້ຕົ້ນກາເຟເລັ່ມແຕກໃບລ້ຽງອອກມາ ແລ້ວຈະສັກເກດເຫັນວ່າ ມີຍອດນ້ອຍຢູ່ແຕ່ບໍ່ທັນແຕກໃບແທ້.
- ໄລຍະໃບແທ້: ໄລຍະນີ້ກາເຟມີໃບແທ້ຕັ້ງແຕ່ 1-2 ຄູ່ ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດໄລຍະນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີຍົນປະຕິບັດກັນເພາະຮາກກາເຟຈະອອກມາຍາວຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການຍ້າຍຊຳຕົ້ນກຳຈະແຫ້ວ ເປີເຊັນການ ຕາຍສູງ.

ໃນການຊຳກັກໄລຍະທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຄືໄລຍະຫົວກັບໄຟ ຮອງລົງມາແມ່ນໄລຍະປົກແມງກະເບື້ອ ເພາະຈະມີເປີເຊັນການຕາຍຕ່ຳ.

7. ວິທີການຊຳກັກກາເຟ: ສຳລັບວິທີຊຳກັກກາເຟ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິທີຄື :

- 1). ການຍ້າຍຊຳລົງໃນໝານຊຳ:
- 2). ການຍ້າຍຊຳໃນຖົງຢາງ: ເປັນວິທີທີ່ມີຍົນກັນຫຼາຍເພາະອັດຕາການຕາຍຕ່ຳ ສຳລັບຖົງຢາງ ໃຊ້ຂະໜາດ 6X 9 ມື້ ເຈາະຮູຮອບຖົງ ແປງກວ້າງ 1 ແມັດ ຍາວ 5 ແມັດ ຈະສາມາດ ບັນຈຸໃນຖົງຊຳໄດ້ ປະມານ 900 ຖົງ ສຳລັບການຊຳກັກກາເຟ 1000 ຕົ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ສ່ວນປະສົມຂອງດິນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

ດິນຊັ້ນໜ້າດິນ ຈຳນວນ 50 ຄູ
ຝຸ່ນຄອກເກົ້າ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມ ປະມານ 10 ຄູ
ປຸຍຊຸບເປີຟອສເຟສປະມານ 1 ກິໂລກຣາມ
ສຳລັບການຊຳໃນຖົງຢາງຄວນລະວັງຢາໃຫ້ຮາກແກ້ວ ແລະ ລຳຕົ້ນຄົດງ່ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ລະບົບຮາກບໍ່ດີ ເຄີບໂຕຊ້າ. ເມື່ອຊຳແລ້ວຄວນນຳຕົ້ນໄປປະໄວ້ໃນທີ່ຮົ່ມ ແລະ ຫົດນ້ຳຫຸກມື້.

8. ການໃຊ້ຕົ້ນກຳກາເຟທີ່ຂຶ້ນຕາມກ້ອງຕົ້ນກາເຟ

ເຮົາຈະເຫັນຕົ້ນກາເຟທີ່ຂຶ້ນມາເອງ ຕາມສ່ວນເກົ່າແລະມັກຈະມີຜູ້ລັກເອົາໄປປູກ ເມື່ອເວລາສ້າງສວນໃໝ່ໆ ຂະໜາດຕົ້ນກຳຈະມີຫຼາຍຂະໜາດ ຄືມີຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍໆ ທີ່ມີໃບລ້ຽງພຽງ 2 ໃບ ແລະ ຂະໜາດ ທີ່ມີອາຍຸ 5 ເດືອນ ຈົນເຖິງ 3 ປີ ກໍຍັງມີຜູ້ຂຸດໄປປູກຢູ່ ກ່ອນນຳໄປປູກ ຄວນນຳໄປ ເພາະຊຳກ່ອນ ໂດຍນຳໄປປັກຊຳໄວ້ບ່ອນຮົ່ມໄມ້ ເມື່ອຕົ້ນກຳແຂງແຮງຈຶ່ງນຳໄປປູກໃນສ່ວນ ຄວນເລືອກຕົ້ນ ທີ່ມີຂະໜາດ ເທົ່າໆກັນ ປູກໃນ ແປງດຽວກັນ.

9. ການບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນກຳກາເຟ

- ການໃສ່ຝຸນ: ເມື່ອຕົ້ນກ້າເລີ່ມມີໃບແທ້ 2 ຄູ່ຂຶ້ນໄປຄວນໃສ່ຝຸນເລັ່ງໂດຍການໃສ່ຝຸນຢູ່ເຮຍ ລະລາຍ ກັບນ້ຳ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 1 ຄູ່ ຫຼື ໃຫ້ຫົວໜານ ທຸກໆ 15 ມື້ ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຢ່າໃຫ້ເມັດປຸຍ ທີ່ລະລາຍບໍ່ໝົດຄ້າງຢູ່ໃນ ຂອງກ້າ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ກ້າໄໝໄດ້ ຄວນຫຼີກລ້າງອີກເທື່ອໜຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ຝຸນແລ້ວ.

- ການຈັດການເລື່ອງຮົ່ມເງົາ: ຕາມປົກກະຕິຕົ້ນກ້າກາເຟຕ້ອງການແສງແດດໜ້ອຍ ແລະ ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການແສງແດດກໍຫຼາຍຂຶ້ນຕາມລຳດັບ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ຈະນຳຕົ້ນກ້າໄປປູກຕົ້ນກ້າຈະມີຄວາມຕ້ອງການແສງແດດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕົ້ນກ້າທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນ ຫ່າອິດຫຼັງຈາກຍ້າຍຊ່າຄວນໃຫ້ ມີຮົ່ມເງົາຫຼາຍ ຈະມີປະມານ 25-30 ເປີເຊັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄວນປັບຮົ່ມເງົາໃຫ້ໄດ້ແສງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທຸກໆ 1 ເດືອນ ແລະ ຄວນເອົາຮົ່ມເງົາອອກໃຫ້ໝົດ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ໄດ້ຮັບ ແສງແດດຕະຫຼອດມື້ກ່ອນເຖິງ ລະດູການປູກ 3 ເດືອນ.

- ການຕັດຍອດ ແລະ ຮາກ : ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຕົ້ນກ້າກາເຟທີ່ເຮົານຳໄປຊ່າໄວ້ໃນເຮືອນເພາະຊ່າ ມັກຈະບຽດກັນຕາມຄວາມຖີ່ຫ່າງ ຂຶ້ນກັບຄວາມໃຫຍ່ ນ້ອຍຂອງຖົງ ໃນກໍລະນີທີ່ຕົ້ນກ້າເຕີບໂຕດີ ຈະມີລຳຕົ້ນໃຫຍ່ ແຂງແຮງ ອາດຈະຕັດຍອດ ແລະ ຮາກພຽງຄັ້ງດຽວ ແຕ່ຖ້າຫາກລຳຕົ້ນກ້າມີລັກສະນະນ້ອຍຮຽວສູງ ກໍອາດຈະຕັດຍອດປະມານ 2-3 ຄັ້ງ ໃນຊ່ວງເວລາຊ່າ. ການຕັດຍອດຊ່າໃດນັ້ນໃຫ້ສັງເກດ ແລະ ຕັດຢູ່ບ່ອນຂໍ້ທີ່ແກ່ ມີສີນ້ຳຕານ ທີ່ຕໍ່ກັບຂໍ້ທີ່ມີສີຂຽວ ແຕ່ບໍ່ຄວນຕັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າໃຫ້ມີຄວາມສູງ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20 ຊັງຕີແມັດ ເຫດຜົນ ທີ່ຕ້ອງຕັດຍອດ ອອກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລຳຕົ້ນມີ ລັກສະນະອົບໃຫຍ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ສ່ວນຍອດທີ່ແຕກອອກມາໃໝ່ 2 ຍອດ ໃຫ້ເດັດອອກ ເຫຼືອໄວ້ພຽງຍອດດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບການຕັດຮາກ ຈະຕັດເທົ່າໃດຄັ້ງກໍໄດ້ ໂດຍສັງເກດໄດ້ ຈາກຮາກທີ່ແຫງອອກມາມອກຖົງ ຖ້າສັງເກດເຫັນ ຮາກແຫງອອກມາ ນອກຖົງ ໃຫ້ຕັດອອກໄດ້ທັນທີ ແລະ ຕ້ອງກວດເບິ່ງຢູ່ເລື້ອຍໆ.

10 ການປ້ອງກັນກຳຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໃນໜານເພາະຊ່າ:

ພະຍາດທີ່ພົບໃນໜານເພາະຊ່າເລື້ອຍໆ ມີຢູ່ປະມານ 2-3 ຊະນິດ ຄື ພະຍາດລາຊ້ໝຽງ ພະຍາດໂບຈຸດ ພະຍາດໂຄນເນົ່າ ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດ ເລົ່ານີ້ ໃຫ້ໃຊ້ ຢາຄູປຣາວິດ ຫຼື ບໍໂຄມິກເຈິດ ປ້ອງກັນເດືອນລະ ປະ ມານ 1-2 ຄັ້ງ ແລະ ໃນເຮືອນກ້າຄວນສະອາດອາກາດຖ່າຍເທດີມີການລະບາຍນ້ຳດີ ໃນກໍລະນີພະຍາດ ລາຊ້ໝຽງ ໃຫ້ໃຊ້ຢາປະເພດດູດຊີມ ພິນ ເຊັ່ນ ຢາເບິນຕັນ ຫຼື ຢາແຟລນແວກ ພິນປະມານເດືອນລະຄັ້ງ.

ສຳລັບແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ທີ່ທຳລາຍຕົ້ນກ້າທີ່ສຳຄັນມີຢູ່ 2 ຊະນິດຄື ແມງໄມ້ຈຳພວກປາກກັດ ເຊັ່ນ ບັ້ງຝູງ (ໝອນກະຫຼໍ່) ແລະ ກໍມີພວກເພີຍຫອຍ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນ ສຳລັບຂີ້ກະເດືອນບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນຕະລາຍໂດຍກົງຕໍ່ຕົ້ນກ້າ ແຕ່ມັນຈະດູດດິນໃນຖົງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າໃນໄລຍະນ້ອຍເສຽຫາຍ ໂດຍຮາກຈະລອຍ ບໍ່ຕິດດິນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຕາຍໄດ້ ສ່ວນການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ອາດໃຊ້ຢາປະເພດດູດຊີມ ເຊັ່ນອາ ໂຊດຣິນ ຟູຣາດານ ສິດຟິນ ເມື່ອກວດພົບມີສັດຕູພືດລະບາດ ແຕ່ຖ້າມີບໍ່ຫຼາຍໃຫ້ຈັບທຳລາຍຖິ້ມ.

ຂໍ້ຕີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການປູກກາເຟດ້ວຍແກ່ນ:

ຂໍ້ຕີ

+ ໄດ້ຫຼາຍ

- + ໃຊ້ເວລານ້ອຍ
- + ໃຊ້ຈ່າຍນ້ອຍໃນການລຳລຽງຂົນສົ່ງ
- + ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິຊາການສູງ ແລະບໍ່ມີເຄື່ອງມືຟິເສດ
- + ຕົ້ນກາເຟຈະມີອາຍຸຍືນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີລະບົບຮາກແກ້ວຂໍ້ເສຍ
- + ຕົ້ນກາເຟທີ່ໄດ້ມາອາດຈະບໍ່ແມ່ນພັນແທ້
- + ໃຫ້ໝາກຊ້າ
- + ໃຫ້ໝາກບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ
- + ເມື່ອເອົາໄປປູກຕົ້ນກາເຟທີ່ໄດ້ຈະບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃນຂັ້ນຕົ້ນ

2.2.2 ການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ໃຊ້ເພດ

ໃນການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ໃຊ້ເພດນີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ : ຕິດຕາ, ຕໍ່ງ່າ, ສຽບຍອດ, ປັກຊ້າງ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວການຂະຫຍາຍພັນແບບບໍ່ໃຊ້ເພດ ບໍ່ເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ໃນການປັບປຸງສວນເກົ່າ ຫລື ປ່ຽນຕົ້ນກາເຟ ພັນທຳມະດາເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດນ້ອຍ ໃຫ້ເປັນຕົ້ນພັນທີ່ດີໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນມາໃໝ່ໄດ້ ຕົ້ນກາເຟທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ເນື່ອງຈາກລະບົບຮາກ ບໍ່ສາມາດສະໜອງໃນການດູດທາດອາຫານ ແຕ່ຈະນຳເອົາຕາ, ງ່າ ແລະ ຍອດທີ່ດີມາຕິດໃສ່ ຫລື ຕໍ່ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ກັບຄ່ອຍດີເທົ່າໃດ ໃຫ້ຊຸດຖິ້ມແລ້ວປູກຕົ້ນພັນໃໝ່ ຈະໄດ້ຜົນດີກວ່າຕົ້ນເກົ່າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ການຕິດຕາ, ຕໍ່ງ່າ ແລະ ຕໍ່ຍອດກາເຟຍ່ອມໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ໃນການປ່ຽນຕົ້ນກາເຟ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ ຫລື ຕົ້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ເປັນພັນດີຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ .

1. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີຕິດຕາ, ຕໍ່ງ່າແລະສຽບຍອດ ວິທີທີ່ໃຫ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ຄືວິທີຕໍ່ຍອດ ຫລື ສຽບຍອດ ຍ້ອນວ່າ ວິທີຕິດຕາ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ວິທີຕໍ່ງ່າ ເວລາຕິດຕິແລ້ວຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນຕົ້ນແລ້ວ ມັກຈະບໍ່ເປັນພູມຕົ້ນໃໝ່ ກໍ່ຍັງຄົງມີລັກສະນະເປັນງ່າ ຢູ່ເວລາອອກໝາກຈະອອກພຽງແຕ່ດ້ານດຽວ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ໝາກໜ້ອຍ ສຳລັບວິທີການຕໍ່ຍອດ ເມື່ອຍອດຕິດຕິແລ້ວ ມັນຈະຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນຕົ້ນທີ່ມີພູມຕົ້ນສວຍງາມ ມີງ່າຫຼາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໝາກອອກມາຫຼາຍດ້ວຍ. ການຕິດຕາ, ຕໍ່ງ່າ, ຕໍ່ຍອດນີ້ ເຫັນວ່າຈະມີບັນຫາໃນເລື່ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ ຈົນກວ່າຈະໃຫ້ຜົນດີກັນ ຕ້ອງມີຄວາມຊຳນານ ໃຊ້ເຕັກນິກສູງ ແລະ ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ ຈິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພາະສວນກາເຟ ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຫຼາຍ ມີຫຼາຍພັນຕົ້ນຕໍ່ເຮັກຕາ ບໍ່ຄືສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

2. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການປັກຊ້າກິ່ງ ຫລື ແໜງ

- ອ່າງປັກຊ້າ (Propagator): ອ່າງມີຂະໜາດຜິ້ນ 120x120 ຊັງຕີແມັດໃນອ່າງປະກອບມີຫີນສູງປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ, ຊາຍປະສົມກັບແກບເຜົາສູງປະມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ອ່າງຕ້ອງມີຝາຜ້າຢາງປົກຄຸມ ແລະ ຢູ່ໃນສວນກ້າເບ້ຍ ທີ່ມີ ຜ້າກັນແສງ 50% ຫລື 70%.

• ແໜງປັກຊ້າ:

- + ແໜງມີຄວາມສູງປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດ ເປັນແໜງທີ່ບໍ່ອ່ອນ ແລະ ບໍ່ແກ່ເກີນໄປ.
- + ເປັນແໜງທີ່ຕັ້ງຊື່ຂັ້ນທາງຕັ້ງ ຫຼັບກັບໜ້າດິນເຊິ່ງ ໄດ້ຈາກການກ່ອງງ່າຂອງຕົ້ນແມ່ພັນ.
- + ຈຳພວກແໜງທີ່ປົ່ງອອກທາງຂ້າງ ບໍ່ເອົາລິຖິ້ມ

- + ຕັດສູງຈາກຂີ້ໃບ 0,5 ຊັງຕີແມັດແລະຕັດເປັນນູມ 45° ຍາວປະມານ 6 ຊັງຕີແມັດ.
- + ລຳໜຶ່ງຈະມີໃບ 1 ຄູ່ ແລະ ຜ່າເຄິ່ງອອກເປັນ 2 ທ່ອນ.
- + ຕັດໃບອອກ ປະມານ 1/3
- + ການປັກຊຳ ໂລຍະຫ່າງໃນແຖວ 5 ຊັງຕີແມັດ ລະຫວ່າງແຖວ 10 ຊັງຕີແມັດ, ປັກລົງໂດຍບໍ່ໃຫ້ໃບຕິດກັບຜິ້ນດິນ.
- ທ່ອນຊຳຈະອອກຮາກຢູ່ພາຍໃນ 2-4 ເດືອນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປຊຳໃສ່ຖົງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນເຮືອນກ້າເບ້ຍ ອີກປະມານ 1 ເດືອນກໍ່ສາມາດນຳໄປປູກໄດ້.
- ຂີ້ດີ ແລະ ຂີ້ເສຍຂອງການປັກຊຳ ແລະ ຕໍ່ຍອດຂີ້ດີ:
 - + ໄດ້ຜັນແທ້ດັ່ງເດີມ
 - + ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໝີ
 - + ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ
 - + ເມື່ອປູກຕົ້ນຈະສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫລອດ
 - + ລຳຕົ້ນໄດ້ຮູບຊົງດີແຕ່ຮຸ່ງສະດວກໃນເວລາເກັບກ່ຽວ
- ຂີ້ເສຍ
 - + ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເພື່ອເຮັດໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ
 - + ອາຍຸສັ້ນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີລະບົບຮາກແກ້ວ ແລະ ເນື່ອງຈາກເບ້ຍທີ່ໄດ້ນຳມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ
- + ໃຊ້ຈ່າຍຫາຍເພາະຕ້ອງມີວັດຖຸອຸປະກອນຕື່ມອີກ

ບົດທົດສະດີທີ 3 ການເລືອກສະຖານທີ່ປູກກາຟ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກກາຟ
2. ອະທິບາຍການເລືອກສະຖານທີ່ປູກກາຟ
3. ບອກວິທີການປູກໄມ້ເປັນຮຸ້ນໃຫ້ກັບຕົ້ນກາຟ

ເນື້ອໃນ

3.1 ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກກາຟ

ນິດໃສການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກາຟ ເປັນພືດທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດຕັ້ງເດີມຢູ່ໃນປ່າ ເຊິ່ງມີສະພາບແວດລ້ອມຊຸ່ມ ແລະ ມີຮຸ້ນເງົາ ການນຳກາຟມາປູກໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການ ຈຶ່ງຕ້ອງການມີການດັດແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນໆ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກາຟ ເຊັ່ນ : ການປູກໄມ້ໃຫ້ຮຸ້ນ ການປົກຄຸມເຫງົ້າຕົ້ນ ຫລື ການປະສົມພັນໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນສະຖານທີ່ໃໝ່ ຂຶ້ນນາ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ .

ກາຟເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັກເກີດໃນພູມປະເທດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບປູກກາຟ ແມ່ນສູງໃນລະດັບລະຫວ່າງ 1000 ແມັດ ແຕ່ກໍ່ມີບາງປະເທດສາມາດປູກໄດ້ຕິດຕັ້ງແຕ່ລະດັບ 250 ແມັດ ເຊັ່ນປະເທດ ບຣາຊິລ ແຕ່ວ່າມີສ່ວນພົວພັນກັບປະລິມານນ້ຳຝົນ, ການກະຈາຍຂອງນ້ຳຝົນ, ເນື້ອທີ່ເໝາະສົມປູກກາຟ ຄວນເປັນເນື້ອທີ່ຄ້ອຍໜ້ອຍໜຶ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາມຈ້າຍພູ ເພາະນ້ຳຈະບໍ່ຂັງ ຖ້າຫາກນ້ຳຂັງ ກາຟຈະຖືກກະທົບກະເທືອນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນຫລືກເວັ້ນຈາກນ້ຳໝອກກ້າມ ຖ້າຫາກມີນ້ຳໝອກກ້າມແລ້ວ ດິນກາຟຈະຕາຍ ແກ່ນກາຟຈະຫລິ້ນກ່ອນສູງ ເຊັ່ນ ກາຟ ອາຣາບິກາ ແຕ່ກາຟ ໂຣບັດສະຕາ ເຫັນວ່າທົນທານຕໍ່ນ້ຳໝອກໄດ້ດີກວ່າ.

3.1.1 ດິນ

ກາຟສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນດິນຮ່ວນ, ດິນຜຸຜຸ່ຍປົນຊາຍ, ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງມີອິນຊີວັດຕູສູງ, ມີການຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ. ໃນເນື້ອທີ່ປູກກາຟທີ່ມີນ້ຳຂັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳອອກໄດ້ໂດຍໄວແລ້ວເຫັນວ່າກາຟຈະສະແດງອາການໃບເຫຼືອງ ຮາກອ່ອນທີ່ແຕກອອກມາໃໝ່ຈະເໝົາ ດິນອາດຈະຕາຍໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ລັກສະນະຂອງດິນທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກກາຟ ຫຼາຍທີ່ສຸດຄື : ດິນຜຸຜຸ່ຍສີແດງ ເນື່ອງຈາກ ດິນຊະນິດນີ້ຈະມີ ທາດໂປຕັດຊຽນ ຢູ່ສູງ (K) ເຊິ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ກາຟ ເຕີດໝາກແລ້ວ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການທາດນີ້ ໃນຈຳນວນສູງ ກ່ວາທາດ ອື່ນໆ ສະພາບດິນດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມເປັນກາງ ຫລື ກົດເລັກນ້ອຍ ລະຫວ່າງ 4,5-6,5 ສ່ວນໃນດິນທີ່ເປັນຊາຍຫຼາຍ ຫຼື ໜຽວຫຼາຍ ຈະບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບປູກກາຟ ເນື່ອງຈາກປະລິມານແຮ່ທາດອາຫານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢູ່ນ້ອຍ. ກາຟເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການ ດິນຜຸຜຸ່ຍ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ ມີໜ້າດິນເລິກ ຢ່າງນ້ອຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 80 ຊັງຕີແມັດ ລະດັບຄວາມເລິກຂອງດິນລົງຜືນ 2 ແມັດ ຂຶ້ນໄປຍັງເປັນການດີ ດີທີ່ສຸດເປັນດິນທີ່ຜຸຜຸ່ຍ ມີຊ່ອງຫວ່າງຂອງອາກາດຫຼາຍ ເຊັ່ນດິນພູໄຟເກົ່າສີແດງແກນສີນ້ຳຕານໄໝ້ອກນັ້ນຕ້ອງເປັນດິນຮາບ ຫລື ຄ້ອຍຊຸ້ນ

ເລັກນ້ອຍ ບໍ່ຄວນເລືອກດິນທີ່ມີລັກສະນະຄ່ອຍເກີນໄປ ເພື່ອປູກກາຟເພາະໃນເວລາລະດູຝົນການເຊາະລ້າງຂອງນ້ຳທີ່ໄຫລເຊາະໜ້າດິນແມ່ນມີສູງເຮັດໃຫ້ທາດອາຫານໃນໜ້າດິນສູນເສຍຫຼາຍ.

3.1.2 ອຸນຫະພູມ

ແມ່ນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ໃນການເຮັດສວນກາຟ ລັກສະນະໂດຍທົ່ວໄປຂອງກາຟ ເປັນພືດທີ່ບໍ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນແຮງ ແລະ ໜາວຫຼາຍໄດ້ ຖ້າສະພາບອຸນຫະພູມມີການປ່ຽນແປງ ຈາກຮ້ອນເປັນໜາວ ຫລື ຈາກໜາວເປັນຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ຈະມີອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຕົ້ນກາຟ ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ອາດຈະບ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການສ້າງໄມ້ເປັນຮົ່ມເງົາ ເຊິ່ງ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັນຕະລາຍ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບອາກາດ ທີ່ອາດປ່ຽນແປງ ຢ່າງໄວວານັ້ນໄດ້. ກາຟແຕ່ລະພັນ ມີຄວາມຕ້ອງການອາກາດຮ້ອນ ແລະ ໜາວແຕກຕ່າງກັນ ກາຟອາຣາບິກາ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີລະຫວ່າງອຸນຫະພູມ 15-26 ອົງສາເຊລຊຽສ. ສ່ວນພັນໂຣບັດສະຕາຈະເລີນເຕີບໂຕດີລະຫວ່າງ ອຸນຫະພູມ 25-32 ອົງສາເຊລຊຽສ. ຖ້າການປ່ຽນແປງປະຈຳມື້ຂອງອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 32 ອົງສາເຊລຊຽສ ໃນຫຼາຍໆມື້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບກະເທືອນເຖິງຕົ້ນກາຟ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກາຟ ອາຣາບິກາ ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກສູງ ໃບຈະແຫ້ວຖ້າອຸນຫະພູມຮ້ອນແກ່ຍາວໄປຫຼາຍໆເດືອນຈະເຮັດໃຫ້ໃບຂຸຫລົ່ນ ແລະ ຕາຍໄປ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກາຟໂຣບັດສະຕາ ພັດບໍ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມໜາວເຢັນຖ້າອຸນຫະພູມຕ່ຳລົງເຖິງ 7 ອົງສາເຊລຊຽສ ຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໃບກໍຈະມ້ານຂາວແລ້ວກາຍເປັນໃບສີເຫຼືອງ ແລະ ຂຸຫລົ່ນ ຖ້າຄວາມເຢັນຫລຸດລົງເຖິງ 4 ອົງສາເຊລຊຽສ ຫຼາຍມື້ມັນກໍຈະຕາຍໄປ ສຳລັບກາຟອາຣາບິການັ້ນ ສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມໄກ້ຄຽງ 0 ອົງສາເຊລຊຽສ ໃນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຖ້າແກ່ຍາວໄປຫຼາຍມື້ມັນກໍຈະຕາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເວົ້າລວມແລ້ວຕົ້ນກາຟ ຫລືພືດພັນທຸກຊະນິດຖ້າອຸນຫະພູມເຢັນລົງເຖິງ 8-10 ອົງສາເຊລຊຽສ ແກ່ຍາວເປັນຫຼາຍມື້ ຫລື ຫຼາຍເດືອນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລຳຕົ້ນແມ່ນຊ້າທີ່ສຸດ ການໃຫ້ໝາກກໍບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ເວລາດຽວຂອງປີຕໍ່ມາກໍເຊັ່ນດຽວ ເຊັ່ນ : ໝໍ້ແໜງບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວການໃຫ້ໝາກກໍຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຜົນດີ.

3.1.3 ປະລິມານນ້ຳຝົນ

ສຳລັບປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ກາຟມີຄວາມຕ້ອງການສະເລ່ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 1500-2300 ມິລິແມັດ ແລະ ມີຊ່ວງເວລາຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 8-9 ເດືອນ ແຕ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີອາກາດໜາວ ແລະ ທ້ອງຟ້າປົກຄຸມໄປດ້ວຍເຜື້ອ ເກືອບຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າປະລິມານນ້ຳຝົນນ້ອຍກວ່າ 1500 ມິລິແມັດ ກໍອາດຈະປູກກາຟໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນຊ່ວຍບ້ອງກັນໃນການລະເຫີຍຂອງນ້ຳ ແຕ່ການປູກກາຟໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ ບັງຮົ່ມ ແລະ ບໍ່ມີການຄຸມດິນແລ້ວຈະຕ້ອງການປະລິມານ ນ້ຳຝົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1500 ມິລິແມັດ ແລະ ຝົນມີການກະຈາຍ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດເວລາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 8 ເດືອນ.

3.1.4 ຄວາມຊຸ່ມ

ກາຟທຸກຊະນິດມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຈາກອາກາດສູງ ເກືອບຕະຫຼອດປີ ເວັ້ນແຕ່ໃນລະດູອອກດອກອອກໝາກ ໄລຍະນີ້ກາຟຈະມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມນ້ອຍລົງ ເພື່ອກະຕຸ້ນການອອກດອກ ແລະ ການສູກຂອງໝາກ. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຂອງກາຟ ໃນແຕ່ລະພັນ ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ອອກໄປເຫັນວ່າ ກາຟພັນອາຣາບິກາ ຈະຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ໃນອາກາດບໍ່ເກີນ 80% ສ່ວນພັນໂຣບັດສະຕາ ຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບທີ່ອາກາດອົບເອົ້າຄືມີຄວາມຊຸ່ມປະມານ 90% ຫລືຫຼາຍກວ່ານີ້. ໃນການຈະເລີນ ເຕີບໂຕທາງຮາກ ແລະ ລຳຕົ້ນກາຟ ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມ

ຊຸ່ມໃນດິນຢູ່ຢ່າງຟຽງຟໍ. ການດູດຊຶມອາຫານໃນດິນເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພາວະການເຊັ່ນນີ້ ຜູ້ປູກກາຟ ອາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຄຸມດິນດ້ວຍວັດຖຸຄຸມດິນອັນໄດ້ແກ່ຫຍ້າແຫ້ງ, ເຜືອງແຫ້ງ ນອກຈາກນີ້ການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ ໃນດິນໃຫ້ມີປະລິມານຢ່າງຟຽງຟໍ ການຄຸມເຫຼົ້າຕົ້ນດ້ວຍວັດຖຸຄຸມດິນຊະນິດຕ່າງໆຍັງສາມາດປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງຈາກນ້ຳຝົນໄດ້ດ້ວຍ ແລະ ຈາກການສະຫຼາຍຕົວຂອງວັດຖຸຄຸມ ດິນ ຈະກາຍເປັນອິນຊີວັດຖຸທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຕົ້ນກາຟອີກດ້ວຍ.

3.1.4 ແສງແດດ

ກາຟແຕ່ລະຊະນິດຈະມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມແຮງກ້າຂອງແສງແດດຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ກາຟຟັນໂຣບັດສະຕາ ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມແຮງກ້າຂອງແສງແດດ ຫລື ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ຫຼາຍກວ່າຟັນອາຣາບິກາ. ກາຟເຊິ່ງປູກກາງແຈ້ງມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງກວ່າກາຟທີ່ປູກໃນຮົ່ມ ເພາະແສງແດດຈະເປັນໂຕຊ່ອຍໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດຂະບວນການປຸງອາຫານ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກາຟແຕ່ລະຟັນຈະມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມແຮງກ້າຂອງແສງແດດໃນປະລິມານທີ່ຈຳກັດ ການທີ່ກາຟໄດ້ຮັບແສງແດດຫຼາຍເກີນຄວນ ໂດຍສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ, ນ້ຳ ບໍ່ເໝາະສົມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ກາຟແຫ້ງຕາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.

3.2 ການເລືອກສະຖານທີ່

ກາຟເປັນພືດທີ່ມັກດິນຜຸ່ຍ, ນ້ຳບໍ່ຂັງ, ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຊັ້ນດິນເລິກ ມີຄວາມສົມບູນດີ ສະນັ້ນຄວນເລືອກເນື້ອທີ່ເປັນປ່າໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ທາດອາຫານຟຽງຟໍ, ດິນທີ່ຈະປູກຕ້ອງເປັນດິນທີ່ມີຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງປະມານ 4,2-5,1 . ສ່ວນກາຟຟັນອາຣາບິກາ ແມ່ນຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນດິນທີ່ ເປັນກາງ ແລະ ເປັນຕ່າງອ່ອນ ເຊິ່ງ ຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງປະມານ 6,5-7,2.

ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ກາຟຕ້ອງການຢ່າງນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ 1500 ມິລີແມັດ ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ສຳຄັນການກະຈາຍນ້ຳຝົນ ຕ້ອງສະໜ້າສະເໝີໃນລະດູຝົນ.

ຟັນອາຣາບິກາ ເໝາະສົມກັບເນື້ອທີ່ ທີ່ມີລະດັບຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ 500 ແມັດ ເຖິງ 2000 ແມັດ.

ຟັນໂຣບັດສະຕາ ເໝາະສົມກັບເນື້ອທີ່ທີ່ມີລະດັບສູງຕັ້ງແຕ່ 250 ແມັດ-2300 ແມັດ. ແຕ່ກໍ່ມີບາງບ່ອນ ສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຄວາມສູງ 50 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ ທັງນີ້ກໍ່ຕ້ອງມີປັດໃຈທາງອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ ສະພາບຂອງດິນ, ນ້ຳຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມ.

3.2.1 ການເລືອກສະຖານທີ່ປູກ

ກາຟມັກດິນຜຸ່ຍທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ຄວນມີດິນໜ້າເລິກ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 80 ຊັງຕີແມັດ. ສະນັ້ນຄວນເລືອກເນື້ອທີ່ເປັນປ່າໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ທາດອາຫານຟຽງຟໍ, ດິນທີ່ຈະປູກຕ້ອງເປັນດິນທີ່ມີ ຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງລະຫວ່າງ 4,2-5,1.

ສ່ວນກາຟອາຣາບິກາ ແມ່ນຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີ ທີ່ສຸດໃນດິນທີ່ເປັນກາງ ແລະ ເປັນຕ່າງອ່ອນ ເຊິ່ງຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງລະຫວ່າງ 6,5-7,2. ການເລືອກເນື້ອທີ່ປູກຄວນໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບຟັນກາຟທີ່ຈະປູກ ເຊັ່ນ : ເນື້ອທີ່ສູງຄວນປູກກາຟນ້ອຍ ອາຣາບິກາ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນນ້ຳໝອກກ້າມ. ເນື້ອທີ່ຕ່ຳໜ້ອຍໜຶ່ງຄວນປູກກາຟກາງ (ໂຣບັດສະຕາ).

ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ກາຟຕ້ອງການ ຕັ້ງແຕ່ 1500 ມິລີແມັດ ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ສຳຄັນຄືການກະຈາຍນ້ຳຝົນ ຕ້ອງສະໜ້າສະເໝີໃນລະດູຝົນ.

ກາຟນ້ອຍອາຣາບິກາ ເໝາະສົມກັບເນື້ອທີ່ໆມີລະດັບຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ 500 ແມັດ ເຖິງ 2000 ແມັດ , ກາຟຜັນໂຮບັດສະຕາເໝາະສົມກັບເນື້ອທີ່ໆມີລະດັບສູງຕັ້ງແຕ່ 250 ແມັດ ຫາ 2300 ແມັດ ແຕ່ກໍ່ມີບາງບ່ອນສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຄວາມສູງ 50 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ ແຕ່ ກໍ່ຕ້ອງມີປັດໃຈທາງອື່ນ ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ສະພາບຂອງດິນ, ນ້ຳຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມ.

ຢູ່ປະເທດລາວ, ການກຽມດິນ ໄດ້ເຮັດພາຍຫຼັງການຖາງປາ ແລະ ຈູດໂຮ່ໃນລະດູແລ້ງ (ທັນວາ-ເມສາ) ສ່ວນຫລວງຫຼາຍດິນພູພຽງບໍລິເວນ ມັກເປັນບ່ອນທີ່ຖືກຖາກຖາງມາກ່ອນແລ້ວ. ປະຈຸບັນແມ່ນກາຍເປັນປາເລົ່າແກ່ ດັ່ງນັ້ນ ການກຽມກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ເຊິ່ງວຽກງານການກຽມດິນ ປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

- ການບຸກເບີກ ຖາກຖາງເນື້ອທີ່
- ການອະນາໄມຈູດຮີ້ ແລະ ຕັດຕົໂມ້
- ໂຖ ແລະ ພວນດິນ
- ການວາງແລວເພື່ອຂຸດຂຸມປູກ

3.3 ການຕຽມ ແລະ ການປູກໄມ້ເປັນຮົ່ມ

3.3.1 ການເລືອກແນວພັນຕົ້ນໄມ້

ໃນການປູກໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຫ້ກັບຕົ້ນກາຟນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ອຸນຫະພູມໃນດິນ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາການລະເຫຼີຍອາຍຂອງນ້ຳໃນດິນ ປ້ອງກັນການຜັງທະລາຍຂອງດິນ ຈາກການເຊາະເຈື່ອນໃນເວລາຝົນຕົກໜັກ ປ້ອງກັນວັດຊະພິດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄໍນ້ອຍທີ່ກາຟ ແລະ ເພີ່ມອິນຊີວັດຖູໃຫ້ແກ່ດິນ.

ໄມ້ເປັນຮົ່ມ ນອກຈາກຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຕົ້ນກາຟ ແລ້ວຍັງມີໂຫດອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ເປັນຄູ່ແຂ່ງຍາດແຍ່ງທາດອາຫານຈາກຕົ້ນກາຟ. ໃນກໍລະນີທີ່ໄມ້ເປັນຮົ່ມງ່າຫັກຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກາຟໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ ແລະ ໄມ້ເປັນຮົ່ມທີ່ແໜ້ນຕິບເກີນໄປ ຫລື ຫຼາຍໂພດ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກາຟເປັນໝາກໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງມັກຕັດແຕ່ງກິ່ງໄມ້ບັງຮົ່ມອອກເໝືອນກັນ.

ສະນັ້ນ ການເລືອກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງລະບົບຮາກ, ທາດອາຫານ ທີ່ຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງຕໍ່ຕົ້ນກາຟ, ລະບົບຮົ່ມເພາະຄວາມຕ້ອງການຮົ່ມຂອງຕົ້ນກາຟ ມີປະລິມານຈຳກັດ ຖ້າຮົ່ມຈົນເກີນໄປກໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັບໝາກ ແລະ ພະຍາດທີ່ເກີດມາຕາມຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມກໍ່ອາດເປັນໄດ້ ແຕ່ກໍ່ສາມາດໃຫ້ ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ : ໝາກຮຸ່ງ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ອື່ນໆ.

3.3.2 ການປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມ

ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມກາຟແບ່ງອອກໄດ້ 2 ຊະນິດໄດ້ແກ່ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມຊົ່ວຄາວ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມຖາວອນ

1 ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມຊົ່ວຄາວ: ໃຊ້ສຳລັບເປັນຮົ່ມກາຟ ເມື່ອຕອນເລີ່ມຕົ້ນປູກ ອາດຈະເປັນພືດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຖົ່ວເຫຼືອລອງ, ຖົ່ວຂຽວ, ເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າ ເພື່ອບັງແດດ ແລະ ນ້ຳໝອກ ແຕ່ໃນລະດູແລ້ງມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ໄຟໄໝ້ ສະນັ້ນຕ້ອງໝັ່ນໃຫ້ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຫາວິທີປ້ອງກັນອີກດ້ວຍ ໂດຍປູກຫ່າງຈາກຕົ້ນກາຟປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ. ຈະເປັນການປູກແຊມຫລືປູກສະຫລັບ ເມື່ອເຮົາປູກກາຟປີທຳອິດ ເຮົາສາມາດປູກຟິດໂຮ່ ສັບຕາມຫວ່າງ ໄດ້ອີກ ສຳລັບກາຟ ກາຕີມ ແມ່ນຄວນປູກໃສ່ພຽງແຕ່ປີທຳອິດເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບກາຟກາງສາມາດປູກຟິດໂຮ່ຕິດຕໍ່ກັນ 2 ປີ ພຶດທີ່ສາມາດປູກຮ່ວມໄດ້

ແກ່ ເຂົ້າ, ຖົ່ວດິນ, ໝາກເຜັດ, ຜັກກະລໍ່າ ແລະ ຟິດໂຮ່ຊະນິດອື່ນໆ ປະສະຈາກການປູກຟິດທີ່ເປັນເຄືອໃສ່ ແຕ່ລິ່ງສໍາຄັນ ການປູກຟິດສະຫລັບສັບຫວ່າງກາເຟ ຕ້ອງປູກຫ່າງຈາກຕົ້ນກາເຟ ແລະ ຈັດວາງການປູກ ໃຫ້ເປັນລະ ບຽບດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຟິດຍາດຊິງອາຫານຈາກກາເຟ, ບໍ່ມີການບັງແສງແດດ ເພື່ອການສັງເຄາະ ແສງຊ່ວຍໃນການປຸງແຕ່ງທາດອາຫານ. ນອກຈາກນັ້ນຖ້າມີຄວາມສາມາດຊອກຟິດຄຸມດິນ (Flemingia) ປູກສັບຫວ່າງແຖວຂອງກາເຟຍິ່ງເປັນການດີຫຼາຍ ເພາະວ່າຟິດຊະນິດນີ້ ສາມາດເກີດໃນສ່ວນນ້ອຍຍືນ ຍາວ ແລະ ມັນສາມາດປົກຄຸມບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າເກີດຂຶ້ນໃນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວຍດຶງດູດ ທາດໂມໂຕຣເຈນຈາກ ທຳມະຊາດມາເກັບໄວ້ໃນ ແລະ ພາກສ່ວນຮາກ ສະໜອງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລຳຕົ້ນ ສາມາດນຳມາ ເປັນທາດອາຫານໄດ້, ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃບຂອງມັນ ເມື່ອເຮົາຕັດລົງເຮັດປົກຄຸມມັນຈະເປັນສາມາດປັບ ໂຄງສ້າງຂອງດິນສ່ວນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

ວິທີການປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມ (Flemingia): ປູກຫ່າງຈາກແຖວຕົ້ນ ກາເຟ 60 ຊັງຕີແມັດ ຫວ່າງກາເຟໜຶ່ງເຮົາສາມາດປູກໄດ້ 3-4 ແຖວ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 50 ຊັງຕີແມັດ ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງຕົ້ນ 30-40 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ແຫລມສັກຄ້າຍຄືກັບສັກເຂົ້າໂຮ່, ໃຊ້ແກ່ນປອນລົງຊຸມໆລະ 10 ແກ່ນ ປະມານ 10-15 ມື້ ແກ່ນຈະງອກຂຶ້ນມາ ຈາກນັ້ນ ເມື່ອສັງເກດເຫັນວ່າລຳຕົ້ນຂອງມັນສູງໄດ້ 70 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າຄົມໆຕັດຕົ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມສູງຫ່າງຈາກໜ້າດິນ ແລ້ວໃຊ້ຊີ້ນສ່ວນທີ່ຕັດມາປົກ ຄຸມລົງຕາມຫວ່າງ ວຽກນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜັກຄັ້ງ ທີ່ ສັງເກດເຫັນຕົ້ນສູງ 70 ຊັງຕີແມັດ ຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ຕັດຈະ ເຮັດໃຫ້ລຳຕົ້ນໃຫຍ່ ແລະ ແຂງຈາກນັ້ນກໍ່ຕາຍ ຖ້າວ່າເຮົາຕັດຕອນເລື້ອຍໆ ຈະເປັນຜົນດີແກ່ສ່ວນກາ ເຟຫຼາຍທີ່ສຸດ.

2. ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມຖາວອນ: ຕົ້ນໄມ້ບັງຮົ່ມຖາວອນທີ່ມີລັກສະນະດີນັ້ນຕ້ອງມີລັກສະ ນະບໍ່ນ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາໃຫ້ຮົ່ມເງົາບໍ່ແໜ້ນຕີບ ເຊັ່ນ : ກະຖິນຍັກ, ກິກຂີ້ເຫລັກ, ກິກ ທອງ, ຕົ້ນຈຳປາປາ, ໝາກກາລິເມຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ໄລຍະປູກໄມ້ບັງຮົ່ມຖາວອນໃນສ່ວນກາເຟ

ຕົ້ນແຄ ໄລຍະປູກ	12 ແມັດx 12 ແມັດ
ຕົ້ນຂີ້ເຫລັກ	15 ແມັດx 15 ແມັດ
ຕົ້ນກະຖິນຍັກ	15 ແມັດx 15 ແມັດ
ຕົ້ນກະຖິນ	9 ແມັດx 9 ແມັດ

ນອກຈາກທີ່ກ່າວແມ່ນຈະຖືເອົາຫລັກການ 10 ຕົ້ນ ກາເຟຕໍ່ໄມ້ເປັນຮົ່ມໜຶ່ງຕົ້ນຢູ່ ເຂດປາກຊ່ອງຈະປູກຕົ້ນທອງຖີ່ກ່ອນກໍ່ໄດ້ ແລ້ວຈຶ່ງຕັດອອກໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍຈຶ່ງປະມັຽນຕາມ ປະລິມານ ທີ່ຕ້ອງການ, ການປູກໄມ້ເປັນບັງຮົ່ມແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມໜາວແຮງ ເຮັດໃຫ້ໄມ້ເປັນ ຮົ່ມຕາຍກ່ອນຈຶ່ງຮອດກາເຟ. ການປູກໄມ້ບັງຮົ່ມຄວນຈະປູກກ່ອນກາເຟ 1 ປີ ຫລືຈະປູກໄປພ້ອມກັນກັບກາ ເຟກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈາກບົດຮຽນຄົວຈິງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າປູກກ່ອນກາເຟ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກາເຟໃຫຍ່ຊ້າ ມີຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ສະພາບຂອງດິນ ເພາະຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຊ້ທາດອາຫານເອົາໄປກ່ອນ.

ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ສ່ວນກາເຟ ໂດຍສະເພາະກາເຟຕອນອາຍຸຍັງອ່ອນ ເປັນຕົ້ນກາເຟ ອາຮາບິກາ ແມ່ນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງສູງເພາະມັນສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີໃນອາກາດເຢັນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການແສງແດດແຮງກ້າ ນອກນັ້ນກາເຟກ່າງກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮົ່ມເຊັ່ນກັນໂດຍສະເພາະເຂດ ທີ່ປູກກາເຟຢູ່ໃນລະດັບ 400-600 ແມັດ ຈາກໜ້ານ້ຳທະເລເພາະອຸນຫະພູມເຂດນີ້ຂ້ອນຂ້າງຮ້ອນ, ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ເຮົາສາມາດປູກໃສ່ກັບສ່ວນກາເຟໄດ້ແກ່ຈຳພວກຕົ້ນທີ່ຈັດຢູ່ໃນພືດຕະກູນຖົ່ວ.

- ປະເພດໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມຖາວອນໄດ້ແກ່ :

- ຕົ້ນທອງ ໂດຍຈະນຳແກ່ນມາກັກເບ້ຍ, ຫລືໃຊ້ງ່ານຳມາປູກໃນໄລຍະ 6 ແມັດ x 6 ແມັດ
- ຕົ້ນກະຖິນທີ່ກັກດ້ວຍແກ່ນ ປູກໄລຍະ 6 ແມັດ x 6 ແມັດ
- ກົກຂີ້ເຫລັກກິນໃບ
- ຫລືຕົ້ນໄມ້ທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຕາມສວນ ທີ່ເຮົາສັງເກດວ່າບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງແກ່ຕົ້ນກາ

ເຟ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປີຕໍ່ໄປເຮົາສັງເກດເຫັນ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມມີຄວາມຕືບໜາຫຼາຍ ເຮົາຄວນເຮັດຕັດຢອນອອກ ໃນຕົ້ນລະດູຝົນໂດຍສະເພາະຕົ້ນທອງ ແລ້ວນຳວ່າທີ່ຕັດອອກນັ້ນຕັດເປັນຊັ້ນ ແລ້ວ ປົກຄຸມລົງຕາມຫວ່າງ ຂອງແຖວກາເຟ, ມັນຈະເໝົາເປື້ອນເປັນຝຸນສະໜອງໃຫ້ຕົ້ນກາເຟໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃນສວນ ເຮົານັ້ນ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ປູກຝັດປະເພດເຄືອທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ເຊັ່ນ : ຜູ້ຮັຽວ, ໝາກຝັກໂທ ໃຫ້ຂຶ້ນຕາມ ລຳຕົ້ນເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວອີກ.

ບົດທົດສະດີທີ 4

ການຜະລິດກາເຟ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາກາເຟ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ອະທິບາຍວິທີການກຽມເນື້ອທີ່ປູກກາເຟ
2. ອະທິບາຍວິທີການໃສ່ຝຸນກາເຟ
3. ບອກວິທີ ການໃສ່ວັດຖຸຄຸມດິນເພື່ອເປັນການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ບຳລຸງຕົ້ນກາເຟ
4. ບອກ ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ຂອງການຕັດແຕ່ງກິ່ງກາເຟ

ເນື້ອໃນ

4.1 ການກຽມເນື້ອທີ່ ແລະ ການປູກ

4.1.1 ການກຽມເນື້ອທີ່

ໃນສະພາບເນື້ອທີ່ງຽບເປັນປ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕັດຕົ້ນໄມ້ອອກ ຢາກໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ຄວນເອົາເຫຼົ່າໜຶ່ງຕໍ່ອອກນຳ ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕັດອອກນັ້ນແຫ້ງ ໃນການຈູດຄວນແຍກອອກເຜົາເທື່ອລະນ້ອຍ ບໍ່ຄວນຈູດເທື່ອດຽວທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຖາງ ແລະ ຈູດເຜົາພວກໄມ້ອື່ນໆເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນໂຖດິນ 2-3 ເທື່ອ ແລະ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມປູກກາເຟ ອາດຈະປູກຟິດພວກຕະກູນຖົ່ວກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງຂອງດິນ.

ໂດຍທົ່ວໄປການຕຽມເນື້ອທີ່ປູກຈະເຮັດໄດ້ 2 ວິທີ :

1. ຖາງປ່າໃຫ້ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້ ເພື່ອເປັນໄມ້ບັງແດດ ການເຮັດແບບນີ້ ໃຫ້ເບິ່ງລະຍະຂອງຕົ້ນໄມ້ວ່າຕົ້ນໃດຈະຈົ່ງໄວ້ເປັນໄມ້ບັງແດດກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຕັດຖິ້ມ ສ່ວນຕົ້ນໃດທີ່ບໍ່ໃຊ້ເປັນໄມ້ບັງແດດກໍ່ຕັດຖິ້ມ ຫຼັງຈາກຕັດຕົ້ນໄມ້ອອກ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ຄວນເກັບເສດກິ່ງໄມ້ອອກໃຫ້ໝົດ ການຕຽມເນື້ອທີ່ດ້ວຍວິທີນີ້ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມກັນເພາະບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ສາມາດປູກກາເຟໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮຸ້ນຊົ່ວຄາວຫຼື ຖາວອນ ຂໍ້ສຳຄັນຄວນຕັດແຕ່ງກິ່ງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕຶບເກີນໄປ.

2. ວິທີການຖາງປ່າໃຫ້ໝົດເລີຍ ວິທີນີ້ມີຄວາມນິຍົມກັນຫຼາຍ ເພາະເບິ່ງແລ້ວມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍກວ່າ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກເຂົ້າຊ່ວຍໄດ້ສະດວກ ແຕ່ຄວນຈົ່ງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໆໄວ້ເພື່ອບັງລົມ ຖ້າເນື້ອທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນຫຼາຍກວ່າ 10 % ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຂັ້ນໂດກ່ອນຈົ່ງປູກ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມກ້ວາງຂອງຂັ້ນໂດ 1 ແມັດ ຫ່າງກັນເປັນໄລຍະ 2-3 ແມັດ ແລ້ວປູກໄມ້ບັງແດດຊົ່ວຄາວກ່ອນຫລື ປູກໄປພ້ອມກັບກາເຟ ຫລືໄມ້ບັງແດດຖາວອນກໍ່ໄດ້.

ສຳລັບເນື້ອທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ອາດຈະປູກກາເຟໄດ້ເລີຍ ຫລືຈະໂຖພວນດິນຈັກ 2-3 ຄັ້ງກໍ່ໄດ້ ແລະ ເມື່ອປູກກາເຟໄປແລ້ວ ສາມາດທີ່ຈະປູກຟິດພວກ ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ສາລີ, ເຂົ້າໄຮ່ລະຫວ່າງຕົ້ນກາເຟກໍ່ຍິ່ງດີ ເພາະນອກຈາກເປັນການຈຳກັດວັດຊະຟິດແລ້ວ ຟິດເຫລົ່ານີ້ຍັງໃຫ້ຜົນຜະລິດອີກ.

ຫຼັງຈາກຖາງປ່າ ແລະ ເຮັດການຈູດເຜົາພວກເສດໄມ້ອື່ນໆເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄວນໂຖດິນ 2-3 ຄັ້ງ ແລະ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມປູກກາເຟ ອາດຈະປູກຟິດຕະກູນຖົ່ວກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ : ຖົ່ວຂຽວ ຖົ່ວ

ເຫຼືອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງດິນ.

4.1.2 ການກຳນົດໄລຍະປູກ

ການກຳນົດໄລຍະການປູກ ກໍເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ ທີ່ກຳນົດຜົນຂອງກາຝ ໃນການກຳນົດໄລຍະ ການປູກຂຶ້ນກັບພື້ນກາຝ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ເຊັ່ນ ກາຝພື້ນອາຣາບິກາ ຖ້າດິນອຸດົມສົມບູນດີ ຄວນປູກໃນໄລຍະບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2x2 ແມັດ ສ່ວນກາຝພື້ນໂຣບັດສະຕາ ຄວນໃຫ້ມີໄລຍະ 3 x3 ແມັດ ແລະ 4 x 4 ແມັດ ສຳລັບດິນອຸດົມສົມບູນດີ ຫຼືອາດຈະປູກໃນໄລຍະ 2,5 x 2,5 ແມັດ ໃນໄລຍະ 6-7 ປີ ຫຼັງຈາກປູກ ໃຫ້ຕັດຕົ້ນອອກຖິ້ມ ຕົ້ນເອີ້ນຕົ້ນ ໄລຍະປູກກໍຈະກາຍເປັນ 5x5 ແມັດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກາຝມີຝຸ່ນໃຫຍ່ແຕ່ບໍ່ສູງ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການເກັບໝາກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ.

ສຳລັບການປູກກາຝໃນໄລຍະຕ່າງກັນ ຈະໄດ້ຈຳນວນຕົ້ນຕໍ່ໂລ່, ຕໍ່ເຮັກຕາດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ໄລຍະປູກ(ແມັດ)	ຈຳນວນຕົ້ນຕໍ່ໂລ່	ຈຳນວນຕົ້ນຕໍ່ເຮັກຕາ
2x2	400	2500
2,5x2,5	256	1600
3x3	177	1100
4x4	100	625
3,5x3,5	130	810
3x4	132	825

• ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກກາຝ ທີ່ນິຍົມປະຕິບັດກັນຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລິເວນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

➢ ກາຝອາຣາບິກາ(ກາຝມ້ອຍ)

- ກາຕິນ (catiແມັດor) 2,0 x 1,0 ແມັດ 5000 ຕົ້ນ/ຮຕ)

- ຊາວາ (java) 2,0 x 1,5 ແມັດ 3333 ຕົ້ນ/ຮຕ)

- ກາຝມ້ອຍຜື້ນເມືອງ (Arabicalocal) 2,0 x 1,5 ແມັດ (3333 ຕົ້ນ/ຮຕ)

➢ ກາຝໂຣບັສຕາ(ກາຝກາງ)

- ປູກເດັດຍອດ 2,0 x 2,5 ແມັດ (2000 ຕົ້ນ/ຮຕ)

2,5 x 2,5 ແມັດ (1600 ຕົ້ນ/ຮຕ)

- ປູກປ່ອຍຍອດ 3,0 x 3,0 ແມັດ (1111 ຕົ້ນ/ຮຕ)

3,0 x 3,50 ແມັດ (957 ຕົ້ນ/ຮຕ)

4.1.3 ການກຽມຂຸມປູກ

ກາຝເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັກຕິນຜົງ, ບໍ່ຂັງນ້ຳ ມີຮົ່ມພຽງພໍບໍ່ມັກແຕດກ້າ, ບໍ່ມັກລົມແຮງ ເມື່ອກຳນົດໄລຍະປູກ ແລະ ໄດ້ປັກເຄື່ອງໝາຍໄວ້ແລ້ວ ກໍຂຸດຂຸມບ່ອນທີ່ປັກເຄື່ອງໝາຍນັ້ນ ຄວນຈະມີຂະໜາດກ້ວາງ, ເລິກ, ຍາວ 50x50x50 ຊັງຕີແມັດ. ຂຸດຂຸມປະໄວ້ກ່ອນປູກກາຝປະມານ 2 ເດືອນ ດິນທີ່ຂຸດຂຶ້ນມາຄວນຈະແຍກດິນຊັ້ນເທິງ ແລະ ດິນຊັ້ນລຸ່ມໄວ້ບ່ອນລະກອງ. ກ່ອນຈະປູກຄວນຈະກຽມຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ກາບກາຝຫຼັງການສີ ແລະ ໃບໄມ້ອື່ນໆທີ່ສາມາດສະຫຼາຍຕົວໄດ້ໄວ ປະມານ 1 ຄູ່ ຮອງກັນຂຸມ ໃຊ້ໜ້າດິນລົງໄປປະມານເຄິ່ງຂຸມປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນກ່ອນການປູກ. ຖ້າບໍ່ມີຝຸ່ນຄອກ ອາດໃສ່ຝຸ່ນຢູເຣຍ 46-00-00 ຈຳນວນ 20 ກຣາມ ແລະ ຝຸ່ນສູດ15-15-15 ຈຳນວນ 30 ກຣາມຕໍ່ຂຸມ, ແລ້ວໃຊ້ດິນຊັ້ນ

ເທິງຄົນເຂົ້າກັນໃນຂຸມ ປະມານຢູ່ເຄິ່ງຂຸມ ໂດຍຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ກ່ອນຈະນຳເບ້ຍກາຝມາປູກ.

4.1.4 ການກຽມເບ້ຍປູກ

1. ການຂຸດກ້າໄປປູກ: ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຊຳກັກແລ້ວປະມານ 12-18 ເດືອນ ເບ້ຍກາຝຈະມີຄວາມ ສູງ ປະມານ 60-75 ຊັງຕີແມັດ ເບ້ຍກາຝ ທີ່ຈະນຳໄປປູກໄດ້ນັ້ນ ຄວນມີໃບແທ້ ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 7 ຄູ່ ການຂຸດຄວນຂຸດດ້ວຍ ຄວາມລະມັດລະວັງບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີດິນຕິດ ໄປກັບຮາກ ກໍໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຕັດຍອດຖິ້ມ ໃຫ້ເຫຼືອໃບພຽງ 3-4 ຄູ່ເທົ່ານັ້ນ ມັດຮວມກັນເປັນມັດໆ ລະປະມານ 10-20 ຕົ້ນ ຖ້າ ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ແຫ້ງຄວນຫຼືດນ້ຳທີ່ຮາກ ຫາກປູກບໍ່ທັນຄວນວາງໄວ້ໃນບ່ອນຮົ່ມ ການນຳໄປປູກນັ້ນ ຖ້າຫາກນຳໄປປູກທັນທີຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນການຕາຍ ນ້ອຍລົງ.

2. ວິທີການຂົນຍ້າຍກ້າກາຝໄປປູກ: ການຂົນຍ້າຍຕົ້ນກາຝໄປຈາກເຮືອນກ້າ ເພື່ອຈະນຳ ໄປປູກ ໃນເນື້ອທີ່ປູກນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເປີເຊັນການຢູ່ລອດ ຂອງເບ້ຍ ກາ ຝ ທີ່ປູກ ຈຶ່ງຜາໃຫ້ເກີດບັນຫາຢູ່ວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເບ້ຍກາຝໄດ້ຮັບຄວາມກະທົບກະ ເທືອນນ້ອຍ ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງວິທີທີ່ ຈະໃຫ້ຕົ້ນກ້າ ກະທົບກະເທືອນນ້ອຍທີ່ສຸດຍັງຊອກບໍ່ທັນໄດ້ ແຕ່ທີ່ປະຕິບັດກັນ ມາມີດັ່ງນີ້ :

ຕົ້ນກ້າທີ່ເພາະຊຳໃນຖົງຢາງ ການຂົນຍ້າຍກ້າແບບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາເທົ່າໃດ ໂດຍສະ ເພາະການ ຂົນໄລຍະ ຫ່າງໄກໆ ແຕ່ຖ້າຂົນສົ່ງໄກ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຂົນສົ່ງທາງລົດ ກໍໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຄຸມ ກ້າກາຝໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນລົມ ກະທົບໃສ່ຕົ້ນກ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າແຫ້ວ.

ສຳລັບການຕົ້ນກ້າກາຝແບບເປືອຍຮາກ ຄື ບໍ່ມີດິນຫຸ້ມການຂົນສົ່ງອາດຈະຍຸ້ງຍາກ ພໍສົມຄວນ ການປະຕິບັດຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດກວ່າແບບຊຳໃສ່ໃນຖົງ ຄືຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົດຂອງ ຕົ້ນກ້າ ກາ ຝ ໃຫ້ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກທີ່ຫຼີກຕົ້ນອອກມາແລ້ວ ໃຫ້ຕັດຍອດແລະໃບອອກດ້ວຍ ພ້ອມ ທັງຕັດແຕ່ງ ຮາກທີ່ຍາວເກີນໄປນັ້ນ ອອກໄປແດ່ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ຖົງຢາງ ຂະໜາດກາງ ຖົງລະປະມານ 100- 200 ຕົ້ນ ຄວນອັດປາກຖົງ ແລະ ຄວນເຈາະຮູ ລະບາຍອາກາດ ວັດຖຸຫຸ້ມທີ່ຊະນິດອື່ນອາດໃຊ້ ຖົງປານ ກາບ ກ້ວຍ ຫຼື ເປືອກໝາກຜ້າວ ທີ່ຫາໄດ້ ແລ້ວແຕ່ສະດວກ ການປະຕິບັດແບບນີ້ ຈະເຮັດກໍເມື່ອ ມີການ ຂົນຍ້າຍກ້າໃນໄລຍະຫ່າງໄກໆ ສຳລັບໄລຍະຫ່າງໄກ ອາດບໍ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຕ້ອງຕົ້ນກ້າໄປປູກໄວ້ຖ້າ ບໍ່ ດັ່ງ ນັ້ນ ຕົ້ນກ້າຈະແຫ້ວ ເວລາໄປປູກຕົ້ນກ້າຈະສະຖິກການຈະເລີນ ເຕີບໂຕ.

4.1.5 ການປູກດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ

ເມື່ອຕົ້ນເບ້ຍໄດ້ 7 ເດືອນແລ້ວກໍເລີ່ມເອົາເຄື່ອງມຸງໝານກ້າເບ້ຍອອກເທື່ອລະນ້ອຍ ເວັ້ນ ໄລຍະຫ່າງ ກັນປະມານ 1 ອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນເບ້ຍຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບແສງແດດເທື່ອລະນ້ອຍ ຈຶ່ງຈະບໍ່ກະທົບ ກະ ເທືອນ. ອາຍຸກ້າ ທີ່ເພາະສົມດ່ານປູກຄືປະມານ 8-12 ເດືອນ.

ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວກາຝທີ່ຈະນຳມາປູກ ຈະແມ່ນຕົ້ນເບ້ຍທີ່ຊຳຢູ່ໃນຖົງປາສຕິກ. ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະນຳ ລົງປູກ ໃນຂຸມຄວນເອົາຖົງຢາງປາສຕິກອອກກ່ອນດ້ວຍການຕັດກັ້ນຖົງເບ້ຍອອກປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຈຶກຂ້າງອອກ. ເວລາປູກໃຫ້ຕົ້ນເບ້ຍຢູ່ຊຶ່ງກາງຂຸມ ຄວນລະມັດລະວັງຢາໃຫ້ຮາກຈົ່ງ ແລ້ວ ເອົາດິນໃສ່ ໃຫ້ເຕັມຂຸມ ຖິ້ມດິນໃຫ້ແໜ້ນເຕັມຂຸມ ແລະ ໃຫ້ດິນທີ່ຖິ້ມສູງກ່ວາ ລະດັບໜ້າດິນຈັກນ້ອຍ ເມື່ອ ເວລາດິນແຈບລົງແລ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບໜ້າດິນ ບັກໄມ້ຜູກມັດກັບຕົ້ນເບ້ຍໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ. ສຳລັບໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ຕົ້ນເບ້ຍທີ່ຖອນ ຈາກໝານຊຳມາປູກ ເມື່ອເວລາປູກຄວນໃຊ້ສຽນຂຸດຂຸມ ພໍທີ່ຈະຢ່ອນຕົ້ນກາຝລົງໄປໄດ້ເຖິງເຈົ້າຂອງຕົ້ນແລ້ວຈຶ່ງຖິ້ມ.

ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ ບໍ່ຄວນຖິ້ມຕົ້ນກາຝເລິກເກີນຂອບເຂດທີ່ເບ້ຍບໍ່ສາມາດເກີດໄດ້ ເພາະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລຳຕົ້ນບໍ່ໄດ້ດີ. ພໍຕົກມາເຖິງລະດູແລ້ງຕົ້ນກາຝກໍຈະຕາຍໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ມີ

ຄວາມແຂງແຮງ. ຖ້າຫາກຝົນບໍ່ຕົກໃຫ້ຫີນນ້ຳໜັກ ແລະ ໃນໄລຍະທຳອິດຄວນຈະຫາໃບໄມ້, ງ່າໝາກຜ້າວ, ກົກເລົາ ມາບັງເຮັດຮົ່ມໄວ້ 2-3 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນກ້າຕັ້ງຕົນໄດ້ດີ. ຫຼັງຈາກປູກໄປແລ້ວ 2-3 ມື້ ຖ້າເຫັນວ່າມີຕົ້ນເບ້ຍຕາຍໃຫ້ປູກຊອນແທນໃໝ່.

4.1.6 ລະດູການປູກ

ລະດູການປູກກາເຟທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຕົ້ນລະດູຝົນ ເພື່ອສະດວກໃນເລື່ອງນ້ຳ. ສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນທີ 5 ຫາເດືອນທີ 6 ຄວນປູກໃນມື້ທີ່ມີຝົນຕົກ ຖ້າປູກຕົ້ນລະດູຝົນຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍມີໂອກາດໃຫຍ່ ຕິດໄວດີກວ່າ. ແຕ່ຖ້າຝົນບໍ່ຕົກ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ນ້ຳ ປະມານ 10 ມື້ ຄວນຫາເລືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງ ມາຄຸມເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ຕົ້ນກາເຟ.

4.1.7 ການໃຫ້ນ້ຳ

ໃນການປູກຜົດບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົດຊະນິດໃດກໍຕາມ ນັບໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການປູກຜົດເຊິ່ງຈະຂາດບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກຜົດຂາດນ້ຳແລ້ວ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜົດກໍຈະຢຸດຊະງັກລົງ ແລະ ຖ້າຫາກຂາດເລື້ອຍໆ ຕົ້ນຜົດອາດຈະຕາຍໄດ້ ເພາະໃນລຳຕົ້ນຜົດມີນ້ຳເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນ ທາດອາຫານຕ່າງໆກໍຕ້ອງອາໄສນ້ຳ ເປັນຕົວລະລາຍ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບທີ່ຜົດສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ກາເຟກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຄວນໃຫ້ໄດ້ຮັບນ້ຳທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກາເຟ ແຕ່ລະວັງຢາໃຫ້ນ້ຳຂັງ ຫລື ນ້ຳຫຼັງ ກາເຟເປັນຜົດທີ່ບໍ່ມັກຄວາມຊຸ່ມ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກາເຟຕາຍໄດ້ ໃນໄລຍະຕົ້ນທີ່ປູກຄວນມີການໃຫ້ນ້ຳແກ່ຕົ້ນກາເຟ ທີ່ປູກໃໝ່ ທັງນີ້ກໍເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຕົ້ນກາເຟ ຕັ້ງຕົວໄດ້ໄວ ເພື່ອເປັນການປະຢັດແຮງງານໃນການໃຫ້ນ້ຳ ການປູກຄວນປູກໃນຕົ້ນລະດູຝົນ.

4.2 ການໃສ່ຝຸ່ນກາເຟ

ຜົດທຸກຊະນິດມີຄວາມຕ້ອງການຝຸ່ນ ຫລື ທາດອາຫານ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຕ່ຈະຫຼາຍຫລືນ້ອຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງດິນ ຫລື ຜົດຊະນິດນັ້ນໆ . ກາເຟກໍເປັນຜົດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຝຸ່ນ ຫລື ທາດອາຫານເພື່ອໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ເຊິ່ງຖ້າຫາກຂາດທາດອາຫານທາດໃດທາດໜຶ່ງແລ້ວກໍຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳລົງກວ່າປົກກະຕິ. ຝຸ່ນເປັນປັດໃຈສຳຄັນໜຶ່ງໃນການປູກກາເຟ ດັ່ງນັ້ນ ການໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ກັບຕົ້ນກາເຟ ຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງຝຸ່ນ ຫລື ທາດອາຫານທີ່ກາເຟມີຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະອາຍຸ ຕະຫລອດຈົນເຖິງປະລິມານຂອງຝຸ່ນທີ່ໃສ່ ຄວນໃຫ້ພໍດີກັບຄວາມຕ້ອງການ.

4.2.1 ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ

ວິທີການໃສ່ຝຸ່ນກາເຟ ໂດຍໂຮຍເທິງໜ້າດິນ ເປັນວົງກົມຮອບໆ ຊົງຝຸ່ນກາເຟ ທີ່ມີອາຍຸ 1-3 ປີ ໂຮຍເປັນວົງກົມໃຫ້ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 30-90 ຊັງຕີແມັດ. ກາເຟມີອາຍຸ 4 ປີ ຂຶ້ນໄປໂຮຍເປັນວົງກົມໃຫ້ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 60-100 ຊັງຕີແມັດ. ປົກດ້ວຍຫຍ້າແຫ້ງ ຫລື ເລືອງເຂົ້າອີກທີ່ໜຶ່ງ. ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະມີການໂຮຍຝຸ່ນຄວນຈະຂຸດດິນຮອບໆ ຕົ້ນກາເຟ ກ່ອນຈົ່ງໂຮຍຝຸ່ນ ແລ້ວຖິ້ມປົກດ້ວຍດິນກ່ອນທີ່ຈະຄຸມດ້ວຍຫຍ້າແຫ້ງຫລືເລືອງເຂົ້າ. ຂໍ້ຄວນລະວັງບໍ່ຄວນຂຸດດິນໃຫ້ເລິກເກີນໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າກາເຟເປັນຜົດທີ່ມີຮາກຝອຍຫຼາຍ ແລະ ຊອກຫາທາດອາຫານຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ໆໜ້າດິນ ຄວນເລິກປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ.

ການໃສ່ຝຸ່ນກາເຟປີທີ 1-3 ເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ ກາເຟຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຫລື ໃຫ້ຜົນຜະລິດນ້ອຍ. ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ສູດ : 15-15-15 ; 17-17-17 ; 13-13-13 ; ຫລື ສູດອື່ນກໍ

ໄດ້ທີ່ໂກ້ຄຽງກັນ ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ ສູດໃດສູດໜຶ່ງ.

ປີທີ 1 ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນລະ 100-150 ກຣາມ/ຄັ້ງ ໃສ່ປີລະ 3 ຄັ້ງ

ປີທີ 2 ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນລະ 200-250 ກຣາມ/ຄັ້ງ ໃສ່ປີລະ 3 ຄັ້ງ

ປີທີ 3 ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນລະ 300-350 ກຣາມ/ຄັ້ງ ໃສ່ປີລະ 3 ຄັ້ງ

ໄລຍະໃສ່ຝຸ່ນ:

ປີທີ 1 ຄວນໃສ່ຫຼັງຈາກປູກກາເຟປະມານ 1 ເດືອນ ສ່ວນຄັ້ງທີ 2-3 ນັ້ນ ໃສ່ ຫ່າງກັນ 4 ເດືອນ.

ປີທີ 2-3 ເລີ່ມໃສ່ ຕົ້ນລະດູຝົນ ໃສ່ຄັ້ງທີ 2 ຫ່າງຈາກຄັ້ງທີ 1 ປະມານ 2 ເດືອນ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ສາມ ປະມານປາຍລະດູຝົນ.

ການໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ກາເຟທີ່ມີອາຍຸ 4 ປີ ຂຶ້ນໄປ ສຳລັບການໃສ່ຝຸ່ນກາເຟທີ່ມີອາຍຸ 4 ປີ ຂຶ້ນໄປຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ ຄວນໃຊ້ ປຸຍສູດ 13-13-21; 14-14-21; 10-05-20 ຫລືສູດອື່ນທີ່ໂກ້ຄຽງກັນ ເພາະ ໃນໄລຍະນີ້ກາເຟຈະມີຄວາມຕ້ອງການ ທາດໂປຕາດຊຽນຫຼາຍກວ່າທາດອື່ນ. ສຳລັບປະລິມານຝຸ່ນທີ່ໃສ່ນັ້ນ ຄວນພິຈາລະນາຈາກຜົນຜະລິດກາເຟທີ່ໄດ້ ຄືຖ້າກາເຟໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ ກໍ່ໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າກາເຟໃຫ້ ຜົນຜະລິດນ້ອຍ ກໍ່ໃສ່ໃຫ້ນ້ອຍລົງຕາມລຳດັບ ເຊັ່ນ: ກາເຟທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄລ່ລະ 150 ກິໂລກຣາມ ຄວນໃສ່ປຸຍ ສູດ 15-5-20 ຫຼື 12-12-17 ໃນອັດຕາຕົ້ນລະ 250 ກຣາມ ຫຼື ປະມານໄລ່ລະ 135 ກິໂລກຣາມ ໂດຍ ໃສ່ປີລະ 3 ຄັ້ງ.

ກາເຟທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄລ່ລະ 220 ກິໂລກຣາມ ຄວນໃສ່ປຸຍສູດ 10-5-20 ຫຼື 12-12-17 ໃນອັດຕາຕົ້ນລະ 500 ກຣາມ ຫຼື ປະມານ ໄລ່ລະ 265 ກິໂລກຣາມ.

4.2.2 ການໃສ່ຝຸ່ນອື່ນໆ

1. ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ-ຝຸ່ນບົ່ມໃນການປູກກາເຟ

ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ-ຝຸ່ນບົ່ມ ເຂົ້າໃນການປູກກາເຟ ຄວນລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ກຳລັງໃຫ້ຄອກ-ໃຫ້ໝາກ ຖ້າໃຫ້ຫຼາຍ ຈະໃຫ້ໃບຫຼາຍ ຈະບໍ່ເກີດຄອກ ອອກໝາກໄດ້ ຈຶ່ງມີຂໍ້ ແນະນຳການໃຊ້ດັ່ງນີ້ :

ກ. ການໃຊ້ໝານກ້າເບ້ຍ: ການປູກກາເຟນິຍົມກ້າເບ້ຍ ແລ້ວປ່ຽນຍອດ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມໃນໝານກ້າເບ້ຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເບ້ຍກາເຟ ມີຄວາມສົມບູນເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນຍອດສຳເລັດ ໄດ້ດີ ຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ປະສົມໄດ້ແກ່ຝຸ່ນຄອກທີ່ໄດ້ຈາກມູນສັດ, ດິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂຸດ ຕ້ອງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ບໍ່ໃຫ້ຂຸດເອົາເລິກເກີນ 30 ຊັງຕີແມັດ ເອົາມາຮ່ອນໃຫ້ລະອຽດ ເກັບເສດຫຍ້າ, ຮາກໄມ້ ແລະ ກ້ອນຫີນ ອອກໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາປະສົມກັບຝຸ່ນທີ່ກະກຽມໄວ້ ໃນອັດຕາຝຸ່ນຄອກທີ່ໄດ້ຈາກມູນສັດ 1 ສ່ວນ ດິນລະອຽດ 3 ສ່ວນ.

ຂ. ການໃຊ້ໃນການຕຽມຂຸມປູກ

ການຕຽມຂຸມປູກກາເຟ ແນະນຳໃຫ້ຕຽມຂຸມ ກ້ວາງ, ເລິກ, ຍາວ 50x50x50 ຊັງຕີ ແມັດ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກເກົ່າ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມ ປະມານ 1 ຄູ່ ຮອງກັນຂຸມ .

ຄ. ການໃຊ້ໃນການບຳລຸງຕົ້ນ

ຄວນໃສ່ບຳລຸງຕົ້ນ ໃນຕົ້ນລະດູຝົນ ຫຼັງຈາກເສຍຫຍ້າແລ້ວ ໂດຍຫວ່ານຮອບຊົງຝຸ່ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຄວນຮຽນ ແລະ ສັງເກດ ລັກສະນະໃບຂອງກາເຟ ຖ້າເຫັນໃບຂຽວເຂັ້ມເປັນມັນຖືວ່າ ໄດ້ຮັບທາດ ໂນໂຕຣເຈນ ພຽງພໍແລ້ວ ອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ ໂນໂຕຣເຈນ ຖ້າໃສ່ຕື່ມ ໃບຈະມີຫຼາຍໂພດ

ອາດຈະບໍ່ໃຫ້ດອກ-ໝາກ. ຖ້າເຫັນໃບສີຂຽວຈາກ ຫລື ອອກເຫຼືອງ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ ດັ່ງລະ 1-2 ຄູ. ເພື່ອເປັນການປັບປຸງດິນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງດິນດີຂຶ້ນ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກນໍ້າປີລະເທື່ອ ໃນອັດຕາສ່ວນ 3-5 ກິໂລກຣາມ/ຕົ້ນ ຄວນໃສ່ໃນເວລາກ່ອນກາຟຈະອອກດອກ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກາຟເພີ່ມຈຳນວນດອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນການຕິດໝາກສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແກ່ນເຕັມສົມບູນດີ ຂໍ້ສໍາຄັນບໍ່ຄວນຂຸດເລິກເກີນໄປ ເພາະຈະກະທົບກະເທືອນຮາກ ຄວນຂຸດປະມານ 0-40 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກຕົ້ນກາຟຂະ ໜາດ ຊົງ ຟຸ່ມ ເພື່ອໃສ່ຝຸ່ນແລ້ວຕ້ອງຖິ້ມຄືນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະລ້າງຂອງຝົນ ແລະ ປ້ອງກັນການລະເຫຼີຍ ຖິ້ມຂອງຝຸ່ນ.

4.2.3 ການໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບ

ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບເຂົ້າໃນການປູກກາຟ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ 3 ສູດຄື :

- 1). ສູດບົ່ມດ້ວຍຜິດຜັກ 3 ກິໂລກຣາມ ແລະ ນໍ້າຕານ 1 ກິໂລກຣາມ
- 2). ສູດບົ່ມໝາກກ້ວຍ, ໝາກຮຸ່ງສຸກ ຢາງລະ 1 ກິໂລກຣາມ ແລະ ນໍ້າຕານ 1

ກິໂລກຣາມ

- 3). ສູດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

1. ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ

ກ. ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບບຳລຸງເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນປູກໃໝ່ : ຄວນໃຊ້ສູດທີ່ ຫົ່ງ 2 ບ່ວງແກງ ຫລື ປະມານ 30 ຊີຊີ / ນໍ້າ 10 ລິດ ສິດອາທິດລະເທື່ອ ເພື່ອເປັນການບຳລຸງໃບ ແລະ ຕົ້ນແຂງແຮງ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດ.

ຂ. ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບບຳລຸງດອກ ແລະ ຕິດໝາກໃຫ້ໃຊ້ສູດທີ່ສອງ 2 ບ່ວງແກງ/ ນໍ້າ 10 ລິດ ສິດໃນຊ່ວງທີ່ເກີດຕາດອກ ເປັນໝາກເລີ່ມແກ່ ທິດລະເທື່ອ. ຈະເຮັດໃຫ້ດອກກາ ຟຈັບໂຕດີ ແລະ ໝາກຕົກ ແລະ ໝາກບໍ່ລົ້ນ ເພາະວ່າໃນສູດນີ້ຈະມີສານຮໍໂມນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ການເກີດດອກ.

2. ການໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບໃນຕົ້ນກາຟ

ວິທີການໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ ໃຫ້ຫວ່ານຮອບຊົງຟຸ່ມ ດັ່ງລະປະມານ 1 ກິໂລ ກຣາມ ເດືອນລະເທື່ອແລ້ວໃຫ້ນໍ້າຟ້ອມ

4.3 ການໃສ່ວັດຖຸຄຸມດິນ

ເພື່ອເປັນການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ບຳລຸງຕົ້ນກາຟ ມີຂໍ້ແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

4.3.1 ການໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນໃນໝານປູກ

ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ຄຸມດິນ ສາມາດໃຊ້ ເຟືອງ, ໂບກາຟແຫ້ງ ຫລື ເປືອກໝາກກາຟ ແຕ່ການໃຊ້ ຜົນຜະລິດຈາກກາຟ ເພື່ອຄຸມດິນນີ້ ອາດຈະມີພະຍາດ, ແມງໄມ້ປົນມານຳ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຊ້ນໍ້າສະກັດຊີວະ ພາບ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍສະເໝີ ຈະແກ້ບັນຫາ ພະຍາດ, ແມງໄມ້ປົນມານຳໄດ້ .

4.3.2 ການປູກຜິດຄຸມດິນ

ໃນປີທີ ຫົ່ງ ແລະ ປີທີສອງ ຕົ້ນກາຟ ຈະບໍ່ໃຫຍ່ ໃນລະບົບການປູກກາຟ ທີ່ບໍ່ທັນມີໄມ້ທີ່ ໃຫ້ຮົ່ມເງົາກ່ອນ ຄວນຈຳເປັນຕ້ອງປູກຜິດຄຸມດິນ ເຊິ່ງຈະເປັນການຊ່ວຍ ໃຫ້ໜ້າດິນມີຄວາມຊຸ່ມ ເປັນການ ຮັກສາໜ້າດິນໃນຍາມແລ້ງໃຫ້ຊຸ່ມ ຜິດທີ່ແນະນຳເພື່ອປູກເປັນຜິດຄຸມຄື : ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວຜ້າ, ຖົ່ວສະໂຕໂລ.

4.4 ການຕັດແຕ່ງກິ່ງກາຟ

ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ຂອງການຕັດແຕ່ງກິ່ງກາຟ ເພື່ອຄວບຄຸມຜົນຜະລິດໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ນັບເປັນຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດປະຈຳ ສວນກາຟໃດທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ການຕັດແຕ່ງກິ່ງແລ້ວ ມັກໃຫ້ໝາກປີເວັ້ນປີສະເໝີ ທັງນີ້ເພາະປ່ອຍໃຫ້ກາຟຕິດໝາກເກີນໄປ ໃນແຕ່ລະປີອາຫານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນຮາກລຳຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງກ້ານສາຂາຖືກນຳໄປສ້າງເປັນໝາກ ບາງກິ່ງທີ່ອອກໝາກຫຼາຍເຖິງຈົນແຫ້ງຕາຍ ແລະ ກວ່າຈະຝັນໂຕໄດ້ຕ້ອງເສຍເວລາຫຼາຍປີ.

ຕົ້ນກາຟນັ້ນຕ້ອງໝັ້ນຕັດແຕ່ງກິ່ງວ່າ ທີ່ແກ່ຖິ້ມໄປ ປະໃຫ້ກິ່ງວ່າໃໝ່ຈະເລີນເຕີບໂຕແທນ ເພາະວ່າກາຟທີ່ແກ່ເກີນໄປ ຈະຜ່າໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເກັບກ່ຽວ ກິ່ງມັກຫັກມັກຈົກເນື້ອເວລາກ່ອນວ່າປົກກະຕິວ່າທີ່ແກ່ໃຫຍ່ແລ້ວນັ້ນ ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ຜົນຜະລິດຕ່ຳລວມທັງຄຸນນະພາບບໍ່ດີພໍ, ດອກ ແລະ ໝາກກາຟຈະບໍ່ອອກຊ້າກັບກິ່ງວ່າເດີມທີ່ເຄີຍອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຈະອອກຈາກກິ່ງທີ່ແຕກໃໝ່ສະເໝີ.

ວິທີການຕັດແຕ່ງກາຟມີຫຼາຍແບບ ເຊິ່ງແຕ່ລະວິທີການຕັດແຕ່ງວ່າຕ່າງໆ ມີຜົນສະໜອງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ປູກທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.

4.4.1 ການຕັດແຕ່ງແບບຕັດຍອດ

ວິທີການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ ວິທີປະຕິບັດຄື ປູກກາຟແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ການເພີ່ມໃຫຍ່ ຈົນລຳຕົ້ນສູງປະມານ 1,80 ແມັດ ແລ້ວຕັດຍອດເທິງສຸດອອກ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນກາຟລ້ຽງວ່າແໜ້ນທີ່ແຜ່ອອກດ້ານຂ້າງແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ ສ່ວນໜ້າທີ່ແຕກອອກມາໃໝ່ໃຫ້ເດັດຖິ້ມ ເອົາໄວ້ສະເພາະກິ່ງແໜ້ນຕາມຮູບຊົງຝຸ່ນເດີມເທົ່ານັ້ນ.

ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ ເໝາະສົມກັບດິນທີ່ມີດິນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ການປູກກາຟໂດຍບໍ່ມີໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມ ທັງນີ້ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສູງ ແລະ ເກີດການແຕກໜ້າໜ້ອຍ.

4.4.2 ການຕັດແຕ່ງແບບໃຫ້ມີງ່າດຽວ

ເປັນການຕັດແຕ່ງກາຟໂດຍ ການປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນກາຟທີ່ປູກໄວ້ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ ມີກິ່ງດຽວຂຶ້ນໄປ ວິທີນີ້ໃຊ້ຫຼາຍໃນອາຟຣິກາ ໂດຍສະເພາະໃນຝັ່ງທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ປູກທີ່ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມ ເປັນການຕັດແຕ່ງວ່າທີ່ສະດວກຕໍ່ການສິດຢາຂ້າແມງ ວິທີນີ້ເໝາະສົມກັບດິນທີ່ຂ້ອນຂ້າງອຸດົມສົມບູນ.

4.4.3 ການຕັດແຕ່ງແບບເຄິ່ງຕົ້ນ

ເປັນການຕັດແຕ່ງກິ່ງທີ່ຕັດແປງຈາກການຕັດແຕ່ງກິ່ງແບບໃຫ້ມີກິ່ງດຽວ ຄື ເມື່ອປູກກາຟ ແລະ ຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ໃຫ້ກາຟມີກິ່ງດຽວ ຈົນກາຟໃຫ້ຜົນຜະລິດແລ້ວ 1-2 ປີ ຈິ່ງຕັດຕົ້ນກາຟນີ້ອອກ ໂດຍຕັດອອກ 1 ໃນ 3 ຂອງຄວາມສູງຕະຫລອດຕົ້ນ ເມື່ອຕັດແລ້ວກໍຈະມີໜ້າໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໜ້າ ໃຫ້ເລືອກໄວ້ 2 ໜ້າ ແລະ ເມື່ອໜ້າໜຶ່ງ 2 ຈະເລີນຍາວ 10-12 ຊັງຕີແມັດ ຈິ່ງເດັດໜ້າທີ່ບໍ່ແຂງແຮງອອກ 1 ໜ້າ ປ່ອຍໃຫ້ໜ້າທີ່ເຫຼືອຈະເລີນເຕີບໂຕສູງເທົ່າລະດັບເກົ່າ ວິທີການຕັດແຕ່ງວ່າແບບນີ້ປະຕິບັດກັນໄດ້ຜົນມາແລ້ວໃນອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ກາງ.

4.4.4 ການຕັດແຕ່ງກິ່ງແບບໃຫ້ມີຫຼາຍກິ່ງ

ການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ ເປັນການຕັດແຕ່ງວ່າແບບໃຫ້ກາຟມີກິ່ງຕັ້ງແຕ່ 2 ກິ່ງຂຶ້ນໄປ ແລະ ເທົ່າທີ່ຜົບເຫັນ ກາຟເຕັ້ນໜຶ່ງຄວນມີງ່າປະມານ 4-5 ກິ່ງ ຈິ່ງຈະເໝາະສົມ ຫຼັງຈາກການປູກກາຟ ຈົນຕົ້ນກາຟສູງປະມານ 38 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ຕັດສ່ວນຍອດອອກເຫຼືອຕົ້ນກາຟສູງຈາກໜ້າດິນ ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ກາຟຈະແຕກໜ້ອອກມາໃໝ່ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍ ເລືອກໜ້າທີ່ແຂງແຮງໄວ້ 4-5 ໜ້າ ແລ້ວກິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່ໄປ ວິທີການຕັດແຕ່ງກິ່ງແບບນີ້ ເໝາະສົມກັບ

ເນື້ອທີ່ ທີ່ມີຄວາມສູງ ຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລບໍ່ຫຼາຍ. ດິນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນພໍຄວນມີປະລິມານຝຶກຕົກ ຟຽງພໍ ແລະ ກາຟຄວນຈະມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມດ້ວຍ.

4.4.5 ການຕັດແຕ່ງແບບອຽງ

ວິທີການນີ້ຕັດແປງຈາກວິທີທີ່ 4 ຄືຫຼັງຈາກປູກກາຟຕົ້ນສູງປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດແລ້ວ ໃຊ້ໄມ້ໂມ້ມລຳຕົ້ນໃຫ້ອຽງປະມານ 45 ອົງສາ ແລ້ວຕັດຍອດໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ຕົ້ນກາຟຈະແຕກກິ່ງອອກມາຫຼາຍກິ່ງ ແຕ່ໃຫ້ເລືອກໜ່ວຍທີ່ແຂງແຮງ ຈິ່ງໄວ້ແຕ່ 4-5 ກິ່ງ ແລ້ວບົວລະບັດ ຮັກສາຕໍ່ໄປໂດຍເດັດ ໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນມາໃໝ່ອອກ ການຕັດແຕ່ງວ່າແບບນີ້ ເໝາະກັບເນື້ອທີ່ທີ່ມີອາກາດຂ້ອນຂ້າງ ຮ້ອນ ດິນມີປະລິມານທາດອາຫານຟຽງພໍ ມີປະລິມານນ້ຳຝົນສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຄວນປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມ ແກ່ຕົ້ນກາຟດ້ວຍ.

4.4.6 ການຕັດແຕ່ງແບບໝູນວຽນ ຫລື ແບບຮາວາຍ

ໂດຍປູກກາຟ ແລະ ໂມ້ມກິ່ງໃຫ້ຮຸ່ງປະມານ 45 ອົງສາ ແລ້ວຕັດຍອດໃຫ້ຍາວຈາກລຳ ຕົ້ນແທກໄດ້ 30 ຊັງຕີແມັດ ຕົ້ນກາຟຈະແຕກກິ່ງອອກມາໃໝ່ ໃຫ້ຈິ່ງກິ່ງກາຟທີ່ແຂງແຮງໄວ້ 4-6 ກິ່ງ ແລ້ວດູແລຮັກສາໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ຟຽງພໍ ເມື່ອກິ່ງມີອາຍຸທີ່ຈະອອກດອກ ໃຫ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນ 4-6 ອອກ ດອກອອກໝາກເຕັມທີ່ ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຕຽມໄວ້ສຳລັບອອກດອກອອກໝາກໃນປີຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງວິທີການນີ້ ໃຊ້ ໄດ້ດີໃນຮາວາຍ ເພາະວ່າດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີຫຼາຍ ແລະ ມີການປູກກາຟຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

4.5 ພະຍາດ ແລະ ສັດຕູຂອງກາຟ

ພະຍາດທີ່ຜິບເຫັນໃນສ່ວນກ້າເບ້ຍກາຟ ໄດ້ແກ່ພະຍາດໃບຈຸດສີນ້ຳຕານ, ພະຍາດລາຊ້ໝຽງ, ພະຍາດເຫຼັງເໝົ້າ.

ແມງໄມ້ທີ່ມັກຜິບເຫັນໃນໝານກ້າເບ້ຍ ໄດ້ແກ່ແມງໄມ້ຟອກປາກກັດ ເຜັຍຫອຍ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນ ແຕ່ສຳລັບຂີ້ກະເດືອນ ບໍ່ໄດ້ສ້າງອັນຕະລາຍ ໃຫ້ແກ່ເບ້ຍກາຟໂດຍກົງ ແຕ່ມັກດູດຢູ່ນຳດິນໃນຖົງຊຳເບ້ຍ ກາຟ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເບ້ຍທີ່ຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເສຍຫາຍໄດ້.

4.5.1 ພະຍາດກາຟ

1. ພະຍາດລາຊ້ໝຽງ

ກ. ສາຍເຫດ: ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ຊີ້ Hemilia Vastatrix B & Br. ເປັນພະຍາດທີ່ ສຳຄັນ ແລະ ທຳຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ອາຣາບິກາ ສ່ວນໂຣບັສຕ້າ ກໍ່ເໝືອນກັນ ໃນບາງເນື້ອທີ່ ທີ່ມີຄວາມສູງ ມັກຜິບພະຍາດນີ້ລະບາດເໝືອນກັນ.

ຂ. ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດ: ກາຟທີ່ເປັນ ພະຍາດລາຊ້ໝຽງອາການຈະປາ ກົດ ເທິງໃບບາກາຟ ທັງໃບອ່ອນ ແລະ ໃບແກ່ ທັງໃນໄລຍະຕົ້ນກ້າໃນໝານປູກ ແລະ ໃນເຮືອນກ້າເບ້ຍລັກ ສະນະອາການຄັ້ງທຳອິດຈະເຫັນ ເປັນຈຸດສີເຫຼືອງນ້ອຍໆ ບໍລິເວນດ້ານກ້ອງຂອງໃບ ຈຸດມີຂະໜາດ ປະ ມານ 3-4 ມິລິແມັດ ຕໍ່ມາຈຸດເຫລົ່ານີ້ຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຈົນເປັນບາດແຜສີສົ້ມ ສ່ວນບາດແຜເທິງຂອງ ໃບທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັນ ກັບບາດແຜເບື້ອງລຸ່ມໃບ ມັກແຫ້ງເປັນສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີຮູບຮ່າງມົນ ເມື່ອພະຍາດ ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ ສີຂອງຜົງສະປິ ຈະປ່ຽນເປັນສີສົ້ມຊັດເຈນຂຶ້ນ ເມື່ອເປັນພະຍາດ ດິນເຂົ້າ ສ່ວນກາງ ຂອງບາດແຜຈະເລີນແຫ້ງ ເຫັນເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມແຕ່ຂອບໆ ບາດແຜທີ່ເປັນ ສີສົ້ມ ສະປິຂອງເຊື້ອລາ ຈະລ້ອມຮອບຢູ່ ຈຸດ ຫຼື ບາດແຜທີ່ເປັນພະຍາດ ອາດຈະຂະຫຍາຍແຜ່ລາມໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເປັນບາດແຜ ໃຫຍ່ຕິດຕໍ່ກັນເກືອບເຕັມໃບ ເຮັດໃຫ້ໃບລົ້ນ ເມື່ອເກີດພະຍາດລະບາດຮຸນແຮງ ໃບຈະລົ້ນໝົດ ເຫຼືອໃບ

ຍອດ 1- 2 ຄູ່ ເທົ່ານັ້ນ ຕົ້ນກາເຟຈະຊຸດໂຊນລົງເລື້ອຍໆ ແລະ ຖ້າເກີດກັບຕົ້ນກາເຟທີ່ກຳລັງອອກໝາກ ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ເຕັມທີ່ ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ໝາກແຫ້ງຄາ ຕົ້ນກຳໄດ້. ການ ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລາຊີໝຽງ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນລະດູຝົນ ສຳລັບໃນເມື່ອທີ່ມີຝົນຕົກໆ ຢູ່ດຽງ ມີແສງ ແດດ ກ້າສະຫລັບກັນໄປ ແລະ ຕົ້ນກາເຟທີ່ປູກພາຍໃນຮົ່ມເງົາຕິບ ພະຍາດນີ້ຈະລະບາດຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຄ. ການປ້ອງກັນກຳຈັດ: ປ້ອງກັນກຳຈັດ ໂດຍການຕັດແຕ່ງງ່າໃຫ້ຫວ່າງແປນໂປງ ກຳຈັດ ວັດຊະພິດໃນສວນກາເຟ ແລະ ໃນລະດູແລ້ງ ຄວນເກັບໃບກາເຟ ທີ່ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເຜົາໄຟ ຖິ້ມ ເພື່ອຊ່ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໃນລະດູຝົນປີຕໍ່ໄປ, ການໃຊ້ສານເຄມີ ໃຊ້ຢາບໍ່ໂດມິ ກເຈີ້ 3 ສ່ວນຕໍ່ນ້ຳ 1 ສ່ວນ ຫຼື ຢາໂຄປຣາວິດ 5% ສີດໃນເດືອນພຶດສະພາກ່ອນຝົນ ແລະ ເດືອນກັນຍາ- ຕຸລາ ຫຼັງຝົນ ແລະ ໃສ່ຝຸນໃຫ້ມີແຮ່ທາດ ພຽງພໍແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກາເຟ ສຳລັບກາເຟພັນ 288, 795 ແລະ 1934 ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດໄດ້ດີ

2 ພະຍາດໃບຈຸດສີນ້ຳຕານ

ກ. ສາຍເຫດ: ເກີດຈາກເຊື້ອລາຊີ *Cercospora coffeicola* Berk & Cooke ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະລະບາດຫຼາຍກັບຕົ້ນເບ້ຍກາເຟ ໃນເຮືອນຜະຊ້າ ຫລື ສວນກຳເບ້ຍ ທີ່ຂາດການດູ ແລຮັກສາເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພົບວ່າມີຈຳນວນນ້ອຍທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ທຳຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຕົ້ນກາເຟ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍ ຫລື ໃຫຍ່ ແລ້ວ.

ຂ. ລັກສະນະອາການ: ເກີດຈາກເຊື້ອລາຊີຂະນິດໜຶ່ງ ອາການຂອງພະຍາດຈະໃນໃບ ແກ່ຂອງກາເຟ ດ້ານລຸ່ມຂອງຕົ້ນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງລະບາດຂຶ້ນເທິງ ທຳອິດຂອງພະຍາດໃບຈຸດສີນ້ຳຕານ ຈະ ເຫັນ ເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ຕໍ່ມາຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະມົນ ສີເທົາ ຫລື ເທົາອ່ອນຈົນເຖິງ ຂາວຢູ່ທາງກາງຂອງບາດແຜ ຂອບແຜມີສີນ້ຳຕານແດງ ຈຸດບາງຈຸດ ຫຼື ບາງບາດແຜອາດຈະເປັນວົງສີ ເຫຼືອງອ່ອນ ອ້ອມຮອບຈຸດ ຫຼື ບາດແຜນີ້ ຈະມີຂະໜາດ 0.3-1.5 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງ ເຫັນໄດ້ ທັງເທິງໃບ ແລະ ທາງລຸ່ມໃບ ທາງກາງຂອງບາດໃນບາງຄັ້ງຫາກອາກາດຊຸ່ມ ຈະພົບກຸ່ມ ແລະ ກ້ານຊູ ສະປີຂອງເຊື້ອລາສາເຫດຂຶ້ນຄຸມຢູ່ ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມເໝາະສົມຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ຈຸດ ຕ່າງໆເທິງໃບຈະຂະຫຍາຍເປັນແຜ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ຮູບຮ່າງບໍ່ແນ່ນອນ ຕໍ່ມາໃບທີ່ເປັນພະຍາດເລີ່ມເຫຼືອງ ແລະ ລົ່ນ ຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດຮຸນແຮງໃບອາດຈະລົ່ນຈົນໝົດ ເຫຼືອພຽງໃບຍອດ 1-2 ຄູ່ ເທົ່ານັ້ນ ຈົນກາເຟ ຈະບໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ອາດຈະຕາຍໄດ້.

ຄ. ການປ້ອງກັນກຳຈັດ: ຄວນບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ຕົ້ນກາເຟແຂງແຮງ ໂອກາດຈະເກີດເປັນ ພະຍາດ ຈະມີນ້ອຍລົງ ພະຍາດໃບຈຸດສີນ້ຳຕານ ມັກຈະເກີດກັບຕົ້ນເບ້ຍໃນໝານ ຫລື ສວນກຳເບ້ຍຜະ ຊ້າ ດັ່ງນັ້ນ ໝານກຳເບ້ຍ ຄວນມີຮົ່ມຢາງພຽງພໍ ແສງແດດບໍ່ກ້າເກີນໄປ ແລະ ໃຫ້ຝຸນທີ່ມີທາດໂນໂຕຣ ເຈນຢາງພຽງພໍ ທັງໃນໝານກຳ ແລະ ສວນປູກ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້. ສ່ວນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ກຳຈັດເຊື້ອລາ ຄວນໃຊ້ຢາທີ່ມີສ່ວນປະສົມ ຂອງ ທາດ ທອງແດງ 5-10 ກຣາມ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ພົ່ນທຸກ 15 ມື້ ຈົນກວ່າຈະໝົດ.

3. ພະຍາດໝາກແຫ້ງສີນ້ຳຕານ

ກ. ສາເຫດເກີດຈາກເຊື້ອລາຊີ *Colletotrichum Coffeanum* Noack ທຳ ລາຍເມື່ອກາເຟຍັງອ່ອນຢູ່ ແລະ *Colletotrichum gloeosporoides* Penz. ທຳລາຍເມື່ອໝາກກາເຟ ແກ່ຫລົກລ້ຽງສຸກ ເປັນພະຍາດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ .

ຂ. ລັກສະນະອາການພະຍາດ: ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ພະຍາດນີ້ຈະເຫັນເກີດກັບໝາກກາເຟ ໃນໄລຍະແກ່ຈັດ ຈົນເຖິງໄລຍະສູງພ້ອມທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ ຈະພົບວ່າເທິງເປືອກກາເຟມີລັກສະນະແຫ້ງເປັນສີນ້ຳຕານ ຂະຫຍາຍບໍລິເວນກວ້າງ ໂດຍຈະເລີ່ມຕົ້ນເທິງກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໆແຜ່ລາມໄປສູ່ເປືອກດ້ານລຸ່ມ ຈົນວ່າໝາກກາເຟຈະມີລັກສະນະແຫ້ງໝົດໝາກ ແລະ ອາດຈະເຫັນເປືອກແຕກອອກເປັນທາງຍາວ ບ່ອນຮອຍຕໍ່ລະຫວ່າງເມັດ ໝາກກາເຟທີ່ເປັນພະຍາດຈະແຫ້ງຕິດເທິງກິ່ງ ແລະ ເມື່ອປະໂວດນຶ່ງເປືອກຂອງກາເຟທີ່ແຫ້ງຈະປ່ຽນເປັນສີນ້ຳຕານຂຽວຫຼືດຳ ເນື່ອງຈາກມີເຊື້ອລາບາງຊະນິດເກີດຂຶ້ນຄຸມບໍລິເວນ.

ຄ. ການປ້ອງກັນກຳຈັດ: ພະຍາດນີ້ ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີສານເຄມີ ໃນການປ້ອງກັນກຳຈັດໂດຍກົງ ຈະປ້ອງກັນດ້ວຍວິທີປູກໄມ້ບັງຮົ່ມ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນກາເຟຖືກແດດເກີນໄປ ແລະ ຜົນຢາບໍ່ໂດມິກເຈ້ີ ເຂັ້ມຂຸ້ນ 5% ຫລື ຄູປາວິດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດນີ້.

4.5.2 ແມງໄມ້ທີ່ເປັນສັດຕູ

1. ເຜັຍຫອຍສີຂຽວ

ໃນພວກແມງປາກດູດທີ່ເປັນສັດຕູກາເຟດ້ວຍກັນແລ້ວ ຈັດໄດ້ວ່າເຜັຍຫອຍສີຂຽວ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຜັຍຫອຍສີຂຽວທີ່ທຳລາຍກາເຟ ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ *Coccus viridis* Green ພົບການລະບາດທົ່ວໄປທຸກແຫ່ງທີ່ປູກກາເຟ ລະບາດຫຼາຍໃນລະດູແລ້ງຈົນເຖິງລະດູຝົນ ຈະຫຼຸດປະລິມານລົງໃນທ້າຍລະດູຝົນ. ຈະມີການຂະຫຍາຍພັນແບບພຣາດສ໌ໂນຊີລີຊີສ ເຖິງວ່າໂຕຜູ້ຈະມີຫຼາຍແຕ່ໂຕແມ່ກໍບໍ່ປະສົມພັນນຳ ອອກລູກເປັນໂຕ ປະສະຈາກການປະສົມພັນ ຊີວິດຫອຍຈຳພວກນີ້ສັ້ນແຕ່ແຜ່ພັນໄວ ອອກໄຂ່ຫຼາຍ ວົງຈອນຊີວິດແຕ່ໄຂ່ຈົນເຖິງໂຕແກ່ໃຊ້ເວລາ 4-5 ອາທິດ ຈະໄວຂຶ້ນເມື່ອອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ. ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງເຜັຍຫອຍຊະນິດນີ້ ໂຕແມ່ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຝາຫອຍຂ້ວນ ສ່ວນຂອງທາງໜ້າຈະຮຽວນ້ອຍກວ່າ ທາງຫຼັງ ບໍລິເວນຫຼັງນູນນ້ອຍໜຶ່ງ ມີຂະໜາດຍາວລະຫວ່າງ 2,5-3,25 ມິລິແມັດ, ກ້ວາງ 1,5-2 ມິລິແມັດ ລຳໂຕສີຂຽວອ່ອນມີຈຸດສີດຳ 2 ຈຸດຢູ່ທາງຂອບດ້ານໜ້າ, ເທິງຫຼັງມີຈຸດສີດຳ ຮຽງເປັນຮູບໂຕຢູ່ ບາງຄັ້ງ ຈຸດດຳຈະເລື່ອນໄປ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ.

ກ. ລັກສະນະການທຳລາຍ: ເຜັຍພວກນີ້ ຈະອາໄສແລະຈະເລີນເຕີບໂຕ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນສ່ວນທີ່ອ່ອນຂອງກາເຟ ເຊັ່ນ ທີ່ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນ ແລະ ໝາກອ່ອນ ຜົນຈາກການທຳລາຍຂອງເຜັຍຫອຍເປັນເຫດໃຫ້ຍອດສ່ວນໃບອ່ອນ ແລະ ໝາກອ່ອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ສະຖິກການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນຈະຜິດປົກກະຕິ ໝາກອ່ອນບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຕົ້ນກາເຟຈະຊຸດໂຊມຢູ່ເປັນເວລານານກວ່າຈະຟື້ນຄືນຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກເຜັຍທຳລາຍ ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນຫລືບາງແຫ່ງມີການລະບາດຂອງພະຍາດຫອຍສີຂຽວຫຼາຍ ໆ່ຍອດລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບຂອງກາເຟເປັນສີດຳ ທັງນັ້ນເນື່ອງຈາກການເກີດລາດຳ ແລະ ມັກມີມົດອາໄສຢູ່ ບໍລິເວນໃດທີ່ມີມົດອາໄສຢູ່ ຈະພົບວ່າມີເຜັຍເຂົ້າທຳລາຍຢູ່ກ່ອນແລ້ວ. ນອກຈາກກາເຟເຜັຍຊະນິດນີ້ຍັງສາມາດທຳລາຍຜິດຊະນິດອື່ນ ເຊັ່ນ : ໝາກກ້ຽວຊະນິດຕ່າງໆ ລວມທັງໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ.

ຂ. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ:

- ຕັດແຕ່ງກິ່ງກາເຟໃຫ້ໄລ່ງແປນ ຮັກສາຄວາມສະອາດໃນບໍລິເວນສວນ ທຳລາຍແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມົດດຳ ເນື່ອງຈາກມົດດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົວນຳເອົາເຜັຍໃຫ້ແຜ່ລະບາດ ຈາກຕົ້ນໜຶ່ງໄປຍັງອີກຕົ້ນອື່ນໆ. .

- ສິດຢາປ້ອງກັນຫລືກຳຈັດດ້ວຍ ມາລາໂທອອນ ໃນອັດຕາ 15 ຊີຊີ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ຫລື ອະໂຊດຣິນ 56% ໃນອັດຕາ 10-15 ຊີຊີ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນ ຫລື ເມື່ອຝົນມີ ເຜັຍລະບາດ ຄວນຝັນຕິດຕໍ່ກັນທຸກໆ 7-10 ມື້.

2. ບັງເຈາະລຳຕົ້ນ

ຟົບວ່າ ບັງເຈາະລຳຕົ້ນເປັນບັນຫາ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຕົ້ນກາເຟ ແລະ ງ່າ ຂອງກາເຟຢູ່ທົ່ວໄປ ບັງເຈາະນິດນີ້ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ *Zeucers coffeae Nieth* ເຖິງຈະບໍ່ມີ ການລະບາດບໍ່ຫຼາຍກໍ່ຕາມ ຕົ້ນຫລືງ່າກາເຟ ທີ່ຖືກບັງເຈາະ ຈະຫັກລົງເມື່ອລົມຜັດແຮງ.

ກ. ລັກສະນະການທຳລາຍ: ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນຈາກຕົວບັງເຈາະ ເຂົ້າໄປໃນ ງ່າ ແລະ ລຳຕົ້ນ ເປັນເຫດໃຫ້ຍອດແຫ້ງ ງ່າຈະຫັກຢູ່ບໍລິເວນທີ່ບັງກັດເຈາະ ຫາກເປັນກັບຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ຕົ້ນນັ້ນ ອາດຈະຕາຍໄດ້ ບັງເຈາະລຳຕົ້ນໂຕແກ່ ເປັນແມງກະເບື້ອກາງຄືນຊະນິດໜຶ່ງມີຂະໜາດປານກາງ ໂຕສີຂາວນວນມີຈຸດສີດຳ ຢູ່ເຕັມບໍລິເວນປົກຄູ່ໜ້າ ຫຼັງຈາກແມງກະເບື້ອໂຕແກ່ໄດ້ຮັບການປະສົມຝັນ ກໍ່ຈະ ອອກໄຂ່ຕິດໄວ້ກັບງ່າ ແລະ ລຳຕົ້ນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ມື້ ໄຂ່ກໍ່ຈະຟັກອອກເປັນໂຕບັງ ໂດຍມີໂຍປົກ ຄຸມໂຕໄວ້ ໃນລະຍະທຳອິດ ຕໍ່ມາໂຕບັງກໍ່ຈະເລີ່ມກັດເຈາະຜິວເປືອກ ຢູ່ບໍລິເວນຂອກງ່າ ແລະ ລຳຕົ້ນ ຈົນ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນງ່າ ຫລື ລຳຕົ້ນເປັນຊ່ວງຍາວ ບັງຈະກັດກິນຈົນມີຮູຊອດເປືອກ ແລ້ວຖ່າຍຂີ້ອອກມາພາຍ ນອກ ເປັນຂຸຍຄ້າຍຄືຂີ້ເລື່ອຍ ກອງຢູ່ບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນ ແລະ ປາກຮູ ເມື່ອບັງມີອາຍຸ 2-3 ເດືອນ ກໍ່ຈະ— ໃຫຍ່ໂຕເຕັມທີ່ ໃນຊ່ວງນີ້ບັງຈະກັດເປືອກຈົນເປັນຮູມົນ ສາມາດຫລຽວເຫັນໄດ້ຈາກພາຍນອກ ແລ້ວໂຕ ໜອນກໍ່ຈະຈະເລີນເປັນໂຕຕັກແຕ້ ຢູ່ປາກຮູນັ້ນ ໃຊ້ເວລາ ເປັນຕັກແຕ້ຢູ່ປາກຮູນັ້ນ ປະມານ 3 ອາທິດ ເຖິງ 1 ເດືອນ ກໍ່ຈະເຂົ້າໄລຍະໂຕແກ່ເຕັມໄວ ເປັນແມງກະເບື້ອອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

ຂ. ການປ້ອງກັນກຳຈັດ

- ທຳລາຍຜິດອາໃສອື່ນໆ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມສວນກາເຟ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນທີ່ອາ ໃສຂະ ຫຍາຍຝັນ

- ຮັກສາບໍລິເວນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ໝັ້ນກວດເບິ່ງ ຕາມຕົ້ນກາເຟຢູ່ສະເໝີ

- ຫາກຝົບຮອຍທີ່ບັງເຈາະ ທຳລາຍອາດຈະຕິດງ່າ ນຳໄປເຜົາໄຟ ຫລື ໃຊ້ສຳລິ ຊຸບຢາປະເພດດູດຊຶມ ເຊັ່ນ ທາມາຣອນ ອັດເຂົ້າໄປໃນຮູ ບໍລິເວນທີ່ບັງເຈາະ ແລ້ວອັດທັບດ້ວຍດິນໜຽວໃຫ້ ແໜ້ນ

- ການຝັນດ້ວຍຢາທີ່ມີຜົນຕົກຄ້າງດີນ ເຊັ່ນ : ດິນຄຣິນ ໄວ້ຕາມລຳຕົ້ນ ແລະ ງ່າ 3-4 ຄັ້ງ ຕໍ່ປີ ຈະຊ່ວຍທຳລາຍໜອນ ທີ່ເລີ່ມຟັກອອກຈາກ—ໄຂ່ໄຟໆ ກ່ອນທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າທຳລາຍຕົ້ນໄດ້.

3. ມອດເຈາະໜາກກາເຟ

ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ *Slephanoderes hampei* ເປັນແມງໄມ້ສັດຕູຜິດທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນບັນຫາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ການປູກກາເຟຈະຟົບການລະບາດຢູ່ໃນການປູກກາເຟ ແຫ່ງຕ່າງໆ ຂອງໂລກ ເຊັ່ນ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ, ປະເທດອັງໂກລາ, ອູການດາ, ເຄນ ຍາ, ບຣາຊິນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ ເປັນເວລານານ. ປະຈຸບັນໄດ້ລະບາດໄປໃນແຫ່ງປູກກາເຟ ທົ່ວໂລກ.

ກ. ລັກສະນະໂຕແກ່ ເປັນແມງໄມ້ປົກແຂງທີ່ມີໂຕຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 2-2,5 ມິ ລິແມັດ ສີນ້ຳຕານເຂັ້ມຈົນເກືອບດຳ ເມື່ອໂຕແກ່ເຈາະເຂົ້າໄປໃນແກ່ນກໍ່ຈະວາງໄຂ່ ຄັ້ງໜຶ່ງ ມີຈຳນວນ 20-30 ໜ່ວຍ ໃຊ້ເວລາ 5-7 ມື້ ໄຂ່ກໍ່ຈະຟັກອອກເປັນໂຕໜອນ ມີອາຍຸປະມານ 12-20 ມື້ ກໍ່ຈະຈະເລີນ

ເຕີບໂຕເປັນຕົກແຕ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກປະມານ 4-7 ມື້ ກໍ່ຈະເປັນໂຕແກ່ແບບເກົ່າອີກ ວົງຈອນຊີວິດທັງໝົດ ປະມານ 21-34 ມື້ ເນື່ອງຈາກວົງຈອນຊີວິດສັ້ນຫຼາຍ ຈຶ່ງສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວ ສຳລັບໂຕຜູ້ມີ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຕົວແມ່ ແລະ ບິນບໍ່ໄດ້ ການແຜ່ກະຈາຍຈຶ່ງເກີດຈາກໂຕແມ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຂ. ລັກສະການທຳລາຍ: ຈະເລີ່ມຈາກການທີ່ໂຕແມ່ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ແລ້ວ ຈະ ເຈາະເຂົ້າໄປໃນໝາກກາຟ ບໍລິເວນປາຍສຸດ ຫລື ຢູ່ແຫວນ ບໍລິເວນຮອບຂ້ວນຂອງໝາກ ນອກຈະເຈາະ ຈາກບໍລິເວນຜົວນອກເຂົ້າໄປໃນແກ່ນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຈົນຈົນເຂົ້າໄປໃນໝາກກາຟໃຊ້ເວລາປະມານ 3,5-5 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອເຈາະເຂົ້າທຳລາຍແກ່ນພາຍໃນ ກໍ່ຈະກັດກິນຊີ້ນຂອງແກ່ນເປັນອາຫານ ການທຳລາຍດັ່ງ ກ່າວ ມັກພົບຕັ້ງແຕ່ກາຟໝາກອ່ອນ ໄປຈົນເຖິງໝາກສຸກ ຫລື ຂະໜາດຂອງໝາກກາຟຕັ້ງແຕ່ 5 ມິລິແມັດ ຫລື ປະມານ 2 ເທົ່າຂອງຫົວໄມ້ຂີດໄຟ ຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງໝາກສຸກ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການທຳລາຍແກ່ນກາຟ ໃນເລົ່າໝາກກາຟອີກດ້ວຍ. ຈາກການສຳຫລວດພົບວ່າມອດຊະນິດນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ກາ ຟ ສູງເຖິງ 87% .

ຄ. ການປ້ອງກັນກຳຈັດ:

- ຄວນຕັດແຕ່ງງ່າ ບໍ່ໃຫ້ຊົງຜຸ່ມແຫ້ມຕີບຈົນເກີນໄປ ຕະຫລອດຈົນຮັກສາຄວາມ ສະອາດ ໃນເນື້ອທີ່ ກຳຈັດວັດຊະພິດ ທີ່ອາດເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ.
- ບໍ່ຄວນຖິ້ມແກ່ນ ຫລື ປອຍໃຫ້ແກ່ນແຫ້ງ ຫລື ຄ້າງເທິງດິນ ຫຼັງລະດູເກັບກ່ຽວ
- ຫາກກວດພົບແກ່ນທີ່ເຫຼືອຄ້າງ ຢູ່ເທິງດິນ ຫລື ລົ່ນລົງ ຄວນເກັບໄປທຳລາຍ
- ການຕາກແກ່ນກາຟໃຫ້ຖືກແສງແດດດັກ ໂດຍກົງຫຼາຍໆແດດ ເທິງລານຊີເນັ້ນ ຄວາມຮ້ອນຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການແຜ່ລະບາດໄດ້.

ການປ້ອງກັນໂດຍການໃຊ້ສານເຄມີ ເຊັ່ນ : ເຊວິນ - ເອຟ 3 ໃນອັດຕາ 25 ຊີຊີ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດສິດພິນ. ນອກຈາກນີ້ແມງປາກດູດທີ່ກວດພົບວ່າອາໄສທຳລາຍດິນກາຟ ນອກເໜືອຈາກທີ່ ກ່າວມາແລ້ວ ເຊັ່ນ: ເຜັຍອ່ອນ, ເຜັຍແປ້ງ, ເຜັຍອ່ອນສີນ້ຳຕານທັງ 3 ຊະນິດມັກພົບຢູ່ທົ່ວໄປ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເກີນໄປ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັກຈະພົບອາໄສຢູ່ກັບສ່ວນອ່ອນໆຂອງດິນກາຟ ເຊັ່ນຍອດ ອ່ອນ ແລະ ໃບອ່ອນ ຫາກມີຫຼາຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຊະວັກ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃບບິດງໍຜິດປົກກະຕິໄດ້ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ອາດທຳລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍສະເພາະມີດ ອາດພົ່ນດ້ວຍຢາມາລາໄທ ອອນອະໂຊດຣິນ ໃນອັດຕາ 10-15 ຊີຊີ ຕໍ່ ນ້ຳ 20 ລິດ ທຸກໆ 7-10 ມື້ ຈົນກວ່າເຜັຍຈະໝົດ .

4.5.3 ວັດຊະພິດ

ບັນຫາໃນການປູກກາຟອີກບັນຫາໜຶ່ງ ຄືວັດຊະພິດ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວວ່າ ວັດຊະພິດມີ ຂັ້ນໃນເນື້ອທີ່ປູກສວນປູກ ເມື່ອໃດ ມັກຈະຍາດແຍ່ງນ້ຳ ຍາດອາຫານ ບັງແສງແດດ ໃນເວລາທີ່ດິນກາ ຟຢັ້ງນ້ອຍຢູ່ ຍາດເນື້ອທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກ ແລະ ລຳດິນ ເປັນທີ່ລີ້ຊ່ອນ ແລະ ອາໄສ ຂອງຜະ ຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກພົບວ່າ ວັດຊະພິດຂຶ້ນມາລົບກວນພິດທີ່ເຮົາປູກ ເມື່ອ ໃດຈະ ຕ້ອງທຳການກຳຈັດຖິ້ມເສຍ ສຳລັບການກຳຈັດມີຢູ່ຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ຄື : ອາດໃຊ້ ສຽນ, ຟ້າ, ມິດ ຖາກຖາງ ຫລື ຕັດອອກ ແລະ ອີກວິທີໜຶ່ງກໍ່ລ້ຽງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຊາວສວນ ເພາະເປັນວິທີທີ່ປະຢັດເວລາ ແຮງງານ ດິນທຶນ ແລະ ເຫັນຜົນໄດ້ທັນຕາ ຄືການໃຊ້ສານເຄມີ ແຕ່ໃນການໃຊ້ສານເຄມີນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢ່າງ ລະ ມັດລະວັງດ້ວຍ.

ໃນການໃຊ້ແຮງງານສຳລັບການກຳຈັດວັດຊະພິດໃນສວນກາຟເພິ່ນ ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍ ບັນຫາເລື່ອງແຮງງານນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ຈາກຄ່າຈ້າງແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການຂາດແຮງງານ ຂອງຊາວສວນກາເຟ ຈະມີຢ່າງແນ່ນອນໃນອານາຄົດ ໃນສວນກາເຟຈະຕ້ອງກຳຈັດ ຢ່າງນ້ອຍເປັນເວລາ 4 ປີ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ໂລຍະປູກຂອງກາເຟນັ້ນ ຫ່າງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງ ຫາກ ຊາວສວນໃຊ້ໂລຍະຫ່າງປູກ 2,5x2,5 ແມັດ ໃນເນື້ອທີ່ 1 ໂລ່ ຈະສາມາດປູກກາເຟ ໄດ້ປະມານ 256 ຕົ້ນ ແລະ ເນື້ອທີ່ທີ່ເຫຼືອຢູ່ລະຫວ່າງຕົ້ນນັ້ນ ຖ້າຫາກປູກກາເຟກັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍແລ້ວ ກໍຈະ ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານ ໃນການກຳຈັດວັດຊະພິດເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ ໃນການໃຊ້ຢາປາບວັດຊະພິດ ຈຶ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຂ້ອນ ຂ້າງຈຳເປັນໃນການປູກກາເຟ ສຳລັບຢາທີ່ໃຊ້ໃນການປາບວັດຊະພິດປະເພດຄຸມກຳເນີດຫຍ້ານັ້ນ ອາດຈະ ໃຊ້ ໂຊນາຊິນ ແລະ ໂລຍູລອນ ໃນອັດຕາສ່ວນ 200 ກຣາມ ຂອງສານ ອອກຊີ ຕໍ່ເນື້ອທີ່ 1 ໂລ່ ສ່ວນວິທີ ພິມນັ້ນ ຄວນຈະພິມໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົ້ນກາເຟ ປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ຖ້າຫາກຕົ້ນກາເຟຍັງນ້ອຍຢູ່ ຄວນໃຊ້ ຖົງຢາງຄຸມຕົ້ນກາເຟກ່ອນພິມ ທັງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນກາເຟ ຖືກຢາປາບວັດຊະພິດ ເຊິ່ງຈະມີຜົນທຳ ລາຍໃຫ້ຕົ້ນກາເຟຕາຍໄດ້ ແລະ ຢາປາບວັດຊະພິດນີ້ຖ້າຫາກໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃນປີໜຶ່ງຈະພິມຢາ ປາບວັດຊະພິດພຽງປີລະ 3 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

ບົດທົດສະດີທີ 5

ການເກັບກ່ຽວກາເຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກາເຟ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ບອກວິທີ ການເກັບກ່ຽວໝາກກາເຟທີ່ຖືກຕ້ອງ
2. ບອກກຳນະວິທີໃນການຜະລິດກາເຟ

ເນື້ອໃນ

5.1 ການເກັບກ່ຽວກາເຟ

5.1.1 ການເກັບກ່ຽວໝາກກາເຟ

ກາເຟຈະເລີ່ມອອກດອກຕິດໝາກຫຼັງຈາກປູກໄປປະມານໃນປີທີ 3 ແລ້ວ ກໍ່ເລີ່ມເກັບໝາກໄດ້ ປຶກກະຕິກາເຟຈະເລີ່ມສູງປະມານເດືອນພະຈິກ ຈົນເຖິງ ເດືອນເມສາ ທັງນີ້ອາດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນກາເຟ ແລະ ສະພາບເນື້ອທີ່ປູກດ້ວຍ. ໃນການເກັບໝາກກາເຟເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບດີນັ້ນ ຈະຕ້ອງເກັບໝາກກາເຟທີ່ສຸກດີ ຄືມີສີສົ້ມຈົນເຖິງສີແດງ ຢ່າປອຍໃຫ້ແກ່ນກາເຟແກ່ໄພດ ຈົນເປັນສີແດງເຂັ້ມ ແລະ ຢ່າເກັບກ່ອນທີ່ກາເຟ ຈະສຸກດີ ຄືຍັງມີສີຂຽວຢູ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກາເຟມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີ. ການເກັບຄວນໃຊ້ກະຕ່າ ຫລື ກະຊ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ ມັດຕິດກັບແອວ ຫລື ແຂວນຄໍ ເມື່ອເກັບເຕັມກະ ຕ່າແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປຖອກ ໃສ່ໃນກະສອບ ການເກັບກາເຟຈະຕ້ອງຄ່ອຍເກັບໄປເທື່ອລະນ້ອຍປະມານ 3-4 ຄັ້ງ ໂດຍເວັ້ນໄລຍະ ຫ່າງກັນປະມານ 20 ມື້ ສາເຫດທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການເກັບດິນເພາະໝາກກາເຟຈະສຸກພ້ອມກັນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຄ່ອຍເກັບໄປເລື້ອຍໆ ເທື່ອລະນ້ອຍ ຍັງມີອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໝາກກາເຟສຸກພ້ອມກັນໄດ້ ຄື: ການໃຊ້ຢາເລັ່ງໝາກກາເຟ ເຊິ່ງວິທີການນີ້ ເຮັດໃຫ້ປະຫຍັດແຮງງານໃນການເກັບ ໝາກກາເຟລົງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ການໃຊ້ຢາເລັ່ງໃຫ້ ໝາກກາເຟໃຫ້ສຸກພ້ອມກັນນັ້ນ ເປັນເຕັກນິກອັນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງສວນກາເຟ ສາມາດຫຼຸດຜ່ືນທຶນໃນການຜະລິດກາເຟ ລົງໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.

5.1.2 ການໃສ່ຢາເລັ່ງໃຫ້ໝາກກາເຟສຸກ

ສຳລັບຢາທີ່ໃຊ້ຄື ອີເທນ ຟີຈີອາ 39,5% ໂດຍຈະໃຊ້ໃນອັດຕາ 10-15 ຊີຊີ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດໃຫ້ທົ່ວໝາກ ແລະ ກິ່ງ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ ຢານີ້ ພະຍາຍາມໃຫ້ຖືກໃບນ້ອຍທີ່ສຸດ ນ້ຳ 1 ລິດ ຈະສິດໄດ້ປະມານ 3 ດິນ. ສຳລັບຈັງຫວະໃນການໃຊ້ຢາປະເພດນີ້ ໃຫ້ໝັ່ນກວດເບິ່ງສວນກາເຟເລື້ອຍໆ ເມື່ອເຫັນວ່າໝາກກາເຟສຸກແລ້ວປະມານ 10% ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາເລັ່ງໝາກກາເຟໄດ້ ຫຼັງຈາກສິດຢາໄປແລ້ວ 10-12 ມື້ ໝາກກາເຟກໍ່ຈະສຸກພ້ອມກັນໝົດ ຍົກເວັ້ນໝາກນ້ອຍຍັງອ່ອນຢູ່ຈະບໍ່ສຸກ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ ໃນການໃຊ້ຢາເລັ່ງໝາກກາເຟ ຫ້າມໃຊ້ພາຊະນະທີ່ເປັນໂລຫະ ໃນການບັນຈຸຢາ ເຄື່ອງສິດທີ່ໃຊ້ ກໍ່ໃຫ້ໃຊ້ ຊະນິດທີ່ຖືກບັນຈຸເປັນພວກປາລາສຕິກ .

5.2 ຜະລິດຕະພັນກາເຟ

ກຳນະວິທີໃນການຜະລິດກາເຟນີ້ ຈະຕ້ອງເຮັດຄວບຄູໄປກັບການເກັບໝາກ ເຊິ່ງເປັນວຽກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນລະຍະຫຼັງ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທຳອິດຈະດຳເນີນການປູກ ບົວລະບັດຮັກສາ

ນາດເປັນຢາງດີ ແຕ່ຖ້າຫາກເກັບໝາກບໍ່ເປັນ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຫລັກຂອງການນະວິທີຜະລິດກາເຟ ທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ກໍ່ເສຍແຮງປູກລ້າງ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ມີທາງທີ່ຈະເສຍຫາຍ ແລະ ຂາດທຶນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບຫລັກການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການນະວິທີການຜະລິດກາເຟ ທີ່ຈະເປັນກຸນແຈ ໃຫ້ຜົນຜະລິດມີຄຸນນະພາບສູງ ມີດັ່ງນີ້ :

1. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການເກັບໝາກ ໃຫ້ເກັບສະເພາະໝາກທີ່ສຸກເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີໝາກສີຂຽວ ປົນມາ ຈະໄດ້ກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນໝາກທີ່ສຸກໂພດ ຈົນນວນມີສີຊ້ຳ ແລະ ໝາກທີ່ແຫ້ງຕິດກິ່ງຢູ່ເຫລົ່ານີ້ ຖ້າຫາກເກັບເອົາມາ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳດ້ວຍ.
2. ເມື່ອເກັບໝາກມາແລ້ວ ຄວນຈະຮີບສີເອົາເປືອກອອກ ຢ່າງຊ້າທີ່ສຸດບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ຖ້າຈະເຮັດໄດ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຍິ່ງເປັນການດີ.
3. ຖ້າເກັບໄວ້ໃນກະສອບ ຫລື ໃນຫີບດິນເກີນກວ່າ 48 ຊົ່ວໂມງ ມັນຈະເຊື່ອມຄຸນນະພາບເນື່ອງຈາກການບູດເນົ້າຂຶ້ນ.
4. ເຄື່ອງແກະເປືອກໝາກກາເຟ ຄວນຈະໄດ້ຍົກເຄື່ອງ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດ ປິລະຄັ້ງກ່ອນໜ້າ ລະດູເກັບໝາກກາເຟ ກວດສອບໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປະຕິບັດງານໄດ້ດີຢູ່ສະເໝີ.
5. ກ່ອນນຳໝາກກາເຟເຂົ້າເຄື່ອງແກະເປືອກ ຄວນເອົາໝາກກາເຟທັງໝົດທີ່ເກັບໄດ້ມາ ລົງແຊ່ນ້ຳໃຫ້ຖ້ວມ ກວດຂີ້ເຫຍື່ອ ໝາກກາເຟແຫ້ງ ແລະ ໝາກທີ່ສຸກເກີນໄປ ທີ່ລອຍຂຶ້ນມາອອກຖິ້ມເສຍກ່ອນ.
6. ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າເຄື່ອງແກະເປືອກອອກມາແລ້ວ ຄວນນຳເຂົ້າເຄື່ອງຄັດເມືອກອອກມາທັນທີ ບໍ່ສະນັ້ນ ຫາກປະໄວ້ ຈະເກີດການບູດເນົ້າ ເຮັດໃຫ້ກາເຟເສຍນ້ຳໜັກໄປ.
7. ຖ້າຈະໃຊ້ວິທີບິ້ນ ໃຫ້ໄດ້ຜົນດີ ຄວນໃສ່ແກ່ນລົງໃນກະບະທີ່ສະອາດ ຈຳນວນຫຼາຍໆ ການໃສ່ກະບະທີ່ສະອາດເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ.
8. ລ້າງແກ່ນກາເຟດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ໃຫ້ໝົດເມືອກທີ່ເກາະຫຸ້ມແກ່ນຢູ່ ກ່ອນນຳໄປເບີຍໃຫ້ແຫ້ງ.
9. ເບີຍແກ່ນກາເຟ ກາງແດດໃຫ້ແຫ້ງ ດີແລ້ວ ຫລື ຈະນຳເຂົ້າເຄື່ອງອົບໃຫ້ແຫ້ງກໍ່ໄດ້.
10. ຖ້າໃຊ້ເຄື່ອງອົບ ຄວນບັງຄັບຄວາມຮ້ອນຢ່າງໃຫ້ສູງກວ່າ 140 ຫາ 150 ອົງສາຟາເລັນໄຮ.
11. ເມື່ອເບີຍ ຫລື ອົບແຫ້ງດີແລ້ວ ໃຫ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອງແກະເອົາເປືອກແຂງອອກ ຂັດໃຫ້ແກ່ນກາເຟກັ່ງໆ ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຜັດເອົາແກບລະອຽດອອກ ແລ້ວນຳເຂົ້າເຄື່ອງຄັດລະດັບ ບັນຈຸລົງກະສອບດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.

5.2.1 ການຜະລິດກາເຟ

ວິທີຜະລິດກາເຟນັ້ນມີຢູ່ 2 ວິທີ ດັ່ງນີ້ :

1. ວິທີເຮັດກາເຟແຫ້ງ (Dry method) ເປັນວິທີການຜະລິດກາເຟທີ່ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຕຽມຂະບວນການໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍນຳໝາກກາເຟ ທີ່ເກັບມາແລ້ວ ນຳມາຕາກແດດ ປະມານ 15-20 ມື້ ເຊິ່ງລາຍທີ່ໃຊ້ຕາກນັ້ນ ຕ້ອງສະອາດ ແລະ ມີແສງແດດຕະຫລອດທັງມື້ ໃນເວລາຕາກບໍ່ຄວນໃຫ້ໝາກກອງສຸມກັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງບໍ່ທົ່ວເຖິງກັນ ເມື່ອໝາກກາເຟແຫ້ງດີແລ້ວ ຈຶ່ງນຳໄປແກະເປືອກອອກ ກໍ່ຈະໄດ້ແກ່ນກາເຟຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ການເຮັດໂດຍວິທີນີ້ ເພາະສົມທີ່ຈະເຮັດກັບກາຟຈຳນວນຫຼາຍໆ ແຕ່ມີຂໍ້ເສຍຄ່າ ແກ່ນສານກາຟ ມີຄວາມໄວຕໍ່ການດູດກິນໄດ້ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກາຟ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແລະ ແກ່ນກາຟນັ້ນບໍ່ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນນານ ດັ່ງນັ້ນ ຫຼັງຈາກຕາກແກ່ນກາຟ ແຫ້ງແລ້ວ ຈຶ່ງຄວນຮີບເຮັດການແກະແກ່ນສີເປືອກອອກທັນທີ .

2. ວິທີປຽກ (Wet method) ເປັນວິທີການຜະລິດກາຟ ທີ່ຍອມຮັບກັນຫຼາຍໃນຕະຫລາດ ເພາະວ່າສາມາດຜະລິດສານກາຟ ທີ່ມີລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນດີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບິ້ມ ຂອງເປືອກ ແລະ ເມືອກກາຟ ເປັນວິທີການທີ່ໃຊ້ໄລຍະເວລາພຽງ 7 ມື້ ກໍ່ສາມາດຜະລິດກາຟໄດ້ ເຊິ່ງມີວິທີການດຳເນີນການຜະລິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

- ແກະສີເປືອກກາຟອອກ ເຮັດໄດ້ໂດຍການນຳເອົາໝາກກາຟ ທີ່ເກັບມາແລ້ວ ເຊິ່ງຍັງສົດໆ ໄປແຊ່ນ້ຳທັນທີ ເພື່ອແຍກໝາກທີ່ມີລັກສະນະບໍ່ດີ ຫລື ໝາກລົບອອກຈາກໝາກກາຟທີ່ດີ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳເຂົ້າເຄື່ອງແກະສີເອົາເປືອກອອກ ມີທັງຊະນິດມີໝູນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ປັບເຄື່ອງໃຫ້ເໝາະກັບຂະໜາດຂອງແກ່ນກາຟ ເມື່ອໝາກກາຟຜ່ານເຄື່ອງແກະສີເປືອກ ສ່ວນຂອງແກ່ນກໍ່ອອກທາງໜຶ່ງ ເປືອກກໍ່ອອກທາງໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳແກ່ນກາຟ ມາກຳຈັດເມືອກ ແລະ ທຳການລ້າງແກ່ນຕໍ່ໄປ ສຳລັບການກຳຈັດເມືອກນັ້ນ ສາມາດກະທຳໄດ້ໂດຍວິທີການຕ່າງໆນີ້ :

+ ການກຳຈັດເມືອກ ໂດຍວິທີທຳມະຊາດ: ເປັນການເຮັດໃຫ້ເມືອກທີ່ຫຸ້ມແກ່ນກາຟ ຟຸດອອກ ໂດຍການບິ້ມໃຫ້ເໝົາເປື່ອຍ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ສານລະລາຍ ທີ່ມີສ່ວນປະສົມ ແອນກໍຣອນ(ເຫລົ້າ) ຫລື ເພີ່ມອຸນຫະພູມໃຫ້ແກ່ແກ່ນ ໃນສະພາບທີ່ຍັງປຽກຊຸ່ມມີ pH ສູງ ໂດຍກອງໃຫ້ສູງຈາກຜິ້ນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ ການເຮັດໃຫ້ເໝົາເປື່ອຍດ້ວຍວິທີນີ້ ບໍ່ຄວນຈະໃຫ້ແກ່ນກາຟແຫ້ງຈົນເກີນໄປ ຄວນຈະໃຊ້ຜ້າຄຸມໄວ້.

ສຳລັບການບິ້ມໃຫ້ເໝົາເປື່ອຍທີ່ຫຸ້ມແກ່ນກາຟໃຫ້ເໝົາເປື່ອຍນັ້ນ ໃນກາຟແຕ່ລະຜັນ ຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການບິ້ມຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ອາລາບິກາ ໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການບິ້ມປະມານ 24-36 ຊົ່ວໂມງ ສ່ວນ ກາຟ ໂຣບັດສະຕາ ຈະມີເມືອກໜາ ແລະ ໜຽວກ່ວາກາຟ ອາລາບິກາ ການບິ້ມໃຫ້ເໝົາ ຟຸດອອກຈາກແກ່ນ ຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາປະມານເຖິງ 72 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອເມືອກກາຟຟຸດອອກໝົດແລ້ວ ນຳໄປລ້າງນ້ຳ ໂດຍປຽນນ້ຳ 3-4 ຄັ້ງ ທັນທີ ກ່ອນຈະນຳອອກຕາກແດດ.

+ ການກຳຈັດເມືອກໂດຍໃຊ້ສານລະລາຍຕ່າງໆ: ມີວິທີການເຮັດ ໂດຍນຳແກ່ນກາຟທີ່ແກະສີເປືອກອອກແລ້ວມາໃສ່ຖັງຂະໜາດໃຫຍ່ ກວມດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ຮຽກວ່າ “gorumanes” ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳສານລະລາຍທີ່ມີສ່ວນປະສົມ ຂອງໂຊດາ 10% (ໂຊດຽມໂຮຕຣິກໂຊດ) ການປະສົມສານລະລາຍນີ້ ເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ ໂຊດຽມໂຮຕຣິກໂຊດ 1 ກິໂລກຣາມ ປະສົມນ້ຳ 10 ລິດ ໃຊ້ໄດ້ກັບຈຳນວນແກ່ນກາຟ 25-30 ກິໂລກຣາມ ໃສ່ລົງໄປ ໃນຂະນະກວມແກ່ນກາຟ ແລະ ເມືອກຈະຖືກກຳຈັດອອກ ໂດຍການສຳຜັດ ຫລື ທຳປະຕິກິລິຍາກັບສານນີ້ ສ່ວນໄລຍະເວລາໃນການເຮັດໃຫ້ເໝົາເປື່ອຍ ຟຸດອອກຈາກແກ່ນກາຟນັ້ນ ໃນກາຟຜິນອາລາບິກາ ໃຊ້ໄລຍະເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ສຳລັບກາຟໂຣບັດສະຕານັ້ນໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ ຄືປະມານ ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງສອງຊົ່ວໂມງ ເມື່ອໄດ້ແກ່ນກາຟບໍ່ມີເມືອກແລ້ວ ໃຫ້ລ້າງນ້ຳ 3-4 ຄັ້ງ ທັນທີ ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຕາກແດດເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ.

+ ການກຳຈັດເມືອກໂດຍການສຽດສີ: ປະຈຸບັນນີ້ມີເຄື່ອງແກະສີເປືອກກາຟທີ່ເອີ້ນວ່າ “Raoerg” ແລະ “Agua Pulpa” ເຊິ່ງສາມາດທີ່ຈະແກະສີເປືອກ ແລະ ກຳຈັດເມືອກຂອງແກ່ນກາຟ ໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບການກຳຈັດເມືອກໃນກາຟ

ໂຮບັດສະຕາ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈຳນວນແກ່ນທີ່ຖືກແກະສີນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປືອກຊັ້ນໃນສຽດສີ ຫລື ເກີດບາດ ແຜໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະມີການແກະສີເປືອກ ແລະ ການກຳຈັດເມືອກ ຄວນຈະມີການຄັດເລືອກໝາກກາເຟໃນຂະໜາດ ຕ່າງໆກັນ ແລະ ປັບເຄື່ອງໃຫ້ເໝາະສົມກ່ອນຈຶ່ງສາມາດສີເປືອກ ແລະ ກຳຈັດເມືອກໄດ້ດີ ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ແກ່ນກາເຟມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍ .

5.2.2 ການຂົ້ວກາເຟ

ໃນແກ່ນກາເຟຈະມີສານຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງມີຄຸນນະສົມບັດເມື່ອສຳພັນກັບປະສາດຮູດັງແລ້ວ ຈະຮູ້ສຶກ ຫອມຫວນ ຊວນຕື່ມ ສານຊະນິດນີ້ຊື່ວ່າ ອາໂຣເມຕິກອອຍ (Aromatic Oil) ລັກສະນະຂອງ ສານຊະນິດນີ້ຈະລະເຫີຍໄດ້ ຖ້າຫາກຖືກຄວາມຮ້ອນ ດັ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຂົ້ວກາເຟ ສານຊະນິດນີ້ ຈະລະ ເຫີຍໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ຖ້າຫາກການຂົ້ວກາເຟ ໃຊ້ເວລາດົນອອກໄປເລື້ອຍໆ ສານນີ້ຈະລະເຫີຍໝົດໄປ ດັ່ງ ນັ້ນ ການຂົ້ວກາເຟຈຶ່ງຄວນປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ .

1. ກະຂະໜາດຂອງໝໍ້ຂ້າງ ແລະ ແກ່ນກາເຟທີ່ຂົ້ວ ກັບຄວາມແຮງຂອງໄຟ ວ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກາເຟ ທີ່ຂົ້ວນັ້ນສຸກໄດ້ພາຍໃນ 25-30 ນາທີ.

2. ການໃຊ້ໄຟແຮງເກີນໄປ ແກ່ນກາເຟຈະໄໝ້ບໍລິເວນພາຍນອກ ແຕ່ພາຍໃນແກ່ນ ກາເຟ ຍັງສຸກບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ແລະ ຖ້າໃຊ້ໄຟອ່ອນເກີນໄປ ກາເຟຈະສຸກຊ້າ ກິນນ້ຳມັນຫອມຈະລະເຫີຍອອກໄປ ຫຼາຍ.

3. ລັກສະນະຂອງໝາກກາເຟທີ່ຂົ້ວສຸກແລ້ວມີດັ່ງນີ້

- Americans taste ຫລື Light roast ການຂົ້ວກາເຟລົດຊາດແບບນີ້ ເປັນ ການຂົ້ວກາເຟ ໃຫ້ແກ່ນມີສີຟຽງສີນ້ຳຕານເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງວິທີສັງເກດວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ຫລືຍັງຄື ຖ້າການຂົ້ວໃນ ລົດຊາດນີ້ ເມື່ອກາເຟສຸກໄດ້ ທີ່ຈະມີແກ່ນກາເຟແຕກ 2-3 ແກ່ນ ເປັນອັນວ່າໃຊ້ໄດ້ ໂດຍໄລຍະເວລາ ປະມານ 20 ນາທີ .

- Europeans taste ຫລື Dark roast ເປັນການຂົ້ວທີ່ໃຊ້ເວລານານອອກໄປ ຈົນສີຂອງກາເຟ ມີສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ ຫລື ຈະສັງເກດໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເວລານານອອກຈາກວິທີທຳອິດ ປະມານ 6-8 ນາທີ ຫລື ປະມານ 26-28 ນາທີ ລົດຊາດກາເຟໃນຊັ້ນນີ້ ມີກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດປະທັບໃຈຫຼາຍ.

- Italian taste ຫລື Heavy roast ເປັນການຂົ້ວຈົນກາເຟສຸກຈົນເກືອບໄໝ້ ກາເຟຈະມີສີດຳ ເຊິ່ງເປັນລົດນິຍົມ ການດື່ມກາເຟອີຕາລີ ເຊິ່ງການຂົ້ວກາເຟແບບນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 35-40 ນາທີ.

4. ເມື່ອກາເຟຂົ້ວສຸກດີແລ້ວ ໃຫ້ຍົກກາເຟນັ້ນລົງຈາກເຕົາໄຟ ແລ້ວໄສ່ເນີຍປະມານ 20 ກະໜົມ ຕໍ່ນ້ຳໜັກກາເຟ 1 ກິໂລກຣາມ ຈະໄດ້ລົດຊາດກາເຟທີ່ຫອມ ແລະ ມັນ ແລະ ຖ້າໄສ່ນ້ຳຕານ ຊາຍແດງ ລົງໄປຕື່ມ ໃນອັດຕາ 30 ກະໜົມ ຕໍ່ນ້ຳໜັກກາເຟ 1 ກິໂລກຣາມ ຈະເຮັດໃຫ້ກາເຟມີລົດຊາດ ແປກອອກໄປ ເຊິ່ງຄຳກາເຟບາງຄົນມັກ ແລະ ບາງຄົນກໍບໍ່ມັກ .

ການໄສ່ເນີຍຫລືນ້ຳຕານຊາຍແດງລົງໄປນີ້ ຄື ເມື່ອເນີຍຫລືນ້ຳຕານຊາຍແດງໄໝ້ ຈະ ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນຫອມແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ສ່ວນຫຼາຍເປັນທີ່ຖືກໃຈຄຳກາເຟ ສຳລັບອັດຕາສ່ວນປະສົມ ໃນການຂົ້ວກາ ເຟຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ມີອັດຕາສ່ວນປະສົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຕາມວິທີການທີ່ຄິດວ່າຈະມີລົດຊາດ ແຊບກວ່າຂອງຜູ້ອື່ນ.

ບົດທົດສະດີທີ 6

ການປຸກຊາ

ຈຸດປະສົງການສອນ

1. ບອກຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ປະຫວັດຂອງການປຸກຊາ
2. ບອກລັກສະນະທາງພຶດສາສາດຂອງຊາ.

ເນື້ອໃນ

6.1 ປະໂຫຍດ ແລະ ປະຫວັດຂອງການປຸກຊາ

6.1.1 ປະໂຫຍດຂອງຊາ

ຊາເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດອາຫານຫຼາຍຊະນິດເປັນອົງປະກອບທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບດີ ຊຶ່ງປະໂຫຍດຂອງຊາ ພໍຈະສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້ :

1. ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ລະບົບປະສາດ ແລະ ຮ່າງກາຍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດພາບ ເນື່ອງຈາກຊາມີສານກາເຟອີນເປັນອົງປະກອບ ຊຶ່ງກາເຟອີນຈະໄປກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລືອດ ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຜ່ອນຄາຍ.

2. ຊ່ວຍແກ້ຫິວນ້ຳ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ການດື່ມຊາຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກ ໃນຊາມີສານໂພລີຟີນອລ (Polyphenol) ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ກິດອະມິໂນເປັນອົງປະກອບ ເມື່ອສານເຫຼົ່ານີ້ເກີດປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳລາຍ ຈະຊ່ວຍກະຈາຍຄວາມຮ້ອນສ່ວນເກີນໃນຮ່າງກາຍ ພ້ອມກັນຊະລ້າງສານພິດຕ່າງໆ ອອກໄປຊ່ວຍ ເລັ່ງໃຫ້ມີການຂັບຖ່າຍຂອງເສ້ຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ.

3. ຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອໂລກ ລົດການອັກເສບ ຊ່ວຍປົວແຜ ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ແລະ ຊະລ້າງສານພິດໃນຮ່າງກາຍ ເນື່ອງຈາກໃນຊາມີສານ ໂພລີຟີນອລ ສາມາດຂ້າເຊື້ອແບກທີ່ເຮຍໄດ້.

4. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະຊາຂຽວຈະມີວິຕາມິນເຊວິຕາມິນບີຄອມເພັກ ແລະ ກິດເພນໂທເທນິດ .

5. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ (Fitness)
ຕໍ່ຕ້ານໂລກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ອຸດຕັນ.

6. ຊາອູຫຼົງ ສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມອ້ວນ ແລະ ອາການທ້ອງຜູກ ໂດຍຈະຊ່ວຍ ລະລາຍໄຂມັນ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ ລົດປະຈຸ (Discharge). ໃນປັດສະວະ

7. ມີລາຍງານຕ່າງປະເທດທີ່ໜ້າສົນໃຈຢ່າງໜຶ່ງ ຄື : ຊາວຈີນ ແລະ ຊາວຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຢູ່ໃນໄຮ່ຊາ ລ້ວນແຕ່ມີອາຍຸຍືນນານ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຊຶ່ງສັນນິຖານວ່າ ມາຈາກ

ການທີ່ປູກຊາເອງ ແລ້ວກໍຊົງຊາດື່ມເປັນປະຈຳ ນອກຈາກນີ້ຄົນຍັງປຸງເຊື່ອວ່າ ການດື່ມຊາຊຽວ ຈະຊ່ວຍລົດການເກີດໂລກມະເຮັງ ໂດຍສະເພາະມະເລັງໃນກະເພາະອາຫານ ລວມທັງຍັງມີ ຄຸນສົມບັດ ຄ້າຍຢາເອແຊດທິ (AZT) ທີ່ໃຊ້ໃນການຮັກສາຜູ້ປ່ວຍໂລກເອດ ຊຶ່ງຄະນະນີ້ມີລາຍ ງານວ່າແພດຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງທຳການແຍກສານຂົມອອກຈາກຊາ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ຮັກສາໂລກ ພ້ອມ ທັງແພດຍັງແນະນຳ ດ້ວຍວ່າ ຖ້າດື່ມຊາວັນລະ 3 ຈອກຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນອີ ເປັນຈຳນວນ 50% ວິຕາມິນອາ ອີກ 20 % ຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໃນແຕ່ລະວັນ.

8. ສະຖາບັນມະເລັງ ແຫ່ງນະຄອນຊຽງໄຮ້ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ແລະ ສະຖາບັນມະເລັງ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ທຳ ການວິໄຈຈາກຄົນດື່ມຊາ 900 ຄົນໃນຊຽງໄຮ້ ແລະ 11,500 ຄົນ ໃນອາເມລິກາວ່າ ຄົນທີ່ດື່ມຊາຊຽວເປັນປະຈຳດົນໆ ໂອກາດເປັນມະເລັງ ໃນກະເພາະ ອາຫານຈະນ້ອຍລົງ ໂດຍຈະລົດລົງ ໃນເພດຊາຍ 20% ໃນເພດຍິງ 20% ໃນເພດຍິງ 50% ເນື່ອງຈາກເພດຍິງ ບໍ່ມີປັດໃຈ ເສີມໃນການ ເປັນມະເລັງ ເຊັ່ນ : ການດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ສູບຢາ.ແລະ ການວິໄຈຍັງພົບອີກວ່າຜົນດີຂອງການດື່ມຊາຊຽວຈະຫຼຸດລົງ ຖ້າດື່ມຊາຮ້ອນຈັດ.

6.1.2 ປະຫວັດການປູກຊາຂອງໂລກ

ການດື່ມຊານັ້ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ ຄາດວ່າບໍ່ນ້ອຍກ່ວາ 2,167 ປີກ່ອນ ຄຣິສຕະສັກກະລາດ ຕຳນານການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການດື່ມຊາມີຫຼາຍຕຳນານ ບາງຕຳນານກໍກ່າວ ວ່າ ຈັກກະພັດ ເສີນໜຶ່ງ ຂອງຈີນ (Shen Nung) ຄົ້ນພົບວິຊາຊົງຊາ ໂດຍບັງເອີນ ເມື່ອພະອົງຊົງ ຕື່ມນ້ຳດື່ມ ໃກ້ໆກັບຕົ້ນຊາ ຂະນະຄອຍໃຫ້ນ້ຳຟົດກຶ່ງຊາໄດ້ຫຼົ້ນລົງໃນໝໍ້ຊາ ບົດໜຶ່ງກິນຫອມກຸ່ນ ກໍໂຊຍອອກມາ ເມື່ອພະອົງເອົາກຶ່ງຊາອອກແລ້ວຊົງດື່ມ ຈາກນັ້ນການດື່ມຊາກໍແຜ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ນອກຈາກຄົນພົບສັບພະຄຸນຂອງຊາແລ້ວ ພະອົງຍັງຊົງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດສອບ ສະໝຸນໄພຊະນິດຕ່າງໆກວ່າ 200 ຊະນິດ ຊາວຈີນຈຶ່ງໄດ້ນັບຖືວ່າພະອົງເປັນບິດາແຫ່ງແພດ ສາດ. ອີກຕຳນານໜຶ່ງກ່າວເຖິງນັກບວດ ຊື່ ທຳ ຊຶ່ງເປັນລູກຂອງກະສັດອິນເດຍ ໄດ້ເດີນທາງ ມາຈາຣີກບຸນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ພະພຸດທະສາສະໜາໃນຈີນ ໃນຊ່ວງແຜ່ນດິນຂອງຈັກກະພັດຄູຕິ ໃນຊ່ວງປີ ຄສ 519 ຈັກກະພັດດິຄູຕິຊົງນິຍົມຊົມຊອບນັກບວດ ຈຶ່ງໄດ້ນິຍົມໃຫ້ນັກບວດ ໄປພັກຢູ່ໃນຖໍ້ແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງນານກິງ ຂະນະທີ່ນັກບວດ ໄດ້ສວດມົນພາວະນາຢູ່ກໍເກີດເຫງົາ ຫຼັບໄປ ເຮັດໃຫ້ຊາວຈີນຫົວເຍາະເຍີ້ຍ ເພື່ອເປັນການລົງໂທດຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄວາມຜິດເຊັ່ນ ນັ້ນອີກ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຕັດໜັງຕາຂອງຕົນຖິ້ມ ໜັງຕາເມື່ອຕົກເຖິງ ພື້ນກໍເກີດງອກຂຶ້ນເປັນຕົ້ນຊາ ຊຶ່ງເປັນນິມິດທີ່ແປກ ຊາວຈີນ ຈຶ່ງພາກັນເກັບຊາມາຊົງ ໃນນ້ຳດື່ມ ເພື່ອຮັກສາພະຍາດ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຕຳນານເລົ່າຂານກັນອີກວ່າໃນສະໄໝໜຶ່ງໄດ້ເກີດໂລກອະຫິວາຕະກະໂ ລກລະບາດໃນເມືອງຈີນຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ກ່ຽວອຸຍຊົນແສພົບວ່າສາເຫດໃຫຍ່

ຂອງການເກີດໂຮກ

ເກີດຈາກການທີ່ຜູ້ຄົນພາກັນດື່ມນ້ຳສົກກະປົກ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ ຊາວບ້ານຕົ້ມ ນ້ຳຕົ້ມ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານເຊື່ອຈຶ່ງຊອກຫາໄປໄມ້ມາຂາງໄຟໃຫ້ຫອມ ເພື່ອໃສ່ລົງໄປໃນນ້ຳ ຕົ້ມ ກຽວອຸຍຊົນແສ ພົບວ່າມີພືດຊະນິດນຶ່ງທີ່ໃຫ້ກິ່ນຫອມຫຼາຍ ເປັນພິເສດ ມີລົດຝາດນ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ແກ້ອາການຖອກທ້ອງໄດ້ ຈຶ່ງເຜີຍແຜ່ວິທີການນີ້ໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ເຮັດຕາມ ຊຶ່ງພືດທີ່ມີກິ່ນ ຫອມກໍຄືຕົ້ນຊານັ້ນເອງ.

ຫລັກຖານສຳຄັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຊາທີ່ສືບທອດມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ຄື : ຄຳພີ ຊາ ຂອງຫລູຍູ່ (Lu Yu) ໂດຍຫລູຍູ່ເກີດໃນມົນທົນເຫີເປີ ລະຫວ່າງ ຄສ 728-804 ຫລູຍູ່ມີຄວາມ ສົນໃຈໃນເລື່ອງຊາຫຼາຍ ໄດ້ຂຽນຕຳລາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ປະມານປີ ຄສ 780 ຊື່ວ່າ “ ຊາຊົງ ” (Tea classic) ຊຶ່ງເປັນຕຳລາທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊາເຖິງ 10 ບົດ ຖືວ່າເປັນຕຳລາ ທີ່ກ່ຽວກັບຊາຫົວທຳອິດຂອງໂລກ ໂດຍເນື້ອຫາໃນໜັງສືຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງຕົ້ນກະເນີດຂອງ ການດື່ມຊາ ເຄື່ອງມືການຜະລິດຊາ ອຸປະກອນການຊົງຊາ ການຊົງຊາທີ່ຖືກວິທີ ວິທີການດື່ມຊາ ປະຫວັດ ທີ່ກ່ຽວກັບຊາ ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຊາ ການແບ່ງຄຸນນະພາບຂອງຊາ ແລະ ທຳນຽມການ ຊົງຊາ.

ສະໄໝລາດສະວົງຖັງ ແລະ ລາດສະວົງຊ້ອງ (ຄສ 618-1260) ການດື່ມຊາ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍມີຮ້ານນ້ຳຊາຢູ່ທຸກທົນທຸກແຫ່ງ ໃນແຕ່ລະມົນທົນຈົນເຖິງເມືອງຫຼວງ ແຕ່ກຳມະ ວິທີຊົງຊາໃນສະໄໝລາດສະວົງຖັງຈະຜິດແຕກຕ່າງຈາກການຊົງຊາທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ສະໄໝນັ້ນຈະນຳ ໃບຊາໄປຫນຶ່ງກັບເຂົ້າແລ້ວຕົ້ມເກືອ ຊົງ ເປືອກສົ້ມ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຈາກນັ້ນນຳມາປັ້ນເປັນກ້ອນ ໄວ້ ສຳຫຼັບລະລາຍນ້ຳຕົ້ມ ສ່ວນໃນສະໄໝລາດສະວົງຊ້ອງ ການຊົງໄດ້ປ່ຽນຈາກກ້ອນຊາໜຶ່ງມາ ເປັນໃບຊາແຫ້ງ ໂດຍນຳໃບຊາມາໄມ້ຈົນເປັນຜົງ ແລ້ວຊົງກັບນ້ຳຮ້ອນ ໃນຍຸກນີ້ເອງ ທີ່ຄົນຈີນ ເລີ່ມມີວັດທະນະທຳຈົບນ້ຳຊາ ພະສົງຫັນມາໃຊ້ການຊົງຊາເພື່ອສ້າງ ສິນ ສະມາທິ ປັດສະຍາ ຈົນກະທັ້ງເມື່ອຊາວຕາດຮຸກຮານຈີນ ຈົນລາດສະວົງຊ້ອງຖືກທຳລາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ການທຳ ແລະ ຊົງຊາ ສຸດສິ້ນໄປດ້ວຍ.

ຕໍ່ມາໃນສະໄໝລາດສະວົງຍວນ (ຄສ 1208-1368) ຄົນຈີນຫັນມາຊົງຊາ ດ້ວຍໃບ ເຊິ່ງຕ້ອງຊົງຊາໃນບ້ານ (ການນຳຊາ) ບ້ານຊາຈະຊ່ວຍຕອງເສດຊາບໍ່ໃຫ້ລົ້ນລົງຈອກໃນ ຂະນະລົນ .

ຈາກປະເທດຈີນ ຊາໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ນຳໄປປູກໃນປະເທດຕ່າງໆໃນເອເຊັຍ ເຊັ່ນ: ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈີນ ໂດຍເລີ້ມຮູ້ຈັກ ແລະ ມີການນຳຊາເຂົ້າຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍ ພະ ຊາວຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເດີນທາງມາປະເທດຈີນກັບເຮືອຄະນະທູດ ເພື່ອມາສຶກສາຄຳສອນ ທາງພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ໄດ້ນຳເມັດຊາກັບໄປປູກທີ່ Shingaken ຊຶ່ງກໍປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຜົນດີ ທັງຈາກນັ້ນໃນປີ ຄສ 1191 ການປູກຊາໄດ້ກະຈາຍທົ່ວໄປ ແລະ ພະຊາວຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຊື່ ໄປໄຊ (Eisai) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຈີນໃນປີ ຄສ 1196 ແລະ 1192 ໄດ້ຂຽນໜັງສືກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ

ສຸຂະພາບໂດຍການດື່ມຊາ (Preserving Health in Drinking Tea) ເປັນໜັງສືເຫຼັ້ມທຳອິດ
ກ່ຽວກັບຊາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດປະເພນີການດື່ມຊາໃນຍີ່ປຸ່ນ
ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ພັດມະນາ ຂຶ້ນເປັນປະເພນີການຊົງຊາຂອງຍີ່ປຸ່ນມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.

6.2 ພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ

6.2.1 ລັກຊະນະທາງພຶກສາສາດ

ຊື່ສາມັນ : Tea

ຊື່ວິທະຍາສາດ : *Camellia sinensis* (L) Okuntze. (2n=30)

1. ຕົ້ນຊາ: ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ສູງປະມານ 30 ຟຸດ ຊົງຟຸ່ມເປັນ
ຮູບກວຍ.
2. ລະບົບຮາກ: ຕົ້ນຊາທີ່ກ້າຈາກເມັດຈະມີຮາກແກ້ວ ແລະ ມີຮາກຜອຍ
ຫາອາຫານ ຮາກຊາຈະມີການສະສົມຂອງຄາໂບໄຮເດຣ ໃນຮູບຂອງແປ້ງ ຊຶ່ງມີການແຕກຍອດ
ໃໝ່ (Flushing) ຂອງຕົ້ນຊາ ຈະຂຶ້ນກັບການສຳລອງຄາໂບໄຮເດຣດໃນຮາກ ໂດຍທົ່ວໄປ
ຕົ້ນຊາທີ່ງອກຈາກເມັດຈະມີຮາກຍິ່ງເລິກໃນດິນສະເລ່ຍປະມານ 1.5 ແມັດ ແຕ່ອາດມີຄວາມຍາວ
ເຖິງ 3 ແມັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າກໍໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງຕົ້ນຊາ ແລະ ສະພາບດິນ.
3. ໃບ : ເປັນໃບຂຽວ ການຈັດລຽງຕົວຂອງໃບເປັນແບບສະລັບ 1 ໃບຕໍ່ 1 ຂໍ້
ໂດຍພັດທະນາຈາກຕາທີ່ມຸມໃບ ຂອບໃບຍັກແບບແຂ້ວເລື້ອຍ ປາຍໃບແຫຼມ ແຜ່ນໜ້າ ໜ້າໃບ
ເປັນມັນ ໃບຍາວປະມານ 7-30 ຊັງຕີແມັດ ໃຕ້ໃບມີຂົນອ່ອນປົກຄຸມ ປາກໃບມີຫຼາຍ
ບໍລິເວນໃຕ້ໃບຊາອັສສາມີໃບສີອ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນຊາຈີນ ມີໃບແຄບ ແລະ ສີຂ້ອນຂ້າງ
ຄຳກວ່າຊາອັສສາ
4. ດອກ : ຈະເກີດອອກມາຈາກຕາລະຫວ່າງລຳຕົ້ນກັບໃບມີທັງດອກດຽວ
ແລະ ດອກຊໍ່ ເປັນດອກສົມບູນເພດ ມີທັງເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ເກສອນຕົວຜູ້ມີສີເຫຼືອງ
ຈຳນວນຫຼາຍ ການເກສອນໂຕຜູ້ຍາວປະມານ 8-10 ມິລິແມັດ ເກສອນໂຕຜູ້ມີ 2 ຊ່ອງ
ການຊູເກສອນໂຕແມ່ສັ້ນ ຍອດເກສອນໂຕແມ່ມີ 3-5 lobe ກົບດອກຊາມີສີຂາວ ຈຳນວນ 5-8
ກົບລັກສະນະໂຄ້ງເວົ້າ ແບບ Obovate ກົບລ້ຽງສີຂາວ 5-6 ກົບ..
5. ໝາກ: ເປັນແຄບຊູນ (Capsule) ເບື້ອງໜ້າສີນ້ຳຕານອົມຂຽວ
ແບ່ງເປັນ 3 ຊ່ອງ ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1.5 - 2.0 ຊຕມ ຈາກເລີ່ມຕົວໝາກເຖິງໝາກແກ່
ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 9-12 ເດືອນ ເມື່ອໝາກແກ່ເຕັມທີ່ ໝາກຈະແຕກເຮັດໃຫ້ເມັດລົ້ນລົງ
ດິນໄດ້.
6. ເມັດ : ມີຮູບຮ່າງກົມ ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0.8-1.6 ຊຕມ
ມີໃບລ້ຽງ 2 ໃບ ອວບໜ້າມີສີມັນຫຼາຍລັກສະນະຫຸ້ມຕົ້ນອ່ອນໄວ້ ເບື້ອງເມັດແຂງໜ້າເຊື່ອມຕິດ

ກັບເປືອກຫຸ້ມເມັດ (Testa) ຊຶ່ງມີລັກສະນະບາງໜຶ່ງ ເມັດຈະສາມາດງອກໄດ້ໃນ 2-3 ອາທິດ ຕົ້ນອ່ອນຕັ້ງຊື່ ເມັດ 1 ກິໂລກຣາມ ຈະມີເມັດຊາ 400 - 600 ເມັດ.

6.2.2 ພັນ

ຊາແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 3 ພັນໃຫຍ່ຄື: ຊາອັສສາ ຊາຂະເມັນ ຊາຈີນ.

1. ຊາອັສສາ

ຊື່ວິທະຍາສາດ *Camellia Sincnsis* Var. *assamica* (Mast)

ລັກສະນະ ລຳຕົ້ນດຸ່ງວ ສູງປະມານ 6- 18 ແມັດ ໃບໃຫຍ່ຈະເລີນເຕີບ ໂຕໄວ ທົນແລ້ງ ດອກອອກເປັນຊ່ຽງລະ 2-4 ດອກ ຊາອັສສາສາມາດແບ່ງອອກເປັນພັນຍ່ອຍໄດ້ 5 ສາຍ ພັນ ຄື:

- ພັນອັສສາໃບຈາງ (Light leaned Assam Jat) ຕົ້ນມີຂະໜາດນ້ອຍ ຍອດ ແລະໃບມີສີຂຽວອ່ອນ ລັກສະນະໃບເປັນມັນວາວ ຂອບໃບຢັກແບບແຂ້ວເລື້ອຍ. ເປັນພັນທີ່ອ່ອນ ແອ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳ ແລະ ຄຸນນະພາບບໍ່ດີ ເມື່ອນຳມາເຮັດຊາຈີນຈະມີສີນ້ຳຕານ.

- ພັນອັສສາໃບເຂັ້ມ (Dark leaved Assam jat) ຍອດ ແລະ ໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມ ໃບນຸ່ມເປັນມັນ ມີຂົນປົກຫຸ້ມ ຂອບໃບຢັກແບບແຂ້ວເລື້ອຍ ເປັນພັນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ມີ ຄຸນນະພາບດີ ເມື່ອນຳມາເຮັດຊາຈີນ ຈະມີສີດຳ .

- ພັນມານິປູຣີ (Manipuri jat) ເປັນພັນທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງໃບມີສີຂຽວ ເຂັ້ມ ເປັນປະກາຍ ຂອບໃບຢັກແບບ ແຂ້ວເລື້ອຍທົນແລ້ງໄດ້ດີ.

- ພັນພະມ້າ (Buma jat) ໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມ ໃບແກ່ມີສີຂຽວແກມນ້ຳເງິນ ໃບກ້ວາງ ແຜ່ນໃບຮູບໄຂ່ ຂອບໃບຢັກແບບແຂ້ວເລື້ອຍ ທົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີຫຼາຍ.

- ພັນ ລູໄຊ (Lushai jat) ຂອບໃບຢັກເລິກ ປາຍໃບເຫັນໄດ້ຊັດ.

2. ຊາຂະເມນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ *Camellia sinensis* Var. *Indo-China*

ລັກສະນະ ລຳຕົ້ນດຸ່ງວ ສູງປະມານ 5 ແມັດ ໃບແຂງເປັນມັນ ໃບຍາວ ຂອບໃບຢັກແບບແຂ້ວເລື້ອຍ ແຜ່ນໃບມ້ວນງໍເປັນຮູບຄ້າຍຕົວວີ ກ້ານໃບສີແດງ ໃນລະດູແລ້ງ ໃບຈະມີສີແດງ ໃນລະດູແລ້ງໃບຈະມີສີແດງ ຍອດອ່ອນລົດຝາດ ມີແທນນິນສູງ ທົນແລ້ງໄດ້ດີ.

3. ຊາຈີນ

ຊື່ ວິທະຍາສາດ : *Camellia sinensis* Var. *sinensis*

ລັກສະນະ ລຳຕົ້ນເປັນພຸ່ມເຕັ້ງ ສູງປະມານ 2-3 ແມັດ ໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມ ຂະໜາດນ້ອຍ ຍາວແຄບ ຂະໜາດໃບຍາວ 3.6-6.4 ຊຕມ ຕັ້ງຊື່ ຂອບໃບຢັກແບບແຂ້ວເລື້ອຍ ເສັ້ນໃບ ເບິ່ງເຫັນບໍ່ແຈ້ງ ຂໍ້ທີ່ບ້ອງສັນ

ທຶນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜັນແປ
ໄດ້ດີ ຜົນຜະລິດຕ່ຳເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມພັນຊາອັສສາ ຊາພັນນີ້ປູກຫຼາຍໃນປະເທດຈີນ ສາຍພັນ
ທີ່ນິຍົມປູກຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ສາຍພັນຊົງຊົງອູຫຼົງ ຊົງຊົງຕ້າພັງ
ເຕໂກວອິນ ຯ

ການຄັດ ເລືອກຊາເພື່ອເຮັດພັນ :

ໃນການປູກຊາໃໝ່ ຖ້າຄັດເລືອກຕົ້ນຊາທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງມາປູກ ຈະເຮັດໃຫ້
ເສັຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນນ້ອຍລົງ. ລັກສະນະຕົ້ນຊາທີ່ຄວນຈະເລືອກໄວ້ເຮັດພັນມີດັ່ງນີ້ :

1. ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ໃນຊ່ວງລະຍະເວລາສັ້ນ.
2. ແຜ່ກິ່ງກ້ານສາຂາດີ
3. ຫລັງຈາກການຕັດແຕ່ງກິ່ງກ້ານຫຼາຍ ແລະ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ.
4. ມີຈຳນວນໃບຫຼາຍ
5. ມີໜ້າທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ
6. ຂໍ້ບໍ່ສົ້ນເກີນໄປ
7. ຜະລິດດອກ ແລະ ໃຫ້ໝາກດີ.

6.2.3 ການຂະຫຍາຍພັນຊາ

1. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ເມັດ:

ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ເມັດ (Seed Propagation) ເປັນວິທີການ
ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼາຍໃນປະເທດໄທເພາະສຳລັບຂະຫຍາຍ ພັນອັສສາ ແລະ ຊາຂະເມນ ຕົ້ນຊາ
ທີ່ກັກຈາກເມັດ ຈະມີລະບົບຮາກແຂງແຮງ ມີຮາກແກ້ວສາມາດທຶນ ຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ
ເພາະສຳລັບປູກໃນພື້ນທີ່ພູດອຍຂອງປະເທດໄທໂດຍທົ່ວໄປເມັດຊາຈະເລີ້ມແກ່ ໃນປາຍເດືອນ
ກັນຍາເຖິງເດືອນຕຸລາ ເມັດຊາທີ່ຈະໃຊ້ເຮັດເປັນເມັດພັນ ຄວນເກັບຈາກໝາກຊາທີ່ແກ່ເຕັມທີ່
ມີສີນ້ຳຕານ ແລະ ຍັງຕິດເທິງຕົ້ນ ບໍ່ຄວນເກັບເມັດຊາ ທີ່ຫຼົ່ນຢູ່ລຸ່ມຕົ້ນ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ເປັນເມັດພັນ.

ການຂະຫຍາຍພັນຈະເຮັດໂດຍເກັບໝາກຊາທີ່ແກ່ເຕັມທີ່ຈາກຕົ້ນແລ້ວ
ນຳມາແກະເປືອກອອກຫຼື ນຳມາໃສ່ກະຈາດ ຕາກໄວ້ໃນທີ່ຮົ່ມ ໝາກຊາຈະແຫ້ງ ແລະ ແຕກເອງ
ພາຍ ໃນ 2-3 ວັນ ຈາກນັ້ນຮັບນຳເມັດຊາທີ່ໄດ້ໄປກັກ ເນື່ອງຈາດເມັດຊາມີປະລິມານນ້ຳມັນ
ພາຍໃນເມັດສູງເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການສູນເສຍຄວາມງອກໄວຫຼາຍ

ກ່ອນກັກເມັດຊາຄວນນຳເມັດທີ່ໄດ້ແຊ່ນຳໄວ້ 12-24 ຊົ່ວໂມງ ເມັດຊາ
ທີ່ບໍ່ດີຈະລອຍນ້ຳ ໃຫ້ຕັກຖິ້ມໄວ້ໃຊ້ແຕ່ເມັດທີ່ຈົມນ້ຳນຳໄປກັກຕໍ່ໄປ.

ວິທີການກັກເມັດທີ່ນິຍົມປະຕິບັດກັນມີ 2 ວິທີຄື:

ກ). ການກັກເມັດໃນແບງກ້າ

ບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ເປັນແປງກ້າຄວນເປັນທີ່ຈະໂລ່ງແຈ້ງແສງແດດສ່ອງໄດ້ທົ່ວ ເຖິງ ມີການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຂັງ ແລະ ສະດວກໃນການກຳຈັດວັດຊະພຶດ ໃນແປງກ້າ ຄວນຕຽມແປງກ້າໃຫ້ມີຂະໜາດກ້ວາງ 1.0-1.5 ແມັດ ເພື່ອສະດວກໃນການເຮັດວຽກ ຄວາມຍາວຂອງແປງກ້າປະມານ 10 ແມັດ ຫຼື ຕາມຂະໜາດຂອງໂຮງເຮືອນ ໂດຍເຮັດເປັນຮາງ ສູງ 70 ຊຕມ ແລ້ວ ໃສ່ຊາຍຫຍາບລົງໃນຮາງ ປະມານ 50 ຊຕມ ກວດໃຫ້ພຽງແລ້ວໂຮຍເມັດພັນ ລົງໄປໂຮຍໃຫ້ສະມຳສະເໝີ ກົດເມັດລົງໄປໃນຊາຍ ຫຼື ວາງເມັດຮຽງເປັນແຖວລະຍະຫ່ວາງ ແຖວປະມານ 5-6 ຊຕມ ລະຍະຫ່ວາງລະຫ່ວາງເມັດປະມານ 4 ຊຕມ ແລ້ວປົກດ້ວຍ ວັດສະດຸກ້າ ໜາປະມານ 10 ຊຕມ ວັດສະດຸກ້າອາດໃຊ້ຖ່ານ ແກບ ປະສົມຊາຍ ຫຼື ຖ່ານແກບປະສົມຊຸຍ ໝາກພ້າວ. ອັດຕາສ່ວນ :1:1 ໃນຊ່ວງເມັດຍັງບ່ຽງອກ ຄວນຄຸມແປງກ້າດ້ວຍ ຕານ່າງບັງແສງ ປະມານ 70-80% ເພາະໄລຍະນີ້ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໃຊ້ແສງຫຼາຍ ການໃຫ້ນ້ຳຄວນໃຫ້ ເຂົ້າ-ແລງ ຢ່າງສະມຳສະເໝີທົ່ວໜານແຕ່ຢ່າໃຫ້ຈືນ ແລະ ຄວນສິດສານ ເຄມີປ້ອງກັນເຊື້ອລາ ອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອລາເຂົ້າທຳລາຍເມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຕົ້ນຊາຈະງອກພານໃນ 30 ວັນ.

ການດູແລຮັກສາຕົ້ນກ້າຊາ: ໃນຊ່ວງທີ່ເມັດຊາຍັງບ່ຽງອກ ຄວນກຳຈັດ ວັດຊະພຶດໃນແປງຫລັງຈາກກ້າເມັດໄປແລ້ວ 30 ວັນ ເມັດຊາຈະເລີ່ມງອກເປັນຕົ້ນຊາພື້ນ ວັດສະ ດຸກ້າ ຈະມີໃບຈົງ 2-3 ໃບ ໃບມີຂະໜາດຍາວປະມານ 2 ຊຕມ ກ້ວາງ 1 ຊຕມ ລັກສະນະໃບ ທີ່ດີຈະບ່ຽງຫຼືແຫວ່ງ ເມື່ອຕົ້ນຊາອາຍຸ 40-45 ວັນຫຼັງງອກກໍສາມາດຍ້າຍຕົ້ນກ້າໄປຊຳລົງຖິງໄດ້ ໂດຍກ່ອນການຖອນຊຳ 1 ອາທິດ ຄວນໃຫ້ປຸຍທາງໃບເພື່ອເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້າຊາມີລະຕົ້ນແຂງແຮງ ພື້ນຕົວງ່າຍ ການຖອນຍ້າຍຕົ້ນຊາໃຫ້ໃຊ້ມືຈັບເທົ່ງຕົ້ນ ຊາດົງຂຶ້ນມາຊຶ່ງ ເມື່ອຖອດອອກມາແລ້ວ ໃຫ້ຕັດຮາກຊາອອກໃຫ້ເຫຼືອປະມານ 2-3 ນິ້ວ ແທກຈາກໂຄນຕົ້ນເຖິງປາຍຮາກ ແລ້ວລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ກ່ອນນຳໄປແຊ່ນ້ຳຢາກັນເຊື້ອລາ ແຊ່ສະເພາະຮາກດິນເຖິງ 5 ນາທີ ຈາກນັ້ນນຳຕົ້ນກ້າຊາຂຶ້ນມາ ວາງລຽນໄວ້ໃນກະຕ່າຢາງ ເພື່ອສະດວກຕໍ່ການຂົນຍ້າຍໄປຊຳຕໍ່ໄປ.

ການກຽມຖົງປັກຊຳ: ໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງ ຂະໜາດ 2X 10 ນິ້ວ, ວັດຖຸປັກຊຳ ໃຫ້ໃຊ້ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນພໍສົມຄວນ ບໍ່ມີວັດຊະພຶດປົນ ບົດດິນໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບ ແກບໃຫ້ເຂົ້າກັນໃນອັດຕາສ່ວນ ດິນ:ແກບ ຄື 5:1 ເພື່ອໃຫ້ດິນຜຸຜູ້ຍລະບາຍນ້ຳໄດ້ງ່າຍ ຈາກນັ້ນ ຮ່າຍດິນໃຫ້ເຕັມຖົງ ນຳຕົ້ນເບ້ຍຊາມາຊຳໃນຖົງ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ປາຍແຫຼມ ເຈາະວັດຖຸປັກຊຳໃນຖົງ ເປັນຮູເລິກພໍທີ່ຈະນຳຕົ້ນເບ້ຍຊາມາຊຳໃນຖົງ ໃຊ້ມືເນັ້ນດິນຮອບໂຄນຕົ້ນກ້າໃນຖົງຊຳໃຫ້ແໜ້ນ ເມື່ອຊຳແລ້ວຫົດນ້ຳທັນທີ ຕົ້ນເບ້ຍທີ່ຖອນໄວ້ຄວນຊຳໃນຖົງໃຫ້ແລ້ວໃນວັນດຽວ ຫຼັງຈາກຊຳແລ້ວ ໃຫ້ໄປວາງເປັນໜານສີ່ຫຼ່ຽມໂດຍໃຊ້ໄມ້ກັ້ນເປັນໜານ ຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມຄື: ກວ້າງ 1.2

ແມັດ, ຍາວ 10 ແມັດ ມີທາງຢ່າງລະຫວ່າງໜານ 50 ຊມ ເພື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຄວນຫົດນ້ຳ 1-2 ມື້ ຕໍ່ເທື່ອ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເບ້ຍຊາປັກຊຳໃນຖົງແຫ້ງ.

ຂ). ການກຳເນີດໃນຖົງ

ໃຫ້ເອົາເມັດຊາທີ່ດີມາກຳໃນຖົງຢ່າງ ຂະໜາດ 6x8 ນິ້ວ ໃສ່ດິນປະສົມ ໄວ້ໃນຖົງ ວາງເມັດໄວ້ກາງຖົງໃຫ້ບ່ອນມີຕາຂວ້າລົງ ຖິ້ມເມັດດ້ວຍຖ່ານແກບ ຫຼື ດິນຊາຍປະສົມ ຊຸຍໝາກພ້າວໜາ ປະມານ 1 ນິ້ວ ຄວນເອົາໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ ແລະ ຫົດນ້ຳຢ່າງສະ ໝໍ່າສະເໝີໃນລະ ຫວ່າງການກຳ.

2. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການປັກຊຳ:

ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການປັກຊຳ ເປັນວິທີການຂະຫຍາຍທີ່ໃຫ້ລັກ ສະນະຖືກຕາມສາຍພັນແມ່ ເໝາະສຳລັບການຂະຫຍາຍພັນ ຊາພັນດີ ຫຼື ພັນຊາຈີນ ເນື່ອງຈາກ ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດມີອັດຕາການກາຍພັນສູງ.

ການປັກຊຳນິຍົມໃຊ້ວິທີປັກຊຳສ່ວນໃບຂອງຊາທີ່ມີແຜ່ນໃບ ກ້ານໃບ ແລະ ກິ່ງ ຫຼື ລຳຕົ້ນ ທີ່ມີສ່ວນຂອງຕາຕິດຢູ່ນຳ ກິ່ງພັນທີ່ເໝາະສົມໃນການນຳມາຂະຫຍາຍພັນ ຕ້ອງເປັນກິ່ງທີ່ສົມບູນ ບໍ່ອ່ອນ ຫຼື ແຂງເກີນໄປ ໂດຍສັງເກດເບິ່ງຈາກສີຂອງເປື້ອນຄວນມີສີ ນ້ຳຕານ ແລະ ຂຽວ ກິ່ງພັນຊາທີ່ຕັດຍອດແລ້ວຍັງບໍ່ສາມາດນຳໄປປັກຊຳໃນໜານໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງ ເກັບໄວ້ໃນທີ່ຊຸ່ມເຢັນ ເຊັ່ນ: ຖົງຢາງພິມນ້ຳ ແລະ ຄວນປັກຊຳພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ.

ໝານກຳເນີດຄວນມີຂະໜາດກວ້າງ 1-1.5 ແມັດ ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ຄວນ ມີ pH ບໍ່ເກີນ 5.5 ແລະ ມີອິນຊີວັດຖຸນ້ອຍ ເຊິ່ງວັດສະດຸກຳເນີດທີ່ເໝາະທີ່ສຸດຄືດິນແດງ (red soil) ວິທີການກຳແມ່ນໃຫ້ຕັດກິ່ງຊາໃຫ້ມີຄວາມຍາວປະມານ 6-8 ຊັງຕີແມັດ ມີ 1 ໃບ ແລະ 1 ຂໍ້ ສຳລັບຊາອັສສຳ ຫຼື 1 ໃບ 2 ຂໍ້ ສຳລັບຊາຈີນ (ຕັດໃບອອກເຄິ່ງໜຶ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄາຍນ້ຳ) ແລ້ວນຳມາຈຸ່ມຮໍໂມນເລັ່ງຮາກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການອອກຮາກຂອງກິ່ງກຳເນີດໄວ ແລະ ສະໝໍ່າ ສະເໝີຫຼາຍຂຶ້ນ ເອົາກຳເນີດປັກລົງໃນໜານ ຫຼື ກຳໃນຖົງຢາງ ໂດຍໃຫ້ສ່ວນໂຄນຂອງກິ່ງງຽມມຸມ

45 ອົງສາ ກັບພື້ນຈັດໃບໃຫ້ຫັນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ຖ້າຊຳໃນໜານຄວນໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ ຂອງກິ່ງກຳ 5 ຊັງຕີແມັດ ລະຫວ່າງແຖວ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຊ້ຖົງຢາງໃສ່ຄຸມປົກໝານກຳ ເບ້ຍເປັນອຸໂມງເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຫຼຸດການສູນເສຍນ້ຳຈາກໃບ ເຮືອນກຳເນີດຄວນມີ ຄວາມຊຸ່ມບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 90% ການໃຫ້ນ້ຳຄວນໃຫ້ 2 ວັນ/ເທື່ອ ຫຼືວັນລະເທື່ອ ຫຼັງກຳປະມານ 3~4 ເດືອນ ຫຼື ເມື່ອກິ່ງກຳແຕກຍອດເກີດໃບແທ້ 2~3 ໃບ ແລ້ວໃຫ້ເອົາຖົງຢາງປົກໝານອອກ ການຊຳໃນໜານກຳເນີດຮາກຈະເລີນດີແລ້ວກໍ່ສາມາດແຍກໄປຊຳຕໍ່ໃນຖົງຢາງຂະໜາດ 6x12 ນິ້ວ ຫຼື ລົງຕໍ່ໄປໃນໜານຊຳຈີນອາຍຸ 10~12 ເດືອນ ຫຼື ຈົນຕົ້ນສູງປະມານ 15~20 ຊັງຕີແມັດ

ກໍ່ສາມາດຍ້າຍລົງໄປປູກໃນໝານໄດ້ ໂດຍຊ່ວງກ່ອນຍ້າຍລົງປູກ 2 ອາທິດ ຄວນຕັດຍອດເພື່ອ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ຍອດແຕກກົງຂ້າງ ເຮັດໃຫ້ຊົງຜຸ່ມແຜ່ຂະຫຍາຍອອກ.

3. ການຕິດຕາຕ່ຳກົງ

ການຕິດຕາຕ່ຳກົງ ວິທີນີ້ສາມາດໃຊ້ຕົ້ນພັນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕດີໂດຍການນຳຍອດພັນດີມາຕໍ່ກັບຕົ້ນຕ່ຳທີ່ໄດ້ຈາກເມັດຊາປ່າ ຊຶ່ງມີກາປັບຕົວເຂົ້າ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ເມື່ອຮອຍແຜປະສານກັນດີແລ້ວສາມາດນຳໄປປູກໃນໝານໄດ້
ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຈາກການປັກຊາ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນພັນທີ່ໄດ້ຈາກການປັກຊາ ຈະບໍ່ມີ
ຮາກແກ້ວ ດັ່ງນັ້ນໃນພື້ນທີ່ຂາດນ້ຳ ຂາດການຊົນລະປະທານ ການກະຈາຍຕົວຂອງນ້ຳຝົນບໍ່ດີພໍ
ໃນເຂດພູເຂົາສູງ ຈຶ່ງຄວນຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການຕ່ຳກົງ ເນື່ອງຈາກວິທີນີ້ຈະເຮັດ ໃຫ້ຕົ້ນກ້າທີ່ມີ
ລະບົບຮາກແກ້ວແຂງແຮງ ສາມາດລໍລຽງອາຫານ ແລະ ນ້ຳໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດຍອດຊາສົດທີ່ເປັນຊາພັນດີ ມີຄຸນນະພາບ.

4. ການຕ່ຳກົງໂດຍການສູບກົງ (Cleft grafting)

ໃຫ້ຕັດຕົ້ນຕ່ຳຈາກຕົ້ນຕ່ຳທີ່ໄດ້ຈາກການເພາະເມັດ ທີ່ມີລຳຕົ້ນຂະໜາດ
ເທົ່າກັບສິດຳ ຍາວປະມານ 15-25 ຊັງຕີແມັດ ອາຍຸປະມານ 1-1.5 ປີ ໂດຍໄຊ້ມີດຕັດຕົ້ນຕ່ຳເປັນ
Stock ສູງປະມານ 8-12 ຊັງຕີແມັດ ຜ່າຕົ້ນຕ່ຳເລິກປະມານ 1-1.5 ນິ້ວ ຈາກນັ້ນຕັດກົງພັນດີ
ໃຫ້ມີຕາແລະໃບຕິດ 2-3 ຕາ ແລ້ວປາດສ່ວນລຸ່ມຂອງກົງພັນດີເປັນຮູບຫຼັ້ມ ເຜີຍຮອຍຕ່ຳເທິງຕົ້ນຕ່ຳ
ແລ້ວສູບກົງພັນດີເຂົ້າໄປໃນສ່ວນຂອງຕົວຕ່ຳທີ່ຜ່າໂດຍໃຫ້ສ່ວນຂອງກົງພັນດີປາດເປັນຮູບຫຼັ້ມ
ຕິດແໜ້ນກັບຕົ້ນຕ່ຳທີ່ຜ່າ (ໃຫ້ເນື້ອເຍື້ອຈະເລີນກົງກັນ) ພັນດ້ວຍຜ້າຢາງ ແລະ ປັດຮອຍແຜໃຫ້
ແຈບແລ້ວໃຊ້ຖົງຢາງໜາດໃຫຍ່ຄຸມໄວ້ເຮັດອັນບັງຮົ່ມ ເພື່ອປ້ອງການການແຫ້ງຂອງກົງພັນດີ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີເປົ້າເຊັນການຈອດຕິດດີຂຶ້ນ ຕົ້ນຕ່ຳ ແລະ ກົງພັນດີຈະຈອດຕິດກັນ ພາຍໃນ 45
ວັນ.

ການຕ່ຳກົງໂດຍວິທີສູບກົງ ສາມາດໃຊ້ໃນການປ່ຽນພັນຊາໃນສະຖານທີ່ປູກຊາ ທີ່ມີອາຍຸ
ຫຼາຍປີໄດ້ດ້ວຍໂດຍສູບກົງພັນດີ 2 ກົງຕ່ຳຕົ້ນຕ່ຳ 1 ຕົ້ນ.

5. ການຕິດຕາ (Budgrafting)

ກະກຽມຕົ້ນຕ່ຳທີ່ສົມບູນ ໄວ້ຊຸດເປືອກຕົ້ນຕ່ຳ ເປັນຮູບຕົວ T ຂະໜາດ
ຄວາມຍາວ 1.5 x 3 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ຕ່ຳແໜ່ງຮອຍຊູດຢູ່ເທິງພື້ນດິນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ
ເສື່ອນແຜ່ນຕາພັນດີຂະໜາດ 2 ຊັງຕີແມັດ ອອກມາແກະເນື້ອໄມ້ອອກແລ້ວນຳໄປສອດເຂົ້າກັບ
ຮອຍຊູດຂອງຕົ້ນຕ່ຳກົງມໄວ້ແລ້ວໃຊ້ ປລາດສະຕິກໃສ່ພັນປັດຮອຍແຜ ໂດຍພັນຈາກທາງລຸ່ມຂຶ້ນ
ທາທາງເທິງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 3-4 ອາທິດ ຮອຍແຜທີ່ຕິດຕາຈະເຊື່ອມຕິດກັນ ຕັດແຕ່ງກົງທີ່ຢູ່ເໜືອ
ຕາຂຶ້ນໄປ 2 ຊັງຕີແມັດ ອອກ ແລະ ສ່ວນຈະເລີນຂອງຕົ້ນຕ່ຳທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຕາພັນດີຕ້ອງຕັດອອກ
ຈົນກວ່າກົງພັນດີຈະເລີນເປັນໝໍ້.

6. ການເພາະລ້ຽງເນື້ອເຍື້ອ

ການເພາະລ້ຽງເນື້ອເຍື້ອ (Tissue Culture) ເປັນວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ ຕົ້ນພັນຄັ້ງລະຈຳນວນຫຼາຍ ປາສະຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ ພັນ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ສຳລັບ ການເພາະລ້ຽງເນື້ອເຍື້ອຊາຍຢູ່ໃນຂັ້ນການສຶກສາວິໄຈພັດທະນາ ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດຈະເປັນ ວິທີການໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດທຳໃຫ້ຂະຫຍາຍພັນຊາພັນດີ ໄດ້ຢ່າງ ໃວວາ.

6.3. ການປູກ ແລະ ການຈັດການສວນຊາ

6.3.1. ປັດໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການປູກຊາ

ຊາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ໃນພູມິປະເທດຕ່າງໆກັນ ຄືສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ບໍ່ວ່າອາກາດຮ້ອນ ຫຼື ໜາວຍົກເວັ້ນແຕ່ພື້ນທີ່ທີ່ມີນ້ຳແຂງ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ບໍລິເວນ ເສັ້ນຂະໜານທີ 29 ອົງສາ ເໜືອ ກັບເສັ້ນແວງ 98 ອົງສາຕາເວັນອອກ.

ປັດໃຈສຳຄັນໃນການປູກຊາ ຄວນພິຈາລະນາຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄື:

1. ດິນ: ຊາຈະເລີນງອກງາມໃນດິນຜຸຜູ້ ທີ່ມີການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ໜ້າດິນມີອິນຊີວັດ ຖຸສູງ ມີທາດໄນໂຕຣເຈນ ຫຼາຍ ແລະ ດິນເປັນກົດເລັກນ້ອຍ ມີ pH 4.5-6.0 ຄວາມລາດຊັ້ນບໍ່ ເກີນ 45 ອົງສາ.
2. ຄວາມຊຸ່ມ: ແລະ ປະລິມານນ້ຳຝົນ ຄວນເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຝົນຕົກສະໝໍ່າສະເໝີ ຕະ ຫຼອດປີ ປະລິມານນ້ຳຝົນຢ່າງຕ່ຳຄວນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 40-50 ນິ້ວ/ປີ ຫຼື 1.140-1.270 ມິນລິແມັດ ຕໍ່ປີ ເພາະຖ້າຂາດນ້ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊາຢຸດສະງັກໃນການຈະລິນເຕີບໂຕ ບໍ່ແຕກຍອດ ເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ .
3. ອຸນຫະພູມ: ຊາສາມາດຈະເລີນໄດ້ໃນອຸນຫະພູມ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຊາຈະເລີນ ເຕີບໂຕດີໃນ ຊ່ວງອຸນຫະພູມລະວ່າງ 25-30 ອົງສາເຊລຊຽສ ແລະ ອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ ຕະຫຼອດປີ ເຮັດໃຫ້ຊາສ້າງຍອດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ .
4. ຄວາມສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ: ຊາທີ່ປູກໃນທີ່ສູງແຕ່ 1.000 ແມັດຂຶ້ນໄປ ມີອາກາດ ເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໃບຊາ ທີ່ໄດ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃບຊາມີກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດດີ ແຕ່ປະລິ ມານຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຈະຕ່ຳ ສ່ວນການປູກຊາໃນທີ່ຕ່ຳ ອາກາດຂ້ອນຂ້າງຮ້ອນ ຊາຈະໄດ້ຜົນຜະ ລິດສູງ ແຕ່ຄຸນນະພາບຈະຕ່ຳກວ່າຊາທີ່ປູກໃນດິນສູງ.

ປັດໃຈທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການປູກຊາ

1. ດິນຊັ້ນລຸ່ມເປັນຫີນ ເຮັດໃຫ້ຊາຍັງຮາກລົງໄປຫາອາຫານໄດ້ຕື່ນ .
2. ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີການລະບາຍນ້ຳ ເປັນໜອງບັງ ແລະ ທີ່ທີ່ມີນ້ຳຂັງ.
3. ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຫີນປູນ ແລະ ມີ pH ເກີນກວ່າ 6 .
4. ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄອຍຂຸ້ນຫຼາຍ
5. ດິນທີ່ມີອິນຊີວັດຖຸນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກັບຄວາມຊຸ່ມຂຶ້ນໄດ້.

6. ບໍລິເວນມີລົມແຮງຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດທີ່ບັງລົມໄດ້
7. ເປັນບ່ອນທີ່ມີຂີ້ກະເດືອນຝອຍ

6.3.2 ການປູກ ແລະ ການຈັດການ

1. ການກຽມດິນ

ຄວນມີການໄຖ່ປັ້ນໜ້າດິນ ແລະ ໄຖ່ພວນ ເພື່ອ ປັບໂຄງສ້າງຂອງດິນ ແລະ ກໍາຈັດວັດຊະພຶດ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ກ່ອນປູກ ຖ້າປູກໃນພື້ນທີ່ທີ່ຮ້ອຍຊັນ ຕັ້ງແຕ່ 5 ອົງສາ ຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງວາງແນວປູກຕາມຂັ້ນໄດ ເພື່ອຫຼຸດການພັງທະລາຍຂອງດິນ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມກ້ວາງ ຂວາງຂອງຂັ້ນໄດ ຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງແມັດ.

ໄລຍະປູກ:

ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຄວາມອຸດົມສົມບູນໂດຍຍຶດຫຼັກການທີ່ວ່າດິນບໍ່ດົນປູກຖີ່ ດິນດີປູກຫ່າງ.

ລະຍະປູກ (ແມັດ) ແຖວ X ຕົ້ນ	ຈຳນວນຕົ້ນ/ໄລ່
2 x 1	SCO
1.5 x 0.75	1.420
1.2 x 0.00	2.200

2. ການກຽມຊຸມປູກ

ຊຸມປູກຄວນມີຂະໜາດ ກ້ວາງ x ຍາວ x ເລິກ ປະມານ 50 x 50 x 50 ຫຼື 50 x 50 x 70 ຫຼື 25 x 25 x 50 ຊຸມ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນຊາ ສາມາດແທງຮາກລົງໄດ້ເລິກ ແລະ ໄດ້ໄວ.

3. ການປູກຊາ

ຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມຄວນເປັນຊ່ວງຕົ້ນຝົນ ປະມານເດືອນ ພຶດສະພາ ເຖິງເດືອນມິຖຸນາ ພາຍຫຼັງຈາກມີຝົນຕົກ 2-3 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພໍ ຕົ້ນກ້າທີ່ຈະນຳມາປູກ ຖ້າປູກຈາກຕົ້ນເພາະເມັດ ຄວນມີອາຍຸ 18-24 ເດືອນ ຕົ້ນປັກຊາຄວນມີອາຍຸ 18 ເດືອນ ຄວນຈະລົດການໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ບັງແສງ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ກົ່ງຊາພ້ອມສຳລັບການຍ້າຍປູກ ກ່ອນປູກ ຄວນຮອງພື້ນຊຸມດ້ວຍດິນປະສົມປຸຍ ຟອສະຟໍ ອັດຕາ 40-50 ກຣາມ ເມື່ອນຳຕົ້ນຊາລົງປູກ ໃຫ້ເລິກເທົ່າກັບລະດັບທີ່ເຄີຍຢູ່ໃນຖົງຊາ ຫຼື ແປງຊາ ຈາກນັ້ນຖິມໃຫ້ແໜ້ນ ດ້ວຍດິນຊັນລຸ່ມ ປະສົມກັບຝຸ່ນປົ່ມ ຫຼື ຝຸ່ນຄອກ ທີ່ສະລາຍຕົວດີແລ້ວ ອັດຕາ 1-2 ກິໂລກຣາມ ຖິມດິນໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວຫົດນ້ຳທັນທີ ຄວນຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງຄຸມດິນ .

4. ການໃຫ້ນ້ຳ

ຊາເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມສູງ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດປີ ເພື່ອໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງກົງ ແລະ ໃບ ການໃຫ້ນ້ຳໃນສວນຊາມີ 3 ແບບ ຄື :

- 1) ການໃຫ້ນ້ຳແບບປ່ອຍໃຫ້ທ້ວມແປງ: ພື້ນທີ່ປູກຊາຈະຕ້ອງມີແຫລ່ງນ້ຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວນມີຄວາມຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍ ເພື່ອການລະບາຍນ້ຳ.
- 2) ການໃຫ້ນ້ຳແບບພົ້ນຝອຍ: ເປັນການໃຫ້ນ້ຳທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ປູກຊາໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ : ອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ໄຕ້ຫວັນ ວິທີນີ້ຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍແຕ່ໃຫ້ຜົນຄຸ້ມຄ່າ.
- 3) ການໃຫ້ນ້ຳແບບຢຶດ: ເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ຂາດແຄນນ້ຳ ເຊັ່ນ : ການປູກຊາເທິງທີ່ສູງ ເພາະເປັນການໃຊ້ນ້ຳແບບປະຢັດ ແຕ່ການລົງທຶນຂ້ອນຂ້າງສູງ.

5. ການເຮັດໄມ້ບັງຮົ່ມ

ຊາມີຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມເງົາ ຄືກັບໂກໂກ້ ແລະ ກາເຟ ການເຮັດໄມ້ບັງຮົ່ມຈະຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມໃນຊ່ວງມື້ເວັນລົງ ຫຼຸດປະລິມານຂອງແສງແດດທີ່ສ່ອງມາຍັງຕົ້ນຊາ ໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ໃບຊາ ສາມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພາະຖ້າຕົ້ນຊາໄດ້ຮັບແສງແດດກ້າເຕັມທີ່ໂດຍກົງຈະເຮັດໃຫ້ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຫຼືອງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດໃບໄໝ້ ໃບຊາບໍ່ມີການປຸງອາຫານ ຕົ້ນຈະຊຸດໂຊມ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ ການປູກໄມ້ບັງຮົ່ມ ຄວນປູກລະຫວ່າງແຖວຊາ ຊຶ່ງໄມ້ບັງຮົ່ມຊາ ທີ່ນິຍົມປູກມີ 2 ຊະນິດຄື :

- **ໄມ້ບັງຮົ່ມຊົ່ວຄາວ:** ເມື່ອປູກຊາໃໝ່ໆ ຕົ້ນຊາຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ ແລະ ໃນບໍລິເວນນັ້ນບໍ່ມີໄມ້ບັງຮົ່ມປ່າທຳມະຊາດຢູ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປູກໄມ້ບັງຮົ່ມຖາວອນໄວ້ກ່ອນ ການປູກໄມ້ບັງຮົ່ມຊົ່ວຄາວຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ພຶດທີ່ໃຊ້ເປັນໄມ້ບັງຮົ່ມຊົ່ວຄາວ ໄດ້ແກ່ຖົ່ວແຮ ຕົ້ນກ້ວຍ ... ການປູກໄມ້ບັງຊົ່ວຄາວ ຄວນປູກລະຫວ່າງແຖວຕົ້ນຊາ ໂດຍປູກໄປຕາມແລວຂວາງກັບແສງແດດ ແລະ ຄວນປູກ ກ່ອນການປູກຊາປະມານ 6 ເດືອນ ເຖິງ 1 ປີ.

- **ໄມ້ບັງຮົ່ມຖາວອນ:** ອາດເປັນໄມ້ບັງຮົ່ມປ່າທຳມະຊາດ ຫຼື ຈະປູກໃນແປງໄວ້ກ່ອນປູກຊາປະມານ 1 ປີ ຄືປູກໃຫ້ໄມ້ບັງຮົ່ມ ມີພູມໃບພໍທີ່ຈະເປັນຮົ່ມຊາໄດ້ ຫຼື ຈະປູກໄມ້ບັງຮົ່ມຊົ່ວຄາວກໍໄດ້ ເມື່ອໄມ້ບັງຮົ່ມຖາວອນໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະເປັນຮົ່ມຊາໄດ້ ກໍຄ່ອຍໆຕັດໄມ້ບັງຮົ່ມຊົ່ວຄາວອອກ ພຶດທີ່ຈະໃຊ້ເປັນໄມ້ບັງຮົ່ມ ຖາວອນໄດ້ແກ່ ແຄຜຮັ່ງ ຕົ້ນທອງ ກະຖິນ.

ປະໂຫຍດຂອງໄມ້ບັງຮົ່ມ: ຊ່ວຍປ້ອງກັນການພັງທະລາຍຂອງດິນ ຫຼຸດ ຜ່ອນປະລິມານແສງແດດໃຫ້ນ້ອຍລົງ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນດິນ ປ້ອງກັນແຮງ ປະທະຂອງນ້ຳ ຝົນທີ່ຊະລ້າງດິນ ສຳ ລັບພຶດຕະກຸນຖົ່ວທີ່ໃຊ້ເປັນໄມ້ບັງຮົ່ມ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະລິ ມານທາດ ໂນໂຕຣເຈນ ໃນດິນ ແລະ ເມື່ອໄມ້ ບັງຮົ່ມ ໜາທົບເກີນໄປ ຄວນຕັດກົງຖິ້ມເພື່ອ ໃຫ້ຕົ້ນຊາໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ .

6. ການກຳຈັດວັດຊະພຶດ

ວັດຊະພຶດຕ່າງໆ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງຊາ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນຊາທີ່ຍັງນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນກຳຈັດ ວັດຊະພຶດ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ໃນການສ້າງສວນຊາ ຄວນເຮັດຢ່າງນ້ອຍປີລະ 3 ຄັ້ງ ໂດຍການພວນດິນໃນລະດັບຕົ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບກະເທືອນ

ເຖິງລະບົບຮາກ ການໃຊ້ສານເຄມີ ກຳຈັດ ວັດຊະພຶດ ກໍ່ເປັນວິທີການສະດວກ ແລະໄດ້ຜົນດີ ນອກຈາກນີ້ການປູກພືດຄຸມດິນ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸຄຸມດິນ ຈະຊ່ວຍ ຍັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງວັດຊະພຶດໄດ້.

7. ການຄຸມດິນ

ປະໂຫຍດຂອງການຄຸມດິນຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ໃນດິນ ເພີ່ມອິນຊີວັດຖູໃນດິນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນກົດໃນດິນ ຫຼຸດຜ່ອນການພັງທະລາຍຂອງດິນ ປ້ອງກັນແຮງປະທະຂອງນ້ຳຝົນ ຫຼຸດຜ່ອນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງວັດຊະພຶດ ເປັນຕົ້ນ .

- **ວັດສະດຸຄຸມດິນ ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ຄຸມດິນ :** ໄດ້ແກ່ໄປໄມ້ແຫ້ງ ທ້າຍແຫ້ງ ເຟືອງ ແກບ ຕົ້ນສາລີແຫ້ງ ເຟືອງ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍຄຸມອ້ອມໂຄນຕົ້ນຊາ ໃຫ້ຫ່າງຈາກໂຕຕົ້ນ ປະມານ 3-5 ນິ້ວ .

- **ພືດຄຸມດິນ:** ພືດຄຸມດິນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນພືດເປັນເຄືອໃຊ້ປູກລະວ່າງແຖວ ຊາ ປະໂຫຍດຂອງພືດຄຸມດິນຊ່ວຍປ້ອງການແຮງກະທົບຂອງນ້ຳຝົນ ບໍ່ໃຫ້ດິນຖືກແສງແດດແຮງ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ ອຸນຫະພູມໃນດິນ ເພີ່ມອິນຊີວັດຖູໃນດິນ ປ້ອງກັນການພັງທະລາຍຂອງດິນ ລົດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງວັດຊະພຶດ ເປັນຕົ້ນ ສຳລັບພືດຄຸມດິນຕະກູນ ຖົ່ວ ຈະເພີ່ມທາດ ໃນໂຕຮເຈນ ໃນດິນ ຕົວຢ່າງ ພືດຄຸມດິນ ເຊັ່ນ: *Calopogonum mucuroides*, *Pueraria Phaeoloide*, *Centrosema pubescens*.

8. ທາດອາຫານ

ໃນສະພາບການ ຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິຕົ້ນຊາຈະດູດທາດອາ ຫານຈາກດິນໃນປະລິມານທີ່ພໍພຽງທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດ ແຕ່ອາຫານກໍອາດຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າທາງ ໃບໄດ້ແດ່ແຕ່ໃນປະລິມານເລັກນ້ອຍຈາກອາກາດ ແລະ ນ້ຳຝົນ ທາດຕົ້ນຊາໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຊາ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງຊາ ລົດລົງ ແຕ່ຖ້າ ໄດ້ຮັບອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊາຕາຍໄດ້ ເນື່ອງຈາກເກີດປະຕິກິລິຍາ *Plasmolysis* ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊາສູນເສຍນ້ຳ ອອກມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນແຫ່ວຕາຍໄດ້.

ທາດອາຫານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການປູກຊາ ມີດັ່ງນີ້

- **ໄນໂຕຣເຈນ** ເປັນທາດທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ຂະບວນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງສານທີ່ສຳຄັນໃນພືດເຊັ່ນ: ຄໍໂຣຟິລ ຣໍໂມນນິວຄລໍໂອໂທຄ ໄລຕາມິນ ແລະ ອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຕົ້ນຊາຈະຕ້ອງການ ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼາຍກວ່າທາດອື່ນ ເພາະຈະຖືກເກັບກ່ຽວໃບ ແລະ ກິ່ງອ່ອນເປັນປະຈຳ ຕົ້ນຊາຕອບສະໜອງຕໍ່ປຸຍໃນໂຕເຈັ້ນໄວທີ່ສຸດ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ໃບຊາແປຜົນ 4 ເປັນ 8 kg ໃນການສ້າງໃບຊາຕໍ່ການໃຫ້ ໄນໂຕຣເຈນ ຫຼາຍຂຶ້ນ 1 Kg ໂດຍທົ່ວໄປ ປຸຍໄນໂຕເຈນທີ່ໃຊ້ເປັນຮູບແອມໂມນຽມຊັນເຟລດ ຫຼື ຢູເລຍ ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ດິນເປັນກົດເລັກນ້ອຍ.

ໃນຕົ້ນຊາທີ່ແຂງແຮງສົມບູນ ຈະມີລະດັບໄນໂຕເຈນຄົງທີ່ໃນໃບຊາ ຄືລະຫວ່າງ 4.5-5 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ເມື່ອປະລິມານໄນໂຕເຈນໃນຊາລົດລົງນ້ອຍກວ່າ 3 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ຕົ້ນຊາຈະສະແດງອາການຂາດໄນໂຕເຈນ ເຮັດໃຫ້ໄລຍະການແຕກຍອດສັ້ນ ລົງ ໃບປຸງເປັນສີເຫຼືອງ ໃຫຍ່ຊ້າ ໃບຂະໜາດນ້ອຍ ຍອດນ້ອຍ ຂະໜາດຍອດນ້ອຍລົງ ຂໍ້ປ້ອງ ສັ້ນລົງ ແລະ ໃບລົ້ນໃນທີ່ສຸດ .

- **ຟອສຟໍຣັສ** ເປັນທາດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ການສ້າງລະບົບຮາກ ເຮັດໃຫ້ຮາກແຂງແຮງ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍທົ່ວໄປໃນໃບຊາ ຈະມີຟອສຟໍຣັສ ປະມານ 0.3-0.9 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ຟອສຟໍຣັສ ເປັນອາຫານທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ດີ ພົບໄດ້ຫຼາຍໃນຍອດອ່ອນ ແລະ ໃບອ່ອນ ລັກສະນະການຂາດທາດຟອສຟໍຣັສ (ເມື່ອປະລິມານທາດ ຟອສຟໍຣັສ ໃນໃບຊາ P205 ນ້ອຍ ກວ່າ 0.4 ເປີເຊັນ) ຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຢຸດສະຫງົບ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮາກຊ້າລົງ ໃບມີສີເຂັ້ມ ໃບດ້ານບໍ່ສະທ້ອນແສງ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ລຳຕົ້ນອ່ອນ ໃບລົ້ນ ແລະ ກິ່ງຕາຍໃນທີ່ສຸດ ຟອສຟໍຣັສ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຄື ຫີນຟອສເຟຕ.

- **ໂປຕັສຊຽມ** ເປັນທາດອາຫານທີ່ສຳຄັນ ມີບົດບາດໃນການສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ກັບທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນຊາ ການຄວບຄຸມນ້ຳໃນຈຸລັງ ການແບ່ງຈຸລັງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຫຍິ່ງ ໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະແຫ້ງແລ້ງດົນນານ ປົກກະຕິໂປຕັສຊຽມຈະມີໃນໃບປະມານ 1.5-2.0 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ລັກສະນະການຂາດທາດໂປຕັສຊຽມ ຈະເຮັດໃຫ້ຂອບໃບປຸງເປັນສີແດງ ຜົນຜະລິດລົດລົງ ໃບລົ້ນ ຍອດກໍບໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ກິ່ງ ແລະ ຍອດອ່ອນມີນ້ອຍ ລຳຕົ້ນລົບນ້ອຍ ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ.

- **ແມກນີຊຽມ** ຕົ້ນຊາຕ້ອງການພຽງເລັກນ້ອຍ ປະລິມານ ແມກນີຊຽມ ໃນໃບຊາປະມານ 0.22 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ລັກສະນະການຂາດແມກນີຊຽມ (MgO) ຈະເຮັດໃຫ້ໃບແກ່ ຫຼື ເກີດຈຸດສີນ້ຳ ຕານ ໃນລະວ່າງເສັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຈຳນວນໃບອ່ອນ ບໍ່ຫຼຸດລົງ ແຕ່ສີໃບຜິດປົກກະຕິຈາກເວລາ ທີ່ຄວນເປັນ.

- **ມາດ** ປະລິມານ ມາດ ໃນໃບມີປະມານ 0.08-0.2 ເປີເຊັນຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ລັກສະນະການຂາດມາດ ໃບຈະມີສີເຫຼືອງ ແຕ່ເສັ້ນໃບຈະມີສີຂຽວ ຍອດໃໝ່ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ປ້ອງສັ້ນລົງ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼຸດລົງ.

- **ແຄລຊຽມ** ຈະມີສ່ວນໃນການສ້າງຜະໜັງຈຸລັງ ຊຶ່ງທາດອື່ນ ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ ໃນໃບຊາຈະມີແຄລຊຽມ ປະມານ 0.3-0.9 ເປີເຊັນ ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ລັກສະນະ ຂາດທາດແຄລຊຽມ ຈະເຮັດໃຫ້ໃບແກ່ມີສະພາບກອບ ໃບອ່ອນສີຈືດຈາງ ບໍລິເວນຂອບໃບຈະ ເກີດມີສີນ້ຳຕານໃນເວລາຕໍ່ມາ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບແຄລຊຽມຫຼາຍເກີນໄປ

ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼຸດລົງ ໃບອ່ອນເກີດເປັນສີເຫຼືອງ ໃບມ້ວນເຂົ້າດ້ານໃນ ເຮັດໃຫ້ຊົງພຸ່ມມີໃບລົດລົງ ຂອບ ແລະ ປາຍໃບ ເປັນສີນ້ຳຕານດຳ ແລະ ລົ່ນ ໃນທີ່ສຸດ .

- **ເຫຼັກ:** ໃນໃບຊາມີທາດເຫຼັກ ປະມານ 700- 1.500 ສ່ວນໃນລ້ານສ່ວນ (ppm) ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ການຂາດທາດເຫຼັກ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສ້າງຄອລໂຣຟິລ ໃນໃບຊາ.

- **ແມງກາມີສ** ໃນໃບຊາມີແມງກາມີສ ຢູ່ປະມານ 900- 1.200 ppm ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ໃບແກ່ ຂຶ້ນປະລິມານຄວາມເຂັ້ມຈະເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ການຂາດແມງກາມີສ ຈະພົບໃນດິນທີ່ມີກົດຫຼາຍ ໃບແກ່ຈະກອບ ຂອບໃບຈະມີສີເຫຼືອງ ແລະມີສີນ້ຳຕານເທິງໃບ .

- **ໂບຣອນ** ການຂາດທາດ ໂບຣອນ ຈະເຮັດໃຫ້ ເມັດຕາໂບລິຊິມໃນຕົ້ນ ຊາຫຼຸດລົງ ເປືອກຕົ້ນຊາແຕກງ່າຍ ຕົ້ນ ແລະ ໃບຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຕາຍໄດ້ ການສ້າງດອກ ແລະ ຜົນຜິດປົກກະຕິ ການຂາດທາດຈະມີຫຼາຍ ໃນດິນໜຽວ ຫຼືຊ່ວງລະດູແລ້ງ .

- **ທອງແດງ :** ໃນໃບຊາມີທາດທອງແດງ ປະມານ 20-30 ppm ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມລົດຕໍ່າ ກ່ວາ 12 ppm ຈຳເປັນຕ້ອງສົດຜົນສານທີ່ມີທາດທອງແດງ ຫຼື ສົດພົ້ນສານປ້ອງກັນເຊື້ອຣາ ເພື່ອໃຫ້ລະດັບທາດທອງແດງ ໃນໃບຊາສູງຂຶ້ນ ຊ່ວຍຮັກສາໃບໄວ້ໄດ້.

- **ອະລູມິນຽມ** ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຊາ ຄືຊ່ວຍດຳລົງ ທາດຟອສຟັຣສຂອງຕົ້ນຊາ ກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນຊາ ປະລິມານ ທາດອະລູມິນຽມ ໃນໃບ ຊາ ມີຊ່ວງລະວ່າງ 200-2.000 ppm ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ .

- **ສັງກະສີ :** ການຂາດທາດສັງກະສີປາກົດເມື່ອມີປະລິມານທາດສັງກະສີ ໃນໃບນ້ອຍກ່ວາ 10 ppm ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງ ອາການຈະເຮັດໃຫ້ປ່ອງສີນ້ຳ ຢຸດຊະກຳການຈະ ເລີນເຕີບໂຕ ປ່ຽນສີ ຍອດໂຄ່ງເປັນຮູບກ່ຽວ ເມື່ອເກີດອາການນີ້ຕ້ອງສົດພົ້ນທາດສັງກະສີ ຊັລເຟຕ ທາງໃບປະລິມານ 4 Kg ຕໍ່ນ້ຳ 200 ລິດ ໂດຍສົດພົ້ນ 3-4 ຄັ້ງ.

9. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຊາທີ່ປູກໄວ້ດົນນານ ຖ້າບໍ່ມີການໃສ່ຝຸ່ນ ຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຄ່ອຍໆ ຫຼຸດ ຕ່ຳລົງ ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ຕົ້ນຊາຈະເລີນງອກງາມ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການໃສ່ຝຸ່ນ ຊຶ່ງ ຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ມີ 2 ຊະນິດຄື:

- **ຝຸ່ນຄອກ:** ເຊັ່ນ : ຂີ້ສັດ ຂີ້ຄວາຍ ຂີ້ໄກ່ ຫຼື ຂີ້ເຈຍ ໆລໆ ໃສ່ຕົ້ນລະ 2-3 ກຳມີ ໂດຍໃສ່ຮອບໆຕົ້ນ ຫຼັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນຄອກແລ້ວຄວນໃຊ້ວັດຖຸຄຸມດິນຮອບໆ ໂຄນຕົ້ນຊາ ເພື່ອປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງວັດຊະພືດ.

- **ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ** ຝຸ່ນວິທະຍາສາດທີ່ສຳຄັນມີຢູ່ 3 ຊະນິດຄື :
ໄນໂຕເຈນ ພົດສຟັຣສ ແລະ ໂປແຕດຊຽມ ໄນໂຕເຈນຈະຢູ່ໃນຮູບແອມໂມນຽມຊັ້ນເຟດ ຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນແຂງແຮງ ແລະ ເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໃບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຜະລິດສູງ ຟອສ

ພໍຣັສ ຈະຢູ່ໃນຮູບຊູເບີຟອສເຟດ ຫຼື ດັບເປັນຊູເບີຟອສເຟດ ຫຼື ທຣີເບິນຊູເບີຟອສເຟດ ໆລໆ ຟອສພໍຣັສ ເຮັດໃຫ້ກິ່ງ ກ້ານ ລຳຕົ້ນຈະເລີນເຕີບໂຕ ລະບົບຮາກແຂງແຮງ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາຍ ໂປຕັດຊຽມຈະຢູ່ໃນຮູບໂປຕັດຊຽມໄດອອກໄຊ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນພືດ ຄວບຄຸມລະບົບການສັງເຄາະແສງ ຫຼຸດຜ່ອນການລະເຫີຍນ້ຳຂອງໃບ ແລະ ເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ພະຍາດໄດ້ດີຂຶ້ນ.

10. ວິທີໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນຊາ

ຄວນໃສ່ຝຸ່ນທີ່ມີທາດຟອສພໍຣັສ ຮອງກິນຊຸມກ່ອນປູກ ຊຸມລະ 50 ກຣາມ ສ່ວນໄນໂຕເຈນເປັນທາດທີ່ສະລາຍຕົວໄດ້ງ່າຍ ຄວນແບ່ງໃສ່ 2-3 ຄັ້ງໆ ລະເທົ່າໆ ກັນ ຄວນໃສ່ຊ່ວງຕົ້ນ ແລະ ປາຍລະດູຝົນ ຫຼື ຫຼັງຈາກການຕັດແຕ່ງກິ່ງດ້ວຍໂດຍໂຮຍຝຸ່ນຮອບໂຄນຕົ້ນ ຕາມຮັດມີຊົງພຸ່ມ ຫຼື ໂຮຍຕາມແນວແຖວຊາ ຫ່າງປະມານ 1 ຟຸດ ແລ້ວພວນກົບຝຸ່ນຄອກ ຄວນໃສ່ປີລະ 1 ຄັ້ງ.

ການໃສ່ປຸ່ຍໃຫ້ແກ່ຕົ້ນຊາໃນຊ່ວງອາຍຸຕ່າງໆ

ອາຍຸຕົ້ນຊາ	ສູດປຸ່ຍ	ຈຳນວນຝຸ່ນ/ຕົ້ນ/ປີ	ຝຸ່ນຄອກ/ຕົ້ນ/ປີ
ປີທີ 1	15-15-15		---
ປີທີ 2	46-00-00 15-15-15		---
ປີທີ 3	46-00-00 15-15-15		5 ກິໂລກຣາມ
ປີທີ 4	46-00-00 15-15-15		5 ກິໂລກຣາມ
ປີທີ 5 ເປັນຕົ້ນໄປ	46-00-00 15-15-15		5 ກິໂລກຣາມ

11. ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຊາ

ເປັນການປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງໃນການເຮັດສວນຊາ ວັດຖຸປະສົງເພື່ອແຕ່ງຊົງພຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຍອດໃໝ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍກຳຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້.

ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຊາມີ 2 ລະບົບ ຄື :

1) ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຕົ້ນຊາອາຍຸນ້ອຍທີ່ປູກຈາກເມັດຫຼືກິ່ງປັກຊຳ ໂດຍຈະເລີ່ມຕັດແຕ່ງກິ່ງຫຼັງຈາກປູກແລ້ວດັ່ງນີ້ :

ປີທີ 1 ຄວນຕັດກິ່ງສູງ 20 ຊັງຕີແມັດ ຈາກລະດັບດິນ

ປີທີ 2 ຄວນຕັດກິ່ງສູງ 30 ຊັງຕີແມັດ ຈາກລະດັບດິນ

ປີທີ 3 ຄວນຕັດກິ່ງສູງ 40 ຊັງຕີແມັດ ຈາກລະດັບດິນ

ປີທີ 4 ຄວນຕັດກິ່ງສູງ 50 ຊັງຕີແມັດ ຈາກລະດັບດິນ

ແລະ ຈະເລີ່ມເກັບຍອດຊາທີ່ລະດັບ 60 ຊັງຕີແມັດ ຫຼັງຈາກເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ 2-3 ປີ ໃຫ້ເຮັດການ ຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ສູງຈາກພື້ນດິນ 55 ຊັງຕີແມັດ ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃຫ້ປະໂຫຍດຫ່າງ 3-4 ປີ ແລະ ຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ສູງປ່ເກີນ 2.5 ຊັງຕີແມັດ ຈາກຮອຍຕົ້ນເດີມ ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຕົ້ນຊາຄວນກະເຮັດໃນຊ່ວງຕົ້ນຊາພັກຕົວ ລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ ເຖິງ ມັງກອນ.

2) ການຕັດແຕ່ງກິ່ງຕົ້ນຊາທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍ ຄວນຕັດໃຫ້ສູງຈາກພື້ນດິນ 50-60 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ສ່ວນເທິງຊົງພຸ່ມລຽນສະເໝີກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ.

12. ການເກັບກຸ່ວຊາ

ການເກັບກຸ່ວຊາເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະການຜະລິດຊາໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບດີ ນັ້ນຕ້ອງເລີ່ມຈາກໃບຊາສົດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃບຊາສົດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດຄື : ໃບຊາທີ່ເກັບຈາກຍອດຊາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 1 ຍອດ ກັບ 2 ໃບ ການເກັບຊາຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມີນາ ຈົນເຖິງເດືອນພະຈິກ ໂດຍສະເລ່ຍຈະເກັບຍອດຊາ 10 ມື້ຕໍ່ເທື່ອ ຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ໃນການເກັບກຸ່ວຍອດຊາຈະຢູ່ປະມານ 05.00-14.00 ໂມງ. ການເກັບຍອດຊາຈະຕ້ອງບໍ່ອັດແໜ້ນໃນກະຕ່າ ຫຼື ກະສອບ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຊາຊຳ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາເສຍໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຫາຍໃຈຂອງໃບຊາ ຫຼັງຈາກເກັບກຸ່ວແລ້ວ ຄວນຮີບເອົາສົ່ງໂຮງງານຜະລິດ ພາຍໃນ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຈະໄດ້ຜະລິດຊາຄຸນນະພາບດີ.

13. ການປັບປຸງສວນຊາເກົ່າ

ສວນຊາທີ່ປູກໄວ້ຕາມທຳມະຊາດມັກຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳ ແຕ່ການສ້າງສວນໃໝ່ຈະຕ້ອງມີການລົງທຶນສູງ ຊາວກະສິກອນຂາດຜົນຜະລິດໃນຊ່ວງທຳອິດ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນບໍ່ມີລາຍໄດ້ ການປັບປຸງສວນຊາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນແນວທາງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ຊາວກະສິກອນຍອມຮັບໄດ້ງ່າຍ ການປັບປຸງສວນເກົ່າ ໃຫ້ມີຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນກະເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ :

- **ປູກຊາເສີມ** ໃນສວນຊາທີ່ມີທີ່ຫວ່າງຢູ່ໃຫ້ເຕັມພື້ນທີ່ ທັງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວ.

- **ຕັດແຕ່ງກິ່ງ ແລະ ຊົງພຸ່ມຕົ້ນຊາທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍ** ໂດຍຕັດແຕ່ງກິ່ງໃຫ້ສູງຈາກພື້ນດິນປະມານ 50-60 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຕັດກິ່ງທີ່ເປັນພະຍາດ ຄອດ (ບ່ຽາມ) ອອກໄປ ຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມຄືໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ປະມານເດືອນທັນວາເຖິງມັງກອນ ການຕັດແຕ່ງຄວນແບ່ງແປງຕັດແຕ່ງແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂາດລາຍໄດ້ໃນຊ່ວງການ ຕັດແຕ່ງ.

- **ການໃສ່ຜຸ່ນ** ຜຸ່ນທີ່ເໝາະຈະໃຊ້ກັບຕົ້ນຊາຄວນເປັນຜຸ່ນສູດ 15-15-15 ໂດຍໃສ່ປີລະ 2 ເທື່ອ ເທື່ອ ລະ 200-300 ກຣາມ/ຕົ້ນ ຫຼື 0.5 ກິໂລກຣາມ/ຕົ້ນ/ປີ ໂດຍໃສ່ໂຮຍຮອບໆ ຕົ້ນຕາມຮັດມີຊົງຟຸ່ມ.
- **ໃນລະດູແລ້ງ** ຄວນໃຫ້ນ້ຳ ຫຼື ໃຊ້ວັດສະດຸຄຸມດິນ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ.

6.3.3 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູຊາ

ກ. ພະຍາດຂອງຊາ ມີດັ່ງນີ້ :

1. ພະຍາດໃບພຸພອງ

ເຊື້ອສາເຫດ ເກີດຈາກເຊື້ອ *Exobasidium Vexsans* (Masse)

ອາການຂອງພະຍາດ ຈະເຫັນເປັນຈຸດກົມນ້ອຍສີປົວອ່ອນ ຫຼື ສີຈາງເທິງໃບອ່ອນຂອງຊາໃນລະດູຝົນ ຕໍ່ມາຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຈົນເຖິງ 0.5-2.0 ຊັງຕີແມັດ ຕາແໜ່ງທີ່ເປັນພະຍາດ ມີຮອຍປູດນູນ ບໍລິເວນຜິວ ໃບດ້ານລຸ່ມຈະເປັນຈຸດກົມ ສີປົວຈາກກາຍເປັນສີແດງເຂັ້ມ ຕໍ່ມາປ່ຽນເປັນສີຂາວພູ ແລະ ມີເທົາອ່ອນ ໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອອາການພະຍາດເຖິງຂັ້ນນີ້ ກໍບໍ່ສາມາດເກັບໃບອ່ອນໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ດ້ານເທິງຂອງໃບຜິວທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ມີຮອຍບຸ່ມລົງໄປສ່ວນດ້ານລຸ່ມຂອງໃບຈະນູນອອກມາ ແລະ ປາກົດເສັ້ນໃຍຂອງເຊື້ອລາສີຂາວພູຈະແຈ້ງ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະດູແລ້ງແຜ່ທີ່ເປັນພະຍາດຈະແຫ້ງ ປ່ຽນເປັນສີເທົານ້ຳຕານ ເພື່ອຖ້າລະບາດໃນລະດູຖັດໄປ

2. ໂລກໃບຈຸດສີນ້ຳຕານ

ເຊື້ອສາເຫດ ເກີດຈາກເຊື້ອ

- 1). *Collectoricum camellae* (COOK) Battler.
- 2). *Glomerella cingulata* (stonem) S. & Sc.

ອາການຂອງໂລກ ອາການທຳອິດເລີ່ມເປັນຈຸດສີນ້ຳຕານ ແກມເຫຼືອງເທິງຜິວໃບຊາ ຕໍ່ມາອີກ 7-10 ມື້ ຈຸດສີນ້ຳຕານຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ແລະ ປ່ຽນເປັນສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ ຫຼື ດຳ ມີວົງແຫວນຮອບແຜເນື້ອເຍື່ອ ໃບທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະແຫ້ງຕາຍ ຖ້າອາການຂອງພະຍາດຮຸນແຮງຈະເຮັດໃຫ້ໃບລົ້ນ ພະຍາດນີ້ມັກເກີດກັບໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນ.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໃຫ້ເກັບໃບທີ່ເປັນພະຍາດເຜົາຖິ້ມ ແລະ ໃຊ້ສານເຄມີກຳຈັດເຊື້ອລາຊະນິດດູດຊຶມເຊັ່ນ : ເບນໂນມີວັດຕາ 500 ppm ສີດຟິນ 7 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງ ປະມານ 3 ເທື່ອ ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ໃຊ້ສະລັບກັບສານປະກອບທອງແດງ ເຊັ່ນ ຄອບເປືອກຊີຄໍໂຮ ອັດຕາ 30 ກຣາມຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດຈະໃຫ້ຜົນດີຢ່າງຂຶ້ນ.

3. ພະຍາດສາລາຍແດງ

ເຊື້ອສາຍເຫດ ເກີດຈາກເຊື້ອ *Cephaleuros parasitices* (Karst)

ອາການຂອງພະຍາດ ອາການທຳອິດເປັນຈຸດນ້ອຍໆ ສີສົມແດງເທິງໃບ ຕໍ່ມາຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫຍ່ ຂຶ້ນ ມີລັກສະນະກົມ ສີນ້ຳຕານແດງຟຸ້ງຄ້າຍຂົນສີແດງ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອ ໄປຫາກິ່ງໄດ້ ພະຍາດສາລ່າຍແດງ ໄລຍະທຳອິດ ເປັນແບບ Epiphytic ຄືເກີດເກາະຕິດຜິວໃບ ສາມາດລູບອອກໄດ້ງ່າຍແຕ່ໄລຍະຕໍ່ມາ ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນກາຍເປັນ Parasite ເສັ້ນໃຍຂອງສາລ່າຍ ຈະເລີນທະລຸໄປຍັງເນື້ອເຍື້ອ Epidermal ແລະ Paremchyma ຂອງໃບຊາ ເຊື້ອນີ້ສາມາດຢູ່ກັບໃບແກ່ ກິ່ງ ແລະ ລຳຕົ້ນໄດ້ ເມື່ອໃບອ່ອນ ແຕກອອກມາໃໝ່ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າທຳລາຍໄດ້ອີກຄັ້ງ ຕົ້ນຊາທີ່ຖືກແສງແດດກ້າ ຈະເປັນພະຍາດນີ້ຮຸນແຮງກວ່າ ຕົ້ນທີ່ຢູ່ໃນຮົ່ມ .

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໃນຕ່າງປະເທດພົບວ່າການໃຫ້ສານປະກອບ ທອງແດງ ເຊັ່ນ ຄອບເປຣອກຊີຄໍໂຣ ສາມາດໃຊ້ສິດພົ້ນປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ດີ .

4. ພະຍາດໃບຈຸດສີເທົາ

ເຊື້ອສາຍເຫດ ເກີດຈາກເຊື້ອ *Pestalotiopsis theae* (Sawada)

ອາການຂອງໂລກ ອາການທຳອິດ ເປັນຈຸດນ້ອຍໆສີນ້ຳຕານ ຕໍ່ມາ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນສີເທົາ ຈຸດແຕ່ລະຈຸດຈະຂະຫຍາຍແຜ່ລາມໄປເປັນເນື້ອດຽວກັນ ຮູບຮ່າງ ແຜບໍ່ແນ່ນອນ ເປັນແຜສີເທົາໃຫຍ່ ວົງແຫວນ ເທິງແຜ ມັກເກີດກັບໃບຊາແກ່.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ເກັບໃບທີ່ເປັນພະຍາດ ມາເຜົາຖິ້ມ ຫຼືໃຊ້ສານເຄມີ ເບນໂນບິນ ສິດພົ້ນ 2-3 ຄັ້ງ ຫ່າງກັນຄັ້ງລະ 7-10 ວັນ .

ຂ. ແມງໄມ້ສັດຕູຊາ

ປະເທດໄທ ຍັງບໍ່ມີແມງໄມ້ສັດຕູຊາທີ່ລະບາດ ທຳຄວາມເສຍຫາຍ ຮຸນແຮງໃຫ້ ແກ່ຕົ້ນຊາ ເພາະພື້ນທີ່ປູກຊາ ຢູ່ກະແຈກກະຈ່າຍ ແຕ່ລະແຫ່ງກໍ່ບໍ່ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີການດູແລຮັກ ສາໄດ້ທົ່ວເຖິງ ອີກດ້ານໜຶ່ງຍັງມີສັດຕູທຳມະຊາດ ຄອຍຄວບຄຸມ ຊຶ່ງແມງໄມ້ສັດຕູຂອງຊາ ທີ່ພົບໃນປະເທດໄທ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຄື:

1. ມວນຊາ

ຊີວິທະຍາສາດ *Helopeltis* sp ເປັນແມງໄມ້

ສັດຕູທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຂອງຊາ ເປັນແມງໄມ້ຊະນິດປາກດູດ ໂຕແກ່ ມີລັກສະນະຄ້າຍຍຸງ ລຳໂຕ ປົກ ແລະ ຂາມີສີດຳ ທ້ອງສີຂຽວ ກາງຫຼັງຈະມີສີເຫຼືອງ .

ລັກສະນະການທຳລາຍ ໃບຊາທີ່ຖືກທຳລາຍ ຈະມີຮອຍແຜໃໝ່ ເປັນວົງນ້ອຍໆ ຫຼືເປັນຈຸດໆ ເຮັດໃຫ້ຍອດ ແລະໃບອ່ອນຫົກກິ່ງໄດ້.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໃຊ້ສານໄພຣທຣອຍ ສັງເຄາະສິດພົ້ນ .

2. ໂຮແດງ

ຊີວິທະຍາສາດ (*Oligonychus Coffear* (Niether)

ລັກສະນະການທຳລາຍ ຈະດູດກິນນ້ຳລ້ຽງຈາກໃບ

ແລະ ຍອດອ່ອນ ຂອງຊາ ເຮັດໃຫ້ໃບຊາຫົດຫົງກົງ.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໄລຍະທີ່ພະຍາດລະບາດ ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກຳຈັດ Acaricide ອັດຕາ 1 ລິດ ຕໍ່ນ້ຳ 200 ລິດສົດໃຫ້ປຽກ ທັງເບື້ອງເທິງ ແລະ ເບື້ອງລຸ່ມ ສົດຄັ້ງທີສອງຫຼັງຈາກສົດຄັ້ງທຳອິດນຶ່ງອາທິດ .

3. ເພີຍອ່ອນ

ລັກສະນະການທຳລາຍ ຈະທຳລາຍໃບຊາໂດຍການດູດນ້ຳລ້ຽງ ເຮັດໃຫ້ໃບຫົງກົງ ໃບອ່ອນ ແລະມ້ວນຕຳລົງ.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ການໃຊ້ສານເຄມີ ເຊວິນ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 0.5% ສົດພົ້ນໃຫ້ທົ່ວຊົງພຸ່ມ.

4. ບັງມ້ວນໃບ

ຊີວິທະຍາສາດ (Homoma coffearia (Niether)

ລັກສະນະການທຳລາຍ ຈະທຳຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນ ຂອງຊາ ໂດຍໜອນຈະນຳໃບມາຕິດກັນ ແລ້ວກັດກິນໃບ ຕົວແມ່ເປັນແມງກະເບື້ອກາງຄືນ ອອກ ໄຂ່ເທິງໃບຊາ ເປັນກຸ່ມໆລະ 100 ນ່ວຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໄຂ່ຈະຟັກເປັນໂຕບົ່ງໃຫຍ່ຍາວ 12-20 ມິນລິແມັດ ເມື່ອເຂົ້າດັກພຽງຈະໃຊ້ຕີ້ນຊາສ້າງຮັງ.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ຕັດແຕ່ງກິ່ງຊາເປັນປະຈຳທຸກປີ ລວມກັບການໃຊ້ວິທີ ທາງຊີວະວິທີ ໂດຍ ນຳຕົວຫໍ້ ຕົວບຸນ ຕາມທຳມະຊາດເຊັ່ນ ແມງປະເພດຕໍ່ (Wasp) ມາໃຊ້.

5. ບັງຄືບ ບັງກິນກິນໃບອື່ນໆ

ລັກສະນະການທຳລາຍ ພວກບັງກິນໃບຕ່າງໆ ຈະມີການລະບາດໃນຊ່ວງຕັ້ງເດືອນມີນາ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຈະກັດກິນໃບເຮັດໃຫ້ໃບເປັນຮູ.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໃຊ້ສານເຄມີ Endosulfan 1 ລິດຕໍ່ນ້ຳ 200 ລິດ ສົດໃຫ້ປຽກທົ່ວໃບຊາ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ບັງຮົ່ມຊາ.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

1. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. 1990. ການປູກຜິດອຸດສະຫາກຳ. 78 ນ.
2. ຄຳນອນ ແສງດາລາ 1991. ຊາວສວນກາເຟລາວ. 71ນ.
3. ບຸນເກີດ ຄຳຟິກ. 2000. ແຜນນິກການປູກກາເຟ. ເອກກະສານຝຶກອົບຮົມໜ່ວຍງານກາເຟ, ໂຄງການພັດທະນາຊຸມນະບົດພູຝຽງບໍລິເວນ. 14 ນ.
4. ອັນຊະລີ ພັດມິເທດ. 2003. ຊາ. 39 ນ.