


ແບບຮຽນເພື່ອການພັດທະນາ
ຄວາມຊຳນານໃນການຜະລິດເຂົ້າ
Rice Production
Skills Development Series



ການກຳຈັດຫມູນາ

Controlling
Field Rats

RECEIVED

01 DEC 2002

ກົມປູກຝັງ ແລະສົ່ງເສີມການກະເສດ
ໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND EXTENSION
LAO-IRRI PROJECT



ໜ່ວຍງານວິກິດພິມສົ່ງເສີມການກະສິກໍາ

- 632.7
263

ການກຳຈັດທຽນາ

Controlling

Field Rats

NAFES		CETDU Central Extension Training and Development Unit
ໜ່ວຍງານ ຝຶກອົບຮົມສິ່ງເສີມ		
P.O. Box 811, Vientiane Lao P.D.R. Tel / Fax: 021 - 740252		
Acc. No.: 04:263/1	Call No.: 632.7 1PM	

ກົມປູກຝັງ ແລະສິ່ງເສີມການກະເສດ

ໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ

**DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND EXTENSION**

LAO-IRRI PROJECT

1993

ລະບຽບການ

ບົດຮຽນບົດນີ້ອະທິບາຍເຖິງສອງວິທີການກຳຈັດ ທນູໂດຍ ເນັ້ນໜັກການກຳຈັດໂດຍການໃຊ້ສານ ເຄມີ ແລະການກຳຈັດແບບພື້ນເມືອງ.

ເຫດຜົນ


ທນູນາແມ່ນສັດຕູພືດທີ່ສຳຄັນ. ການເສຍຫາຍ ຂອງຜົນຜະລິດໃນແຕ່ລະປີຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ ຈາກການທຳລາຍຂອງທນູ ປະເມີນ ໄດ້ເຖິງ 5-60 %. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເສຍ ຫາຍນັ້ນລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳ ເປັນທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອ ກຳຈັດທນູນາເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ໝົດໄປ.


ຈຸດປະສົງ

- ເມື່ອຮອດຫ້າຍຂອງບົດຮຽນນີ້ແລ້ວທ່ານຈະສາມາດ
- ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການກຳຈັດທນູໂດຍການ ນຳໃຊ້ສານເຄມີ (ເທຍິ່ອລີ້)
 - ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ເທຍິ່ອລີ້ ແລະ
 - ອະທິບາຍພາກປະຕິບັດໃນການກຳຈັດທນູ ແບບພື້ນເມືອງ.

ອຸປະກອນຕ່າງໆ

- ທີ່ງານທີ່ໄດ້ດຳເຂົ້າໃສ່ແລ້ວປະມານ 2 ອາທິດ
- ກະບອກໃສ່ເທຍິອ
- ຢາຂ້າໝູແບບຊຳເຮື້ອຊະນິດໃດກໍໄດ້ເຊັ່ນ :
ວາຣຟາຣິນ (Warfarin), ຄາວແມັຕທຣາລິລ (Coumatetralyl), ຄາວໂມໂຄລ (Coumochlor), ດີຟາຊີໂນນ (Diphacinone), ໂຄຣຟາຊີໂນນ (Chlorophacinone) ແລະອື່ນໆ.
- ຈັດຫຸປຸງແຕ່ງເຮັດເທຍິອເຊັ່ນ : ເຂົ້າປຽນ
ທຸລີເມັດສາລີ.





ປະຕິບັດງານ 1 .


ການກຳຈັດດ້ວຍວິທີການນຳໃຊ້ສານເຄມີ (ເທຍິໂອລີ້)

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

1. ຊອກບ່ອນໃສ່ເທຍິໂອ.

ຫຼັງຈາກດຳນາແລ້ວ 2 ອາທິດ, ຊອກບ່ອນໃສ່ເທຍິໂອທຸກໆເຮັກຕາໃຫ້ໄດ້ 5 ບ່ອນ, ແຕ່ລະບ່ອນຢ່າງນ້ອຍ ທ່າງກັນ 40 ແມັດ. ບ່ອນວາງເທຍິໂອໃສ່ທີ່ເໝາະສົມນັ້ນໃຫ້ໃສ່ຕາມຄູຄັນນາ ແລະ ບ່ອນສີແຍກຂອງຄູຄັນນາ.

ຈຸດໃສ່ເທຍິໂອ



2. ກຳນົດກະບອກເທຍື່ອໃສ່ແຕ່ລະບ່ອນ .

ກະບອກໃສ່ເທຍື່ອຈະແມ່ນກະປັ່ງໆ , ກະບອກໄມ້
ໄຜ່ , ກະໄປື້ະທມາກພ້າວ ແລະອື່ນໆກໍໄດ້ , ແຕ່
ຕ້ອງແມ່ນ ຊະນິດທີ່ຮັກສາບໍ່ໃຫ້ເທຍື່ອປຽກຈາກ
ການຖືກນ້ຳຝົນ .



3. ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ປະສົມຢາຂ້າໜູ.


ປະສົມຢາຂ້າໜູເຂົ້າກັບຈັດຫຸທີ່ປຸງແຕ່ງເປັນເທຢື່ອຈາກ
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ບາງຕົວຢ່າງຢາຂ້າໜູ ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງຈັດຫຸເພື່ອ
ປຸງແຕ່ງເປັນເທຢື່ອມີດັ່ງນີ້ :

ຢາຂ້າ ໜູ	ສູດປະສົມ %	ອັດຕາສ່ວນ ຢາພຶດຕໍ່ຈັດ ຫຸເພື່ອປຸງແຕ່ງ ເຮັດເທຢື່ອ*	ຈັດຫຸເພື່ອ ປຸງແຕ່ງ
- ວາຣ ຟາຣິນ	0.50	1:19	ສາລີບົດຫຼື ເຂົ້າປຽນ
- ຄາວແມັດ ທຣາລິລ	0.75	1:19	ສາລີບົດຫຼື ເຂົ້າປຽນ
- ຄາວໂມ ຄລໍຣ	1.00	1:40	ເຂົ້າສີ(ມຸ່ນ)ຫຼື ເຂົ້າປຽນ
- ດີຟາ ຊີໂນນ	1.10	1:30	ເຂົ້າສາລີ
- ໂຄລໂຣ ຟາຊີໂນນ	0.25	1:50	ເຂົ້າສາລີ

*1:19 = ທມາຍຄວາມວ່າຢາພຶດ 1 ສ່ວນແລະ
ຈັດຫຸທີ່ປຸງແຕ່ງເປັນເທຢື່ອ 19 ສ່ວນ.

4. ເອົາເທຍື່ອທີ່ປະສົມຢາເບື້ອແລ້ວໃສ່ກະບອກ.

ກະບອກເທຍື່ອນຶ່ງອັນໃສ່ເທຍື່ອ 6 ບ່ວງ
(ບ່ວງຊົດແກງ).



5. ທລັງຈາກໃສ່ເທຍື່ອໄດ້ 4 ມື້ແລ້ວຕ້ອງກວດເບິ່ງ.

ຖ້າເທຍື່ອບ່ອນໃດຖືກກິນຫມົດແລ້ວ, ໃຫ້ຕື່ມກະບອກໃສ່
ເທຍື່ອອີກ 2 ອັນ. ແຕ່ລະ 3 ກະບອກໃຫ້ໃສ່ 6 ບ່ວງ
ຕັກແກງ.

ທລັງຈາກນັ້ນແລ້ວ 4 ມື້ ໃຫ້ກວດກາເບິ່ງອີກ. ຖ້າວ່າ
ເທຍື່ອທັງຫມົດຖືກກິນຫມົດໄປແລ້ວ ໃຫ້ເພີ່ມກະບອກໃສ່
ອີກ 3 ອັນ ແລະຕື່ມເທຍື່ອໃສ່ແຕ່ລະກະບອກອີກດ້ວຍ.



6. ສືບຕໍ່ກວດກາກະບອກໃສ່ເທຍື່ອນັ້ນໃຫ້ສະຫມໍ່າ
ສະເໝີ.

ຖ້າວ່າການກິນເທຍື່ອນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ເພີ່ມຈຸດໃສ່
ເທຍື່ອຕື່ມຂຶ້ນອີກ.



7. ເຈົ້າເທຍິ່ງຜິ່ງເກີດມີເຊື້ອລາມັນອອກຖິ້ມແລ້ວ
ຕື່ມອັນໃໝ່.



8. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກໍາຈັດໝູ່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ສານ
ເຄມີເປັນເຫຍື່ອລື້ໃຫ້ໄດ້ຜົນນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຫໍາລາຍບ່ອນ
ຢູ່ອາໄສຂອງໝູ່ ໂດຍການຮັກສາໄຮ່ນາແລະບໍລິເວນ
ໃກ້ຄຽງ ໃຫ້ສະອາດຕະຫຼອດທັງຄູ່ກັນນໍ້າອີກດ້ວຍ.



9. ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ 2 ອາທິດຕ້ອງໄດ້ເກັບ
ເຈົ້າເຫຍື່ອ(ຢາຂ້າໝູ) ອອກໃຫ້ໝົດ.




ປະຕິບັດງານ 2 .

ການກຳຈັດທຽມແບບຟື້ນເມືອງ

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

1. ຈົ່ງດຳເຂົ້າໃສ່ຟື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນໃນເວລາດຽວກັນ .

ຕື່ມກ້າທີ່ໄດ້ດຳໃສ່ບໍລິເວນທີ່ງ່າອັນກ້ວາງຂວາງ ໃນເວລາດຽວກັນຈະມີການສູນເສຣຸທນ້ອຍກ່ວາບ່ອນທີ່ດຳໃສ່ເປັນຕອນໃຜຕອນມັນ .



2. ຫຼັງຈາກດຳນາແລ້ວຈຶ່ງຮັກສາໄຮ່ນາໃຫ້
ສະອາດ.

ໄຮ່ນາທີ່ສະອາດຈະລຸດຜ່ອນບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງຫຼູ.



3. ຮັກສາອູ້ນນາໃຫ້ແຄບ ແລະບໍ່ໃຫ້ມີຈຳລະພືດ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້. ກໍາຈັດຈຳລະພືດຢູ່ຕາມອູ້ນນາແລະ
ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.

ອູ້ນນາແຄບຈະເປັນການຈຳກັດການຄັດຮູຂອງໝູ
ແລະການເຕີບໂຕຂອງຈຳລະພືດ. ຮັກສາອູ້ນນາ
ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງບໍ່ໃຫ້ມີຈຳລະພືດເພື່ອລຸດຜ່ອນ
ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງໝູໃນເວລາກາງເວັນ.



4. ຫລັງຈາກກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ ເກັບຕໍ່ເຟືອງອອກ
ໃຫ້ຫມົດ.

ຊຸມຕໍ່ເຟືອງນັ້ນຈະເປັນສະຖານທີ່ ໃຫ້ທນູໄດ້ຄວັດຮູ,
ເຮັດຮັງ ແລະ ເພາະພັນໃສ່.



ນິຍາມຂໍ້ຄວາມ

- ສານເບື້ອ** : ສານເຄມີນໍ້າໃຊ້ເພື່ອເບື້ອສັດທີ່ໃຊ້ແຂ້ວແທ້ໝາຍ ທລືທນູ.
- ສານເບື້ອລິດແຮງ** : ສານເຄມີທີ່ອອກລິດຢ່າງໄວ ແລະທລັງຈາກສັດກິນແລ້ວຈະຕາຍໃນເວລາທັນທີທັນໃດໂລດ (ຄືກັນກັບສານເຄມີ).
- ສານເບື້ອຊໍາເຮື້ອ** : ລິດຕ້ານການແຂງຕົວ. ມັນເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກພາຍໃນຫລາຍໆມື້ທລັງຈາກທນູໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ.

ປະເມີນຜົນ :

ຈົ່ງຈັດຫາວັດຖຸທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການ, ສາທິດຂັ້ນ

ຕອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ:

1. ຊອກຫາຈຸດວາງໃສ່ເທຍິ່ອ.
2. ກະກຽມກະບອກໃສ່ເທຍິ່ອ.
3. ເລືອກໃຊ້ຢາຂ້າທນູໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
4. ເອົາເທຍິ່ອເບື້ອໃສ່ໃນກະບອກ.
5. ກວດກາກະບອກໃສ່ເທຍິ່ອພາຍໃນ 4 ມື້ຕໍ່ມາ.
6. ສືບຕໍ່ກວດເບິ່ງກະບອກເທຍິ່ອຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
7. ເອົາເທຍິ່ອທີ່ເກີດມີເຊື້ອລາ ແລະ ເທຍິ່ອປຽກແລ້ວອອກຖິ້ມ.
8. ຫໍາລາຍບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທນູ.
9. ກ່ອນການເກັບກ່ຽວເຂົ້າ 2 ອາທິດຕ້ອງເກັບເອົາເທຍິ່ອເບື້ອທນູອອກໃຫ້ທນິດ

