

ການປຸກພືດປອດສານພິດໂດຍນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີ.

ການເຮັດກະສິກໍາແບບຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງທໍາມະຊາດ
ໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານພິດ ໃນການຜະລິດພືດ ແລະ ສັດເຊິ່ງອາດເອີ້ນ
ວ່າ: ການກະສິກໍາທໍາມະຊາດ.

ວິທີການ.

1. ປັບປຸງບໍາລຸງດິນໃຫ້ອຸດົມສົມບູນຕາມທໍາມະຊາດ.
2. ໃຊ້ເທັກນິກຈຸລິນຊີ (Microorganism) ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ມາຊ່ວຍ.
3. ຈັດລະບົບການຈັດການຜະລິດໃຫ້ເກື້ອກູນເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນຕາມທໍາມະຊາດຄວາມສໍາຄັນຂອງກະສິກໍາທໍາມະຊາດ.
1. ຜະລິດອາຫານທີ່ມີລົດຊາດທໍາມະຊາດ ແລະ ປອດສານ
ພິດ.
2. ຜູ້ຜະລິດອາຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກປອດໄພຈາກສານພິດ.
3. ເປັນລະບົບເຮັດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ.
4. ຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງປະເທດ.

ນໍ້າຊີວະພາບ (Bio extract BE) ເທັກນິກກະສິກໍາ ທໍາມະຊາດ

ນໍ້າຊີວະພາບຄື : ທາດແຫລວສີນໍ້າຕານໄໝ້ທີ່ໄດ້ຈາກນໍ້າສ່ວນ
ຕ່າງໆຂອງ ພືດມາໝັກກັບກາກນໍ້າຕານ (Molasses) ປະມານ

7 ວັນຈະໄດ້ຂອງ ແຫລວທີ່ມີທັງຈຸລິນຊີ ແລະ ສານອິນຊີຫລາຍ ຊະນິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກະ ສິກໍາຄື:

- ຈຸລິນຊີທີ່ຍ່ອຍສະຫລາຍອິນຊີວັດຖຸໃນດິນໃຫ້ເປັນບຸ່ຍ.
- ສ່ວນທາດອິນຊີທີ່ມີຢູ່ໃນຂອງຫລວຈະເປັນບຸ່ຍໂດຍກົງ

ປະໂຫຍດ.

1. ໃຊ້ປະສົມນໍ້າທົດພຶດທຸກຊະນິດເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ.
2. ໃຊ້ເຮັດບຸ່ຍໝັກແຫ້ງ, ບຸ່ຍໝັກດິນ ຊ່ວຍປັບປຸງ ແລະ ບໍາລຸງດິນ.
3. ຊ່ວຍລົດການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ.
4. ໃຊ້ຜະສົມນໍ້າທົດບໍລິເວນທີ່ມີກິ່ນເຊັ່ນ: ຫ້ອງນໍ້າ, ຄອກສັດ ຈະຊ່ວຍດັບກິ່ນໄດ້.
5. ສາມາດຜະລິດໃຊ້ເອງໄດ້.

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້.

ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບເປັນຂອງແຫຼວທີ່ມີຈຸລິນຊີທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມ ຂັ້ມຊັນຂອງສານຍ່ອຍສະຫລາຍ ຢູ່ຫລາຍພຶດແຕ່ລະຊະນິດຈະໄດ້ ຮັບຮໍໂມນເຊິ່ງປັນຮໍໂມນສົ່ງເສີມ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຖ້າໃຊ້ໃນ ຄວາມເຂັ້ມຊັນສູງຈະເຮັດໃຫ້ພຶດເຊົາການຂະຫຍາຍຕົວ ຫລື ອາດ ຕາຍໄດ້.

ຊຽນໂດຍ: ທ່ານ ແຕນ ພິມມະແສນ.

ບັນນາທິການໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາເສີມ ມະນີວົງ.

ທ່ານ ໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ.

ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ໄຊທາລາດ.

ອອກແບບໜ້າປົກໂດຍ: ທ່ານ ປານຕະນະ ອາລຸນສະຫວດ.

ຈັດໜ້າໂດຍ: ນາງ ສີໄພ.

ເຈົ້າຂອງ: ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ (PADETC).

ໃສ່ແກ້ວປະໄວ້ 3 ມື້ ປັດຝາ ແລະ ເປັດຝາລະບາຍແກ້ດ 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ກໍສາມາດນຳມາດື່ມໄດ້ຖ້າຢາກໃຫ້ມີລົດຊາດ ດີຄວນ ໃສ່ຕູ້ເຢັນ ຫລື ນ້ຳກ້ອນເວລາດື່ມທຸກຄົນສາມາດດື່ມໄດ້.

ໝາຍເຫດ:

ນ້ຳທີ່ຈະນຳມາປະສົມຫຼຸດ ຫລື ເພີ່ມໄດ້ຕາມຄວາມມັກ

ການເກັບຮັກສາ :

ເມື່ອລົດຊາດດີຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວຄວນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຖ້າ ປະໄວ້ນອກຄວາມເປັນເຫຼົ່າຈະສູງຂຶ້ນກາຍເປັນເຫຼົ່າວາຍໂດຍທຳມະ ຊາດ.

ວິທີດື່ມນ້ຳສຸຂະແຊບ

ດື່ມປະມານ 2 - 3 ບ່ວງແກງຕໍ່ມື້ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ.



ການເຮັດນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ.

ສ່ວນປະກອບ.

1. ພືດຜັກສົດທຸກຊະນິດ 3 ກິໂລ.
2. ນ້ຳຕານ ຫລື ກາກນ້ຳຕານ 1 ກິໂລ.

ວິທີເຮັດ.

1. ນຳພືດຜັກທຸກຊະນິດຊອຍໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ໃສ່ໃນພາ ຊະນະທີ່ມີຝາປັດ.
2. ໃສ່ກາກນ້ຳຕານ ຫລື ນ້ຳຕານປະສົມໃສ່ກັບຜັກທີ່ຊອຍ ໄວ້ນັ້ນໃນອັດຕາ ສ່ວນ 1/3 (ນ້ຳຕານ 1 ກິໂລ ຕໍ່ ຜັກ 3 ກິໂລ).

ຮູບການເຮັດຝຸ່ນບົມຊະນິດນ້ຳ.



3. ມີສິ່ງທີ່ໝັກວາງໄວ້ ເພື່ອເປັນການປົບໃຫ້ຜັກມີນ້ຳຫລາຍ ແລ້ວປັດຝາ ປະໄວ້ 5 - 7 ວັນ.

4. ຈະມີນ້ຳສີນ້ຳຕານໄຫລອອກມານັ້ນຄືນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ, ຫ່າຍໃສ່ແກ້ວປິດ ຝາໃຫ້ແຈບພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ (ຫາກໃຊ້ນ້ຳຕານຊາຍຂາວນ້ຳ BE ຈະເປັນ ສີຂາວ ຫລື ຖ້າຫາກວ່າໃຊ້ນ້ຳຕານຊາຍແດງນ້ຳທີ່ໄດ້ອອກມາຈະເປັນສີແດງ ແລະ ຖ້າໃຊ້ກາກນ້ຳຕານນ້ຳທີ່ໄດ້ອອກມາຈະເປັນສີດຳ).



ຮູບການເກັບຮັກສາຝຸ່ນໃນຖັງທີ່ອັດແຈບ.

ການນຳໃຊ້.

ນຳນ້ຳສະກັດຊີວະພາບປະສົມນ້ຳທຳມະດາເຮັດໃຫ້ເຈືອ

1. ສີດພົນ ຫລື ຫົດພົດຜັກ, ໝາກໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ອັດ ຕາສ່ວນ: ນ້ຳຊີວະພາບ 1 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ ນ້ຳ 10 ລິດສີດພົນທຸກມື້.
2. ຫົດກອງໄບໄມ້, ໄບຫຍ້າສົດ, ແຫ້ງໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ: ນ້ຳຊີວະພາບ 2 ບ່ວງ ແກງຕໍ່ນ້ຳ 10 ລິດ. ໃຊ້ຖົງພຣາດສະຕິກຄຸມກອງພືດ ປ່ອຍໃຫ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫລາຍ 1 – 2 ອາທິດ, ສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃຊ້ຄຸມດິນບໍລິເວນຕົ້ນພືດ.

ຂັ້ນຕອນ 1: ການຜະລິດຫົວເຊື້ອນ້ຳສຸຂະແຊບ.

ອຸປະກອນ :

- ເຄື່ອງບັນຈຸທີ່ມີຝາປິດແໜ້ນບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄດ້ເຊັ່ນ: ກວດໂຫຼ, ຖັງຢາງ, ຄູ ຖ້າເປັນເຄື່ອງບັນຈຸທີ່ໃສ່ສ່ອງຊອດຈະເປັນການດີ ແລະ ຖ້າມີກ່ອກເປີດນ້ຳຍິ່ງຈະດີຫຼາຍ.
- ໝາກໄມ້ຕາມລະດູຄວນມລົດສົ້ມ ຫລື ສົ້ມຝາດ ສ່ວນຫຼາຍໝາກໄມ້ປະເພດດັ່ງກ່າວຈະເປັນໝາກໄມ້ລາຄາຖືກ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນນິຍົມກິນຕົວຢ່າງເຊັ່ນ : ໝາກຕ້ອງ, ໝາກເພືອງ, ໝາກຍົມ, ໝາກນັດ, ໝາກມອນ, ໝາກເໝົາ, ໝາກກຸ້ງ, ໝາກສີດາ, ໝາກໝອດ, ໝາກຫຼອດ, ໝາກໝັ້ນ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກຜາງ, ໝາກຄາຍ.
- ນ້ຳຕານຊາຍນ້ຳອ້ອຍກ້ອນ ຫລື ນ້ຳເຜິ້ງ.

ວິທີຜະລິດ

ລ້າງໝາກໄມ້ໃຫ້ສະອາດ ແລະ ສະເດັດນ້ຳຖ້າໝາກໄມ້ຊະນິດເປືອກໜາຄວນປອກເປືອກອອກປາດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານຊືມເຂົ້າໄດ້ງ່າຍບັນຈຸໃສ່ຖັງໝັກແລະ ເທນ້ຳຕານລົງໄປນຳ.

ອັດຕາສ່ວນ ໝາກໄມ້ 3 ກິໂລ ຕໍ່ນ້ຳຕານ 1 ກິໂລ ປິດຝາໃຫ້ແຈບປະໄວ້ 7 - 10 ມື້ ຈະໄດ້ນ້ຳຫົວເຊື້ອສຸຂະແຊບ

ຂັ້ນຕອນ 2:

ນຳເອົານ້ຳຫົວເຊື້ອສຸຂະແຊບ 1 ສ່ວນ ປະສົມກັບນ້ຳຕານອີກ 1ສ່ວນ ແລະ ນ້ຳສະອາດ 4 - 5 ສ່ວນ ປະສົມກັນແລ້ວບັນຈຸ

- ໃຊ້ຄຸມເງົ້າໄມ້ກິນໝາກ
- ໃຊ້ຄຸມໝານຜັກ
- ໃຊ້ປະສົມດິນ ເພື່ອການປູກຝັງຕ່າງໆ

ໝາຍເຫດ

ຖ້າເຮົາຢາກໃສ່ພືດຜັກຄວນຕັດໃຫ້ສັ້ນກ່ອນຈຶ່ງນຳມາກອງເຮັດຝຸ່ນ ເພາະຈະສະດວກໃນການນຳໃຊ້.

ນ້ຳສຸຂະແຊບ

ສຸຂະແຊບເປັນນ້ຳຕື່ມເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ມີລົດແຊບດີ ນ້ຳນີ້ຜະລິດດ້ວຍໝາກໄມ້ທີ່ມີຕາມລະດູການ ແລະ ຜະລິດໂດຍບໍ່ໃຊ້ເຄມີ ຫລື ຢາກັນບູດແຕ່ຢ່າງໃດ. ຖ້າຕື່ມເປັນປະຈຳທ່ານຈະແຂງແຮງດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີພ້ອມທັງປະຫຍັດເງິນຂອງທ່ານດ້ວຍ. ເປັນການສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດລາວດ້ວຍການຕື່ມນ້ຳສຸຂະແຊບ.

ຄຸນປະໂຫຍດ.

- ຊ່ວຍກິນເຂົ້າແຊບເມື່ອຕື່ມກ່ອນອາຫານ.
- ຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫລາຍອາຫານເມື່ອຕື່ມຫຼັງອາຫານ.
- ບັນເທົາ ແລະ ກັນໂລກກະເພາະ
- ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ.
- ລາຄາຖືກ.
- ຜະລິດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

ການຜະລິດນ້ຳສຸຂະແຊບມີຢູ່ສອງຂັ້ນຕອນໃຫຍ່ຄື :

1. ການຜະລິດຫົວເຊື້ອຂອງນ້ຳສຸຂະແຊບ.
2. ການຜະລິດນ້ຳສຸຂະແຊບເພື່ອບໍລິໂພກ.

3. ໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມແຫ້ງໂດຍໃຊ້ນ້ຳຊີວະພາບ 2 ບ່ວງແກງ + ນ້ຳຕານ 2 ບ່ວງແກງ ປະສົມນ້ຳ 10 ລິດ ໃຊ້ທົດຝຸ່ນພໍໃຫ້ມີຄວາມຊຸມໝາດໆ.
4. ທົດໝານກ້າເບ້ຍໄມ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ສັບດິນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບຫຍ້າ ແລະ ເສດພືດ ໃຊ້ອັດຕາ ສ່ວນເຈືອຈາງນ້ຳຊີວະພາບ 2 ບ່ວງແກງ + ນ້ຳຕານ 2 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ ນ້ຳ 10 ລິດ. ທົດໝານ 1 ຕາແມັດ ຕໍ່ 1 ລິດ ປ່ອຍໃຫ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫລາຍ 3 – 7 ວັນກໍ່ ສາມາດທີ່ຈະປູກພືດ ຫລື ກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້. ຖ້າຕ້ອງການກຳຈັດຫຍ້າທີ່ມີເມັດຄວນປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າງອກອີກເທື່ອໜຶ່ງຈຶ່ງສັບຊ້ຳ, ແລ້ວທົດນ້ຳສະກັດຊີວະພາບເຈືອຈາງອັດຕາສ່ວນ 2 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ ນ້ຳ 10 ລິດ ປະໄວ້ 3 ວັນ ຫລັງຈາກນັ້ນສາມາດປູກພືດໄດ້.
5. ປະສົມອັດຕາສ່ວນ 2 ບ່ວງແກງ / ນ້ຳ 10 ລິດທົດໝານນ້ຳ ຈະຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫລາຍອິນຊີວັດຖູໃນໜອງຈະເຮັດໃຫ້ໜອງນ້ຳມີສະພາບດີຂຶ້ນ.
- 6 ຂະຫຍາຍຫົວເຊື້ອເຮັດໄດ້ໂດຍມີອັດຕາສ່ວນຄື:
 1. ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ 1 ລິດ.
 2. ກາກນ້ຳຕານ 1 ລິດ.
 3. ນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ.
 4. ໃສ່ແກ້ວປິດຝາ 3 ມື້ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້.
 5. ຫລື ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ 1 ຈອກ.

6. ກາກນ້ຳຕານ 1 ຈອກ.

7. ນ້ຳສະອາດ 10 ຈອກ.

ໃສ່ແກ້ວປັດຝາໃຫ້ແໜ້ນປະໄວມື້ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ໄດ້ ຂຽນໄວ້ຂ້າງເທິງ.

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ.

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບຄື: ຝຸ່ນອິນຊີ ຫລື ຝຸ່ນທຳມະຊາດ ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງບຳລຸງດິນ ສາມາດຜະລິດໄດ້ງ່າຍ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ໂດຍການ ນຳເສດວັດຖຸເຫລືອ ໃຊ້ປະສົມໝັກລວມກັບຂີ້ສັດ, ແກບດຳ, ຮຳອ່ອນ ປົກດ້ວຍກະເປົາປ່ານໝັກໄວ້ 3 ມື້ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ວັດຖຸເຮັດຝຸ່ນໝັກຊີວະພາບ.

1. ຂີ້ສັດແຫ້ງ 1 ຄູ.
2. ຂີ້ແກບເຝົ້າ 1 ຄູ.
3. ຮຳອ່ອນ 1 ກິໂລຖ້າໄດ້ 1 ຄູນຳກັນຍິ່ງເປັນການດີ.
4. ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ.
5. ກາກນ້ຳຕານ



ແລ້ວປົກດ້ວຍເປົາປ່ານ ຫຼື ເຟືອງ ປະໄວ້ 3 ວັນກໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

ວິທີໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ :

- ໃຊ້ກັບພືດຜັກ ປະມານ 2 - 4 ກຳມີຕໍ່ເນື້ອທີ່ປູກຝັງ 1 ຕາແມັດ.
- ໃຊ້ກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະມານ 2 - 3 ກິໂລ ຕໍ່ຕົ້ນໄມ້ 1 ຕົ້ນຕໍ່ປີ.

2. ໃຊ້ຄຸມເຫງົ້າຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ໝານຜັກ.

ຄືເຮົານຳເອົາໄມ້ ຫລື ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ສາມາດເນົ່າເປື້ອຍໄດ້ດີ ໄປຄຸມເຫງົ້າໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຕົ້ນພືດ ແລະ ໝານຜັກ. ຈາກນັ້ນກໍທົດນ້ຳ ບີອີ ປະສົມນ້ຳທຳມະດາທົດເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຫຼຸດການເຕີບໂຕຂອງຫຍ້າໄດ້ດີນອກຈາກນັ້ນເວລາເສດໄມ້ເປື້ອຍກໍຈະກາຍເປັນອາຫານ ແກ່ພືດຜັກອີກດ້ວຍ (ອັດຕາສ່ວນນ້ຳທຳມະດາ 10 ລິດຕໍ່ ນ້ຳ BE 1 ບ່ວງແກງ)

3. ໃຊ້ນ້ຳ BE ຊ່ວຍເພື່ອເຮັດຝຸ່ນທຳມະຊາດ

ນຳໄມ້ ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆກວດໂຮມກັນເປັນກອງໄວ້ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມ ຈາກນັ້ນກໍນຳ BE ມາປະສົມນ້ຳທົດໃຫ້ຊຸ່ມ (ອັດຕາສ່ວນນ້ຳ 10 ລິດຕໍ່ນ້ຳ BE 2 - 3 ບ່ວງແກງ) ຈາກນັ້ນຄຸມດ້ວຍຜ້າຢາງປະໄວ້ ໃຫ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫຼາຍປະມານ 1 - 2 ອາທິດແມ່ນນຳໄປໃຊ້ໄດ້ເພາະຈະເປັນຝຸ່ນໄດ້ດີ.

ວິທີໃຊ້ຝຸ່ນທຳມະຊາດ

1. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕະຫລອດ.
2. ຊ່ວຍປະຢັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ເວລາ.
3. ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ.
4. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫຍ້າ.
5. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ.
6. ຊ່ວຍເພີ່ມພູນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.
7. ຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີ.
8. ສາມາດຜະລິດໃຊ້ໄດ້ເອງ.

ວິທີການໝູນໃຊ້.

ໃຊ້ຜະລິດເປັນຝຸ່ນບົມ.

ສ່ວນປະກອບ ແລະ ວິທີເຮັດ.

ນໍ້າເສດໃບໄມ້, ຂີ້ເລື້ອຍ, ແກບ, ກາກອ້ອຍ, ກາບໝາກຖົ່ວ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້ (ໃຫ້ເລືອກເອົາໂຕໃດໂຕໜຶ່ງ ຫລື ຈະນໍາທຸກສ່ວນມາໃສ່ນໍ້າກັນກໍໄດ້) ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1 ຄູ ແລະ ຮໍາອ່ອນ 1 ຄູ, ແກບເຜົາ ຫລື ແກບແຫ້ງ 1 ຄູ ຈາກນັ້ນກໍປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ນໍ້ານໍ້າປະສົມນໍ້າ ບີອີ ແລະ ກາກນໍ້າຕານ ຫລື ນໍ້າຕານຊາຍ ມາຫົດໃຫ້ຊຸ່ມພໍດີຕາມອັດຕາສ່ວນ ການໃຊ້ນໍ້າ ບີອີເຮັດຝຸ່ນ (ອັດຕາສ່ວນນໍ້າ 10 ລິດຕໍ່ນໍ້າ ບີອີ 2 ບ່ວງແກງ ແລະ ກາກນໍ້າຕານ 2 ບ່ວງແກງ ຖ້າບໍ່ມີກໍໃຊ້ນໍ້າຕານຊາຍແດງ ແທນ 2 ບ່ວງແກງກໍໄດ້) ຈາກນັ້ນເອົາໄປກອງໄວ້ພື້ນຊົນໃຫ້ ສູງປະມານ 1 ຄືບ

6. ວັດຖຸທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ແກບ, ຂີ້ອ້ອຍ, ຂີ້ເລື້ອຍ, ເປືອກຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວຂຽວ, ໄຍໝາກພ້າວ ແລະ ອື່ນໆຈໍານວນ 1 ຄູ.

ວິທີເຮັດ:

1. ປະສົມວັດຖຸທັງໝົດໃຫ້ເຂົ້າກັນ.



2. ຫົດນໍ້າປະສົມນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ ແລະ ກາກນໍ້າຕານ (ໃຊ້ນໍ້າຕານຊາຍແທນກໍໄດ້).

ອັດຕາສ່ວນນໍ້າ 10 ລິດ.

ນໍ້າຊີວະພາບ 2 ບ່ວງແກງ.

ກາກນໍ້າຕານ 2 ບ່ວງແກງ.

ຫົດກອງຝຸ່ນທີ່ປະສົມກັນນັ້ນ ຈົນໄດ້ຄວາມຊຸ່ມ 50% (ວິທີການກວດສອບວ່າໄດ້ບໍ່ໄດ້ຄື ກໍາຝຸ່ນ ແລະ ເມື່ອແບມືອອກນັ້ນເປັນກ້ອນໂດຍທີ່ບໍ່ມີໄຫລອອກມາ) ນັ້ນສະແດງຕາອັດ



ຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງນ້ຳ ແລະ ສ່ວນປະສົມຂອງຝຸ່ນນັ້ນເຂົ້າ ກັນດີ.

3. ກອງຝຸ່ນຢູ່ເທິງພື້ນຄວາມໜາປະມານ 1 ຄືບ ປົກດ້ວຍ
ກະເປົາປານປະໄວ້ 3 ວັນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້.

4. ລັກສະນະຝຸ່ນທີ່ດີ
ແມ່ນມີເຊື້ອລາ
ຂາວມີກິ່ນຄື
ເຊື້ອເຫດ,ບໍ່ຮ້ອນ,
ມີນ້ຳໜັກເປົາ.



ວິທີການໃຊ້.

1. ໃຊ້ຝຸ່ນປົ່ມຊີວະພາບປະສົມດິນໃນໜານປູກຜັກທຸກຊະນິດ
ອັດຕາສ່ວນຝຸ່ນ 1 ກິໂລ ຕໍ່ 1 ຕາແມັດ.
2. ພືດຜັກອາຍຸເກີນ 2 ເດືອນເຊັ່ນ: ກະລຳປີ, ໝາກຖົ່ວຍາວ,
ໝາກແຕງ, ໝາກອຶໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໝັກແຫ້ງຮ້ອງພື້ນຊຸມກ່ອນ
ປູກປະມານ 1 ໂກບມື.
3. ຕົ້ນໝາກໄມ້ຄວນຮອງພື້ນ
ຊຸມດ້ວຍເສດຫຍ້າ, ໃບໄມ້,
ເພືອງແຫ້ງ ແລະ ຝຸ່ນປົ່ມ
ແຫ້ງປະມານ 1 - 2 ຄູ, ສ່ວນຕົ້ນໝາກໄມ້ທີ່ປູກແລ້ວ
ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໂຮຍບໍລິເວນພຸ່ມ



ຈັບກັນແຂງ ແຕ່ຈະອ່ອນອຸ່ມນ້ຳ ແລະ ອາກາດຜ່ານໄດ້ດີຈຶ່ງບໍ່ຈຳ
ເປັນໄຖພວນອີກຕໍ່ໄປ. ກະສິກອນທີ່ໃຊ້ ບີອີ ມາ 3 ປີແລ້ວບໍ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ອີກ ແລະ ຍັງສາມາດໄດ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີອີກ.

ການໝູນໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

ຂີ້ເຫຍື້ອ.

ຄຳວ່າຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນໃຜກໍ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າມັນເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອ
ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ມີໃນຂອບເຂດບໍລິເວນຄອບຄອງຂອງຕົນ,
ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫລາຍຕ້ອງທຳລາຍຖິ້ມ ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆແຕ່ທ່ານ ຮູ້ບໍ່
ວ່າການທີ່ທ່ານເຮັດແບບນີ້ເໝືອນກັບທ່ານທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງ
ຕົນ, ເພາະສິ່ງເສດເຫຼືອເລົ່ານັ້ນຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ ຢ່າງໃຫ້
ແກ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາແຕ່ວ່າຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ບໍ່ມີຫລາຍຊະນິດ.

ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ.

- ຂີ້ເຫຍື້ອເຖິງວ່າມີຫລາຍຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຊົມໃຊ້
ຂອງຄົນເຮົາໃນແຕ່ລະວັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ສາມາດແຍກອອກມາເປັນ
2 ປະເພດໃຫຍ່ຄື:

1. ປະເພດທີ່ເນົ່າເປື້ອຍໄດ້.
2. ປະເພດທີ່ບໍ່ສາມາດເນົ່າເປື້ອຍໄດ້.

ໃນນີ້ຈະຂໍເວົ້າສະເພາະແຕ່ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່
ສາມາດເນົ່າເປື້ອຍໄດ້.

ປະໂຫຍດ.

ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດເນົ່າເປື້ອຍໄດ້ນັ້ນ ຈະມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍ
ຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບ້ອງກັນເພີຍລະບາດ.

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຕ່າງໆລົບກວນ ຄວນສິດພົນ ດ້ວຍບີອີ 5 ທຸກໆ 15 ວັນ, ໃນອັດຕາສ່ວນ ບີອີ 5 400 ຊີຊີ ປະສົມກາກນ້ຳຕານ 400 ຊີຊີ ແລະ ນ້ຳ 200 ຊີຊີ.

ການເຮັດໃຫ້ດິນນຸ້ມອ່ອນດ້ວຍ ບີ ອີ.

ຕາມປົກກະຕິລັກສະນະຂອງດິນນັ້ນ ຈະແໜ້ນຈັບກັນເປັນກ້ອນ ແຂງ ມີລັກສະນະທີ່ລະບາຍນ້ຳບໍ່ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫລຜ່ານໄປ ເບິ່ງໜ້າດິນ ແຕ່ຫລັງຈາກການໃຊ້ ບີອີ ດ້ວຍການ ເຮັດວຽກ ຂອງ ບີອີ ດິນຈະຈັບກັນເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນນ້ອຍນຸ້ມອ່ອນ ມີສະພາບອຸ່ມນ້ຳໄດ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນລັກສະນະທີ່ເໝາະຕໍ່ການກະເສດເປັນຢ່າງດີ.

ແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບຫຍ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີ.

ໃນກໍລະນີຂອງນາເຂົ້າ ແລະ ໄຮ່ຫລັງຈາກທີ່ໃສ່ບີອີ ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດຫຍ້າທີ່ພັກຕົວຢູ່ເກີດຂຶ້ນມາໝົດ ຈຶ່ງສາມາດກຳຈັດຫຍ້າທັງໝົດໄດ້ດ້ວຍການໄຖພວນ ຈຶ່ງເປັນການຕັດຫຍ້າວັດສະພືດບໍ່ໃຫ້ງອກອີກຕໍ່ໄປອາດຈະໃຊ້ວິທີຕັດ ຫລື ລົ້ມຫຍ້າຕ່າງໆ ໃຫ້ເກີດຮອຍຊໍ່ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໂຮຍຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດລົງໄປຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຫຍ້າຕາຍ ແລະ ບ່ຽງອກຂຶ້ນມາອີກ, ເມື່ອໃຊ້ ບີອີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ນານບັນຫາຫຍ້າກໍຈະໝົດໄປ.

ການປູກໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄຖພວນ.

ການໄຖພວນແມ່ນ ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ດິນທີ່ແຂງຕົວອ່ອນຂຶ້ນ ອຸ້ມນ້ຳ ແລະ ອາກາດຜ່ານໄດ້ດີ, ການໃຊ້ ບີອີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ດິນບໍ່

ຂອງຕົ້ນໄມ້ແລ້ວປົກດ້ວຍຫຍ້າ, ໃບໄມ້, ເພືອງແຫ້ງ.

4. ການໃສ່ຜັກທີ່ໃຫຍ່ແດ່ແລ້ວໃຊ້ໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ກຳມີ/1 ຕາແມັດ ໂດຍກຳໂຮຍຕາມຫວ່າງຜັກ ແລ້ວຫົດນ້ຳປະສົມນ້ຳຊີວະພາບນຳທຸກຄັ້ງທີ່ໃສ່ຝຸ່ນເພີ່ມ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຝຸ່ນ.
5. ດອກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກໝັກທຸກ 7 ວັນປະມານ 1 ກຳມີ.
6. ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກປູກໄດ້ 2 ປີຂຶ້ນໄປໃຊ້ໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ກິໂລ / ຕົ້ນ / ປີ.

ປະໂຫຍດ:

1. ເພີ່ມປະລິມານອິນຊີວັດຖູໃນດິນ ຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.
2. ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ແລະ ຊ່ວຍການຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນ.
3. ເພີ່ມທາດ ໄນໂຕເຈນ ໃຫ້ກັບດິນ.
4. ບໍ່ເປັນອັດຕະລາຍຕໍ່ດິນ ແລະ ພຶດເຖິງວ່າຈະໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ຫລາຍ ແລະ ຍາວນານ.
5. ບັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
6. ປະຢັດຕົ້ນທຶນຜະລິດງ່າຍໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ.

ການຮັກສາ.

ໃສ່ກະສອບເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງ ບ່ອນຮົ່ມສາມາດເກັບໄດ້ດິນເຖິງ 1 ປີ.

ສູດໄລ່ແມງໄມ້.

ສ່ວນປະສົມ.

1. ເຫຼັກຂາວ 2 ລິດ.
2. ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 1 ລິດ.
3. ກາກນ້ຳຕານ 1 ລິດ.
4. BE 1 ລິດ.

ເອົາທຸກຢ່າງມາປະສົມກັນໃສ່ແກ້ວປະໄວ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວ ຈົ່ງນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໂດຍໃຊ້ BE 5 10 ຊີຊີ ປະສົມນ້ຳ 10 ລິດ ສົດພົ້ນຕົ້ນໄມ້.

ແບບນ້ຳ.

1. ສຳລັບພືດຜັກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ໃນນ້ຳ 100 ລິດໃສ່ BE 100 ຊີຊີ (1 ລິດ) ປະໄວ້ 2 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3 ວັນເອົາ BE ທີ່ຂະຫຍາຍແລ້ວນີ້ ໄປປະສົມນ້ຳສົດພົ້ນພືດຜັກໄດ້.

2. ສຳລັບສັດ.

ນ້ຳ 100 ລິດ ໃຊ້ BE 1 ລິດ ການນ້ຳຕານ 1 ລິດໝັກໄວ້ 3 ວັນ ເອົາບີອີທີ່ຂະຫຍາຍແລ້ວນີ້ ປະສົມນ້ຳສົດພົ້ນຄອກສັດຈະ ເຮັດໃຫ້ກິນຕ່າງໆໝົດໄປພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

3. ສຳລັບລ້ຽງປາ.

ໃຫ້ເອົາບີອີຂະຫຍາຍແລ້ວນີ້ ປະສົມນ້ຳຖອກລົງໃນໜອງປາ ຕາມຂະໜາດຂອງໜອງ ແລະ ບໍລິມາດນ້ຳໃນໜອງໃນປະລິມານ 5 000 – 10 000 ລິດຕໍ່ ບີອີ

ໄຖຄາດ.

1. ຈາກນັ້ນອີກ 15 ວັນຈຶ່ງໄຖ ແລະ ຄາດ ແລ້ວສົດ ບີອີ ໃນອັດຕາສ່ວນເກົ່າອີກ 1 ເທື່ອ.
2. ໄຖຄາດເພື່ອກຽມປັກດຳ.
3. ຫລັງຈາກທີ່ດຳໄດ້ 7 – 15 ວັນ.
4. ຫລັງຈາກປັກດຳຫວ່ານຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດໃຫ້ທົ່ວໄຮ່ນາປະໄວ້ປະ ມານ 30 ກິໂລ/ ໄລ່.
5. ສົດພົ້ນດ້ວຍບີອີ + ກາກນ້ຳຕານ ຢ່າງລະ 200 ຊີຊີ ປະສົມນ້ຳ 200 ລິດ.
6. ອາຍຸເຂົ້າໄດ້ 1 ເດືອນ.
7. ຫວ່ານຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດ 30 ກິໂລ/ໄລ່ໃຫ້ທົ່ວນາ.
8. ສົດພົ້ນດ້ວຍບີອີ + ກາກນ້ຳຕານ ຢ່າງລະ 200 ຊີຊີ ປະສົມນ້ຳ 200 ລິດ.ກ່ອນເຂົ້າມານເລັກໜ້ອຍ. (ເຂົ້າຖື ວົງແຫວນ).
9. ຫວ່ານຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດ 40 ກິໂລ/ໄລ່.
10. ສົດພົ້ນດ້ວຍບີອີ + ກາກນ້ຳຕານ ຢ່າງລະ 200 ຊີຊີ ປະ ສົມນ້ຳ 200 ລິດ.

ໝາຍເຫດ: ສະເລ່ຍເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່ ໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມປະມານ 200 ກິໂລ. ໃນບີທຳອິດທີ່ໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດໃນນາເຂົ້າອາດຕ້ອງໃສ່ໃນປະລິມານ ຫລາຍແຕ່ເມື່ອດິນດີແລ້ວປີຕໍ່ໄປຈຶ່ງຄ່ອຍຫລຸດປະລິມານການໃສ່ລົງ

ໄຖພວນດິນ.

1. ຫວ່ານຝຸ່ນປົມຂີ້ສັດໃຫ້ທົ່ວ 100 ກິໂລ/ໄລ່.
2. ປະສົມ ບີອີ 400 ຊີຊີ + ກາກນ້ຳຕານ 400 ຊີຊີ + ນ້ຳ 200 ລິດ, ສົດໃຫ້ຖົ່ວເນື້ອທີ່ຂອງນາແລ້ວ ໄຖດິນປົກ ໃຫ້ທົ່ວປະໄວ້ 15 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ບີອີ ຍ່ອຍສະຫລາຍຫຍ້າ ວັດສະພິດ ແລະ ເພື່ອງ ໃຫ້ເປັນຝຸ່ນທຳມະຊາດ ເລັ່ງການ ອອກງອກຂອງເມັດພືດ 15 ວັນຫລັງຈາກໄຖແລ້ວປະສົມ ບີອີ + ກາກນ້ຳຕານ ຢ່າງລະ 400 ຊີຊີ ກັບນ້ຳ 200 ລິດ ສົດພົ້ນໃຫ້ທົ່ວແລ້ວໄຖປົກ ເພື່ອຂ້າຫຍ້າວັດສະພິດ ໃຫ້ກາຍເປັນປຸ່ຍພືດສົດ.



ຮູບການນຳໃຊ້ຝຸ່ນປົມ ແລະ ນ້ຳບີອີໃສ່ຕາກ້າເຂົ້າ.

- 1 ລິດ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນໜອງ ສະອາດຂຶ້ນບໍ່ເໝົາເໝັນປາແຂງແຮງສົມບູນໃຫ່ຍໄວ.

BE 5 ກັບສະໝຸນໄພໄລ່ສັດຕູພືດ.

- ສະໝຸນໄພໄລ່ດ້ວງໝັດຜັກ, ບັງໄຍຜັກ, ບັງເຈາະຫົວກະ ລຳ, ຂີ້ກະເດືອນຝອຍ, ໄຮແດງ.

ອຸປະກອນ.

1. ໃບໝາກເຂືອເຄືອ 2 ກຳມື.
2. ນ້ຳອຸ່ນ 2 – 5 ລິດ.
3. ນ້ຳເຢັນ 10 ລິດ.
4. BE 5 10 ບ່ວງແກງ.

ວິທີເຮັດ.

1. ນຳໃບໝາກເຂືອເຄືອຈຳນວນ 2 ກຳມືມາຕຳໃຫ້ມຸ່ນ.
2. ນຳມາປະສົມກັບນ້ຳອຸ່ນ 2 – 5 ລິດ (ເອົາ 2 – 3 – 4 – 5 ລິດຕາມ ຄວາມຕ້ອງການວ່າຈະຕ້ອງ ການຄວາມ ເຂັ້ມຊັນພຽງໃດ).
3. ແຊ່ປະໄວ້ 5 ຊົ່ວໂມງ.

ວິທີໃຊ້.

1. ເອົານ້ຳໃບໝາກເຂືອເຄືອທີ່ຕ້ອງແລ້ວ 1 ບ່ວງປະສົມນ້ຳ 10 ລິດຄົນໃຫ້ ເຂົ້າກັນ ແລ້ວເອົາ BE 5 ຈຳນວນ 1 ບ່ວງ ແກງປະສົມກັບນ້ຳທີ່ປະສົມໄວ້ກ່ອນ.

2. ຫລັງຈາກນັ້ນນໍາໄປສິດຜັກໄດ້ເລີຍ. ສາມາດສິດ ຫລື ຫົດ ເວລາທີ່ຜັກເລີ້ມ ໃຫ່ຍເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໂດຍສິດ 2ມື/ 1ເທື່ອ ຫລື ຢ່າງຕໍ່າ 1 ອາທິດ ຕໍ່1ເທື່ອ.

ສະໝຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້ທຸກຊະນິດ.

ອຸປະກອນ.

- ສີໄຄເຄື່ອງ 1 ສ່ວນ (ບໍລິມາດ).
- ຫົວຂ່າແກ່ 1 ສ່ວນ (ບໍລິມາດ).
- ໃບຂົມກະເດົາ 1 ສ່ວນ (ບໍລິມາດ).
- ເຄືອເຂົ້າອໍ. ສ່ວນ (ບໍລິມາດ).
- ນໍ້າປີອີ 5 1 ບ່ວງແກງ.
- ນໍ້າສະອາດ 10 ລິດ.

ວິທີເຮັດ.

1. ເອົາສີໄຄເຄື່ອງ, ຫົວຂ່າ, ຂົມກະເດົາ, ເຄືອເຂົ້າອໍມາຝັກ ໃຫ້ໝຸ່ນ ແລ້ວນໍາໄປຕໍາ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ.
2. ນໍາເຄື່ອງທີ່ຕໍາແລ້ວ ມາແຊ່ໃນນໍ້າໂດຍໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມສະໝຸນ ໄພທີ່ກຽມໄວ້.
3. ແຊ່ປະໄວ້ 1 ຄືນ.
4. ສະໝຸນໄພໄລ່ມົດ.

ອຸປະກອນ.

- ໝາກເຜັດແດງ 1 – 3 ໜ່ວຍ.
- ນໍ້າ BE 5 1 ບ່ວງແກງ.

2. ໝາກອີແກ່ 2 ກິໂລ.
3. ໝາກຮຸ່ງສຸກ 2 ກິໂລ.
4. ປີອີ 20 ຊີຊີ.
5. ກາກນໍ້າຕານ 40 - 50 ຊີຊີ.
6. ນໍ້າ 10 ລິດ.

ວິທີເຮັດ.

ຝັກກ້ວຍ, ໝາກອີ, ໝາກຮຸ່ງ, ທັງເປືອກ ແລະ ໃນເຂົ້ານໍາ ກັນຈົນລະອຽດ.

ປະສົມ ປີອີ + ກາກນໍ້າຕານ + ນໍ້າສະອາດຕາມອັດຕາສ່ວນ ທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ.

ບັນຈຸລົງໃນຖົງປຸ່ຍໝັກໄວ້ໃນຖົງປາລາສະຕິກອັດຝາໄວ້ 7 – 8 ວັນ.

ວິທີໃຊ້.

1. ນໍາເອົາສ່ວນທີ່ເປັນນໍ້າ 20 ຊີຊີ ປະສົມນໍ້າສະອາດ 5 ລິດ, ສີດພົ່ນ ຫລື ຫົດຕົ້ນໄມ້ໃນໄລຍະທີ່ເປັນໝາກຕິດດີ.
2. ສ່ວນທີ່ເປັນໄຂມັນເຫລືອງໃນຖົງປຸ່ຍໃຊ້ທາງກົງຕອນກົງປັກ ຊໍາກົງທາງບາງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການແຕກຮາກດີຂຶ້ນ.

ການໝຸນໃຊ້ ປີອີ ໃນນາເຂົ້າ.

ໃນພື້ນທີ່ 1 ໄລ່ ໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດປະມານ 200 ກິໂລ ໂດຍ ການແບ່ງໃສ່ເປັນໄລຍະດັ່ງນີ້:

4. ນໍ້າໄປກອງໃນພື້ນຊື່ເມັນເປັນຮູບ 4 ລ່ຽມໃຫ້ສູງປະມານ 30 ເຊັ່ນທາງກອງຢູ່ພື້ນດິນທຳມະດາໃຫ້ໃຊ້ຝາຢາງປູກອ່ນ.
5. ເອົາສອບປ່ານປົກຄຸມໄວ້ 18 ຊົ່ວໂມງ ປື້ນກອງຝຸ່ນໜຶ່ງເທື່ອ.
6. ເມື່ອຄົບ 24 ຊົ່ວໂມງກໍສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້.

ຂໍ້ສັງເກດ: ບຸ່ຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈະບໍ່ຮ້ອນ ບໍ່ເພັ່ນ ມັກມີລາສີຂາວເກີດຂຶ້ນ.

ວິທີຂະຫຍາຍຝຸ່ນໝັກ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ວັດຖຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມ.

1. ບຸ່ຍໝັກ 24 ຊົ່ວໂມງ 1 ສ່ວນ.
2. ຫຍ້າ ຫລື ເພືອງແຫ້ງ 10 ສ່ວນ.
3. ຮຳລະອງດ 1/2 – 1 ສ່ວນ.
4. ບີອີ 20 ຊີຊີ.
5. ກາກນ້ຳຕານ 20 ຊີຊີ.
6. ນ້ຳ 10 ລິດ.

ການປະສົມ.

ປະສົມຄືກັບເທື່ອທຳອິດໂດຍການແຊ່ເພືອງ ຫລື ຫຍ້າແຫ້ງໃນຊາມທີ່ປະສົມບີອີ ກາກນ້ຳຕານ ແລະ ນ້ຳແລ້ວ.

ເມື່ອຄົບ 18 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ປື້ນກອງບຸ່ຍ ແລະ ເມື່ອຄົບ 24 ຊົ່ວໂມງກໍເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ແລະ ເອົາໄປຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຕະຫລອດ.

ການໃຊ້ບີອີ ຂະຫຍາຍເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.

ວັດຖຸ.

1. ກ້ວຍນ້ຳສຸກ 2 ກິໂລ.

- ນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ.

ວິທີເຮັດ.

1. ຕຳໝາກເຜັດ 3 ໜ່ວຍໃຫ້ໝຸ່ນ.
2. ເອົາໝາກເຜັດທີ່ຕຳແລ້ວມາປະສົມນ້ຳ 1 ຈອກ.
3. ຕອງເອົາເຍື່ອໝາກເຜັດອອກ ເອົາສະເພາະແຕ່ນ້ຳໝາກເຜັດໄວ້ໃຊ້.

ວິທີໃຊ້.

ປະສົມນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ + ນ້ຳ BE 5 1 ບ່ວງແກງ + ນ້ຳໝາກເຜັດ 1 ບ່ວງແກງ.

ນຳໄປສີດ ຫລື ຫົດບໍລິເວນທີ່ມີມົດຕິດຕໍ່ກັນ 3 ວັນ ໂດຍສັງເກດໄປນຳແຕ່ລະມື້ຖ້າສີດແລ້ວເຫັນຜົນພາຍໃນມື້ໜຶ່ງກໍສາມາດເຊົາສີດໄດ້.

ສະໝຸ່ນໄພໄລເພີຍ.

ອຸປະກອນ.

1. ຢາສູບປຸກ.
2. BE 5.
3. ນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ.

ວິທີເຮັດ.

1. ເອົາຢາສູບໃສ່ພາສະນະທີ່ມີຝາປິດ.
2. ຖອກນ້ຳໃສ່ໃຫ້ພຽງກັບຈຳນວນຂອງຢາສູບ.
3. ປັດຝາແຊ່ປະໄວ້ປະມານ 10 – 24 ຊົ່ວໂມງ.

ວິທີໃຊ້.

ເອົາປະສົມນໍ້າໃນອັດຕາສ່ວນນໍ້າສະອາດ 10 ລິດ + BE 5
1 ບ່ວງແກງ + ນໍ້າຢາສູບ 1 ບ່ວງແກງສິດທິດທຸກມື້ຈົນກວ່າ
ເພີ່ມຈະໜີ້ຈິ່ງຢຸດໃຊ້.

ແບບແຫ້ງ.

ຝຸ່ນບົ່ມແມ່ນການນໍາເອົາວັດສະດຸຈາກທໍາມະຊາດມາປະສົມກັນ
ເພື່ອໃຫ້ເກີດການໝັກໂດຍມີ BE ເປັນຕົວເຮັດປະຕິກິລິຍາຍ່ອຍ
ສະຫລາຍທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເປັນອາຫານ
ຂອງພືດໂດຍເອີ້ນຕາມວັດສະດຸແຕ່ລະຊະນິດທີ່ໃຊ້ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນບົ່ມ
ເຟືອງ, ຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດ....

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເຟືອງ.

1. ສ່ວນປະສົມເຟືອງແຫ້ງ 1 ສ່ວນ (ຕັດໃຫ້ສັ້ນປະມານ 1 – 2 ນິ້ວ).
2. ແກບແຫ້ງ 1 ສ່ວນ.
3. ຮ່າອ່ອນລະອຽດ 1 ສ່ວນ.
4. ກາກນໍ້າຕານ 20 ຊີຊີ.
5. BE 20 ຊີຊີ.
6. ນໍ້າ 10 ລິດ.

ວິທີປະສົມ.

1. ເອົາເຟືອງ ແລະ ແກບມາປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ.

7. ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີແລ້ວເອົາໄປຮອງກິນຊຸມ ຫລື ບັນຈຸໃສ່
ຖົງເພາະຊໍາໄດ້ເລີຍ.

ການເຮັດຝຸ່ນໝັກຫຍ້າ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ບຸ້ຍໝັກຫຍ້າ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃຊ້ສໍາລັບຮອງກິນຊຸມ ຫລື ໃຊ້
ໂຮຍໃນໜານຜັກສ່ວນຄົວປະສົມ ຫລື ປົກດິນໃນໜານຜັກ ໃຊ້ຄຸມ
ເທິງງາຕົ້ນໄມ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງຫາເຟືອງ ຫຍ້າແຫ້ງ ປົກທັບອີກຊັ້ນນຶ່ງ.

ວັດຖຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມ.

1. ຫຍ້າ ຫລື ເຟືອງແຫ້ງຕັດຍາວປະມານ 5 – 10 ຊັງຕີ
ແມັດ 10 ສ່ວນ.
2. ຮ່າລະອຽດ 1/2 - 1 ສ່ວນ.
3. ຝຸ່ນບົ່ມເຟືອງ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດ 1 ສ່ວນ.
4. ບີອີ 20 ຊີຊີ.
5. ກາກນໍ້າຕານ 20 ຊີຊີ.
6. ນໍ້າ 10 ລິດ.

ການປະສົມ.

1. ເອົາບີອີ ປະສົມນໍ້າ ກາກນໍ້າຕານໃສ່ຊາມ.
2. ເອົາຫຍ້າ ຫລື ເຟືອງແຫ້ງຈຸລົງໃນຊາມເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຊຶມເຂົ້າ
ໃຫ້ທົ່ວແລ້ວກອງໄວ້.
3. ເອົາຮ່າລະອຽດປົນກັນຝຸ່ນບົ່ມເຟືອງ ຫລື ຝຸ່ນບົ່ມຂີ້ສັດໃຫ້
ເຂົ້າກັນດີແລ້ວປະສົມກັບກອງເຟືອງ ຫລື ຫຍ້າແຫ້ງຄົນ
ໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ.

7. ນໍ້າ 10 ລິດ.

ການປະສົມ.

1. ເອົາດິນ ແກບເຝົາ ຂີ້ສັດ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ.
2. ເອົາຮ່າລະອງປະສົມລົງເທື່ອສຸດທ້າຍ.
3. ນໍ້າປະສົມ ກາກນໍ້າຕານ ບີອີ ລົງໄປຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊຸມ 50%.
4. ເອົາໄປກອງເທິງພື້ນຊີເມັນໃນລັກສະນະຮູບ 4 ລ່ຽມຖ້າ ເປັນດິນທຳມະດາຕ້ອງເອົາຜ້າຢາງພື້ນກ່ອນ ຈຶ່ງເອົາບຸ່ຍ ກອງໃສ່ເອົາສອບປ່ານປົກໄວ້ຈຸລິນຊີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ຮ້ອນສູງຈະປີ້ນກອງຝຸ່ນ ຫລື ບໍ່ປີ້ນກໍໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມອຸ ທະພູມປະໄວ້ 5 ວັນກໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້.

ຂໍ້ສັງເກດ: ປະໄວ້ 1 ຄືນຈະມີເຊື້ອລາເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຄວາມຊຸມສູງ ເກີນໄປ ເຊື້ອລາຈະເກີດຫລາຍເປັນເຊື້ອທີ່ມີປະໂຫຍດ ລັກສະນະ ຂອງຝຸ່ນໝັກດິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕ້ອງບໍ່ຮ້ອນ ບໍ່ເພັດມີລາສີຂາວ.

ວິທີໃຊ້:

1. ໃຊ້ສຳລັບຮອງກິນຊຸມເພາະຊຳເນັດພືດໃນຖົງ.
2. ວັດຖຸອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາທີ່ນຳໄປໃຊ້.
3. ດິນໝັກ 1 ສ່ວນ.
4. ດິນປູກຝັງ 1 ສ່ວນ.
5. ແກບເຝົາ 1 ສ່ວນ.
6. ແກບດິນ 1 ສ່ວນ (ຖ້າມີ).

2. ເອົາ BE ກາກນໍ້າຕານມາປະສົມກັນກັບນໍ້າໃຊ້ບົວທົດນໍ້າ ດັ່ງກ່າວລົງກອງເພື່ອງປະສົມແກບໃຫ້ປຽກຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປຽກເກີນໄປ.
3. ຮ່າປະສົມລົງໄປ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນໂດຍໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊຸມປະ ມານ 50% ສາມາດທົດສອບໄດ້ຄືໃຊ້ມີກຳເບິ່ງສ່ວນປະສົມ ດັ່ງກ່າວ ຈົນເປັນກ້ອນແລ້ວແບ່ງອອກ ຖ້າເປັນກ້ອນຕິດກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີນໍ້າໄຫລອອກມາໃນເວລາທີ່ກຳນັ້ນ ສະແດງວ່າ ສ່ວນປະສົມຕ່າງໆນັ້ນໄດ້ແລ້ວ.
4. ນຳໄປກອງໃສ່ກະສອບປ່ານທີ່ມີເພື່ອງຮອງພື້ນ ຄວນກອງ ໃຫ້ສູງບໍ່ເກີນ 30 ເຊັ່ນ.ໃຊ້ກະສອບປ່ານຄຸມທັບອີກຊັ້ນ ໜຶ່ງປະໄວ້ 5 ຊົ່ວໂມງ. ເມື່ອຄົບ 5 ຊົ່ວໂມງແລ້ວຕ້ອງ ໝັ່ນກວດອຸທະພູມທຸກໆຊົ່ວໂມງຄວບຄຸມໃຫ້ອຸທະພູມສູງບໍ່ ເກີນ 40 – 45 ອົງສາ ຖ້າເກີນນັ້ນໃຫ້ປີ້ນກອງຝຸ່ນທັນທີ ຖ້າຫາກປ່ອຍໃຫ້ອຸທະພູມສູງເກີນ 45 ອົງສາຝຸ່ນຈະບໍ່ມີ ຄຸນນະພາບ.
5. ຕ້ອງກວດສອບທຸກໆຊົ່ວໂມງຈົນກວ່າອຸທະພູມຈະເລີ່ມຫລຸດ ລົງ ເປັນປົກກະຕິຈຶ່ງສາມາດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ (ປະມານ 2 - 3 ວັນ).
6. ຖ້າປະສົມໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊຸມ 50% ພໍດີ 3 ວັນກໍສາມາດ ໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ຖ້ານໍ້າຫລາຍຄວາມຊຸມສູງກອງຝຸ່ນກໍຈະຮ້ອນ ຫລາຍອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍວັນກອງຝຸ່ນຈຶ່ງຈະເຢັນ.

7. ການກວດສອບວ່າໃຊ້ໄດ້ ຫລື ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ດິນກິນ ຖ້າໃຊ້ໄດ້
ຈະມີກິນຫອມຄືດອກເຫັດ.

ວິທີໃຊ້.

ໃຊ້ກຽມດິນສຳລັບປູກພືດທຸກຊະນິດໂດຍໃຊ້ຕະລາງຕາແມັດຕໍ່
200 ກະລາມ (2 ກຳມີ). ໃຊ້ຫຍ້າ ຫລື ເພືອງແຫ່ງປົກກັບ
ອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ແລ້ວທົດດ້ວຍນ້ຳປະສົມນ້ຳ ບີອີ ກາກນ້ຳຕານ ໃນອັດ
ຕາສ່ວນຢ່າງນ້ອຍຢ່າງລະ 20 ຊີຊີ ຕໍ່ ນ້ຳ 10 ລິດ ປະໄວ້ 7
ວັນຈຶ່ງສາມາດທີ່ຈະປູກຜັກໄດ້.

ໃຊ້ກັບພືດທຸກຊະນິດ ໂດຍໂຮຍຮອບຕົ້ນພືດທ່າງໆຢ່າໃຫ້ຖືກ
ເທົ່າພືດທີ່ຍັງອ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ພືດຕາຍໄດ້ ເພາະຜຸ່ນບົ່ມເພືອງມີ
ຄຸນສົມບັດເປັນກົດໃຊ້ຫຍ້າແຫ້ງ ຫລື ເພືອງປົກຄຸມເທິງາແລ້ວທົດ
ດ້ວຍນ້ຳປະສົມ ບີອີ ອີກກໍໄດ້ ໃຊ້ເກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 2 ກຳມີ ຕໍ່
ຕະລາງແມັດໂດຍໂຮຍຮອບໆປົກດ້ວຍຫຍ້າແຫ້ງ ຫລື ເພືອງທົດ
ດ້ວຍນ້ຳປະສົມບີອີ.

ການປະສົມບີອີໃນອາຫານສັດທຸກຊະນິດ.

ອາຫານໄກ່ ແລະ ໝູ.

1. ປາປິ່ນ 6 ກິໂລ.
2. ກາກຖົ່ວ 6 ກິໂລ.
3. ຮຳລະອງດ 20 ກິໂລ.
4. ກະດູກປາ 0.2 ກິໂລ.
5. ຫອຍປິ່ນ 0.2 ກິໂລ.
6. ອອງກະບູປິ່ນ 0.2 ກິໂລ.

7. ຂີ້ເຖົ້າແກບ 0.2 ກິໂລ.

8. ບີອີ 6 ຊີຊີ, ກາກນ້ຳຕານ 6 ຊີຊີ, ນ້ຳສະອາດ 3 ລິດ.

ວິທີເຮັດ.

1. ປະສົມທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນຈະໄດ້ຄວາມຊຸ່ມ 40%.
2. ເອົາໃສ່ກະສອບປ່ານໄວ້ມັດປາກໃຫ້ແໜ້ນ.
3. ເອົາກະສອບຜຸ່ນບົ່ມເພືອງໃສ່ຖົງປາລາສະຕິກດຳ ມັດປາກ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າ.
4. ໝັກໄວ້ 9 ວັນ ອຸນຫະພູມຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 35 – 40 ອົງ
ສາ.
5. ເອົາກະສອບອອກຈາກຖົງປາລະສະຕິກແລ້ວ ປະໃຫ້ແຫ້ງ
ໃນຮົ່ມໂດຍປີ້ນກະສອບທຸກມື້ ຢ່າໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມໄປຂ້ອນຢູ່
ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດດານເນົາເສຍໄດ້.

ວິທີໃຊ້.

ເອົາປະສົມອາຫານສັດໃນປະລິມານຜຸ່ນບົ່ມເພືອງ ຫລື ຜຸ່ນບົ່ມ
2 ກິໂລ/ອາຫານ 100 ກິໂລ.

ການເຮັດຜຸ່ນໝັກດິນ.

1. ດິນຕາກແຫ້ງທັບໃຫ້ລະອງດ 5 ສ່ວນ.
2. ຮຳລະອງດ 2 ສ່ວນ.
3. ແກບເຝົາ 2 ສ່ວນ.
4. ຂີ້ສັດ 2 ສ່ວນ.
5. ບີອີ 20 ຊີຊີ.
6. ກາກນ້ຳຕານ 20 ຊີຊີ.