

ການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ



ກະຊວງກະສິກໍາ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມື

ການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ

ກົມເຜີຍແຜ່ ວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກກະສິກຳ

ກະຊວງກະສິກໍາ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ

ແປຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ
ກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃຫ້ທຶນຈັດພິມໂດຍ: ອົງການກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອິຟັດ

1990

ຄຳນຳ

ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປະເທດເຮົາ ໃນແຕ່ລະເຂດເປັນ ສິ່ງຍິ່ງບອກເຖິງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອຜະລິດອຸດສາຫະກຳທີ່ ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງອາໄສຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະເຂດ ເພື່ອຜະລິດພືດອຸດສາຫະກຳຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຜະລິດວັດຖຸສຳ ລັດຮູບເພື່ອເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສິນຄ້າຂາອອກ.

ປັນຫົວໜ້າໄດ້ຮູບຮຽງຂຶ້ນມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຍູ້ ແຮງການຜະລິດພືດອຸດສາຫະກຳບາງຊະນິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮອງຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ຜະລິດພືດເຫຼົ່ານີ້ (ເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຮ່ວມໝູ່ ແລະ ປ່ວງຊົນ) ໄດ້ນຳໄປພູນໃຊ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຜລາວ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ວິຊາການທີ່ໄດ້ຮູບຮຽງນີ້ ແມ່ນເອົາບົດຮຽນບາງສ່ວນມາ ຈາກບັນດາສະຖານີຄຸ້ມຄອງ, ບົດຮຽນກະເສດ, ສະຫະກອບກະເສດ, ຜູ້ຜະລິດຕົວຈິງ ປະສານສົມທົບກັບບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ພິດ ອຸດສາຫະກຳ ຈຳພວກນີ້ເປັນສິນຄ້າຂາອອກອັນສຳຄັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ ກໍຍັງມີອັນຈຳ ກັດຢູ່, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບມັນຄວາມຮຽກຮອງຕ້ອງການ ໃນດ້ານວິຊາ ການຊຸກຍູ້ພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປັນຫົວໜ້າຍັງບໍ່ທັນສົມບູນແບບເທື່ອແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ສາລະບານ

1. ການປຸກກາຝ.	1
2. ການຕັດແຕງຕົ້ນກາຝ.	25
3. ການປຸກພາກແຫງ.	42
4. ການປຸກຢາດູດ.	53
5. ຄຸນກຽວກັບການປຸກອອຍ.	69
6. ການປຸກຝາຍ.	100
7. ການປຸກພິກໄທ.	119
8. ການປຸກງາ.	140
9. ການປຸກຫຸງສາ.	146
10. ການປຸກພາກມວງຫິນະພານ.	154
11. ການປຸກຂາ.	161
12. ການປຸກຂົງ.	165
13. ຄຸນປະໂຫຍດແລະການປຸງແຕງຂົງ.	169
14. ການປຸກຫົວສີໃຄ.	186
15. ການປຸກກົກກະຖິນ.	191

ການປູກກາເຟ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ວິສັນ ນະລົງສັກ

: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປູກກາເຟ

I. ປະຫວັດແລະຄວາມເປັນມາຂອງກາເຟ

ກາເຟເປັນພືດຜົນກຳເນີດຢູ່ໃນປະເທດ ເອທິໂອເປຍ ທະວີບອາຟະຣິກາ. ໃນສັດຕະວັດທີ່ 15 ມີຜູ້ນຳເອົາກາເຟໄປປູກໃນແຄວ້ນ ອາຣາເບຍ ຊຶ່ງໄດ້ມາແຄວ້ນນີ້ໂດຍກາຍເປັນຕະຫຼາດກາເຟອັນສຳຄັນ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດຄຳກາເຟແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກ ແລະ ໂດຍກາຍເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 200 ປີ. ຊາວອາຫຼັບຫວັງຫາມາສັກໃຫ້ເອົາກາເຟອອກຈາກປະເທດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນສາມາດລັກລອບເອົາເມັດພັນກາເຟ ອອກໄປປູກຢູ່ປະເທດອື່ນໄດ້ ແລະ ຢູ່ໂຮຍ ໃນສັດຕະວັດທີ່ 17 ຊາວໂຮຍລັງ ໄດ້ນຳເອົາກາເຟໄປປູກຢູ່ອັນໂດເນເຊຍ ແລະ ຍັງມີຄົນອື່ນນຳໄປປູກຢູ່ທະວີບອາເມລິກາກາງ ແລະ ອາເມລິກາໃຕ້, ກາເຟຈຶ່ງແຜ່ຫຼາຍໄປທົ່ວໂລກ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາ ການປູກກາເຟສັບພິຖານໄດ້ວ່າ . ຊາວຝຣັ່ງເສດໄດ້ນຳເຂົ້າມາປູກໃນປະມານປີ 1940 ກວ່າ, ໃນສະໄໝຝຣັ່ງປົກຄອງ, ໂດຍນຳໄປປູກຢູ່ສະຖານີປູກຝັງຫຼັກ 42 ສິ້ນ ຫ່າງປາກເຊ, ປາກຊອງ ແລະ ມີຢູ່ 5 ຊະນິດທີ່ນຳເອົາເຂົ້າມາປູກຄື :

- ພັນອາລາຍິກາ ຊຶ່ງຊາວສວນເອີ້ນວ່າ ກາເຟນ້ອຍ.

- ພັນ ໂລບັສຕາ (ກາເຟກາງ)
- ພັນເອັກແອນຊາ (ກາເຟນົກ)
- ພັນລິເບລິກາ
- ຊາລີ.


ສ່ວນປະຈຸບັນນີ້ຍັງເຫຼືອແຕ່ສະເພາະ 3 ຊະນິດ ພັນທຳອິດ ເທົ່ານັ້ນ ຫວຍກາເຟໄດ້ບັນຈຸທາດກາເຟອົບລະຫວ່າງ 0,65 ຫາ 2,70%.

II. ລັກສະນະ ແລະ ນິດໄສປະຈຳຕົວຂອງກາເຟ

ກາເຟເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີກເກີດໃນພູມປະເທດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ ຊຸ່ມ, ດິນຫວຽນ, ລະບາຍນ້ຳດີ, ແລະສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບ ນ້ຳທະເລຂຶ້ນໄປຈົນຮອດ 2300 ແມັດ. ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສຳລັບປູກກາເຟແມ່ນສູງລະຫວ່າງ 1000 ແມັດ. ແຕ່ກໍມີບາງປະເທດສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບ 250 ແມັດ ເຊັ່ນ ປະເທດ ບະເຣຊິນ.

ແຕ່ວ່າມີສ່ວນພົວພັນກັບປະລິມານນ້ຳຝົນ, ການກະຈາຍຂອງ ນ້ຳຝົນ ແລະ ຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດ ເພາະວ່າໃນບ່ອນສູງໆ ຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ກາເຟເຕີບໃຫຍ່ດີ.

ເນື່ອງມາຈາກເໝາະສົມປູກກາເຟ ຄວນເປັນເນື້ອທີ່ຂຽງ ພາຍ ຄວາມວ່າ ຕາມຈາຍພູ ເພາະນ້ຳຈະບໍ່ຂັງ ຖ້າຫາກນ້ຳຂັງກາເຟ ຈະຖືກກະທົບກະເທືອນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຫຼີກລ້ຽງຈາກນ້ຳພອກ



ຮູບ 1. ພັນອາລາບັກາ



ຮູບ 2. ພັນໂລບັສຕາ

ຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກມີນ້ຳພອກຂຶ້ນແລ້ວ ຕົ້ນກາເຟຈະຕາຍເມັດກາເຟຈະ
ຫຼົ້ນກອນສຸກຂຶ້ນ ກາເຟອາລາບິກາ. ແຕ່ກາເຟໂລບັສຕາເຕັ້ນວ່າ
ຕົ້ນທາບຕໍ່ນ້ຳພອກຂຶ້ນໄດ້ດີ ກາເຟບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວປົກກະຕິ ຢູ່ໃນ
ອຸບນະພູມຕໍ່ກວ່າ $10-12^{\circ}\text{C}$ ສະເລ່ຍ ອຸບນະພູມພູມຖິ້ງຂອງກາເຟ
ອາລາບິກາຕໍ່ສຸດ 16°C ; ຢາມກາງ $18-22^{\circ}\text{C}$ ແລະສູງ
ສຸດ 26°C ສ່ວນແນວພັນອື່ນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດ $20-25^{\circ}\text{C}$
(ສຳລັບແນວພັນອື່ນໆ).

1. ດິນແລະການເລືອກດິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບກາເຟ ແຕ່ລະພັນ.

ດັ່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ. ກາເຟພັນກົດຫຼວມ ນ້ຳບໍ່ຂັງລະບາຍ
ນ້ຳໄດ້ດີ ຊັ້ນດິນເລິກ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ. ສະນັ້ນ, ຄວນເລືອກ
ເນື້ອທີ່ ເປັນປ່າໄມ້ປູກເບີກໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າມີອົບຊີວິດຖູ ແລະ
ຫາດອາຫານພຽງພໍ, ດິນທີ່ຈະປູກຕ້ອງເປັນດິນທີ່ ເປຕັສ Ph
4,2-5,1 ສ່ວນພາກກາເຟ ອາລາບິກາ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ
ທີ່ສຸດໃນດິນທີ່ເປັນກາງ ແລະ ດັ່ງອອນ ຊຶ່ງເປຕັສ Ph6,5-7,2
ການເລືອກເນື້ອທີ່ປູກຄວນໃຫ້ເໝາະສົມກັບພັນກາເຟທີ່ຈະປູກເຊັ່ນ:
ເນື້ອທີ່ສູງຄວນປູກກາເຟນ້ອຍ (ອາລາບິກາ) ເນື້ອທີ່ກວ່າຈາກ
ນ້ຳພອກຂຶ້ນ ແລະ ພູທີ່ຕໍ່າໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄວນປູກກາເຟກາງ (ໂລບັສ
ຕາ).

ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ກາເຟຕ້ອງກາຍຢ່າງໜ້ອຍຕັ້ງແຕ່ 1.500 ມມ. ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ການກະຈາຍຂອງນ້ຳຝົນຕ້ອງສະໜັບສະໜູນໃນລະດູຝົນ.

ພັນ

ພັນກາເຟທີ່ປູກເປັນເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳມີ 2 ພັນຄື : ພັນອາລາບິກາ (ກາເຟນ້ອຍ) ແລະ ພັນໂລບັສຕາ (ກາເຟກາງ).

ພັນອາລາບິກາ ເພາະສົມກັບພັນທີ່ ທົນລະດົບຄວາມສູງຕັ້ງ ແຕ່ 500 ແມັດ ເຖິງ 2000 ແມັດ.

ພັນໂລບັສຕາ ເພາະສົມກັບພັນທີ່ ທົນລະດົບສູງຕັ້ງ ແຕ່ 250 ແມັດ ຫາ 2300 ແມັດ.

ແຕ່ກໍມີບາງບ່ອນສາມາດປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຄວາມສູງ 50 ແມັດ ຂຶ້ນໄປທັງນີ້ ກໍຕ້ອງມີປັດໄຈຢ່າງອັນຫຼາຍເພາະສົມ ເຊັ່ນ : ສະພາບຂອງດິນ, ນ້ຳຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມ.

ການເລືອກພັນທີ່ຈະປູກກໍມີສ່ວນພົວພັນກັບສະພາບຂອງດິນທີ່ຈະປູກເພື່ອນກັນ ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້າເປັນພື້ນທີ່ ສູງຄວນຈະເລືອກກາເຟນ້ອຍ (ອາລາບິກາ) ເນື່ອງຈາກວ່າມັນທົນແລງໄດ້ດີ ແລະ ກໍສາມາດຫຼີກເວັ້ນຈາກນ້ຳຟອກຂຸນໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພື້ນທີ່ຕໍ່າລະຫວ່າງຫຼຸບຂອງເປັນພູ ຄວນຈະເລືອກເອົາກາເຟກາງ (ໂລບັສຕາ) ເພາະສາມາດທົນຕໍ່ນ້ຳຟອກຂຸນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ພະຍາດຂົນຮຸ່ງໄດ້.

2. ການຂະຫຍາຍພັນ

ການຂະຫຍາຍພັນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ :

1. ການກາແກບ

2. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການຕອບ, ປັກຊຳແລະອື່ນໆ.

ໃນການຂະຫຍາຍພັນນີ້ຈະເລືອກວິທີການໃດກໍໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານ ເພາະແຕ່ລະວິທີມີຂັດແລະ ຂໍ້ ເສຍຕ່າງກັນ ຈຶ່ງຈະກ່າວຕໍ່ໄປຄື :

ກ. ການກາແກບ

- ຂັດຂອງມັນ :

- + ໄດ້ຫຼາຍ
- + ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ
- + ໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍໃນການລຳລຽງຂົນສົ່ງແນວພັນ
- + ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິຊາການສູງ ແລະ ບໍ່ມີເຄື່ອງມືພິເສດ
- + ຕົ້ນກາແກບຈະມີອາຍຸຍືນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີລະບົບຮາກແກວ.

- ຂເສຍ :

- + ຕົ້ນກາແກບທີ່ໄດ້ມາອາດຈະບໍ່ໄດ້ພັນແທ້
- + ໃຫ້ເລືອກຊາ
- + ໃຫ້ເລືອກບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
- + ເມື່ອເວົ້າໄປປູກຕົ້ນກາແກບທີ່ໄດ້ຈະບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີໃນຂັ້ນຕໍ່ມາ.

2. ການຂະຫຍາຍພື້ນແບບອື່ນໆເຊັ່ນການຕອນ

- ຂໍ້ :
 - + ໄດ້ພົ້ນແຫຼ່ງເດີມ
 - + ໃຫ້ພົ້ນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໝີ
 - + ໃຫ້ພົ້ນຜະລິດໄດ້ໄວ
 - + ເມື່ອປຸກ, ຕົ້ນຈະສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດ
 - + ລຳຕົ້ນໄດ້ຮູບຊົງດີ ເຕຍຊົງສະດວກໃນເວລາເກັບກ່ຽວ
- ຂໍ້ສະເໜີ :
 - + ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຳນວນຕ້ອງການ
 - + ອາຍຸສັບ ເບື້ອງຈາກບໍ່ມີລະບົບຮາກແກວ ແລະ ເບື້ອງຈາກເບຍຫໍ້ໄຟອາຍຫຼາຍແລ້ວ.
 - + ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ເພາະຕ້ອງມີວັດຖຸອຸປະກອນອື່ນໆເພີ່ມອີກ.

3. ການຄັດເລືອກເມັດພັນ

- ເລືອກຈາກຕົ້ນທີ່ເຕີບໂຕສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ໃຫ້ພົ້ນຜະລິດຫຼາຍ.
- ຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງທຶນຫານຕ່ຳພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້.
- ໃຫ້ພົ້ນຜະລິດສະໝໍ່າສະເໝີ.
- ເລືອກຈາກຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸສັມຄວບ ເຊັ່ນ : ພັນອາລາບິກາຄວບມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 5 ຫາ 8 ປີ ແລະ ພັນໂລບັສຕາມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 8 ຫາ 10 ປີ.

- ເລືອກເອົາໜ່ວຍສຸກເຕັມທີ່ ແລະ ຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງ
ກົງ ແຕ່ບໍ່ຄວນເອົາເມັດທີ່ຢູ່ປາຍກົງ ຫຼື ໃກ້ຕາມ.

- ບໍ່ຄວນເລືອກເອົາເມັດທີ່ແຫງຄາຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ຄວາມງອກຕ່ຳ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີເລີຍ.

- ສີຂອງເມັດຄວນມີສີສົດໃສ.

ເພື່ອຫຼີກສອບວ່າເມັດມີຄວາມງອກດີເມື່ອເກັບໄດ້ດັ່ງເຈື່ອນ
ໄຂຂ້າງເທິງແລ້ວ ຫຼັງຈາກອ່ວເປືອກບອກອອກແລ້ວ ເອົາແຊບ້າ
ເພື່ອລ້າງເນືອກອອກ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສັງເກດວ່າ ເມັດທີ່ຟຸ້ນກໍ່
ບໍ່ຕ້ອງນຳເອົາໄປກາ; ເລືອກເອົາແຕ່ເມັດທີ່ມີນ້ຳເຫຼົ້າບໍ່.

ຫຼັງຈາກໄດ້ເມັດພ້ອມ ເພື່ອຈະນຳໄປຕາກ ບໍ່ຄວນຕາກໃສ່
ແດດເກີບໄປ ເຊັ່ນ : ແດດຕອນທຽງ 2 ຫາ 3 ໂມງແລງ
ເພາະແດດກາຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເສຍຄວາມງອກໄປ, ຄວນຕາກ
ແດດຕອນເຊົ້າອອດ 12 ໂມງເຊົ້າ ແລ້ວເອົາເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີ
ອາກາດລຽງດີ. ເມື່ອອອດປາຍ 3 ໂມງແລງຈຶ່ງນຳອອກມາຕາກ
ໃໝ່. ແຕ່ຫາມຕາກໜ້ອກໄວກາງຄືນ ເມື່ອຄຳແລ້ວຄວນກູ້ໄວ້ເຊັ່ນ
ດຽວກັນກັບທີ່ເຮັດຜ່ານມາ.

ຊີວິດຂອງເມັດພ້ອມກາຝາ ຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ 2 ເດືອນ ຖ້າ
ກາຍຈາກບໍ່ແລ້ວ ອັດຕາການງອກຈະຕ່ຳລົງ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເກັບ
ເມັດພ້ອມໄດ້ແລ້ວ ຄວນກຽມໜ້ານກາ ແລະ ກາພາຍໃນ 2 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກເກັບເມັດ.

4. ການກ້າແກ່ນເມັດພັນ

ດັ່ງໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວວ່າ ຄວາມມີຊີວິດຂອງເມັດພັນຈະມີລະຫວ່າງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າກາຍຈາກນັ້ນໄປ ອັດຕາການງອກຈະຕໍ່າ ສະນັ້ນ, ຕ້ອງກະກຽມເງື່ອນໄຂການກ້າແກ່ນພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເບຍຫຼືສົມບູນ, ແຂງແຮງ ແລະ ໃຊ້ເມັດພັນໜ້ອຍເມັດທີ່ຄວນເຮັດແປວພັນ ຕ້ອງເປັນເມັດຄູ່ ໄດ້ຂະໜາດງາມສະໝໍ່າສະເໝີ, ສ່ວນເມັດດຽວ ເອີ້ນວ່າເມັດຜູ້, ກ່າແລ້ວບໍ່ແຕກໜ້າເຂົ້າບໍ່ມີຍົນເລືອກພັນ ສ່ວນເມັດ 3 ຊຶ່ງເປັນເມັດຫຸ້ນໜ້ອຍບໍ່ໄດ້ ສ່ວນເມັດຝາແຜ່ດອກຂຸບ 2 ຕົ້ນ ຫຼື ຕົ້ນດຽວກໍ່ໄດ້ ຄືຈຳພວກບໍ່ສົມບູນແບບ. ສະຖານທີ່ກ້າແກ່ນຄວນເປັນບ່ອນທີ່ໃກ້ນ້ຳ ເພື່ອສະດວກໃນການຫຼືດນ້ຳ. ດິນຈະຕ້ອງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ມີອົບຊີວິດຖູຫຼາຍລະບາຍນ້ຳດີ. ບໍລິເວນການກ້າຈະຕ້ອງໄໝ້ງຫ່າງໆ ອາດຈະໃຊ້ຕົ້ນເລື້ອຍໆຫ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເບຍທີ່ເກີດໃໝ່ກະທົບກັບແສງແດດກາໃນຍາມຫຼົງ. ເມື່ອນຳໄປກ້າໄດ້ປະມານເຄັ່ງເດືອນ ເມັດກໍ່ຈະແຕກງອກຂຸບມາເລື້ອຍໆ ເມື່ອເບຍມີໃບແທປະມານ 3 ຫາ 5 ໃບ ໃຫ້ເອົາວັດຖຸຫຸ້ມໆ ເຮືອນກ້າແກ່ນອອກເລັກນ້ອຍ. ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນກ້າໄດ້ຮັບແສງແດດເຝັ້ນຂຸບ, ແຕ່ບໍ່ຄວນເອົາອອກເພີດເຫຼືອດຽວ ຄວນເອົາອອກເຫຼືອລະນ້ອຍ ໂດຍເວັ້ນຫ່າງກັນປະມານ 1-2 ອາຫິດ ຈົ່ງເອົາອອກອີກ.

ອົກປະການໜຶ່ງ ການກຳນົດລວມກວ່າໆເກີນ 1 ແມັດ ເພື່ອ
ສະດວກໃນການປະຕິບັດເສຍຫຍາ, ຂ້າຫຸນ ແລະ ໃສ່ຝຸນ, ສ່ວນ
ຄວາມຍາວບໍ່ຈຳກັດ.

ໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດເຮັດເຮືອນກຳເບີຍໄດ້ ກໍສາມາດກຳ
ໃສ່ກອງຕັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຈຸດປະສົງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ
ແລ້ວ.

ເມື່ອເບີຍສູງປະມານ 30-40 ຊ.ມ ກໍຍ້າຍໄປປຸກໄດ້
ຊຶ່ງຈະກິນເວລາທັງໝົດປະມານ 10 ຫາ 12 ເດືອນ ລວມທັງກຳ
ຊຳ, ການຊຳຟ້າຍເຖິງການຍ້າຍເບີຍນອຍອອກໄປບົງໄວ້ໃນໝາຍ
ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອກຽມເອົາໄປປຸກ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເບີຍແຂງແຮງມີງ່າ
ສົມຄວນ, ຕົ້ນເຕຍ, ດ້ວຍເຫດວ່າຖ້າຍ້າຍອອກຊຳແລ້ວເບີຍຈະ
ບຽດກັນໄຟດ ເຮັດໃຫ້ລຳຕົ້ນສູງອ່ອນແອລ້ມງ່າຍ.

III. ການປຸກກາເຟ

ກາເຟເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີກົດໜຶ່ງ, ບໍ່ຂົງເກີນ ມີຮົ່ມພຽງພໍບໍ່ມີກ
ແດດຫ້າ, ບໍ່ມີກລົມແຮງ, ການປຸກຄວນປຸກໃສ່ບ່ອນທີ່ຄົງຕົ້.

- ລະດູການປຸກແມ່ນຕົ້ນລະດູຝົນ ເພື່ອສະດວກໃນ ລ້ອງ
ນ້ຳ.

- ເບີຍທີ່ຈະປຸກຕ້ອງຄຳນຶງວ່າໄດ້ມາຈາກການກຳເນີດ ຫຼື
ການຕອນກ່ອນຈະປຸກກາເຟ ຄວນປຸກຕົ້ນໄມ້ບັງຮົ່ມຊົ່ວຄາວໄວ້ເສຍ
ກ່ອນລວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຫຼື 1 ປີ ເຊັ່ນ : ຈຳພວກຕົ້ນກ່ວຍ ,

ສາກຮູງ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອເປັນຫົນພູມ
ວຽນ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ເກັບຮ່ວມກັນແດດກໍໄດ້.


ເມື່ອປະຕິບັດໂຄງກາງແລ້ວ ກໍລົງມືປຸກກາຟຢ່າງຕາຕະ
ລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ : (ດັງຮູບ 3,4,5,6).

ເພີ່ມກາຟໄລຍະໄດ້ 1 ຈ/ນ້ຳ/	ເລີ່ມກັບໄດ້ 1 ຈ/ນ້ຳ/
1	1 ປຸກ 1 ຈາກ 1 ຄຕ. ເພີ່ມຜະລິດໄດ້ 1 ຈ/ນ້ຳ/

1 ອາລາບິກາ 3x3ມ ກາຟແກນ	1.110 ຕັນ	3 ປີ	1 30ປີ
1 ອາລາບິກາ 2x2ມ ຕອນ	12.500 ຕັນ	2 ປີ	1 15-20ປີ
1 ໂລບັສຕາ 4x5ມ ກາຟແກນ	500 ຕັນ	4 ປີ	1 30-50ປີ
1 ໂລບັສຕາ 3x3ມ ຕອນ	1.110 ຕັນ	2 ປີ	1 25-30ປີ

ການຂົນສົ່ງປຸກໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດ 30x30x30 ຊຸດ. ແລ້ວໃສ່
ຝຸນຄອກ ຫຼື ໃບໄມ້ເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ໃນອັດຕາ 2ກິໂລ
ຕໍ່ 1 ຂມ, ນຳເອົາເບຍກາຟປຸກໃສ່, ຖິ້ມດິນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ
ໃຫ້ດິນທີ່ຖິ້ມຂຶ້ນປຸກສູງກວ່າລະດັບພື້ນດິນຈັກໜ່ວຍ ເພື່ອເວລາດິນ
ແຈບລົງ ແລ້ວໃຫ້ປຸກໃນລະດັບດຽວກັບລະດັບພື້ນດິນ. ຖ້າຫາກມີ
ຄວາມສາມາດຫາຝຸນຄອກໃສ່ໃນຂຸມກ່ອນປຸກໄດ້ຍິ່ງດີ. ໂດຍສະ
ເພາະຝຸນຈຳພວກອາຊິດ ແລະ ກາລີໃນອັດຕາ 1 ບວງກາຟ/ຕັນ
(ປະມານ 5 ກຳມ/ຕັນ).

ອີກປະການໜຶ່ງເບຍທີ່ຈະນຳໄປປຸກຄວນຈະຕັດໃບຈຳພວກໃບ



ຮູບ 3. ອາລາບກາ(ກາແກນ)



ຮູບ 4. ໂລບັສຕາ(ກາແກນ)



ຮູບ 5. ອາລາບກາ(ຕອນ)



ຮູບ 6. ໂລບັສຕາ(ຕອນ)

ທີ່ໃຫຍ່ອອກ 2/3 ຂອງຈຳນວນໃບໝໍ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເທີຍ
ຂອງບັ້ງອອກ. ຈຶ່ງໄວ້ແຕ່ໃບອ່ອນໜຶ່ງໃໝ່. ຮາກກໍເຊັ່ນດຽວຫາກ
ເຫັນວ່າຮາກມັນມີຫຼາຍ ແລະ ຮາກແກ້ວຍາວໄພດກໍຄວນ ຕັດອອກ
ກະວ່າໃຫ້ພໍດີກັບຂຸມປຸກ, ສ່ວນຮາກຟອຍກໍຕັດແຕ່ງຕາມອຸກເລັກນ້ອຍ
ເພື່ອໃຫ້ພໍດີກັບຂຸມປຸກ ແລະ ເພື່ອຄວາມຕຸ່ນດຽງລະຫວ່າງການຕູດ
ນ້ຳຂອງຮາກ ແລະ ການລະເທີຍຂອງໃບ.

1. ການບົວລະບັດຮັກສາ

ເມື່ອປຸກກາເຟຊຶ່ງຕັ້ງຕົວໄດ້ແລ້ວ ກໍຜັນຫາຄວາມສະອາດບໍ່
ລົດວນສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວບໍລິເວນອ້ອມຕົ້ນກາເຟ ນັ້ນ ບໍ່ຄວນ
ໃຫ້ມີຫຍາເພາະວ່າຫຍາມັນຈະຍາດເອົາອາຫານຈາກກາເຟ ແຕ່ດີ
ທີ່ສຸດເທິງຕົ້ນກາເຟຕ້ອງປົກຄຸມດ້ວຍໃບໄມ້ ເພື່ອຮັກສາຄວາມອຸ່ມ
ຊຸ່ມຢູ່ເລື້ອຍໆ. ເມື່ອຕົ້ນກາເຟສູງໄດ້ປະມານ 1 ຫາ 1,5 ແມັດ
ຄວນຕັດຍອດເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນກາເຟແຕກກົງການອອກ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ກາເຟສູງຂຶ້ນຫ່າງດຽວ ເພື່ອສະດວກໃນເວລາເກັບກຽວ ແລະ ໃຫ້
ພົ້ນຜະລິດສູງ, ຕົ້ນກາເຟທີ່ກຳລັກສະໜະດີຄວນຈະເປັນພູມກົງການ
ແພ່ອອກດານຂາງ.

2. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຝຸ່ນຄອກຈຳພວກຂີ້ເປັດຂີ້ເກີ່ ຂີ້ ແລະ ອື່ນໆໃສ່ໃນອັດຕາ
2 ກິໂລ/ຕາ, ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ໃນເມື່ອເຫັນວ່າຕົ້ນກາເຟ ເລີ່ມໃຫ້ພົ້ນ

ຜະລິດລົງສູດ; ຝຸ່ນເຄມີທີ່ໃຊ້ໄດ້ນັບສົມຄວນໄດ້ແກ່ສູດ 10-5-20. ໃສ່ໃນອັດຕາ 100-150 ກຼາມ/1 ັ້ນ.

ນອກຈາກຝຸ່ນທີ່ຫາໄດ້ຍາກແລ້ວ ເປື່ອກຫຸ້ມເມັດກາເຟທີ່ສອກໄປແລ້ວບຸ້ນນໍ້າເອົາໄປຢາຍໃສ່ທີ່ວິບໍລິເວນສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນປົກຫຸ້ມບໍລິເວນຕົ້ນຈົນຊື່ຕົງກັບປາຍສຸດຂອງພູມ, ໃບກໍຈະສາມາດເພີ່ມສະມັດຖະພາບໄດ້ດີ ແລະ ເປັນຊະນິດດຽວທີ່ຊອກໄດ້ງ່າຍ.

ການປູກພືດຄຸມດິນ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອບັນ ເພາະສາມາດກາຍເປັນຝນຂຽວໃຫ້ແກ່ກາເຟ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະໄຫຼຂອງຝຸ່ນ ເມື່ອມືນຕົກລົງມາ, ແຕ່ມີຂໍ້ຄວນຄິດຢູ່ວ່າ ຄວນປູກຕາມຫວາງແຖວກາເຟໃນບໍລິເວນພູມຄວນໃຫ້ກ່ຽງສະອາດ ເນື່ອງຈາກວ່າກາເຟເປັນພືດທີ່ມັກຝອຍຫຼາຍ ແລະ ຊອກຫາອາຫານຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ໆ ໝາດິນ.

ເວລາໃນການໃສ່ຝຸ່ນຫໍ່ມະຊາດ (ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນຂຽວ, ຝຸ່ນບົນ) ຄວນເລີ່ມໃສ່ເມື່ອຝົນເລີ່ມຕົກ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ ຖ້າຫາກສາມາດໃສ່ໄດ້ຄວນໃສ່ກ່ອນກາເຟອອກດອກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເມັດກາເຟເຕັ້ນ ແລະ ດົກ, ແຕ່ມີຂໍ້ຄວນລະວັງ ກໍຄືຢ່າຂັດດິນທີ່ຈະໃສ່ຝຸ່ນເຄມີເລີກເກີນໄປ ຄວນໃຫ້ເປັນຮ່ອງໃສ່ຝຸ່ນເລີກປະມານ 10-15 ຊຸດ. ແລະ ຫວາງຈາກຕົ້ນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 50 ຊຸດ. ເມື່ອໃສ່ແລ້ວກໍຖິ້ມຮ່ອງໃສ່ຝຸ່ນ.

3. ການຕັດແຕ່ງຂົງພຸ່ມ

ການຕັດແຕ່ງຂົງພຸ່ມ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດກໍ່ສູງ ແລະ ສະກຸ້ມສະເໝີ, ເພື່ອໃຫ້ແສງແດດພຽງພໍ, ເພື່ອໃຫ້ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີໃນລະຫວ່າງແຖວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກາເຟພຸ່ມຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມີອາຍຸຍືນຍາວ ສະດວກໃນການປັ່ງກັນ ສັດຕູ ແລະ ພະຍາດ.

ການຕັດແຕ່ງ ຄວນເຮັດໃນລະດູແລ້ງ, ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວ ແລ້ວ ແຕກການປູກກາເຟໃນບ້ານເຮົາປະຈຸບັນນີ້ ຊາວສວນເສຍດາຍ, ເລີຍບໍ່ໄດ້ຕັດແຕ່ງ, ບາງສ່ວນປ່ອຍໃຫ້ຕົ້ນກາເຟ ສູງຈົນເກືອບ 4-5 ແມັດກໍ່ມີ. ສາຍເຫດນັ້ນຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍດ້ານນອກ ຈາກວ່າອາດຈະເສຍຍອນສາຍເຫດດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຍັງໃຊ້ເວລາ ດົນອີກ ສົມມຸດວ່າມີແຜນຈະເກັບໄດ້ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 25 ຕົ້ນ ແຕ່ ເກັບໄດ້ພຽງແຕ່ 3 ຕົ້ນ ເພາະຕ້ອງໄດ້ແຍກຂັນໄດ້ຍາຍຢູ່ເລື້ອຍ. ຕົ້ນກາເຟທີ່ເພາະສົມ ຄວນສັ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2-2,5 ແມັດ.

4. ພະຍາດແລະສັດຕູຂອງກາເຟ

ພະຍາດຂອງກາເຟໂດຍທົ່ວໄປມີ 3-4 ຊະນິດແຕ່ພະຍາດ ທີ່ສຳຄັນກວ່າທຸກພະຍາດຂອງກາເຟ. ພະຍາດນີ້ຈະຫຼາຍໃບກອນ ລັກສະນະເປັນວົງສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີຝຸ່ນເຜືອນກັບຂຸ້ນຂຸ້ນ ເຫຼັກສີນ້ຳ ຕານແດງ, ພະຍາດນີ້ເຂົ້າກັບກາເຟທຸກໆ ພັນ ແຕ່ກາເຟອາລາບິ-

ກາແມ່ນເປັນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແລະ ອ່ອນແອກວ່າໝູ່, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນພະຍາດນີ້ ຄວນເຮັດດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

- ປຸກພັນຫົກຫານ ຫຼື ວ່າປ່ຽນພັນໃໝ່ເຊັ່ນ ພັນ ໂລບັສ-ຕາ.

- ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ໂດຍການໃສ່ຝຸ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ກາເຟເຕີບໂຕໄວ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາດ.

- ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຕົ້ນໄມ້ຍັງຮົ່ມນັ້ນ ຫາກກາເຟກົນໄປກໍອາດຈະຕັດອອກເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ແສງແດດດູຮຸ່ງພໍ.

- ເມື່ອເຫັນວ່າກາເຟເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວ. ອາດຈະແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍການສິດຢາຈຳພວກຫອງແດງ ເປັນອົງປະກອບເຊັ່ນ: ຢາບໍໂດຊິມສ່ວນປະສົມດັ່ງນີ້ : ຢາຫອງແດງຊັ້ນແຟດ 300 ກຼາມ ປະສົມກັບປຸນຂາວ 150 ກຼາມ ແລະ ປະກອບກັບນ້ຳ 100 ລິດ. ປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວສິດ. (ສິດໃນ 1-2 ເທື່ອຕໍ່ມື້).

5. ແມງໄມ້ທີ່ທຳອັນຕະລາຍຕໍ່ກາເຟ

ທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ປະກົດພົບໃນປະເທດເຮົາ ມີຢູ່ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍມີຄວາມສຳຄັນສົມຄວນຄື : ບັງເຈາະລຳຕົ້ນ, ຈຳພວກນັ້ນຈະເຈາະຕົ້ນກາເຟໂດຍກົງ ອາດຈະເລີ່ມເຈາະລຳຕົ້ນ ຫຼື ງ່າອ່ອນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກາເຟຫຼົງ ແລະ ຕາຍ.

ການສັງເກດເນື້ອເຫັນຂວຍສີນ້ຳຕານເມັດນ້ອຍໆ ສະແດງ

ຄຳມີຄວາມເຈາະລຳດັບ, ວິທີການງ່າຍໆ ເມື່ອເຫັນດັ່ງນັ້ນ ກໍເອົາ
ການພາວ ຫຼືເຫຼົ້າ ໄມ່ນອຍໆ ແບ່ງເຂົ້າເພື່ອຫຼຸດລາຍດ້ວຍໃນຮູບ
ຖ້າຫາກວ່າມີຢາເຄມີ ເຊັ່ນ : ອອກໂທຣິນ ກໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
ເມື່ອໃຊ້ຢາແລ້ວຄວບເອົາສຳລິອັດຮູໄວ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ຢາມາ
ລາຫອບ 0,25% ຫຼື ດີອາຊິນອບກໍໄດ້ 0,4% ສິດໃຫ້ຫ້ວງ ລຳ
ດັບ ແລະ ໃບ.

ແມງໄມ່ອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ພົບກັບກິດ ເຊັ່ນວ່າ : ດ້ວງເສືອ
ແມງໄມ່ຊະນິດນີ້ຄວາມຈົບໄດ້ເຈາະຕັບກາເຟ ເພື່ອເປັນອາຫານ
ຫາກແຕ່ວ່າເຈາະເພື່ອເຮັດຮັງ ແລະ ບ່ອນໄຂ, ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້
ຕັບກາເຟຫຼັກ ຫຼື ກົງກາເຟຫຼັກ.

ວິທີປາບກໍໃຊ້ສຳລິຈຸນນັ້ນເຄື່ອງລົດ ແລ້ວອັດຮູຈະເຮັດ
ໃຫ້ດ້ວງຕາຍ.

ນອກຈາກພະຍາດແລະແມງໄມ່ແລ້ວຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງມີສັດ
ຕ່ຳສຳຄັນ ແລະ ພົບເລື້ອຍໆ ຄື : ເຫງັນ ແລະ ລິງ ສັດສອງ
ຈຳພວກນີ້ ແມ່ນກົນພາກກາເຟສຸກແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມີລົດຫວານ.

IV. ການເກັບກ່ຽວ

ກາເຟແຕ່ລະຊະນິດພັນ, ຈະບໍ່ສຸກພ້ອມໆ ກັນ ດັ່ງນັ້ນການ
ເກັບກ່ຽວຕ້ອງສືບຕໍ່ເກັບໄປຈົນຮອດໝ້າຍໆ ເດືອນ, ຂອບເຂດຂອງ
ການເກັບກ່ຽວນັ້ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງບ່ອນປູກດັ່ງກ່າວ ແລະ ລັກສະ
ນະຂອງກາເຟອັດດ້ວຍ. ເຊັ່ນວ່າ : ພັນອາລາບິກາ ຈະສຸກກ່ອນ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ເຖິງເດືອນ ກຸມພາ, ກາເຟພັນໂລບັສ-
 ຕາ ຈະເລີ່ມສຸກຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ທັນວາ ເຖິງເດືອນ ມິນາ ໂດຍສະ
 ເພາະແລ້ວ ເມັດກາເຟໃນຕົ້ນດຽວກໍຈະບໍ່ສຸກພ້ອມກັນ ສະນັ້ນການ
 ເກັບກາເຟ ຈິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາສົມຄວນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຊາວສ່ວນ
 ປະເທດເຮົາຈະເກັບກາເຟປະມານ 3 ເທື່ອ ຄື ເທື່ອທຳອິດ ແລະ
 ເທື່ອທີສອງເລືອກເກັບເອົາແຕ່ພ້ອມສຸກ ສ່ວນເທື່ອທີສາມແມ່ນເກັບ
 ເອົາພືດທັງສຸກ ແລະ ດິບ, ທັງນີ້ກໍຍອມວ່າແຮງງານໃນການເກັບ
 ບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການວາງແຜນປູກກໍຍັງບໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບດິວ
 ຈິ່ງ ຄວາມຊາວສ່ວນຜູ້ຟັງອາດຈະມີທັງກາເຟນ້ອຍ (ອາລາບິກາ)
 ແລະ ກາເຟກາງ (ໂລບັສຕາ). ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບ
 ຈິ່ງຕ້ອງເກັບແຕ່ 3 ເທື່ອ ເພາະຖ້າຈະເກັບໄປເລື້ອຍໆ ກາເຟ
 ກາງກໍຈະຫຼົ່ນກ່ອນຈິ່ງຂຽວເກັບກາເຟນ້ອຍໃຫ້ແລ້ວ ຈິ່ງໄປເກັບ
 ກາເຟກາງຕໍ່ໄປ. ການເກັບແບບນີ້ ກໍຖືວ່າເໝາະສົມໃນສະພາບທີ່
 ຂາດແຮງງານ ແລະ ກາເຟທີ່ຜ່ານການເກັບແບບນີ້ ອັດຕາສ່ວນ
 ການເສຍຫາຍກໍບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າການເກັບເທື່ອທີສາມນີ້ ມັກຈະມີຜົນ
 ເສຍຫາຍຕໍ່ຕົ້ນກາເຟຫຼາຍກວ່າເມັດກາເຟ ເນື່ອງຈາກວ່າການ
 ເກັບເທື່ອທີສາມເປັນການຮຸດເອົາເລີຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ກົງກາເຟຈົກຫຼື
 ຫັກເປັນເຫດໃຫ້ໃນປີຕໍ່ໄປຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າລົງ ຍ້ອນມີສິ່ງອື່ນແຊກ
 ເຂົ້າມາຕາມປາກບາດຂອງກົງກາເຟທີ່ຈົກ ອາດຈະເປັນຈຳພວກ
 ດວງເຈາະລຳຕົ້ນ ຫຼື ອາດຈະແມ່ນພວກພະຍາດ. ສະນັ້ນໃນການ
 ເກັບນີ້ຈິ່ງຈະມີຄວາມວັງຟຸດ. ຜົນຜະລິດກາເຟໃນທັງເຮັກຕາ ຈະ

ໄດ້ຮັບ 300 ຫາ 1200 ກິໂລ ຫຼື ບາງຄັ້ງຈະໄດ້ຮັບສູງ ເຖິງ 5000-6000 ກິໂລ ຕໍ່ 1 ເຮັກຕາ, ຖ້າຫາກເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມເພາະສິນ.

1. ການຕາກແລະການແກະເບື້ອກ

ເທົ່າທີ່ປະຕິບັດກັນມາ ຊາວສ່ວນປະເທດເຮົາຫຼັງຈາກເກັບກາເຝນມາແລ້ວ ມີວິທີປະຕິບັດ 2 ວິທີ :

ກ- ການອອກ (ການເອົາເປື້ອກນອກອອກ) ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອຕາກໃຫ້ແຫງໄວ, ວິທີນີ້ອາດຈະເອີ້ນວ່າ : ວິທີປຽກ ເນື່ອງຈາກວ່າກາເຝນທີ່ເກັບມາແລ້ວ ຕ້ອງບິ້ມໄວລາງຄົນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາອອກ. ຈຶ່ງຢູ່ບາງຄົນອາດຈະອອກເນື້ອເກັບມາສົດເລີຍແຕ່ກໍເປັນພຽງບາງສ່ວນຂອງກາເຝນທີ່ເກັບໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວແມ່ນບິ້ມໄວລາງຄົນຈຶ່ງນຳໄປອອກ ແລ້ວລາງນຳຈຶ່ງນຳໄປຕາກ. ຈາກການຄົບຄວາມຂອງນັກຊຽວຊານ ເຫັນວ່າວິທີນີ້ມີສິນຄວນ ຫາກແຕ່ວ່າບໍ່ເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ກາເຝນເມື່ອໄປປຸງແຕ່ງກັນ ແລະ ລົດຊາດກໍຈະແຕກຕ່າງກັນໄປເລັກນ້ອຍ ສະນັ້ນ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ປະເທດທີ່ປຸກກາເຝນທີ່ສຳຄັນໄດ້ລົ້ມປະຕິບັດມາແລ້ວ.

ຂ- ວິທີແຫງ, ວິທີນີ້ງ່າຍກວ່າວິທີປຽກ ເນື່ອງຈາກວ່າເນື້ອເກັບມາແລ້ວ ກໍນຳມາຕາກພືດເປື້ອກເລີຍ ເນື້ອແຫງດີແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປສື່ອກມາເປັນກາເຝນມັດ ພ້ອມທີ່ຈະຈຳໜ່າຍໄດ້ເລີຍ.

ວິທີເປັນວິທີທີ່ຍິນໃຊ້ໃນບັນດາປະເທດພະລິດກາເຟທົ່ວໆໆ ດ້ວຍ
ເຫດວ່າເປັນວິທີງ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ແລະ ໄດ້ກາເຟທີ່ມີລົດຊາດ
ດີ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດກາເຟ.

2. ການຕາກ

ໃນປະເທດເຮົາການຕາກຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ຕາກໃສ່ດິນ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ກາເຟມີເຊື້ອເຫຼັດເກີດຂຶ້ນ ແລະ
ເມັດກາເຟຈະມີສີຂຶ້ນ, ບາງເທື່ອກໍມີສີດຳ ເຮັດໃຫ້ຄົນນະພາບ
ຂອງກາເຟເສຍ. ນອກຈາກນັ້ນການຕາກໃສ່ດິນ ເມື່ອນຳເອົາກາ
ເຟໄປປຸງແຕ່ງແລ້ວຈະມີກົນດິນຕິດໄປນຳຄົນນະພາບກໍຕຳ. ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ກາເຟຮັກສາຄົນນະພາບອັນດີໄວ ຄວນຈະເອົາໃຈໃສ່ການ
ຕາກເປັນສຳຄັນ, ຄວນຈະຫວັດຖຸຮອງພັນກອນແລ້ວຈິ່ງຕາກ. ວິທີ
ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ພົບດີ ແມ່ນເອົາຈຳພວກໄມ້ຊອດຊຶ່ງມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ
ມາພຸບໃຊ້ ເປັນວັດສະດຸໃນການຕາກກາເຟ ເພາະພຽງແຕ່ສັບ
ຟາກໄມ້ຊອດ ຫຼື ໄມ້ເຮຍ ແລ້ວເຮັດຮ່າງສູງຂຶ້ນຈາກດິນເລັກນ້ອຍ
ເອົາຟາກດັ່ງກ່າວປຸບ ແລ້ວຈິ່ງຕາກກໍຈະເຮັດໃຫ້ກາເຟ ຮັກສາທາດ
ແທຂອງກາເຟໄວ້ໄດ້ ຊຶ່ງພົວພັນກັບດາວລາຄາ ແລະລາຍໄດ້ໂດຍ
ກົງ.

3. ການເກັບມ້ຽນ

ເຮືອນທີ່ຈະໃຊ້ເກັບມ້ຽນກາເຟຄວນໃຫ້ມີ ອາກາດລະບາຍ

ໄດ້ຕິດຕໍ່ບໍ່ຄວນວາງເປົ້າກາເຟຕິດກັບຜິດດິນ ຖ້າເປັນສາງເກັບ
 ແບບພັນຕຳ (ພາຍຄວາມວ່າບໍ່ໄດ້ຍົກຮາບ) ຄວນຈະມີວັດຖຸຂອງ
 ໃຫ້ສູງຈາກກາດິນປະມານ 15-20 ຊຸດມ. ກໍພໍໃຊ້ໄດ້ເພື່ອໃຫ້
 ອາກາດພູນວຽນໄດ້ດີ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມອຸ່ມຈາກດິນ ລະເຫີຍ
 ໃສ່ກະເປົ້າກາເຟໂດຍກົງ, ເພື່ອຮັກສາຊັງຄຸນນະພາບຂອງກາເຟ
 ສິ່ງສຳຄັນສາງເກັບຕ້ອງມີປ່ອງລະບາຍອາກາດ ເພື່ອລະບາຍອາ
 ກາດຮອບ ແລະ ອຸ່ມອອກນອກ.

4. ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ໃນສະພາບປະຈຸບັນນີ້ ຊາວສວນນັກຈະໃຊ້ຄືກ່ອນ ກາເຟ
 ເອົາເອງອັນນັ້ນຜິດດິນ ແລະ ຜິດເສຍ, ຜິດດີກໍຄື : ປະຢັດຄ່າໃຊ້
 ຈ່າຍ, ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງ ເພາະປະຕິບັດກັບເຮືອນຂອງ
 ຕົນເອງ. ແຕ່ຂໍເສຍນັ້ນມີຫຼາຍກວ່າ ເຊັ່ນວ່າ ບໍ່ປະຢັດແຮງງານ
 ຍອນວາຕອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດິນ, ບໍ່ປະຢັດແຮງງານສຳລັບວຽກອື່ນ
 ພາຍຄວາມວ່າເກືອບຈະບໍ່ມີເວລາໄປເພີ່ມພູນຢ່າງອື່ນ, ສິ່ງສຳຄັນ
 ກວ່າພູນຄຸນນະພາບຂອງກາເຟຕົກຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າເມັດກາ
 ເຟທີ່ໄດ້ຈາກການສ້ອມດ້ວຍມືນັ້ນ ເມັດຈະບໍ່ສະເໝີສະເໝີ ອັດຕາ
 ເມັດແຕກມີຫຼາຍເຮັດໃຫ້ລາຄາຕົກຕໍ່າ. ຈາກການທົດລອງແບບ
 ງ່າຍໆ ໃນການນັບເມັດກາເຟທີ່ສ້ອມດ້ວຍມື ເຫັນວ່າມີເມັດດີພຽງ
 45% ເທົ່ານັ້ນ, ເມັດແຕກ 45% ແລະ ເມັດເສຍມີ 10% ເພື່ອ
 ເປັນດັ່ງນັ້ນຫາກວ່າສາມາດແກ້ໄຂຂອດນີ້ໄດ້ ໂດຍການນຳໄປສື່ຢູ່

ໂຮງສີ ແລ້ວຈະສາມາດເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງກາເຟໄດ້.

V. ອະນາຄົດການປູກກາເຟຂອງປະເທດລາວ

ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບ ພູມສາດ ຖານທີ່ຕ່າງ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງປະເທດເຮົາແລ້ວ ດົງບໍລິເວນມີເນື້ອທີ່ເພາະສົມ ໃນການປູກ ກາເຟ ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດເຮົາ, ເນື້ອທີ່ ຄວາມສາມາດປູກກາເຟໄດ້ຕໍ່ກວ່າ 100.000 ເຮັກຕາ, ແຕ່ ວ່າປະຈຸບັນນີ້ ເນື້ອທີ່ປູກກາເຟໃນດົງບໍລິເວນທີ່ໄດ້ປູກແລ້ວ 19266 ເຮັກຕາ ເທົ່ານັ້ນ. ປະເທດເຮົາຍັງມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ປູກກາເຟໄດ້ອີກຫຼາຍ ປະກອບກັບການເພີ່ມຕື່ມ ດ້ານວິຊາ ການເຂົ້າໄປອີກ ກໍຈະສາມາດນຳເອົາເງິນຕາເຂົ້າປະເທດໄດ້ຕື່ມ ຂຶ້ນ. ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນລາວໂດຍສະເພາະໃນເຂດດົງບໍລິເວນ ມີ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການປູກກາເຟດີສົມຄວນ.

ກາເຟນອກຈາກຈະໃຊ້ບໍລິໂພກແລ້ວ ຍັງສາມາດນຳເຂົ້າ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳອັນອື່ນອີກ ດັ່ງຈະກ່າວໄວ້ໃນຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງກາເຟດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກາເຟ

1. ເປັນເຄື່ອງດື່ມ
2. ເຮັດເຫຼົ້າຊຶ່ງອາດຈະເອີ້ນວ່າ ເຫຼົ້າກາເຟ
3. ເຮັດປະລາສະຕິກແຂງຫົນໄຟ

4. ດຣັດນ້ຳມັນຫາຜົນ
5. ສະກັດເອົາວິຕາມິນເດ
6. ດຣັດຢາປາບສັດຕູພືດ
7. ສະກັດເອົານ້ຳມັນເພື່ອດຣັດສະບູ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາ

ຫານ.

ເອກກະສານອ້າງອີງ :

- ບາງຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປຸກພືດຊະນິດຕ່າງໆ
ກົມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ
(1 9 8 1)
- ສາດສະດາຈາຍ ໂຊໂລ ໂຊລອບ
ກົມປຸກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ພາກໃນຂອດຮອບ ແລະ ຂອດອົບອຸ່ນ
(1 9 8 1)

ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນກາເຟ

(COFFEE ARABICA)

ບົດວິຊາການບົດນີ້ຈະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ວິທະຍາການຂອງການຕັດແຕ່ງຕົ້ນກາເຟເປັນຈຸດໜັກ, ສ່ວນວິຊາການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ເກັບກ່ຽວ ແລະ ປຸງແຕ່ງກາເຟເມັດນັ້ນໄດ້ສະເໜີໃນເອກະສານໝູ່ການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ໄປແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນວິຊາການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈຶ່ງໃສ່ເອກະສານທີ່ໄດ້ຂຽນ ແລະ ຈັດພິມມາແລ້ວທັງໝົດ.

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕອນວ່າຂອງຕົ້ນໝາກກາເຟ. ການຕັດແຕ່ງວ່າທີ່ໃຊ້ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນຕັດແຕ່ງວ່າໃຫ້ເກີດ ແຫງໃໝ່ນານນຳເອງ.

ອີງຕາມບົດຂຽນ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຜະລິດກາເຟ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າຂາອອກເຊັ່ນ: ບະເຣຊິນ ເອນຊານວາດໍ ໂກລົມເບຍ ກິດສະຕາຣິກາ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆມີການຕັດ, ແຕ່ງວ່າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໝາກຫຸກປີສະໝໍ້າສະເໝີ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອສະດວກແກ່ທ່ານຜູ້ອ່ານ ແລະ ປາກອອກຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງການປູກກາເຟ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີເລື່ອງກາເຟໂດຍຫຍໍ້ ໃນເອກະສານວິຊາການສະບັບນີ້.

I. ສະພາບການປູກໝາກກາເຟໂດຍຫຍໍ້

ໝາກກາເຟຈັດຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຣູບີອາເຊ (Rubiaceae)

ຊຶ່ງເກີດ ແລະ ໃຫ້ພາກໄດ້ໃນອາກາດຫຼາຍຊະນິດ. ກາເຟທີ່ໃຫ້
ພາກດີແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລແຕ່ 1200
ເຖິງ 1700 ພຶກ ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມແຕ່ 16° ຈຶ່ງຕິກອາດ ເຖິງ
22° ຈຶ່ງຕິກອາດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກາເຟທີ່ຂາຍໃນຕະຫຼາດ
ໂລກປະມານ 50% ແມ່ນມາຈາກປະເທດບະເຣຊິນ ຊຶ່ງມີຄວາມ
ສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລແຕ່ 800 ເຖິງ 1200 ພຶກ. ກາເຟ
ຊະນິດນີ້ແມ່ນຕ້ອງການແສງແດດ (ບໍ່ຕ້ອງການຕົ້ນໄມ້ເຮັດຮົ່ມເຊັ່ນ
ຕົ້ນຫອງ ແລະ ອື່ນໆ) ເກີດ ແລະ ໃຫ້ພາກຫຼາຍ. ເມື່ອຢູ່ກາຍໃນ
ຄວາມສູງລະດັບດຽວກັນນ້ຳທະເລຄື 2-5 ພຶກ ຈາກລະດັບນ້ຳ
ທະເລທີ່ ລັດອາວາຍ ກາເຟກາງສ່ວນໃຫຍ່ ມາຈາກເຂດສູງຂອງ
ປະເທດ ເອນຊານວາດໍ ກົວເຕມາລາ ໂກລົມເບຍ ແລະ ກົດສະ
ຕາຣິກາ.

ຕົ້ນກາເຟເກີດໃນດິນທີ່ມີຊີນດິນລົງຫລັບຢາຍນ້ຳໄດ້ດີ ບໍ່
ເປັນດິນເນອັກກິນເກີນໄປ (ດິນຊາຍ) ແຕ່ເປັນດິນແດງຊຶ່ງແມ່ນ
ດິນຟຸໄຟເກີ້ (ບາຊານ) ເຫັນວ່າເປັນດິນທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບກາ
ເຟທີ່ສຸດ. ຄວາມເປັນກົດຂອງດິນໃນລະດັບ PH 4,2 ເຖິງ
5,1 ເຫັນວ່າເໝາະສົມສຳລັບກາເຟ ອາລາບິກາ ແລະ ໂລບັສ-
ຕາ ຊຶ່ງໃຫ້ຜົນດີໃນປະເທດ ບະເຣຊິນ ແລະ ຫະວີບອາຟະລິກກາ
ຕາເວັນຕົກ ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ແຫຼ່ງທີ່ຜະລິດ ກາເຟໃຫຍ່
ກວ່າໝູ່ໃນດິນແດງ ພູພຽງບໍລະເວນ ແລະ ສາມາດເກີດໄດ້ໃນຫຼາຍ
ແຂວງອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ : ເຂດຕີນພູຫຼວງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ເມືອງວັງວຽງ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຄາດວ່າຍັງມີຫຼາຍເຂດທີ່ສາມາດປູກໝາກ ກາເຟໄດ້ແຕ່ຄອດປະຈຸບັນ ການສຳຫຼວດແບ່ງເຂດພະລິດກຳລັງດຳ ເນີນວຽກງານຂະແໜງນຸ່ງ.

ຂໍສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນເລືອກພື້ນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແຕ່ລະຫ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອເລີ່ມຂະຫຍາຍການປູກກາເຟໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງ, ໃຫ້ໄດ້ ຜົນດີ ຄວບຄືມການປູກທົດລອງ ເລືອກພື້ນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຫ້ອງຖິ່ນ ນັ້ນກ່ອນ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍອອກໄປໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງ, ບາງຊະ ນິດພື້ນທີ່ເຂດຫະວີບອາເມລິກາລາຕິນມີຂໍ້ ໃຫ້ໝາກດີກ ສຸກພອມ ກັນດີ ເກັບກ່ຽວສະດວກມີຢູ່ປະມານ 4 ຊະນິດຄື : ກາຕຸຍຣາ, ປາກກາສ, ມອນໂດ ໂນໂວ ແລະ ພັນ ບວກດົງ.

ໝາກກາເຟຊະນິດຕ້ອງການຕົ້ນໄມ້ເຮັດຮົ່ມກໍ່ນິຍົມປູກກັນ ໃນ ຫຼາຍປະເທດ ແຕ່ມາຄອດປະຈຸບັນ ຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການປູກ ກາເຟຊະນິດບໍ່ຕ້ອງການຮົ່ມໄດ້ຮັບການນິຍົມເຂົ້າມາແທນທີ່, ໄດ້ ພິນດີກວ່າໃນເນື້ອທີ່ນຳເຕັກນິກວິທະຍາການເຂົ້າຊ່ວຍເຊັ່ນ : ໃສ່ ຝຸ່ນ ສິດຢາດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ກ່ຽວກັບໄລຍະປູກນັ້ນ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເຮັດການທົດລອງ ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນຕໍເຮັດຕາ ຜົນຂອງການທົດລອງທີ່ ປະເທດ ປອກໂຕຣິໂກ ແລະ ເອກົວດໍ ເຫັນວ່າການປູກທີ່ເຂົາໃຫ້ຜົນດີກວ່າ ຄື ສະມັດຖະພາບ ສູງກວ່າການປູກແກ່ງ. ຈາກການທົດລອງດັ່ງ ກ່າວ ໄລຍະປູກທີ່ເສດຖະກິດກວ່າໝູ່ແມ່ນ 1×2 ແມັດສຳລັບກາເຟ

ພັນ ກາຕູຍຣາ (Caturra) ເພາະວ່ານອກຈາກຈະໃຫ້ສະມັດ
ຖະພາບສູງແລ້ວ ຍັງລົດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາດຍາດວຍມື ຫຼື
ເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ດ້ວຍສາຍເຄມີອີກດ້ວຍ.

ໃນບ້ານເຮົາປະຈຸບັນນີ້ໃຊ້ 3×3 ແມັດສຳລັບພັນອາຣາບິກາ
ຫຼື ອາຣາບິດສະຕາ ແລະ ກວາງກວ່ານັ້ນສຳລັບພັນອື່ນເຊັ່ນ: ໂລ
ບັດສະຕາ ຫຼື ກາເຟມິກ. ເທົ່າທີ່ເຫັນຈາກບົດຮຽນຕົວຈິງ ຫ່າງວິ
ຊາການຢາກສະເໜີແນະນຳໃຫ້ທົດລອງ 2×3 ຫຼື $1,5 \times 3$ ສຳລັບ
ກາເຟ ອາຣາບິກາ ແລະ 3×4 ສຳລັບກາເຟຊະນິດອື່ນ. ເພື່ອ
ຍົກສູງສະມັດຖະພາບທີ່ແນ່ນອນລອງປະຕິບັດໃນເນື້ອທີ່ນອນກ່ອນຖ້າ
ໄດ້ຜູ້ມີຈິງຂະໜາຍໄປປູກໃນເນື້ອທີ່ໃຫຍ່ໄປ. ທັງນັ້ນການ
ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານກາເຟໃນປະເທດເຮົາກໍຍັງຈຳກັດຢູ່ ຈຶ່ງບໍ່
ຢາກສະເໜີ ໃຫ້ທົດລອງໃນເນື້ອທີ່ໃຫຍ່.

ດ້ານການໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນໝາກກາເຟ ກໍຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມ; ບາງເຂດອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ ບາງ
ເຂດກໍອາດຈະຂາດຫາດອາຫານໃດໜຶ່ງ ສຳລັບກາເຟກໍໄດ້ ສະນັ້ນ
ການທົດລອງໃສ່ຝຸ່ນ ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຖະພາບນີ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳ
ເປັນເຮັດສະເພາະເຂດນັ້ນໆ.

ໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ສະເໜີຊະນິດກາເຟປູກບໍ່ຕ້ອງການຮົ່ມເຊັ່ນ :
ພັນກາຕູຍຣາ, ປາກາສ, ມອນໂດ, ໂນໂວ ແລະ ພັນບວກດົງ
ດັ່ງກ່າວມາແລ້ວໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງການຝຸ່ນ ເພື່ອຍົກສູງ
ສະມັດຖະພາບກວ່າກາເຟທີ່ຕ້ອງການຮົ່ມ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ປູກກັນຢູ່ໃນ

II. ການຕັດແຕ່ງງານຕົ້ນກາເຟ

ການຕັດແຕ່ງງານຕົ້ນກາເຟ ກໍ່ເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ຂໍສຳຄັນ ເຫດຜົນທີ່ຕັດແຕ່ງກໍ່ ເພື່ອລົດຜ່ອນການທີ່ຕົ້ນກາເຟ ໃຫ້ໝາກປີ້ເວ້ນປີ້ (ບາປີ້) ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເກັບກູ້ຮ່ວງງາຍຂຶ້ນ ລັກສະນະປີ້ເວ້ນປີ້ ຈຶ່ງຕິດໝາກດີຂອງງານາງຂອງຕົ້ນກາເຟທີ່ມີອາຍຸ 1 ປີນັ້ນ ແມ່ນລັກສະນະທາງຊີວະສາດຂອງຕົ້ນກາເຟເອງ. ຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ຕຶກແຕ່ງງານຕົ້ນກາເຟນັ້ນ ຕົ້ນກາເຟທີ່ກ່ອນໄຫ້ໝາກ ຢ່າງດີຫຼາຍໃນປີ ທີ່ຕົ້ນກາເຟໂຫມ ປີນັ້ນແມ່ນງານທີ່ມີອາຍຸ 1 ປີ ເປັນງານທີ່ໃຫ້ໝາກດີກ (ງານາງທີ່ມີອາຍຸໜຶ່ງປີ) ແຕ່ປີຕໍ່ມາຈະໃຫ້ໝາກເບົາບາງລົງ ສຳລັບງານເດີມ ແຕ່ຈະໃຫ້ໝາກດີກງານາງທີ່ແຕກໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າບໍ່ຕັດແຕ່ງງານ ໂດຍການຕັດນັ້ນ ຕົ້ນກາເຟຈະມີປີ້ ໃຫ້ໝາກດີກ ແລ້ວເວ້ນອີກປີໜຶ່ງຫາ 2 ປີຈຶ່ງໃຫ້ໝາກດີກໃໝ່ອີກ ຫຼືບາງບ່ອນນານກວ່ານັ້ນ ແລ້ວແຕ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ການປົວລະບົດຮັກສາ ເສຍຫຍາ ພວນດິນ ສິດຢາ ຂາແມງໄມ້ ແລະ ປາບພະຍາດ ຈຶ່ງເຈົ້າຂອງສູ່ວນ ຫຼື ນິຄົມ ຫຼື ສະໜະກອນເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີຫຼາຍນອຍພຽງໃດ.

ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນກາເຟ ກໍ່ເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ ຕົ້ນກາເຟໃຫ້ໝາກສະໝໍ່າສະເໝີແຕ່ລະປີນັ້ນເອງ ຖ້າຈະອະທິບາຍທາງຊີວະສາດຂອງຕົ້ນກາເຟເອງແລ້ວ ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນປີ້ທີ່ໃຫ້ໝາກໂຫມ ແລ້ວຍົກລະດັບຂອງຈຳນວນປີ້ທີ່ບໍ່ໂຫມນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໝາກສະໝໍ່າສະເໝີແຕ່ລະ

ປີ ຖ້າວ່າອີກແຫ່ງໜຶ່ງແມ່ນຄວບຄຸມການອອກໜ້າກຂອງຕົ້ນກາເຟໃຫ້
ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (ແຜນການພະລິດ) ນັ້ນເອງ.

ການຕັດແຕ່ງວ່າຕົ້ນກາເຟຮຸກຮອງເຕັກນິກວິຊາການພິສິມ
ຄວນ ແຕ່ກໍຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍມີຫຼັກຖານດ້ານວິຊາການຮຸກຮອງເຕັກ ວິຊາ
ການທີ່ສູງປານໃດ ຄາດວ່າຊາວສວນກາເຟທົ່ວໄປ ກໍຄຽງເຮັດໄດ້
ແມ່ນການຕັດແຕ່ງລະບົບ "ບີເອຟ" (B.F) ແມ່ນໄດ້ຈາກການ
ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຂອງສາດສະດາຈານ Dr.J.H.Beaumond
ແລະ Mr. Edward FUKUNAGA ຈຶ່ງໄດ້ໃສ່ຊື່ເບື້ອງລະບົບຕັດ
ແຕ່ງນີ້ວ່າ ບີເອຟ (B.F) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາວາຍ
ຂໍສຳຄັນຂອງລະບົບ ບີເອຟ ນີ້ແມ່ນເປັນ ວິທີງ່າຍດາຍ ເຮັດໄດ້ໃນ
ເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຊາວສວນ ຕົ້ນກາ
ເຟເອງ ຫຼື ບຸກຄົນ ສະຫະກອນ. ຜ່ານມາການປ່ຽນແປງຂອງລະ
ບົບນີ້ໄດ້ປັບປຸງມາເລື້ອຍໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະເຂດ
ແຕ່ລະບະເທດ ແຕ່ລະພູມປະເທດ ແລະ ຂັ້ນກັບໄລຍະຕົ້ນ ຂອງ
ການປູກຕົ້ນກາເຟ. ລະບົບ ບີເອຟ 1-3-2-4 ໄດ້ທົດລອງໃຊ້
ໃນການປູກກາເຟ ທີ່ມີໄລຍະລະຫວ່າງຕົ້ນທີ່ຫ່າງກວ່າ 1x2 ແມັດ
ການຕັດແຕ່ງວ່າແມ່ນເຮັດໃນປີທີ 4 ຂອງການປູກກາເຟໂດຍທົ່ວ
ໄປ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕັດແຕ່ງວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົ້ນກາເຟໃໝ່ໜ້າກເຕັມ
ທີ່ແລ້ວ (ປີທີ່ກາເຟໂຫມ).

ຕົວຢ່າງ ສົມມຸດວ່າຕົ້ນກາເຟເຍືອນໃນປີ 1987 ແລ້ວ
ໃນປີ 1988 ຫຼັງຈາກເກັບໜ້າກໝົດແລ້ວໃນປີ 1988 ແລ້ວ

ເລີ່ມລົງມືຕັດແຕ່ງວ່າ ໃນທັບທີ່ໂລດ ບໍ່ຄວນລໍຖ້າ ຫຼື ຫາຊ້າຈົນຮອດ
ເວລາຕົ້ນກາເຟແຕກຕາແລ້ວຈຶ່ງຕັດແຕ່ງວ່າ ຕ້ອງຕັດແຕ່ງກ່ອນນັ້ນ
ຢ່າງນ້ອຍ 45 ວິນ.

ວິທີການຕັດແຕ່ງນັ້ນ ແມ່ນການຕັດຕົ້ນຕໍເລີຍ (ໃນປີທີ 4,
ທີ່ໜ້າກາເຟໂທນ) ໃຊ້ເລື່ອຍຕັດໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 30-
45 ຊັງຕີແມັດ ຕັດເປັນຮູບອ່ຽງ 45° ກັບພື້ນທີ່ ຕັດພຽງເລີຍກໍ
ໄດ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກຕັດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ທາດວຍສິນ້ຳມັນຫຼືປຸນຄຽວໜ້າກທຳ
ມະດາຈະເປັນປຸນແດງຫຼື ປຸນຂາວກໍໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນເນົ້າ
ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ພະຍາດແຊກຊຶມເຂົ້າໄປທຳລາຍຕົ້ນໄດ້ .
ຫຼັງຈາກຕັດແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແຫຼງປົ່ງຂຶ້ນໃໝ່ ແລ້ວເລືອກເອົາໄວ້ພຽງ 3
ແຫຼງທີ່ງາມ, ແຂງແຮງ, ຂົນໄວກວ່າໝູ່ ປົດ ຫຼື ຕັດແຫຼງອື່ນ ທີ່
ອ່ອນແອອອກໃຫ້ໝົດ, ໃຫ້ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ 3 ແຫຼງເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼງຈຳພວກນີ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄປເປັນຕົ້ນກາເຟທີ່ໃຫ້ໜ້າກທີ່
ມີອາຍຸຫຼັງປີຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ. ບາງປະເທດທີ່ມີການປູກຂະ
ໜາດໃຫຍ່ໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກຕັດແທນແຮງງານເຊັ່ນ : ປະເທດ ບະ
ເຣຊິນ, ກົດສະຕາຣິກາ, ຈາມາອິກາ ເປັນຕົ້ນ.

ສ່ວນຫຼາຍການຕັດແຕ່ງລະບົບ ບີເອຟ (B.F) 1-3-2-4
ນີ້ໃຊ້ໃນໄລຍະປູກ 1x2 ແມັດ ແຕ່ກໍນຳໃຊ້ໃນໄລຍະອື່ນໄດ້ດີເຊັ່ນ
ກັນເຊັ່ນ : 2x3; 3x3 ແລະ 3x4 ແມັດ.

ຂໍ້ຍົກຕົວຢ່າງການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງການຕັດແຕ່ງແບບ ບີ
ເອຟ 1-3-2-4 ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ :

ແຖວຕໍ່ໄປເປັນແຖວທີ 1 ໃໝ່ອີກ ແລະ ນັບຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າ
ຈະພົດທຸກແຖວໃນສ່ວນ ໃນເວລາປີທີ່ຕັດແຕ່ງນັ້ນ ຕົ້ນທີ່ມີແຫງຂັນ
ໃໝ່ນັ້ນຈະບໍ່ໃຫ້ໝາກກັ່ນທີ່ໂລດ ອາດຈະປີຕໍ່ໄປຈຶ່ງໃຫ້ໝາກ ດຶກຫາ
ສະນັ້ນວິທີຕັດແຕ່ງແບບນີ້. ແມ່ນຈະໄດ້ເກັບໝາກພົບພຽງແຕ່ 75%
ແລວບໍ່ໃຫ້ໝາກ 25% ເພາະວ່າ 1 ໃບຈຳນວນ 4 ແຖວນັ້ນຖືກຕັດ
ແຕ່ງໃຫ້ເກີດງ່າໃໝ່ ແຕ່ໃຊ້ເຕັກນິກການປູກໃໝ່ຂ້າຊ່ວຍໃນໄລຍະ
ລະຫວ່າງຕົ້ນ 1 ແມັດແລະໄລຍະລະຫວ່າງແຖວ 2 ແມັດ ຈະໃຫ້
ຈຳນວນຕົ້ນຕໍເຮັກຕາ 5000 ຕົ້ນໄດ້ເກັບໝາກແທ້ເມື່ອຕັດຕອນຕົ້ນ
ແລ້ວພຽງແຕ່ 75% ຄືໄດ້ເກັບຈາກ 3750 ຕົ້ນຕໍເຮັກຕາແຕ່ເມື່ອ
ສົມທຽບໃສ່ການປູກຢູ່ໃນປະເທດເຮົາໃນປະຈຸບັນນີ້ ໃຊ້ໄລຍະປູກ
3x3 ແມັດຈະມີຈຳນວນຕົ້ນພຽງແຕ່ 1111 ຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າບໍ່ຕັດ
ປະໄວ້ເກັບກ່ຽວພົດກໍຍັງຕຳກວ່າປະມານ 30% ຂອງວິທີປູກຖື.

ໃນປີຕໍ່ມາ, ຄືປີ 1989; ຕັດແຕ່ງຕົ້ນທີ່ຢູ່ໃນແຖວທີ 3
ແລະຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ຕາມຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ການຕັດແຕ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວິທີເລັ່ງແຫງໃຫ້ມີ ຄວາມແຂງ
ແຂງເພື່ອໃຫ້ໝາກຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນວິທີປະຫວັງໃຫ້ຕົ້ນ ກາ
ເຟໄດ້ຮັບແສງແດດສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພຽງພໍ ແລະສາມາດປູກຖື
ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນກາເຟຕໍ່ເຮັກຕາໃຫ້ສູງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ນອກນີ້
ການປົວລະບົດຮັກສາກ່ຽວຂ້າງຂຶ້ນ : ສິດຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ
ປາບພະຍາດຕ່າງໆ ຂຶ້ນ : ພະຍາດຂີ້ພຽງໃນໃບ ແລະໃນໝາກ
ຊຶ່ງເກີດຈາກເຊື້ອ *Hemileia vastatrix* ຈະລົດຜ່ອນ

ລົງໄດ້ໃນເນື້ອເຈົ້າເຈັດໃຫມ່ແສງແດດສ່ອງໃສ່ຕົ້ນກາເຟ ຢ່າງທີ່
ເຖິງ ຊຶ່ງການຕັດແຕ່ງຕົ້ນກາເຟແມ່ນມີຄວາມກວ້າງໜ້າ ກວ່າການບໍ່
ຕັດແຕ່ງ. ໃນການໃຫ້ສະນັດຖະພາບເພີ່ມ, ໃຫ້ສະນັດຖະພາບສະ
ໜ້າສະເໝີກຸ່ມ ແລະ ລົດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສິດຢາຂາ ແມງ
ໄມ້ ແລະ ປາບພະຍາດຂອງຕົ້ນກາເຟ. ການປັບປຸງຕັດແຕ່ງ ເປັນ
ແຖວແຕ່ລະປີ, ແລ້ວກັບມາຄືບຄອບຕົ້ນທີ່ຢູ່ໃນແຖວເກົ່າ ແຕ່ລະ 5
ປີ, ເບິ່ງແລ້ວກໍ່ມີລັກສະນະຄືກັບປຸກໃໝ່ ຖ້າໃຊ້ລະບົບຕັດແຕ່ງຕົ້ນ
ແບບ ບິເອຟ (B.F) ເພາະຖ້າປຸກແລ້ວກໍ່ຕັດແຕ່ງໃນປີທີ 5
ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ການຕັດແຕ່ງນີ້ເຈັດໃຫມ່ອາຍຸຍືນ ແລະ ໃຫ້ໝາກໃນປະ
ລິມານທີ່ປານະຕິທຸກປີ ຊຶ່ງດີກວ່າປຸກແລ້ວປ່ອຍຕາມຫນ້າມະຊາດແລ້ວ
ລົງໄດ້ກັບພູມ ຫຼື ບົວລະບັດຮັກສາແບບອື່ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕັດແຕ່ງຕົ້ນ
ງ່າເລີຍ. ທາງບົດຮຽນທົດລອງການຕັດແຕ່ງຕົ້ນ ແລະ ງ່າໝາກກາ
ເຟໃນປະເທດຈາເມອິກາ ແລະ ກົດສະຕາຣິກາ ນັ້ນເປັນອີກແບບ
ໜຶ່ງ ຊຶ່ງຄ້າຍຄືກັບລະບົບຕັດແຕ່ງຕົ້ນ ບິເອຟ (B.F) ແຕ່ວ່າ
ກ່ອນຈະຕັດແຕ່ງຕ້ອງໄດ້ໂນ້ມຕົ້ນໝາກກາເຟໃຫ້ຮຽງປະມານ 45
ອົງສາຈາກລະດັບພື້ນດິນ, ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແຫງທີ່ແຂງແຮງປົ່ງຂຶ້ນທາງ
ຕັ້ງກັບແນວດັງ (Vertical) ຮັກສາແຫງທີ່ນາງຈຳພວກທີ່ຢູ່ບໍ່
ລິເວນຫ່າງໄກຈາກແຫງຂອງຕົ້ນກາເຟປະມານ 30-50 ຊັງຕີ
ແມັດ ເລືອກແຫງທີ່ແຂງແຮງໄວໃນຈຳນວນ 3-5 ແຫງ ນອກນັ້ນ
ແມ່ນຕັດຖິ້ມໃຫ້ໝົດ. ເນື້ອແຫງທີ່ຈັງໄວແຂງແຮງດີແລ້ວຈຶ່ງຕັດສ່ວນທີ່
ເປັນຍອດອອກໃນບໍລິເວນທີ່ຖັດຈາກແຫງທີ່ຢູ່ຕ່ຳແຫ່ງປາຍໝູ່ ອອກ

ເລີຍ (ໝາຍຄວາມວ່າຕັດລຳຕົ້ນເດີມ ຫຼັງຈາກໄດ້ແຫງທີ່ແຂງແຮງ
ແລ້ວ) ປ່ອຍໃຫ້ເປັນໝາກ, ສ່ວນການເລືອກແຖວເພື່ອຕັດແຕ່ງນັ້ນ
ໃຊ້ລະບົບດຽວກັບລະບົບ ບີເອຟ ຕາຕະລາງການຕັດແຕ່ງທີ່ ໄດ້
ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຕັດແຕ່ງລະບົບ ບີເອຟ 1-3
2-4 ທີ່ໄດ້ຫຼຸດລອງຢູ່ ອາເນລິກາ ມີພຽງແຕ່ການຫຼຸດລອງ ຢູ່ ຮາ
ວາຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໂນມຕັນກ່ອນ, ຕັດໂລດ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ແຫງ
ເກີດຂຶ້ນມາ, ເລືອກແລ້ວຈຶ່ງຕັດ ແຕ່ຢູ່ ອາເນລິການແມ່ນ ໂນມ
ກ່ອນແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແຫງປົ່ງມີແຫງງາມດີແຂງແຮງດີ 3-5 ແຫງແລ້ວ
ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຕັດແຕ່ງຍອດຂອງຕົ້ນເດີມ ແລະ ງ່າມາງທີ່ບໍ່ສົມບູນ
ອອກຜົນໄດ້ຮັບຈາກວິທີການຕັດແຕ່ງແບບນີ້ ເຫັນວ່າໃຫ້ຜົນດີເຊັ່ນ
ດຽວກັນໝູ່ ລື້ນລະບົບຕັດແຕ່ງແບບ ບີເອຟ 1-3-2-4 ປະມານ
10-15% ຕໍ່ປີ.

ໃນ 5 ປີຕໍ່ມາ (ຄອບທີ່ 2) ຂອງການຕັດແຕ່ງແມ່ນຕັດ
ແຕ່ງງ່າມາງຫຼັງ 3-5 ໃນລະດັບສູງຈາກຕົ້ນເດີມທີ່ຮ່ຽງ 45°
ຈາກພື້ນປະມານ 10-15 ຈຶ່ງຕັດແລ້ວປ່ອຍແຫງແຂງແຮງ
ໄວ້ 2 ແຫງຕໍ່ແຫງເດີມ ຖ້າປ່ອຍໄວ້ 3 ແຫງມາຮອດ ປະຈຸບັນກໍ
ຈະກາຍເປັນ 6 ແຫງທີ່ແຂງແຮງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາມ
ການຫຼຸດລອງຈະບໍ່ປ່ອຍແຫງໄວ້ເກີນ 7 ແຫງເຖິງວ່າເມື່ອກ່ອນຈະ
ປະໄວ້ແລ້ວ 5 ແຫງກໍຕາມເລືອກໄວ້ 2 ແຫງ ໃນບາງແຫງເກົ່າ
ແລະ ຈຶ່ງແຫງດຽວໃນບາງແຫງເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ແຫງໃໝ່ຢູ່ໃນລະດັບ

6-7 ແຫງ ພຽງເກົ່າມັນທັງນັ້ນກໍ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຫງໃໝ່ທີ່ບັນຫຼາຍ ແຕ່
 ທາງບ່ອນກໍ່ພະຍາຍາມຈຶ່ງໄວ 3-5 ຕາມຈຳນວນເດີມທີ່ໄດ້ຈຶ່ງໄວ
 ໃນການຕັດຄັງໜຶ່ງ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສົມບູນຂອງແຫງເກົ່ານັ້ນເອງ
 ການຕັດແຕ່ງວິທີ ສາມາດໃຫ້ມີໂອກາດເລືອກແຫງເກົ່າທີ່ຕັດ ໃນ
 ອອບໜຶ່ງ ຄັດອອກໄດ້ຖ້າຫາກວ່າແຫງບໍ່ສົມບູນມີແນງໄມ້ ແລະພະ
 ຍາດລົບກວນແລ້ວ ອາດຈະຕັດເອົາແຫງທີ່ຕັດແຕ່ງໃນເມື່ອ 5 ປີ
 ກ່ອນໄວພຽງ 2-3 ແຫງກໍ່ໄດ້ແລ້ວໃຫ້ແຕກຈາກສ່ວນ ທີ່ເຫຼືອນັ້ນ
 ຈຶ່ງໄວ 6-7 ແຫງໃໝ່ ແຕ່ເກີດຈາກເຫງົ້າແຫງທີ່ຕັດໃນ 5 ປີຫຼັງ
 ທີ່ຈຶ່ງເອົາໄວພຽງ 2-3 ແຫງນັ້ນເອງ.

ການທົດລອງແບບນີ້ ໄດ້ນຳອອກໃຊ້ເພື່ອຂັ້ນແຜນ ແລະກຳ
 ນົດປະລິມານການຜະລິດກາເຟຂ້າວໆ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ທີ່ປະ
 ເຫດອາເມລິກາ ແລະ ກົດສະຕາຣິກາ ກຳລັງນິຍົມກັນທີ່ ປະເທດ
 ບະເຣຊິນ. ພ້ອມກັນນັ້ນສາມາດຍົກສູງສະນັດຖະພາບຕໍ່ເຮັກຕາໄດ້
 ອີກ ເພີ່ມຈາກເດີມທີ່ປະໄວຕາມຫ້າມະຊາດ 40-60% ຕາມບົດ
 ຮຽນປະເທດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແຕ່ຂໍສຳຄັນແມ່ນສາມາດບັງ
 ຄັບໃຫ້ຕົນກາເຟຕົດໝາກສະໝໍ້າສະເໝີໃນແຕ່ລະປີ ແລະສາມາດຂັບ
 ແຜນການຜະລິດໄດ້.

ເອກະສານບົດນີ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຈາກປຶ້ມວິຊາການ ຂອງ
 ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາປະເທດທີ່
 ຜະລິດກາເຟເພື່ອເປັນຂາອອກ ເປັນບົດຮຽນໃໝ່ ສະນັ້ນຈຶ່ງຂໍແນະ
 ນຳຜູ້ອ່ານ ແລະ ນັກວິຊາການກ່ຽວກັບການປູກໝາກກາເຟ ແລະ

ຊາວສ່ວນກາເຟທົດລອງເຮັດໃນເນື້ອທີ່ນ້ອຍກວ່າ ໃນສ່ວນສ່ວນຕົວ
ສ່ວນຂອງສະໜະກອນປູກກາເຟ ສ່ວນທົດລອງຂອງນິຄົມຈຸດທັກແລວ
ຕອງທົດລອງລະອຽດໃນສະຖານີຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ກ່ຽວກັບການປູກ
ໝາກກາເຟເຫັນວ່າ ໄດ້ຜົນດີແລ້ວຈຶ່ງເຜີຍແຜ່ລົງສູ່ນະໜາຊົນເພື່ອສະ
ດວກແກ່ການເຜີຍແຜ່ວິທະຍາການດັ່ງກ່າວຂ້າສູ່ການຜະລິດຕົວຈິງ.

ດ້ານແມງໄມ້ ແລະພະຍາດນັ້ນກໍ່ຂໍເວົ້າພຽງຫຍັງ:

ພະຍາດ

ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງແມ່ນມີ 2 ຊະນິດຄື :

1/ ພະຍາດໃບເປັນຂໍ້ໝູ່ງ ແລະ ໝາກອ່ອນກໍ່ເປັນ ເຊັ່ນ
ກັນ ສິ່ງເກດເຫັນຈຸດສີແດງແສດຕາມຫຼັງໃບ ແລະ ບາງຄັ້ງແມ່ນ
ຊອດຂຶ້ນມາເຖິງທ້າໃບເຕັມໃບ ທັງໃບແກ່ ແລະ ໃບອ່ອນລາມໄປ
ເຖິງໝາກອ່ອນອີກເຮັດໃຫ້ສະນັດຖະພາບຂອງໝາກກາເຟ ຫຼຸດລົງ
ຫຼາຍ ພະຍາດນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອ *Hemileia vastatrix* Berk
Br . ສ່ວນຫຼາຍຈະເກີດໃນຈຳພວກອາລາບິກາ (ກາເຟນ້ອຍ)
ສ່ວນກາເຟ ໂລບັສຕາ ແລະ ລິເບີຣິກາ ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ເພາະ
ມີຄວາມຕານຫານໄດ້. ກາເຟທີ່ເກີດພະຍາດນີ້ແລ້ວຄວນໃຊ້ຢາປະ
ເພດ ມາເນບ ແລະ ຊີເນບ ຫຼື ມັງເຊດດີ (Maneb, Zeneb,
Manzate - D) ສີດໃນອັດຕາ 15 ກຸນຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ກໍ່ຈະ
ລົດຜ່ອນລົງໄດ້.

2/ ພະຍາດປາກເນົ້າທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອ *Rosellinia*
bunodes (Berk. Br) (Sacc)

ເກີດໄດ້ໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມລະບາຍນ້ຳບໍ່ດີຝົນຕົກໜັກ
ຢູ່ສະເພາະເປັນຕົ້ນໝໍ້ນິຍາຍຢ່າງກັນ ນອກຈາກຈະລະບາຍນ້ຳໃຫ້ດີ
ແລະຫຳລາຍຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດນຸມ. ພະຍາດນີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາມີຢູ່
ບາງເຂດເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນດຽວກັບພະຍາດ ຈຸດດຳໃນໝາກຂອງ ກາ
ເຟ ເກີດຈາກເຊື້ອ *Cercospora Coffeicola* (Berk +
CKE). ຖ້າເປັນພະຍາດນີ້ໃຊ້ຢາຊະນິດດຽວກັບພະຍາດຂ້າງ.

ແມງໄມ້

ມີເພຍໜ້ອຍເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍັງຊອບໃບໃຊ້ຢາພວກເຊວິນ
85% 1 ບ່ວງຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດກໍຈະແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ຝົນຕົກແລ້ວ
ແມງໄມ້ພວກນີ້ລົດຜ່ອນລົງ ໄປເອງ.

ການເກັບແລະປຸງແຕ່ງ

ກາເຟທຸກຊະນິດແມ່ນຕ້ອງການປຸງແຕ່ງໂດຍວິທີປຽກ ເພື່ອ
ຜະລິດແກ່ນກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເມັດກາເຟທີ່ເກັບ ຕ້ອງລອກ
ເປືອກໄພໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ ບາງປະເທດໃຊ້
ອ່າງນ້ຳແຍກເມັດສິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະສ່ວນບໍ່ມີຄຸນນະພາບອອກ
ຈາກກັນ ແລ້ວແຊ່ແກ່ນທີ່ລອກເປືອກຂອງເມັດອອກແລ້ວ ປະມານ
12-24 ຊົ່ວໂມງ ນຳມາລາງເອົາເນືອກອອກແລ້ວ ຕາກດວຍ

ແສງແດດ ຫຼື ຄຣິດໃໝ່ແຫ່ງຄວບຄື້ອງອົບ. ເມື່ອແຫ້ງດີແລ້ວນຳ
ມາແກ້ະເປືອກແກ່ນ ແລະ ຄັດເອົາເມັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ.

ການປຸງແຕ່ງແບບໄດ້ຈາກບົດຮຽນທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົວຈິງ ບໍ່
ແມ່ນອຳນາດອກະສານແລ້ວຈະເຮັດໄດ້ໂລດ.

ວິທີປຸງແຕ່ງແກ່ນໝາກກາເຟ ດ້ວຍວິທີແຫ້ງກໍ່ໄດ້ເຮັດ ເຊັ່ນ
ກັນໃນປະເທດ ບະເຣຊິນ ຢູ່ຕາມເຂດທີ່ບໍ່ມີເງືອນໄຂ ໃຊ້ນ້ຳສະ
ດວກ ໝາກກາເຟສູງທີ່ເກັບແລ້ວນຳມາຕາກ 15 ເຖິງ 30 ວັນ
ແລະ ແກ້ະເປືອກດ້ວຍຄື້ອງແກ້ະເປືອກກາເຟ ແຕ່ຂໍ້ສຳຄັນວິທີປຸງ
ແຕ່ງແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕຳລົງຫຼາຍໃນເມື່ອສົ່ງອອກຂາຍ ຕາມ
ຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພາະ ຄຸນນະພາບຂອງແກ່ນກາ
ເຟ ປຸງແຕ່ງແບບນີ້ ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າການປຸງແຕ່ງແບບປຽກ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

1. Ernest Mortensen and Ervin T, Bul-
lard, Handbook of Tropical and Sub -tropical
Horticulture November (1964).

2. Anonymous 1960 Coffec Bibliography
Instituto Interamericano de Ciencias Agri-
colas. Turrialba, Costa Rica.

3. Haarer, A.E 1956, Modern Coffee production Leonard Hill Ltd., London, England.

4. Muller, L.E. 1959 Algunas deficiencias minerales comunes en el Cafeto. Instituto interamericano de ciencias Agrícolas. turrialba, costa Rica.

5. Ochse, J.J., M.G. Soule, Tr., M.J. Dijkman, C. wehlburg 1961. Tropical and Sub-tropical Agriculture, the Moc Millan Co. New York N.Y.

ການປູກໝາກແໜ່ງ

ແປແລະຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ

ວັນນະກອນ ພິມມະສະຖິດ



ການປຸກໝາກແຫງ່

I. ສະພາບແລະຈຸດພິເສດຂອງໝາກແຫງ່

ໝາກແຫງ່ເປັນສິນຄ້າຂາອອກປະເພດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີລາຄາດີ, ສົ່ງພິສິມຄວນ ແລະ ປະເທດລາວເຮົາກໍມີທ່າແຮງທີ່ຈະພະລິດ ສິນຄ້າຄັ້ງປະເພດນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຜ່ານມາກໍຄືໃນປະຈຸບັນ ລາຄາໝາກແຫງ່ລາວສົ່ງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດສາກົນກໍຍັງຕຳຢູ່ (7-12 ດອນລາຕໍ່ 1 ກິໂລ) ຖ້າປຽບໃສ່ໝາກແຫງ່ປະເທດອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນຊຶ່ງໄດ້ບໍ່ຕຳກວ່າ 18-20 ດອນລາ ຕໍ່ 1 ກິໂລ. ທັງນີ້ກໍຍອມສາມສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ. ພັນໝາກແຫງ່ຂອງລາວເຮົາຕິດຕາມທຳມະຊາດບໍ່ທັນໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຖືກພັນໃຫຍ່ຕິບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຜ່ພາຍຕາມດິນຟ້າອາກາດສົ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ, ເພາະດິນຟ້າອາກາດກໍມີສ່ວນໃນຄຸນນະພາບຂອງໝາກແຫງ່.

- ການເກັບກຳໝາກແຫງ່ ແມ່ນເກັບໃນໄລຍະເວລາສຸກ ບໍ່ສະເໝີກັນ, ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເກັບເອົາໝາກແຫງ່ທີ່ຍັງດິບຢູ່, ບໍ່ມີການຄັດເລືອກປະເພດ ປະເພດໜ້ອຍ.

- ການຕາກຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້, ຕາກໃສ່ກັບພັນດິນ ໃນເມື່ອນຳເອົາມາປຸງແຕ່ງ. ກິນແລະລົດຊາດກໍບໍ່ໄດ້, ຄຸນນະພາບບໍ່ສູງຍັງມີກິນດິນຕິດມານຳ ບໍ່ໄດ້ຕາມກຳນົດຄາດຫາຍຂອງສາກົນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ແຕ່ລະປີ, ພາກແຫ່ງຂອງລາວເຮົາ ກໍ
ສົ່ງອອກຂາຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 200-300 ໂຕນ.

II. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຊະນິດແນວພັນ

ພາກແຫ່ງມັກເກີດໃນພາກພື້ນທີ່ສູງ ແຕ່ 600 ແມັດຂຶ້ນໄປ
ຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ ບ່ອນທີ່ດິນຟ້າອາກາດອຸ່ມຊຸ່ນ ແລະ ອຸ່ມສົມ
ບູນດີ.

ນອກຈາກນັ້ນ ໃນພາກພື້ນຕໍ່າກວ່າ 100 ໂມ. ໃນລະດັບ 165 -
170 ມ. ພາກແຫ່ງກໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ມີລັກສະນະຕົ້ນມຸກ,
ງາມດີ. ພາກແຫ່ງຕ້ອງການດິນທີ່ອຸ່ມສົມບູນ, ເປັນດິນທີ່ມີອົດຕຸກ
ສ່ວນຂອງອິນຊີວິດຕຸກສູງດິນດີ ມີອາກາດອຸ່ມຊຸ່ນເປັນດີ. ມີໂບໄມ
ຫຼືນປົກຄຸມໜ້າດິນຢ່າງຕໍ່ເໝາ ອັນເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍ ຂອງອິນຊີວິດຕຸກ.
ບ່ອນໃດມີດິນອຸ່ມສົມບູນ, ຕົ້ນພາກແຫ່ງຈະມີລັກສະນະມຸກພົດງາມ
ດອກຖົ່ວພາກກໍ່ໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາຍໜ່ວຍອົງດ້ວຍ. ສະມັດຖະພາບທີ່
ໄດ້ຮັບ 200-600 ກິໂລ/1 ເຮັກຕາ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມຫາກ
ແທດເໝາະ, ສະມັດຖະພາບຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າດ້ວຍ.

ພາກແຫ່ງທີ່ປຸກຢູ່ລາວມີ 3 ຊະນິດຄື: ພາກແຫ່ງຂຽວຫຼືພາກ
ແຫ່ງນອຍ, ພາກແຫ່ງແດງ ຫຼື ພາກແຫ່ງຕາຄວາຍ ແລະ ພາກ
ແຫ່ງ. ມີແຕ່ພາກແຫ່ງຂຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນສິນຄ້າລາຄາດີ, ສ່ວນ
ພາກແຫ່ງອື່ນໆບໍ່ມີຜູ້, ຖ້າຊຸກໃຫລາຄາຕໍ່າ.

III. ການປຸກໝາກແໜ່ງ

ການປຸກໝາກແໜ່ງມີສ່ວນວິທີການ.

- 1.- ປຸກດ້ວຍເຫງົ້າຕົ້ນ
- 2.- ປຸກດ້ວຍເມັດ.

1. ການປຸກດ້ວຍເຫງົ້າຕົ້ນ

ແມ່ນເອົາຕົ້ນລຳພອມດ້ວຍເຫງົ້າປຸກ ດ້ວຍການຫຼັກເອົາຕົ້ນໝາກແໜ່ງໃຫ້ໄດ້ທັງຮາກຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະຕັດສອມພຽງແຕ່ 20 ຊັງຕີແມັດ ຕັດຮາກ ແລະ ຕັດຕົ້ນຈົ່ງປຸກ. ຝັ່ງຮາກເຫງົ້າລົງດິນເອົາດິນຖິ້ມ ແລະຢຽບດິນອອມດິນໃຫ້ແໜ້ນ. ລະດູປຸກໝາກແໜ່ງ ດິນສຸດແມ່ນຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນຂອງລະດູຝົນ. ຫຼັງຈາກຝົນຕົກ 2-3 ເດືອນໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ດິນອຸ່ມພໍດີ, ຄື ເລີ່ມປຸກໄດ້ແຕ່ເດືອນ 4-5-6 ຖ້າຝົນບໍ່ເລັ່ງຫຼາຍດິນຍັງອອມຢູ່ ຈະສືບຕໍ່ປຸກຕະຫຼອດເດືອນ 7 ກໍໄດ້ ຫຼັງຈາກປຸກລົງດິນແລ້ວໜຶ່ງເດືອນ, ໝາກແໜ່ງກໍຈະເລີ່ມແຕກ ພື້ນດິນອອກມາ. ນ້ຳຝົນໃນປີໜຶ່ງສະເລຍແລ້ວມີປະມານ 1700 -4500 ມມ. ໄລຍະປຸກ 1,5×1,5 ແມັດ ພາຍໃນໄລຍະ 3 ປີຕົ້ນໝາກແໜ່ງກໍຈະແພຂະຫຍາຍປົກຄຸມດິນທົ່ວເຖິງກັນປີທີ 3 ໝາກແໜ່ງ ຈະເລີ່ມໃຫ້ຜົນ (ໝາກແໜ່ງເປືອນ) ແລະ ປີທີ 4 ໝາກແໜ່ງ ຈະເລີ່ມໃຫ້ຜົນສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆຈົນເຖິງປີທີ 10 ຜົນຜະລິດກໍຈະຄ່ອຍຫຼຸດລົງເທື່ອລະນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຖິງປີທີ 15 ກໍຄວນເລີກ ປ່າໝາກ

ແຫຼ່ງເກົ້າແລ້ວປຸກໃໝ່ ເພາະຕົ້ນໝາກແຫຼ່ງເກົ້າມັນຫົດອຸດ ຍ້ອນຕົ້ນ
ຮຽວ, ຈອຍຮາກຂົນໂຄນ ຖ້າມີການບົວລະບັດຮັກສາດີໃສ່ຝຸ່ນ ຫົດ
ນ້ຳບໍ່ຂາດ, ອາຍຸການຜະລິດຂອງໝາກແຫຼ່ງກໍອາດຈະຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ຖ້າຕ້ອງການຈະປຸກໝາກແຫຼ່ງໃນເນື້ອຫອນກວ່າງຂວາງ, ແຕ່ລະປີ
ນັ້ນກໍຕ້ອງມີການກະກຽມແນວພັນ ຫຼື ໝໍ້ແນວຕົ້ນໝາກແຫຼ່ງໄວແຕ່ຫົວ
ປີ ເພື່ອໃຫ້ມີແນວພຽງພໍໃນລະດູການປຸກ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນ
ແລະ ເວລາດັ່ງນີ້:

ເດືອນ 10: ກຽມສະຖານຫັກຊຳ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແນວ
ພັນໝາກແຫຼ່ງດ້ວຍການຕູ້ກຽມດິນເປັນໜ້ານ, ຍົກໜ້ານໃຫ້ສູງປະມານ
10 ຊັງຕີແມັດ ລວງກວ່າງປະມານ 1,00 ແມັດ. ລວງຍາວຕາມ
ແລວແຕ່ງອ່ອນໄຂ. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ. ຝຸ່ນເຄື່ອງສີມຄວນປິ່ນ ກັບດິນ
ໜ້ານໃຫ້ສະໝໍ້ສະເໝີ. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຮົມປ່ອງກັນແສງແດດກາໃຫ້
ມີຮົມປະມານ 50%.

ເດືອນ 11-12- 1: ກຽມຕົ້ນໝາກແຫຼ່ງ ຕາມອາຍຸ 6
ເດືອນຫາ 10 ເດືອນ. ມາປັກຊຳໃສ່ໜ້ານ ທີ່ກະກຽມໄວ້ລວງໜ້າ
ແລວນັ້ນ. ຕົ້ນໝາກແຫຼ່ງແຕ່ລະຕົ້ນຕ້ອງຕັດສອມທັງຮາກ ແລະ ທັງ
ຕົ້ນຈົງໄວພຽງແຕ່ 15-20 ຊັງຕີແມັດ. ແລວຝັງລົງດິນໃຫ້ຖອມ ຫົດ
ເຫຼົ້າ ແລະ ລະບົບຮາກ. ໄລຍະປັກຊຳ 0,30 x 0,30 ມ.
ຈະສາມາດປັກຊຳໄດ້ປະມານ 100.000 ຕົ້ນ/1 ເຮັກຕາ. ຫຼັງ
ຈາກປັກຊຳສຳເລັດແລ້ວຕ້ອງສືບຕໍ່ບົວລະບັດຮັກສາ ເປັນໝາກແຫຼ່ງ
ເປັນປົກກະຕິດ້ວຍການຫົດນ້ຳ ໃຫ້ອຸນຫະພູມອຸດເວລາ; ຫຼັກຫຍາ ,

ຊົມດິນ (ພວນດິນ), ໃສ່ຝຸ່ນ, ຖ້າສົງເກດເຫັນບັງແມງລົບກວນ
ກໍຄວນສິດຢາທັນທີ. ໃນໄລຍະເວລາເບຍໜາກແຫງ ຍັງຢູ່ໃນໜ້າ
ປັກຊຳກໍຈະມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ກໍໝາຍເປັນສູ່ມູນ ຂຶ້ນ
ມາແຕ່ລະສູ່ມູນອາດຈະມີເຖິງ 5-6 ຕົ້ນ. ເບຍໜາກແຫງຈະໄດ້ຮັກ
ສາໄວຍູ່ໜ້າປັກຊຳປະມານ 4-5 ເດືອນ, ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປປຸກ.

ເດືອນ 4-5-6-7: ກ່ອນຈະນຳເບຍໜາກແຫງ ໄປປຸກ
ໃສ່ສ່ວນຕອງມີການກະກຽມສະຖານທີ່ໄວຢ່າງລະອຽດກ່ອນອັນ ທີ່ດີ
ຕອງຕຽມດິນ ໄຖ່, ອາດ, ໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຮົ່ມ
ບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນໜາກແຫງໄດ້ຮັບແສງແດດກາຕະຫຼອດໄລຍະ, ກຽມຂຸມແລວ
ຊຸ່ງເອົາຕົ້ນໜາກແຫງມາປຸກໃສ່ (ສຳລັບບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂກຽມດິນ)
ແຕ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດກຽມດິນ ກໍຂຸດຂຸມປຸກຕາມໂຮ່ເຫຼົ້າ ໃນໄລຍະ
2x2 ແມັດ ສຳຫຼັບໜາກແຫງຂຽວທີ່ພັບເຫັນໃນເຂດບໍລະເວນແລະ
ເຂດເມືອງກາສີ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ແຕ່ບາງຈຸດນິດໝູ່ຕົ້ນ
ໃຫຍ່ສົ່ງເຫຼົ້າຕົບ ແມ່ນ 2 ແມັດ ລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ 3 ແມັດ
ລະຫວ່າງແຖວ. ຈຳນວນຕົ້ນແມ່ນປະມານ 4500 ຕົ້ນ/ຮຕ.

2. ການປຸກດ້ວຍແກ່ນເມັດ

- ການປຸກໜາກແຫງດ້ວຍແກ່ນເມັດ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາແກ່ນ
ໜາກແຫງມາກາໃນໜ້າໃຫ້ແຕກກຽວກອກໜ້າຂຶ້ນມາ, ດ້ວຍການ
ເລືອກເອົາໜາກແຫງທີ່ສຸກສົດໆໃໝ່ ເປັນຜົວໃຫຍ່ມີໜ້າຫຼາຍ ປິດ
ຈາກຕົ້ນແລວ ແກະກາບອອກ, ຕາກແດດຫຼືຕາກລົມໃຫ້ແຫງ ພົ່ປະ

ມານຈັກ 2-3 ມື້ ພໍ້ໃຫມ່ເມື່ອກ ແລະບົບທາງແຫຼ່ງ. ເມື່ອໃຫ້
 ແກ່ນທັງຕິດຢູ່ນັ້ນແຕກອອກຈາກກັນເປັນເມັດໃຜເມັດນັ້ນ, ແລະຈຶ່ງ
 ນຳໄປຫວານໃສ່ໝານກາທຽມໄວກອນແລ້ວ. ການກຽມໝານກາ
 ຕອງເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໃຫ້ດີ ປະສົມປົນຝຸ່ນໃຫ້ໄດ້ອັດຕາສ່ວນຄັກແນ່,
 ຕິດໝານກາໃຫ້ແຕກ ແລະ ໝູ່ສະເໝີກັນທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຮົມຕະ
 ຫຼອດເວລາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງແຫຼ່ງສຸກສິດດີແລ້ວຕອງກາພາຍໃນ
 1 ອາທິດພໍ້ໃຫ້ກາຍ, ຖ້າຊັກຊ້າໄປກວ່ານັ້ນຄວາມງອກຂອງ ເມັດ
 ທາງແຫຼ່ງຈະຫຼຸດລົງແຕ່ລະມື້ ແລະ ຈະພົດຄວາມງອກພາຍໃນ 1
 ເດືອນ. ການຫວານເມັດທາງແຫຼ່ງລົງໝານຕອງປະຕິບັດພໍ້ໃຫ້ ຖື
 ໂພດ ຫຼື ຫ່າງໂພດດຸ່ງສຸດແມ່ນ 3-4 ແກ່ນຕໍ່ 1 ຊຸດມ. ດ້ານດີ
 ຂອງການປູທາງແຫຼ່ງດ້ວຍການກາແກ່ນແມ່ນ ສາມາດຜະລິດເບຍ
 ທາງແຫຼ່ງໄດ້ຫຼາຍ ໃນເນື້ອຫາວາງຂວາງໄດ້. ອາຍຸຂອງການຜະ
 ລິດທາງແຫຼ່ງທີ່ປູດ້ວຍການກາແກ່ນແມ່ນຍືນກວ່າວິທີເອົາຕົ້ນເຫຼົ່າ
 ປູກ. ບາງປະເທດໄດ້ຢຶດຢືນວ່າ ວິທີປູດ້ວຍການກາແກ່ນ, ອາຍຸ
 ຜະລິດຈະຍືນເຖິງ 30-40 ປີ, ແຕ່ອັນອ່ອນຂອງການປູກ ທາງ
 ແຫຼ່ງ ວິທີນີ້ແມ່ນຕອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 4 ປີຈຶ່ງຈະເຕັມດອກ ແລະ
 ອອກຜົນໄດ້ (4 ປີເປືອນ, 5 ປີໂທມ). ເມື່ອທາງແຫຼ່ງແຕກ
 ຫຼອກມາສູ່ປະມານ 10-20 ຊຸດມ, ແລ້ວ, ກໍຕອງຈົມອອກໄປບົ່ງ
 ໄວ້ໃນໝານບົ່ງທຽມໄວ້ລວງໜ້າແລ້ວຕາງຫາກ. ໝານບົ່ງກໍຕອງ
 ຕຽມດິນໃຫລະອຽດ, ມີຝຸ່ນແລະອິນຊີວັດຖຸຢ່າງອຸດົມສົມບູນຮັບປະກັນ
 ຮົມຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຫຼີດນ້ຳໃຫ້ອຸ່ມອຸ່ນຢູ່ສະໜ້າສະເໝີ, ໄລຍະ

ບົງຫ່າງຖືປະມານ 10x20 ຊຕມ. ຫຼື 20 x20 ຊຕມ. ອັນສູງ
ມາດບັນຈຸເບຍທາກແຫງໄດ້ 500.000 ເບຍຫຼື 250.000 ເບຍ
ໃນເນອໜ້ານບົງ 1 ເຮັກຕາ. ເພື່ອຈະປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ ຖືກັບ
ລະດູການປາ ຕອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແຜນ ແລະ ເວລາດັ່ງນີ້:

ເດືອນ 8-9: ຕຽມດິນໜ້ານກາ ຕຽມຮົ່ມ, ຊອກທາກແຫງ
ສຸກມາກຽມເປັນແຖນກາ ແລະ ປະຕິບັດການກາແຖນໃຫ້ສຳເລັດ.

ເດືອນ 10-11: ບິວລະບັດໜ້າເບຍທາກແຫງທັງອອກອອກ
ຈາກການກາແຖນ, ໝູນຫົດນ້ຳ, ເສຍຫຍາ, ຂາແມງໄມເປັນປົກ
ກະຕິ.

ເດືອນ 12-1: ເລີ່ມຈຸມໜ້າເບຍທາກແຫງໄປບົງໃສ່ ໜ້ານ
ໃຫ້ລະບັດລະວັງເວລາບົງບໍ່ໃຫ້ເບຍທາກແຫງກະທົບກະເທືອນຫຼາງ
ຮາກ ແລະ ທາງຕົ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເບຍທາກແຫງທຸກໆອອນຫຼວງແຫງ
ແລະ ຕາຍໄປກໍມີ. ໝູນຫົດນ້ຳໃຫ້ອຸ່ມສະເໝີ. ບິວລະບັດຮັກສາບໍ່ໃຫ້
ມີຫຍາເກີດ ສັບປຸ້ນໃນໜ້ານບົງ. ໝູນພວນດິນໃສ່ຝຸ່ນພອມ ຖ້າມີສິດ
ຕູ້ມີດລົບກວນ ກໍໃຫ້ສິດຢາປາບທັນທີ.

ເດືອນ 4-5-6-7: ເລີ່ມເອົາໄປປູກໃສ່ສ່ວນໄດ້. ແຕ່
ກ່ອນຈະນຳເບຍທາກແຫງໄປປູກໃນສ່ວນ ຕອງມີການກະກຽມ ສະ
ຖານທີ່ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນລວງໜ້າໄວກ່ອນເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນ
ໄຂໄດ້ປູກຕົ້ນເບຍທາກແຫງທັນທີໃນໄຕຫຼັງຈາກຫຼັກອອກຈາກ ໜ້ານ
ບົງ.

IV. ການບົວລະບັດຮັກສາ

ຫຼັງຈາກປຸກດ້ວຍເຫງົ້າຕົ້ນ ຫຼື ດ້ວຍແກ່ນເມັດແລ້ວໃຫ້ສືບຕໍ່
ຫົດນ້ຳຈົນຕົ້ນໝາກເໝາງຕິດດີ. ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີແສງແດດກາຖືກ ,
ໝູ່ເລາະລຽບເບິ່ງສ່ວນຫຸ່ງໝາກເໝາງ. ຖ້າເຫັນວ່າມີຕົ້ນຕາຍ ກໍ
ໃຫ້ປຽນສາມໃສ່ໜ້າ. ໃນໄລຍະເດືອນ 12-1-2 ແລະ ເດືອນ
3 ເປັນໄລຍະທີ່ແຫງແລ້ງ ຝົນບໍ່ຕົກ ຕ້ອງຮັບປະກັນນ້ຳໃຫ້ແກ່ ຕົ້ນ
ໝາກເໝາງເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ຖ້າມີຫຍາດແຫງ, ໃບໄມ້ ຫຼື ເຜືອງແຫງ
ຢ່າຍຕາມສົມໝາກເໝາງ ແລະ ບໍລິເວນອອມຕົ້ນ ກໍຈະຊ່ວຍຮັກສາ
ຄວາມອຸ່ມອຸ່ນແກ່ຕົ້ນໝາກເໝາງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທັງເປັນການຂາຫຍາ
ໄປໃນຕົວອີກດ້ວຍ.

V. ການເກັບກ່ຽວໝາກເໝາງ

ໃນໄລຍະເດືອນ 8 ຫາ ເດືອນ 9 ຕ້ອງປະໃຫ້ໝາກເໝາງ
ສຸກຄ່າຕົ້ນຈົ່ງເກັບແຕ່ກໍບໍ່ຄວນປະໃຫ້ໝາກເໝາງສຸກເກີນໄປ ຈົນເຮັດ
ໃຫ້ກາບຫຸ່ງໝາກເໝາງເປັນອົບເນົາ ເປັນຊ່ອງວ່າງໄດ້ເມັດໝາກ
ເໝາງຕົກເຮັດລົງດິນເສຍລາງ. ລະດູເກັບໝາກເໝາງ ກໍແມ່ນຍັງຢູ່
ໃນຊ່ອງທ້າຍຂອງລະດູຝົນ, ຝົນອາດຈະຕົກລືນ, ແດດອາດຈະມີ
ນ້ອຍ ຫຼື ຖ້າມີກັບສະໜ້າສະເໝີ, ດັ່ງນັ້ນ ການຕາກໝາກເໝາງຕ້ອງ
ໃຫ້ແຫງດີຢ່າງໄວວາ. ຫຼັງຈາກເກັບມາແລ້ວນັ້ນ ເປັນບັນຫາທີ່ຈະ
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເພາະມັນພົວພັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງໝາກເໝາງ.

ຖ້າຕາກທາກແຫງໄດ້ດີ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທາກແຫງເປັນສິນຄ້າ ມີຄຸນ
ນະພາບສູງເທົ່ານັ້ນ, ຕອງຕາກທາກແຫງໃຫ້ແຫງຢ່າງສະໝໍ້າ ສະ
ເໝີ, ບໍ່ແກຍາວຈົນເຮັດໃຫ້ທາກແຫງຕົກເໝົາ, ລາຄາບໍ່ດີ, ຖ້າຕາກ
ດວຍວິທີຢ່າງໄຟ ກໍຕອງເຮັດໄຟອອນໆ ສະໝໍ້າສະເໝີ. ຈັດຕັ້ງກັນ
ເຝົ້າ, ໝັ້ນພົບ ທາກແຫງບໍ່ໃຫ້ມີອາການໄຟໄໝ້ ຫຼືບາງບອນພັດ
ບໍ່ແຫງພຽງພໍ.

ທາກແຫງທີ່ເກັບມາມັກຈະມີດິນ, ມີຕົມຕິດມານຳສະເໝີ,
ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະຕາກຄວນລາງເອົາດິນອອກຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາມາ
ຕາກແຫງໄວ້ບໍ່ເຮັດກອງສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ທາກແຫງທຸ່ງທາງພື້ນບໍ່ແຫງ
ດີ, ຫຼື ຖ້າຕາກດວຍວິທີຢ່າງໄຟ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທາກແຫງທີ່ ຢື່ນ
ແຫມ ຫຼື ໄໝ້ໄຟດຸ່, ແຕ່ສ່ວນທີ່ຢູ່ເບື້ອງເທິງພັດບໍ່ແຫງດີ, ສຳລັບ
ການຕາກທາກແຫງແຫງຄາກາບ ກໍຄວນຮັກສາໄວ້ເປັນພ້ອມ ແລະ
ຕາກເປັນພ້ອມໂລດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ແຕ່ບາງປະ
ເທດຊຳພັດຕ້ອງການຊື້ເປັນທາກແຫງ ມີກາບ ແຕ່ບໍ່ເປັນພ້ອມ

ໃນກໍລະນີຕ້ອງປິດແຕ່ລະທາກເສຍກ່ອນຈຶ່ງຕາກ. ການ
ຕາກທາກແຫງຄາກາບຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າການຕາກເອົາກາບ
ອອກ. ຖ້າຕາກບໍ່ແຫງຄືກ. ອາດຈະແຫງແຕກກາບ, ແຕ່ແກນທາງ
ໃນພັດຍັງຊຸ່ມກໍຈະກາຍເປັນທາກແຫງທີ່ເສຍຄຸນສຳລັບການ ຕາກ
ທາກແຫງບໍ່ມີກາບນັ້ນ, ຫຼັງຈາກລາງທາກແຫງສິດຄ້າເປືອກແລວ,
ຕ້ອງແກະກາບອອກກ່ອນຈຶ່ງເອົາແຕ່ແກນໄປຕາກ. ເວລາແກະກາບ
ທາກແຫງຕ້ອງລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ເມັດແກນແຕກອອກຈາກກັນ ເດັດ

ຂາດ. ເມື່ອຕາກແຫງແລວທາກແຫງຈະຕິດຂ້າມລັກສະນະຄ້າຍຄື
ແກນທາກກະທັນຖາແກນທາກແຫງແຕກອອກຈາກກັນຈະເປັນສິນຄ້າ
ລາຄາຕ່ຳ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ການເກັບທາກແຫງທັງພື້ນດິນເອົາໃຈໃສ່ເລືອກພວ ທີ່ແກ່
ດີ ແລະ ມີບາງທາກທີ່ເລື່ອມສຸກແລ້ວ ຫຼືກວ່ານການເກັບທາກແຫງ
ອອນພູມາຮູ້ເມື່ອຕາກແຫງຫຼືຢາງແລວຄຸນນະພາບຈະຕິດຕ່ຳ ແລະ
ການຢາງດວຍໄຟກໍ່ຕອງໃຊ້ໄຟອອນແລວໝູ່ຄົນປັນໃຫ້ມີຄວາມຮອນ
ສະຫຼັກສະເຫຼີມດ້ວຍຈາກການໄພແລະບໍ່ແຫງດິນເມື່ອເຫັນວ່າແຫງ ດີ
ແລວຈິ່ງເກັບໃສ່ກະສອບຫຼືພາຊະນະອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

1. ໂອຣິດ ຈຸນລະມຸນຕຣີ, ພະແນກກະສິກຳ ກຳແພງນະ
ຄອນວຽງຈັນ, ທາກແຫງໃນໂຄງການປຸກພືດ ອຸດສາ
ຫະກຳ ແລະ ພຶດສິນຄ້າຂາອອກ (1985).
2. Dr.K.V. Ahamed Bavappa
Cardamom, Package of Practices,
Central Plantation Crops Research
Institute; KASARAGOD, Kerala
India (1985).

ການປູກຢາດູດ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສີອຳພອນ ພົມມະລືວົງ
: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກຢາດູດ

ກ. ລັກສະນະທົ່ວໄປແລະຄວາມສໍາຄັນ

ຢາດູດເປັນພືດລ້ຽມລຸກ ຈັດເຂົ້າໃນຈຳພວກພືດອຸດສາຫະກຳ ຢາດູດນີ້ໄດ້ນຳຜົນເສຍຫາຍມາສຸ້ອນເອົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມັນ ໄດ້ບັນຈຸດ້ວຍຫາດ ນີໂກຕິນ ແລະ ຫາດຢາງຊື້. ນອກນັ້ນຢາດູດ ຍັງໄດ້ປະກອບດ້ວຍຫາດ ໂປຼຕິນ ແລະ ຫາດອາໂຣມັດ ອີກດ້ວຍ. ແຕ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກຽວກັບຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງ ການດູດຢາ ຕ້ອງລະມັດລະວັງດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

- ສີຂອງໃບຢາດູດຕ້ອງເປັນໃບສີເຫຼືອງ ເພາະມັນໄດ້ບັນ ຈຸດ້ວຍຫາດ ນີໂກຕິນ ແລະ ຫາດຢາງຊື້ຫຼາຍ.
- ໃຊ້ຢາຫມັກກນຕອງ ຊຶ່ງມັນໄດ້ບັນຈຸຫາດ ທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍປະມານ 35%.

ປະຊາຊົນລາວພວກເຮົາ ໄດ້ເລືອກປຸກຢາດູດມາເປັນເວລາ ນານເກືອບ ແຫ່ບຫຸກແຫ່ງ ນັບແຕ່ເຂດພູດອຍລົງເຖິງທົ່ງພຽງແຕ່ ວ່າຢາດູດທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມປຸກ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນເປັນພັນພັນ ເມືອງ (ຢາລາດ) ແຕ່ກໍມີພັນຊະນິດໜຶ່ງຄື ພັນເວີຈີເນຍ (ພັນ ເກ້ງປະເທດ) ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກປະຊາຊົນແລະກຳລັງຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະເທດພວກເຮົາ. ສະນັ້ນຖະພາບ ຂອງຢາດູດພັນ ເວີຈີເນຍ ແລະ ຢາລາດ ໂດຍທົ່ວໄປ ປະມານ

4000 ຫາ 5500 ກິໂລ/ເຮັກຕາ ແຕ່ສຳລັບພື້ນຜະລິດຢາແຫ້ງ
ທີ່ ຢາດູດທີ່ຊອຍແຫ້ງແລ້ວຈະໄດ້ນ້ຳໜັກປະມານ 500-600 ກິໂລ
ຕໍ່ເຮັກຕາ

ດິນພ້ຳອາກາດ

ດິນປູກທີ່ເໝາະສົມ

ຢາດູດມັກເກີດໄດ້ດີໃນດິນຟຶງປົນດິນຊາຍ ດິນທີ່ມີການລະ
ບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ເປັນສະ ຂອງດິນ(PH)5,3-5,7 ແລະດິນທີ່ຕົກຕະ
ກອນຕາມຄືມື້ຝົງແມ່ນນ້ຳເຊັ່ນ ຕາມແມ່ນ້ຳລຳເຊຕ່າງໆ. ນອກຈາກ
ນັ້ນກໍແມ່ນດິນຈຳພວກທີ່ບຸກເບີກໃໝ່ ແລະດິນທີ່ເປັນຄອກສັດເກົ່າ ກໍ
ປູກຢາດູດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ລະດູປູກ

ລະດູປູກຢາສຳລັບປະເທດເຮົານັ້ນຕ່າງກັນ ຈະເວົ້າຕາຍ
ຕົວບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ປູກຢາດູດຄວນຄຳນຶງເຖິງວ່າ ເວລາກາເບ້ຍຢາ
ດູດບໍ່ຄວນໃຫ້ຖືກກັບເວລາຝົນຕົກຫຼາຍ ຄວນຈະໃຫ້ ຢູ່ໃນລະດູຮອນ
ຈັກປະມານ 1 ເດືອນ ເພາະວ່າເວລາເຮົາຈະຍາຍເບ້ຍຢາ ໄປ
ປູກໃໝ່ນັ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ມີຝົນຕົກຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວຈົນກວ່າເບ້ຍຢາ
ດູດຕິດດີແລ້ວ ຫຼືວ່າເບ້ຍຢາດູດຕັ້ງໂຕໄດ້ດີແລ້ວຄື ເວລາເຮົາເສຍ
ໝາ, ພວນດິນຖິມຂຸມ ແລ້ວຈຶ່ງມີຝົນຕົກຫຼາຍກໍບໍ່ເປັນຫຍັງເຊັ່ນຕົວ

ຢ່າງ : ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ເວົ້າສະເພາະ ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ ເຄີຍ
ປູກຢາດູດໃນລະຫວ່າງເດືອນ ພະຈິກໄປຫາເດືອນມັງກອນ.

ການກັ່ນເບ້ຍຢາດູດ

ດິນສຳລັບກັ່ນເບ້ຍຢາດູດ ຄວນເປັນດິນຜົງ ຫຼື ດິນທີ່ເປັນ
ຄອກສັດເກົ່າ, ດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຫາດອາຫານພືດ ແຕ່ສຳຄັນທີ່
ສຸດຕ້ອງເປັນດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ. ການກຽມດິນໝານກັ່ນເບ້ຍຢາ
ດູດເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິ
ເສດ, ຕ້ອງກຽມດິນໃຫ້ລະອຽດປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກໃນອັດຕາ 2 ກິໂລ
ຕໍ່ແມັດມົນທົນ, ຄືນເຂົ້າກັນກັບດິນໃຫ້ລະອຽດກ່ອນຈະຫວ່ານ ແມັດ
ຢາ, ຫານທີ່ຈະກັ່ນເບ້ຍຢາໃຫ້ກວ້າງ 1 ແມັດ, ຍາວປະມານ 10
ແມັດ. ຄວນໃຊ້ແມັດຜັນຢາດູດປະມານ 1 ບ່ວງຕັກແກງເຕັມ ຫຼື
ປະມານ 20-30 ກຸກມ ການຫວ່ານແມັດຢາ ຄວນຈະປະສົມກັບ
ຂີ້ເຖົ້າຫຼື ດິນຊາຍ ລະອຽດດີ ໃຊ້ແມັດຢາ 1 ສ່ວນ ປະສົມກັບຂີ້
ເຖົ້າ ຫຼື ດິນຊາຍລະອຽດ 10 ສ່ວນ ຈຶ່ງຫວ່ານລົງໃນໝານກັ່ນເບ້ຍ
ໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີດີ, ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຫຼີດນ້ຳແຕ່ພຽງເບົາໆ ເປັນຟອຍ
ໃຫ້ທົ່ວທັງໝານກັ່ນເບ້ຍ ລະວັງຢ່າຫຼີດນ້ຳແດງຈົນເກີນໄປ ເວລາ
ນັ້ນແມັດຈະໄຫຼໄປໂຮມກັນ ຫຼື ແສຍຖິ້ມໝົດ. ອີກວິທີໜຶ່ງເຮົາຈະໃຊ້
ວິທີແບບບົວຫຼີດນ້ຳກໍໄດ້ຄື ເຮົາເອົາບົວຫຼີດນ້ຳມາແລ້ວ ໃສ່ນ້ຳລົງ
ໄປໃຫ້ເຕັມ ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ໄມ້ ຫຼື ມື້ຄົນແມັດຢາເຂົ້າກັບນ້ຳ ໃຫ້ລະ
ອຽດດີແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຊ້ບົວຫຼີດນ້ຳດັ່ງກ່າວຫຼີດລົງໄປ ເທິງ

ການກຳເນີດໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ຈາກນັ້ນກໍ່ມີຄົນທີ່ແຕ່ລະຊາດເປັນ
ຝ່ອງອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍ່ເປັນອັນວ່າໃຊ້ໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງນຳຂໍ້
ແກບມາປຶກສາກັນກ່າວບາງ ບ່ອນໃຫ້ເຮົາຂໍແກບປຶກສາກາສາ
ເກີນກວ່າ 1 ຊຸດ ແຕ່ຫາງຫົດຫຼັກສຸດແມ່ນໃຊ້ຜ່າຂາວຂາດບາງເພື່ອ
ປຶກສາກັນ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ແກບປຶກສາ ແລະ ສິ່ງອື່ນປະກັນໄດ້ທີ່
ສຸດ ຫຼັງຈາກໜ້ານັ້ນມັດຢາດລ້ວ ຄວນໃຊ້ຢາຂາດແນວ ໂດຍອອມ
ການກາເປັນຕົ້ນ : ຢາເຊວິນ, ແອນດິນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນມົດແນວຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ເຖິງກັບເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອາກຢາ
ດຸດໄດ້.

ການບົວລະບັດຮັກສາໜານກຳເນີດ

ຫຼັງຈາກໜ້ານັ້ນມັດຢາດລ້ວ, ເຮົາຄວນມີຄົນທີ່ 2
ເທື່ອຄື ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ. ຫົດເທື່ອໜຶ່ງປະມານ 2 ບົວ
ຕໍ່ໜ້ານ. ຫົດໄປຈົນວ່າມັນຈະງອກ ນັບແຕ່ມັດຢາງອກແລ້ວໃຫ້ຫົດ
ຫົດນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນຄື 3 ບົວຕໍ່ໜ້ານ ແລະ ໃຫ້ຫົດມູ່ລະ 2 ເທື່ອ ແຕ່
ຄວນລະວັງ ຖ້າວ່າເຮົາສັງເກດເຫັນໜານກຳເນີດ ປຸກຊຸ່ມຫຼາຍ
ໂພດ ເຮົາຄວນລົດການຫົດນ້ຳລົງ. ເພາະວ່າໄລຍະນີ້ ເບຍຢາ
ມັນມັກຈະເນົ້າເປື້ອຍ ເພາະດິນຊຸ່ມໂພດ. ເມື່ອເຮົາສັງເກດເຫັນ
ວ່າ ເບຍເກີດມີການເນົ້າເປື້ອຍ ເຮົາຄວນສິດຢາບອກໂຕ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນຊ້ອພະຍາດຕ່າງໆ, ເປັນຕົ້ນພະຍາດລຳຕົ້ນເນົ້າ ແລະ
ພະຍາດໃບຈຸດ, ປະລິມານຢາທີ່ໃຊ້ຄວນ 2 ຫາ 2,5 ລິດ/ໜ້ານ

ຂະໜາດການກຳບັດກວ່າ 1 ແມັດຍາວ 10 ແມັດ ຫຼື ໃຊ້ຢາ
 20 ຫາ 25 ລິດ ຕໍ່ເນື້ອທີ່ການກຳ 100 ຕາລາງແມັດມືນທຶນ .
 ໃຊ້ສິດຢານຕໍ່ໄປປະມານ 5 ຫາ 7 ມັດຕະຫຼອດ, ຖ້າຫາກມີຝົນ
 ຕົກຫຼັກ ເຮົາຄວນໃຊ້ສິດ 3 ມັດຕະຫຼອດ ສິດໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າ
 ບັບຢາດູດຈະເຊົາການເກີດເປື້ອນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເຮົາໃຈໃສ່ຫາ
 ຄວາມສະອາດການກຳບັດເລື້ອຍໆ. ຖ້າສັງເກດເຫັນບັງ ແມງ
 ຕ່າງໆລົງຫາລາຍ ເຮົາຄວນເສັດຢາຈຳພວກ ເຊວິນ, ອາໂຊດອິນຫຼື
 ດີແອນດອນ ໃນອັດຕາ 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 10 ລິດ, ສິດໃຫ້ຫົວ
 ທັງໝົດ ນັບແຕ່ມັກກຳບັດໄປປະມານ 6 ຫາ 8 ອາທິດຫຼືວ່າບັບ
 ຢາດູດມີໃບປະມານ 5 ຫາ 6 ໃບ ເຮົາຄວນຍ້າຍໄປປຸກໄດແລ້ວ.
 ການກຳບັດຂະໜາດກວ່າ 1 ແມັດ ຍາວ 10 ແມັດ ຫຼື ເນື້ອທີ່
 ການກຳບັດ 10 ຕາຕະລາງແມັດມືນທຶນ ເຮົາສາມາດຜະລິດ
 ບັບຢາດູດໄດ້ປະມານ 2000 ຫາ 2500 ເບຍ ສາມາດປຸກໄດ້
 ໃນເນື້ອທີ່ 1 ໄລ່.

ການຍ້າຍເບ້ຍຢາໄປປຸກ

ພາຍຫຼັງທີ່ເບ້ຍຢາເຊາະສົມຫຼືຈະປຸກໄດ້ແລ້ວ ເຮົາຄວນ
 ຍ້າຍໄປປຸກໄດ ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາກຳບັດໂດຍເຮົາເຜົາຂາວປົກຄຸມນັ້ນ
 ກ່ອນຍ້າຍໄປປຸກ 1 ອາທິດ ເຮົາຄວນເປີດຜ້າອອກ ບໍ່ຄວນປົກຄຸມ
 ອີກ. ເພື່ອໃຫ້ເບ້ຍຢາຂອງເຮົາຊິນເຄີຍຕໍ່ອາກາດ ແລະແສງແດດ
 ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຄັດເລືອກເຮົາເບ້ຍທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງ

ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຫຳລາຍກ່ອນຈະຫຼີກ ຫຼືຍ້າຍໄປ
ປູກໝັ້ນ ເຮົາຄວນຫຼີດນ້ຳຫານກຳໄຕປຽກຊຸ່ມເສຍກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ອາກເບຍຢາດູດເປັນອັນຕະລາຍ.

ການຕຽມດິນປູກ

ຖ້າຫາກວ່າດິນຂອງເຮົາມີການປຽກຊຸ່ມໂພດ ເຮົາຄວນໄຖ
ດິນຕາກແດດໄວປະມານ 5 ຫາ 7 ມື້ ແລ້ວຈຶ່ງຄາດ ແລະ ກັບ
ຫຍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄຖຄັນ ແລະ ຄາດລະອຽດອີກເທື່ອຫຼື ເພື່ອ
ໃຫ້ດິນຂອງເຮົາຟຶງ ແລະ ຍິ່ງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ການ
ໃສ່ຝຸ່ນຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກປະມານ 20 ໂຕນຫຼືວ່າ 3 ໂຕນ / ເຮັດ,
ຫວ່ານ ຫຼື ຢາຍໃຫ້ໜ້ວແລ້ວຈຶ່ງໄຖ ຫຼືຄາດກັບຝຸ່ນໃຫ້ດີ.

ການປູກ

ປູກແບບໃຊ້ເຈືອກຜຽກໜຶ່ງແລ້ວໃຊ້ສົ່ງມຸດຂຸ່ມໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ລະດັບທີ່ເຮົາຕ້ອງການຂະໜາດຂອງຂຸ່ມກວາງປະມານ 5 ຫາ 10
ຊຕມ. ເລິກ 5 ຫາ 10 ຊຕມ. ເຮົາອາດຈະຂຸດຂຸ່ມ ປູກຕອນ
ເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ ເວລາແດດອ່ອນເຮົາຄ່ອຍປູກກ່ອນປູກເຮົາ
ຄວນເອົານ້ຳໜັດໃສ່ຂຸ່ມໃຫ້ປຽກເລັກນ້ອຍ ບໍ່ຄວນຖອກນ້ຳໃສ່ຂຸ່ມ
ຫຼາຍໂພດ ຄວນຈະຫຼີດໃຫ້ພໍດີ ແລ້ວປູກເບຍຢາ ໄປໂລດ.

ປູກແບບເປັນແຖວເທິງຄັນຄູ ເຮົາຄວນຍົກຮ່ອງເລັກນ້ອຍຈຶ່ງ
ຈະເປັນການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ເມື່ອເວລາຝົນຕົກຫຼັກ; ແລະສາມາດ

ເອົານ້ຳເຂົ້າໃສ່ໄດ້ໃນເວລາແຫ້ງແລ້ງ. ສ່ວນວິທີການປູກນັ້ນແມ່ນ
ຄືກັນກັບວິທີກ່າວມາແລ້ວນັ້ນພຽງແຕ່ເອົາຊຸດຊຸມເທິງຄັນຄູ່ເທົ່ານັ້ນ.

ໄລຍະປູກ

- ຖ້າເປັນຢາດູດໃບໃຫຍ່ ໃຫ້ປູກລະຫວ່າງແຖວ 100
ຊັງຕີແມັດ, ລະຫວ່າງຕົ້ນ 60 ຊຕມ.


- ຖ້າເປັນຢາດູດໃບປານກາງໃຫ້ປູກລະຫວ່າງແຖວ 80
ຊັງຕີແມັດ, ລະຫວ່າງຕົ້ນ 35 ຊຕມ.

- ຖ້າເປັນຢາດູດໃບນ້ອຍໃຫ້ປູກລະຫວ່າງແຖວ 50 ຊຕມ
ລະຫວ່າງຕົ້ນ 20 ຊຕມ. ສຳລັບຢາດູດໃບໃຫຍ່ໃນ 1 ເຮັກຕາແມ່ນ
ໃຫ້ປູກລະຫວ່າງ 20000- 40000 ຕົ້ນ. ສ່ວນຢາດູດໃບນ້ອຍ
ແມ່ນນຳໃຊ້ລະຫວ່າງ 200000-400000 ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ


- ຫຼັງຈາກປູກຢາແລ້ວ 1 ຫາ 2 ອາທິດ ຫຼືວ່າຕົ້ນຢາດູດ
ປົນຕັ້ງໂຕໄດ້ແລ້ວ ຄວນພວນດິນ ແລະ ເສຍຫຍາ ການພວນດິນ
ແມ່ນຕອງລະມັດລະວັງ, ພວນໃຫ້ຕົ້ນໆ, ໃນການພວນດິນຄັ້ງ ທຳ
ອິດໃຫ້ພວນບາງໆຢູ່ເທິງສຳດິນປະມານ 5-6 ຊຕມ, ຄັ້ງທີສອງລະ
ຫວ່າງ 8-12 ຊຕມ.

- ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ, ແມ່ນໄດ້ຫຼືດນ້ຳ 150-200ມ³/ເຮ
ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມນ້ຳຂຶ້ນເຖິງ 400-600ມ³/ເຮ.




ລະຫວ່າງແຖວ 100 ຊມ. ລະຫວ່າງຕົ້ນ 60 ຊມ.

ຮູບ 8. ເຕັກນິກການປູກ (ໃບໃຫຍ່)



ລະຫວ່າງແຖວ 80 ຊມ. ລະຫວ່າງຕົ້ນ 35 ຊມ.

ຮູບ 9. ການປູກຢາດູດໃບປາບກາງ



ລະຫວ່າງແຖວ 50 ຊມ. ລະຫວ່າງຕົ້ນ 20 ຊມ.

ຮູບ 10. ການປູກຢາດູດໃບນ້ອຍ

ສຳລັບຢາດູດໃບນ້ອຍ ແມ່ນຫຼັກຢູ່ປະມານ 2-4 ເທື່ອ. ສ່ວນຢາດູດໃບໃຫຍ່ແມ່ນຫຼັກຢູ່ປະມານ 5-6 ເທື່ອ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຈຳນວນການຫຼັກ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິມາດຂອງນ້ຳ ມັນຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ, ຂຶ້ນກັບພູມອາກາດ, ລັກສະນະການປູກ ການຄົບຄວາມຕືດລອງ, ການພະລິດ ແລະ ລັກສະນະແນວພັນ.

ການເດັດຍອດຢາດູດ ແມ່ນຈະເພີ່ມຄວາມໃຫຍ່ ຂອງໃບ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ໃບມີຄຸນນະພາບສູງອີກດ້ວຍ, ຍ້ອນວ່າຫາດຫຼັກ ພືດຈະໄປສັງລວມຢູ່ທີ່ໃບ.

ການເດັດຍອດແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງການເປັນດອກ. ສຳລັບຢາດູດໃບນ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ເດັດສະເພາະພ້ອມດອກ, ເພາະວ່າໃບຢາດູດຂອງເຫຼືອງສຸດ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າໃບຟາກສ່ວນອື່ນ. ສ່ວນຢາດູດໃບໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ເດັດຢູ່ລຸ່ມລວມ ທັງໃບອີກດ້ວຍ. ຫຼາຍຄວາມວ່າ ການເດັດຈະໄດ້ເດັດທັງຟາກສ່ວນຂອງໃບນ້ຳ (ໃບຢູ່ເທິງສຸດແມ່ນບໍ່ມີຄຸນນະພາບດີ). ສຳລັບຕົ້ນໃດທີ່ຈະເຮັດແນວພັນໃນປີຕໍ່ໄປ ໃຫ້ຈັງປະດອກໄວ ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ຖົງຄຸມໄວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງເນັດພັນ.

ຫຼັງຈາກເດັດຍອດແລ້ວປະມານ 7 ຫາ 10 ມື້ ຈະເຫັນແຫງງອກຂຶ້ນມາ. ເຮົາຕ້ອງກຳຈັດດ້ວຍມືທັນທີ ຫຼືຈະໃຊ້ດ້ວຍຫາດເຄມີໃນການສະກັດກັ້ນກໍໄດ້ (ນາໄລນອຍ ອິດຮາຊິດ) 5ຫາ 10 ກິໂລ/ເຮັກຕາ. ເພື່ອສະກັດກັ້ນການປົ່ງທີ່ແຫງງໃໝ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ການນຳໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ຫຼັງຈາກເດັດຍອດແລ້ວ ປະ

ນານ 2-3 ວັນ.

ການເດີດແຫ້ງຖິ້ມ ແມ່ນເພື່ອຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ແຫ້ງນາຍາດແບ່ງ
ອາຫານທີ່ຈະນຳເຂົ້າໄປຫຼືລົງໃບ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ໃບຢາບໍ່ດີ
ແລະ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ.

ການສືບຢາບ້ອງກັນແລະກຳຈັດບັ້ງແນວຕ່າງໆ

- ໃນໄລຍະຕົ້ນຢາກຳລັງໃຫຍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນ ເຮົາ
ຄວນອອກກວດກາເບິ່ງສະຖານທີ່ປູກຢາດດເລື້ອຍ . ເມື່ອສັງເກດ
ເຫັນແມງບັ້ງຕ່າງໆລົງຫຳລາຍ ກໍຄວນສືບຢາບ້ອງທີ່ເຊັ່ນ : ຢາເຊ
ວິນ, ດີແອນດີນ ໃນອັດຕາ 2 ບ່ວງແກງ/ນ້ຳ 10 ລິດຖ້າຫາກ
ສັງເກດເຫັນຕົ້ນຢາເກີດພະຍາດຈຳພວກໃບກູດ ໃບງົ່ ກໍຄວນຫຳ
ລາຍຕົ້ນຢາເຫຼົ່ານັ້ນຖິ້ມ.

2. ການຄັດເລືອກແນວພັນ

1/ . ຕົ້ນຢາດທີ່ຈະເອົາໄວ້ເຮັດແນວພັນ ຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງ
ຈາກຕົ້ນຢາດອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມກ້ອນກັນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 500 ແມັດ.

2/ . ເລືອກຕົ້ນຢາດທີ່ມີລັກສະນະທີ່ກ້ອນຕາມ ແນວພັນ
ບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ອົວະຈົນເກີນໄປ.

3/ . ຕົ້ນຢາດທີ່ຈະເອົາໄວ້ເຮັດແນວ ຈະຕ້ອງບໍ່ເປັນພະ
ຍາດ ແມງໄມຫຳລາຍ.

4/ . ຕ້ອງຕັດຕົ້ນຢາດທີ່ມີລັກສະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມແນວ

ພັນທັງໝົດຖິ້ມ.

5/. ຕົ້ນຢາດູດທີ່ຈະເອົາໄວ້ເຮັດແນວນັ້ນ ຖ້າເຮັດຖືກ ຕ້ອງຕາມວິທີດັ່ງກ່າວແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໝໍ້ໝູ່ຄຸມດອກ ພຽງແຕ່ ຕັດດອກໃດທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັນໂພດອອກບາງເລັກນ້ອຍກໍພໍ.

6/. ຕົ້ນຢາດູດທີ່ຈະເອົາໄວ້ເຮັດແນວນັ້ນ ກໍມີການເກັບ ໃບຢາໄປຊອບໄດ້ຄືກັນຂໍ້ແຕ່ວ່າເວລາເກັບໃບ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈ ໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາ, ເສຍຫຍ້າໃສ່ນ້ຳ ແລະ ສິດຢາອຳແນງໄມ້, ບ່າງຕ່າງໆ ເພື່ອຕົ້ນຢາເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້ແຂງແຮງ ອອກດອກໃຫ້ໝາກ ຢ່າງສົມບູນດີ.

ການເກັບກ່ຽວ

ຫຼັງຈາກເດັດບອດ ແລະ ເສຍແຫ້ງແລ້ວປະມານ 20 ຫາ 30 ມື້ກໍເລີ່ມເກັບໃບຢາໄດ້ແລ້ວ. ຕາມປົກກະຕິ ໃບຢາລຸ່ມທີ່ ວ່າ ຢູ່ຕີນ 2-3 ໃບຈະເກັບໄດ້ ຫຼັງຈາກເສຍແຫ້ງແລ້ວ 10 ມື້ 20 ມື້, ໃບຢາແກ່ເກັບກ່ຽວໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຄວນເກັບໃບ ໃນເວລາຝົນຕົກ ແລ້ວໄໝ້. ເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າປະມານ 2-3 ມື້ ຫຼັງຈາກຝົນຕົກແລ້ວ ຈຶ່ງເກັບ ເພາະວ່າອາຫານໃນໃບຢາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໃບຢາ ໄດ້ຖືກຝົນສະລາງໄປໝົດແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຢາດູດນັ້ນບໍ່ ດີ ປາສະຈາກລົດຊາດທີ່ແຊບຂອງຢາດູດທັງຫຼາຍ.

ຂັ້ນຕອນໃບຢາເກັບກ່ຽວໄດ້ຫຼືຍັງ

1/. ໃບຢາປ່ຽນຈາກສີຂຽວແກ່ ເປັນສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ສີ

ດອກກະດັ່ນງາ.

2/. ສິ່ງເກດເບິ່ງໃບຢາຕື່ນໃນເວລາເຊົ້າ ໃບຢາມັກຫັກງ່າຍ, ເວລາຫັກໃບຢາບໍ່ມີເປືອກຕິດລອກອອກມາດວຍ, ເວລາເອົາພັບໃບຢາຈະແຕກຫັກບ່ອນຮ່ອງພັບ.

3/. ໃບຢາມີລັກສະນະພຶດພອງ ບໍ່ລະອຽດ ເພາະວ່າໃບຢາມີຫາດເກືອຊະນິດໜຶ່ງ ນອກຈາກໄປເຮັດໃຫ້ໃບຢາ ມີລັກສະນະພຶດພອງ. ແຕ່ບໍ່ຄວນຈະຖືສີຂອງໃບຢາແຕ່ຢ່າງດຽວ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວ. ເພາະວ່າ ບາງປີຈະມີການແຫ້ງແລ້ງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບຢາຈະມີສີເຫຼືອງອ່ອນໜຶ່ງ ດອກກະດັ່ນງາ ເຖິງແມ່ນວ່າໃບຍັງບໍ່ທັນມີສູນນະພາບສຸກແກ່ກິດາມ ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນວ່າໃບຢາແດດ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຄວນພິຈາລະນາເກັບໃບຢາທີ່ດີສຸດຄື ໃບແກ່.

ການບົ່ມຢາແບບພັນເມືອງ

ການບົ່ມໃບຢາດູດມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ ບົ່ມດ້ວຍແດດ ບົ່ມດ້ວຍອາກາດຫຳມະດາ, ບົ່ມດ້ວຍຄວາມອ່ອນ ແລະ ອື່ນໆ, ເພື່ອເອົາຢາແຫ້ງເອົາປ່ອນໂຮງງານຢາດູດ. ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ ເຮົາຈະເວົ້າສະເພາະການບົ່ມຢາ ເພື່ອເອົາມາຊອບເຮັດຢາກະທໍ ເພາະເປັນວິທີງ່າຍ ສະດວກ ເພາະແກ່ຊາວໃຮ່ນາທົ່ວໄປ ເພື່ອເຮັດຢາກະທໍແບບພັນເມືອງລາວເຮົາ, ການບົ່ມຢາແບບພັນເມືອງ ກ່ອນອັນພັດເຮົາຕ້ອງເຮັດຄອກບົ່ມ. ການເຮັດຄອກບົ່ມຢານັ້ນ ເຮົາຈະເອົາຕົ້ນກ່ວຍ, ຫຍ້າແຊງ, ເພືອງ, ໄຖ່ປ່ານຂາດ, ໄມ້ແປ້ນ ຫຼືອັນໃດ

ອັນໜຶ່ງກໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ເພາະສົມ. ຂະໜາດ
 ຂອງຄອກຢ້ານນິຕານຫ້າມະດາກວ່າງປະມານ 2 ພັນດ ຍາວປະ
 ມານ 4 ພັນດ ສູງປະມານ 20-30 ຊຸຕມ. ຫຼັງຈາກເຮັດຄອກ
 ແລ້ວ ໃບຢາສິດທີ່ເກັບມາບໍ່ຄວນຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ແຫງໜຽວ ອົບຈັດການທີ່
 ເຂົ້າຄອກໂລດ. ການລຽງໃບຢາເຂົ້າຄອກນັ້ນ ເອົາຄວນເຮັດ
 ແບບຫຼື ຫໍຕາມຫ້າມະຊາດ, ແບບໜຶ່ງປະມານ 15 ຫາ 25 ໃບ
 ເພື່ອສະດວກໃນການຊອບຄືວ່າ ແບບໜຶ່ງ ຫຼືກໍາໜຶ່ງໃບຢາໃຫ້ເພາະ
 ສົມກັບໜ້າມາຊອບຢາເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກແບບໃບຢາແລ້ວ ກໍນຳໄປ
 ລຽນໄວ້ໃນຄອກໂດຍຕັ້ງຫົວໃບຢາລົງລຸ່ມ ເອົາປາຍໃບຢາຂຶ້ນແລ້ວ
 ພັບຫາງໃບຢາປະມານ 1/3 ຂອງໃບຢາ ແລ້ວຕັ້ງລຽນກັນອອກ
 ມາເລອຍໆຈົນສຸດຄອກ ແລ້ວໃຊ້ຫຍາ ເພື່ອງ, ໃບກວຍແລະອື່ນໆ
 ປົກຫາງເທິງໃຫ້ຫາພໍສົມຄວນ ເພື່ອເກີດຄວາມຮອນປະມານ 45-
 50 ອົງສາ ຈັງຕີກາດ ເມື່ອໃບຢາໄດ້ຮັບຄວາມຮອນດີຈະຄ່ອຍໆ
 ປ່ຽນສີຈາກສີຂຽວເປັນສີເຫຼືອງຂຶ້ນທຸກໆວັນ ເມື່ອໃບຢາເຫຼືອງແລ້ວ
 ຈຶ່ງນຳມາຊອບໄດ້; ຕາມຫ້າມະດາ ການປັ້ນໃບຢາ ຖ້າວ່າເປັນ
 ຄອກໃໝ່ ກໍຈະໃຊ້ເວລາ 5-6 ມື້ ກໍສຸກ ແລະ ຊອບໄດ້ ຖ້າຄອກ
 ເກົ່າ ຫຼືອາກາດຮອນອົບເອົາຈະໃຊ້ເວລາ 2 ຫາ 3 ມື້ກໍຊອບໄດ້

ການຕາກ

ຫຼັງຈາກຊອບຢາແລ້ວ ກໍນຳເອົາຢາເສັ້ນທີ່ຊອບແລ້ວ ໄປ
 ຢາຍໃສ່ແຕະໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ບໍ່ໃຫ້ບາງ ແລະ ຫາໂພດ ໃຫ້ຢາຍ

ໃຫ້ພິດຂະໜາດຂອງແຕະ ຢາທຳມະດາກວ່າງປະມານ 80 ຊມ., ບາວປະມານ 150 ຊມ. ສານດວຍໄມ້ ແລ່ນນຳໄປຕາກແດດຖາ ຈະເຮັດຢາຂາວ ເຮົາຄວນປັ້ນຢາໃນແຕະ ເພື່ອໃຫ້ຢາແຫ້ງສະໝໍ້າ ສະເໝີ ຕອນຄຳກຳນຳເຮົາໄວ້ໃນຮົ່ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຢາຖືກນ້ຳໝອກແລະ ຕອນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາກໍເຮົາອອກຕາກແດດອີກ ຈົນຮອດຕອນເລີ່ມ ເມື່ອ ຕາເວັນຕົກດິນນ້ຳໝອກເລີ້ມລົງພິດໃຫ້ຢາເຮົາຢູ່ໃນແຕະອ່າວຈຸ່ມ ພັກ ໄດ້ ກໍຮີບຈັດການກູ້ໂລດ ລວມຄວາມວ່າ ເຮັດຢາຂາວແຕ່ຕາກ 2 ແດດແລ່ນນຳໄປຍັ້ນຈູໃສ່ກະທໍ່ຢາຫຼື ນຳດູດໄດ້ໂລດໂດຍບໍ່ຕາກນ້ຳ ໝອກອີກຖ້າເຮັດຢາປຸກຫຼື ຢາແດງຄວນຕາກ 2 ແດດ 2 ໝອກຈົ່ງ ກູ້ໄດ້.

(ເອກກະສານອ້າງອີງ)

- ບາງຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປຸກພືດຊະນິດຕ່າງໆ
ກົມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ,
(1 9 8 1)
- ສາດສະດາຈານ ເດໂກ ເດກອບ ແລະ ດີໂມວາ,
ການປຸກພືດເຂດຮອນ ແລະ ເຂດອົບອຸ່ນ.
(1 9 8 1).

ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການປູກອ້ອຍ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກອ້ອຍ

I. ຄວາມສຳຄັນ

- ອ້ອຍແມ່ນພືດເຂດຮ້ອນ ມັນໄດ້ບັນຈຸທາດນ້ຳໜານ ປະມານ 9-18% ອ້ອຍບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດເປັນນ້ຳຕານ ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນຂອງໜານເທົ່ານັ້ນ, ຍັງຖືກຮັບໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງສັດອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນນ້ຳອ້ອຍຍັງໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງ ຈຶ່ງມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ :

- ຜະລິດເປັນເຫຼົ້າແດງ.
 - ເຫຼົ້າ 90°
 - ເຫຼົ້າຂາວປະເພດຕ່າງໆ...
 - ໃບແລະລຳຕົ້ນຂອງອ້ອຍແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນຝຸ່ນປັ່ນກໍໄດ້.
- ສ່ວນຂົ້ວເຖົ້າຂອງອ້ອຍແມ່ນອຸດົມສົມບູນດ້ວຍທາດ (K_2O) ກາລີ.
- ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນິຍົມກັ່ນປຸກອ້ອຍພືດເມືອງເປັນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ : ອ້ອຍດຳ, ອ້ອຍແດງ, ອ້ອຍຫຼົກ, ອ້ອຍສະເພົາ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ການປຸກອ້ອຍແດງ, ອ້ອຍດຳແລະອ້ອຍສະເພົາ, ອ້ອຍຫຼົກ ບໍ່ສາມາດຈະນຳມາເຮັດນ້ຳຕານໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກວ່າອ້ອຍພວກນີ້ມີຈຸລັງອ່ອນຫຼາຍ ເວລາເຮົາບິບເອົານ້ຳອ້ອຍຈາກພັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຂອອຍຊຶ່ງມີລັກ

ສະນະເປັນຝຸ່ນນ້ອຍໆ ແລະ ເວລາເອົາໄປຕົ້ມກໍເປັນເມັດນ້ຳຕານໄດ້ຍາກ.

ເພື່ອຢາກໄດ້ອອຍທີ່ໃຫ້ນ້ຳຕານໄດ້ດີ, ຄວນພັ້ນມາປັກອອຍເລົ່າ ເພາະອອຍຊະນິດນີ້ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃຫ້ນ້ຳຕານເທົ່ານັ້ນ, ຍັງເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຜະລິດວັດຖຸອື່ນໆ ເຊັ່ນ ເຫຼົ້າຊະນິດຕ່າງໆ, ສ່ວນເສດເຫຼືອຂອງອອຍແມ່ນສາມາດເຮັດເປັນໄມ້ອັດ, ຝຸ່ນ, ອາຫານສັດ ແລະ ອື່ນໆ...

II. ລັກສະນະ, ເຂດທີ່ປູກອ້ອຍແລະແນວພັນ

1. ລັກສະນະຂອງອ້ອຍ

ອ້ອຍຈັດເປັນພືດຢູ່ໃນຕະກຸນໝ້າ, ມີຖົນກຳເນີດທີ່ເກາະນິວກິເນ ໃນມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ, ລັກສະນະພາຍນອກຂອງອ້ອຍປະກອບດ້ວຍລຳຕົ້ນທີ່ມີຮູບກົມ, ເປັນເປື່ອງ ແລະ ເປັນຂໍ້, ແຕ່ລະຂໍ້ຈະປະກອບດ້ວຍຮາກ, ຮາກຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງລຳແມ່ນອ່ວນຕຸ້ຍພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຮາກ ແມ່ນໄດ້ຢືນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ 60 ຈັງຕິແມັດ, ຮາກອອຍ ເປັນລະບົບຮາກຟອຍແຕ່ຂອງແຮງດຶງ, ສາມາດຢັ້ງລົງໄປໃນດິນໄດ້ເລິກເຖິງ 0,6-1,5 ມ. ໃບຂອງອ້ອຍຍາວ ແລະ ແຫຼມ, ຄວາມຍາວຂອງໃບຍາວກວ່າ 1 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 5-7 ຊຕມ. ຄວາມສູງຂອງຕົ້ນປະມານ 4-6 ມ. ແລະ ຄວາມໜາຂອງ

ລຳ 2-3 ຊຕມ., ບາງປ້ອງແມ່ນມີຄວາມຍາວແຕ່ 5-22 ຊຕມ. ດອກອອຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 2 ເພດຮ່ວມກັນ.

ທຸກໆຂໍ້ແມ່ນມີຕາ, ເບື້ອງເທິງຂອງພາກສ່ວນລຳແມ່ນມີຕາ ຫຼາຍກວ່າ, ພາກສ່ວນເທິງຂອງລຳແມ່ນມີຫາດໜ່ວຍ ຢູ່ນອຍໜຶ່ງ ແຕ່ມີຫາດ ອາມິດົງຫຼາຍ, ເພາະສົມໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການ ປູກ. ສຳລັບພາກສ່ວນກາງຂອງລຳ ແມ່ນມີຫາດໜ່ວຍເຖິງ 18% ເພາະສົມ ນຳເຂົ້າໃນການຜະລິດນ້ຳຕານ.

2. ເຂດປູກອ້ອຍຢູ່ໃນປະເທດລາວພວກເຮົາ

ສະເພາະດິນຟ້າອາກາດຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ເປັນອາກາດ ເພາະສົມແກ່ການປູກອ້ອຍທຸກຊະນິດ ດ້ວຍເຫດນັ້ນການປູກອ້ອຍນຳ ຕາມ ຈຶ່ງມີຢູ່ທົ່ວທຸກເຂດໃນປະເທດເຮົາເຊັ່ນ :

ກ. ເຂດເໜືອ

- ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ພັນອ້ອຍທີ່ໃຊ້ ປູກ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພັນອ້ອຍພັນເມືອງຄື : ອ້ອຍແດງ, ອ້ອຍດຳ, ອ້ອຍສະເລີາ, ອ້ອຍຫົກ ແລະ ພັນອ້ອຍນ້ຳຕານ ພັນອາ.

ຂ. ເຂດກາງ

- ໄດ້ແກ່ແຂວງກຳແພງ, ເຂດນວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະໜັ່ນນະເຂດ. ພັນອ້ອຍທີ່ໃຊ້ມີພັນເຊື້ອ 375 ແອຟ 175, ພັນອາ, ພັນແອນເຊື້ອ 310, ອ້ອຍແດງ.

ຄ. ເຂດໄດ້

- ໄດ້ແກ່ຂອງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ. ພັນອ້ອຍທີ່ໃຊ້ປຸກ
ມີພັນ ແອຟ 153, ແອຟ 135, ພັນແອນເຊໂອ 310, ອ້ອຍ
ແດງອ້ອຍດຳ... ເວົ້າລວມແລ້ວ ແນວພັນອ້ອຍນ້ຳຕານທີ່ສາມາດ
ເອົາໄປຜະລິດນ້ຳຕານໄດ້ນັ້ນຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ຫາກໄດ້ຮັບຄວາມ
ນິຍົມໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້.

3. ແນວພັນອ້ອຍນ້ຳຕານ

ພັນເຊໂອ 375 (00 375)

ພັນອ້ອຍ ເຊໂອ ເກີດຈາກປະເທດອິນເດຍ, ເປັນພັນອ້ອຍ
ທີ່ມີລຳຕົ້ນໃຫຍ່, ປ້ອງຍາວ, ມີສີຂຽວແກມເຫຼືອງ ໃບໃຫຍ່, ບໍ່ມີ
ຄາຍ, ຕານອຍກົມ, ເປັນພັນບໍ່ອອກດອກ, ຈຳນວນລຳອ້ອຍຕໍ່ຊຸມ
ປະມານ 5 ລຳ, ບໍ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ສະນັ້ນ ໃນເວລາ
ປຸກ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງນ້ຳ, ມັກດິນຊາຍແກມຕົມ, ດິນແດງ,
ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີ. ຄວາມສູງຂອງອ້ອຍພັນນີ້ 3-4
ມ. ມີທາດນ້ຳຕານປະມານ 11% ທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ປານກາງ
ແນງໄມ້ມັກຢາກຫຳລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງ.

ພັນແອຣ໌ກ (R.X)

ເປັນພັນອ້ອຍເກີດຈາກເກາະ ໂອກີນາວາ (ຢີປຸ່ນ) ມີລຳ
ຕົ້ນສູງປະມານ 3-4 ແມັດ, ລຳຕົ້ນນ້ອຍ, ປ້ອງຍາວສີຂຽວແກມ

ເຫຼືອງ; ມີຮາກເກີດຢູ່ຕາມຂ້າງລຸ່ມ, ມີໃບນ້ອຍຍາວ ແລະກາຍ
ແຂງ ເຮັດໃຫ້ໃບຫຼືນຈາກລຳຕົ້ນຍາກ, ມີຕາເປໄຫຍ່. ບໍ່ທົນຫານ
ຕໍ່ຄວາມແຫງແລງ, ທົນຫານຕໍ່ພະຍາດປານກາງ, ທົນຫານຕໍ່ແມງ
ໄມ້ດີສົມຄວນ. ເພາະສົມປຸກໃນດິນຊາຍແກນຕົມ. ດິນແດງຊຶ່ງລະ
ບາຍນ້ຳ ແລະ ອາກາດໄດດີ.

ເປັນພັນອ້ອຍທີ່ອອກດອກໄວປະມານທ້າຍເດືອນ 10 ຫາ
ຕົ້ນເດືອນ 11 ມີຫາດນ້ຳຕານປະມານ 9-11% ລຳອ້ອຍຕໍ່ສູ່ມ
6-7 ລຳ.

ພັນແອນເຊໂອ (N CO 310)

ເປັນພັນອ້ອຍຂອງປະເທດ ອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ມີລັກສະນະ
ຄ້າຍຄືກັນກັບພັນ ແອຣ໌ກາ ຕ່າງແຕ່ຕາອ້ອຍຈະໃຫຍ່ ເປັນກວ່າ ພັນ
ແອຣ໌ກາ.

ພັນອາ (A)

ເປັນພັນອ້ອຍຂອງປະເທດ ອັງຕິກວາ ມີລຳຕົ້ນບໍ່ສູງປານ
ໃດ, ສີແດງ, ປ້ອງຍາວປານກາງ, ໃບອ້ອຍຍາວ ກາບບໍ່ແກະ
ງ່າຍ, ຕາເປ, ທົນຫານຕໍ່ຄວາມແຫງແລງເລັກນ້ອຍ ບໍ່ທົນຫານ
ຕໍ່ພະຍາດ. ແຕ່ທົນຫານຕໍ່ແມງ ໄມ້ປານກາງ. ເພາະສົມປຸກໃສ່ດິນ
ແດງ, ດິນຊາຍແກນຕົມ ແລະ ດິນທີ່ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອາກາດ
ໄດດີມີຫາດນ້ຳຕານປະມານ 10-11% ຈຳນວນລຳອ້ອຍຕໍ່ຊຸມປະ
ມານ 7-10 ລຳເປັນພັນອ້ອຍທີ່ແຕກລູກຫຼາຍກວ່າພັນອື່ນໆ.

ພັນໂອທັດ (O.H)

ເປັນພັນອ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ບ່ອນເກີດແນ່ນອນເທື່ອ, ມີລຳໄຫຍ່ດີ
ລວງສູງປະມານ 2-3 ແມັດ ມີສີນ້ຳຕານແກ່, ມີປ້ອງໄຫຍ່ສະເໝີ
ກັນ, ຕາໃຫຍ່ເປ, ໃບໃຫຍ່ມີຄາຍຫຼາຍ, ກາບໃຫຍ່ ແລະ ຫຼິ້ນ
ຍາກ ເປັນພັນອ້ອຍທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລງດີສົມຄວນ ຈຳນວນ
ລຳອ້ອຍຕໍ່ສູນປະມານ 4-7 ລຳ ເພາະສົມປູກໃນດິນຊາຍແກນຕົມ
ດິນແດງ ແລະດິນຊາຍອຸ່ນກິດອື່ນໆ ທີ່ລະບາຍນ້ຳ, ອາກາດໄດ້ດີ,
ມີຫາດນ້ຳຕານປະມານ 10% ເປັນພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມ້ດີສົມຄວນ.

III. ດົນພ້ຳອາກາດສຳລັບການປູກອ້ອຍນ້ຳຕານ

1. ສະພາບດົນພ້ຳອາກາດ

ອ້ອຍເປັນພືດທີ່ເຕີບໄຫຍ່ໄດ້ດີ ໃນເຂດຮ້ອນມີຝົນຕົກ ແລະ
ແສງແດດພຽງພໍ, ໂດຍທົ່ວໄປ ອ້ອຍຈະເລີ່ມເຕີບໂຕໄດ້ໄວ ໃນ
ເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມ 25-30 ອົງສາ. ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຊຸນລະປະທານ
ຕ່ອງໂມ້ນ້ຳ 1. 150 ມມ ຕໍ່ປີ ຖ້າຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ອ້ອຍອາດຈະ
ຈະເລີ່ມເຕີບໂຕໄດ້ຊາ ຈຸດທີ່ກວມໃນໄລຍະເດືອນທຳອິດ. ອ້ອຍ
ທີ່ມີອາຍຸຍາວມີເວລາຈະເລີ່ມເຕີບໂຕໄດ້ດີ ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ,
ແຕ່ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ປະເທດທີ່ປູກອ້ອຍເປັນຕົ້ນຕໍ ຈະຕ້ອງການເກັບ

ກ່ຽວເນື້ອອ້ອຍມີອາຍຸແຕ່ 11 ຫາ 12 ເດືອນເປັນຕົ້ນໄປຕົວຢ່າງ
ປະເທດກູບາ, ອິດສະຕຣາລີ, ເປລູ ແລະອື່ນໆ ມີບາງປະເທດກໍ
ເກັບກ່ຽວໃນເນື້ອອ້ອຍມີອາຍຸ 24 ເດືອນ ເຊັ່ນ ອາວາຍເປັນຕົ້ນ.

2. ດິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບອ້ອຍ

ອ້ອຍແມ່ນພືດທີ່ປູກໄດ້ດີ ໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດທີ່ມີຊີ້ນດິນ
ເລິກ, ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີ ຕົ້ນອ້ອຍ ໃນເວລາຍັງ
ນ້ອຍບໍ່ສາມາດຫຼົບຫ່ານຕໍ່ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ນ້ຳຂັງໄດ້ ດິນເປັນຄານ
ແຂງເລິກປະມານ 20 ຊມ. ແລະ ດິນທີ່ເປັນກົດ ຫຼື ດັ່ງ ເລັກນ້ອຍ
ໃຊ້ປູກອ້ອຍໄດ້ດີ ຖ້າມີທາດອາຫານອຸດົມສົມບູນ. ດິນທີ່ມີທາດການ
ຊີອອມ (Ca) ຫຼາຍ ບໍ່ເໝາະສົມກັບອ້ອຍເພາະມັນອາດຈະເປັນ
ອັນຕະລາຍສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອ້ອຍໄດ້.

ສະພາບຂອງດິນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການປູກອ້ອຍ ນ້ຳຕານ ຈຶ່ງ
ເປັນກົດ ຫຼື ດັ່ງ ສູງເກີນໄປ ເປັດ (PH) 6-8 ແລະມີ
ທາດອາຫານອຸດົມສົມບູນດີ.

IV. ການປູກອ້ອຍ

1. ລະດູການປູກເໝາະສົມພາຍໃນປະເທດເຮົາ

- ເຂດມີນ້ຳຊື້ນລະປະທານ : ເໝາະສົມປູກລະຫວ່າງ
ເດືອນ ພະຈິກ - ເມສາ.

- ຂອດອາໄສນ້ຳຝົນ : ສາມາດປຸກໄດ້ໃນຕົ້ນລະດູຝົນຕັ້ງ
ແຕ່ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເຫັນວ່າການປຸກຕົ້ນ ລະ
ດູຝົນ ນັກປະສົບບັນຫາຫຼາຍກວ່າປຸກໃນຫາຍລະດູຝົນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບັນຫາດານພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້.

2. ການຕຽມດິນ

ການຕຽມດິນສຳລັບປຸກອ່ອຍ ກໍມີຫຼາຍວິທີແຕ່ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ
ແມ່ນໃຊ້ວັດຖຸໜຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ລົດ ຫຼື ຄວາຍກໍໄດ້.

ວິທີຕຽມດິນ

- ໄຖເລິກປະມານ 25-30 ຊມ. ປະໄວ້ 15-20 ມ.
- ຄາດເລິກປະມານ 15 ຊມ. ປະໄວ້ 5 ມ.
- ໄຖຄົ້ນເທື່ອທີສອງໃນລວງຕັດ ເລິກປະມານ 30-35
ຊມ. ປະໄວ້ 15 ມ.
- ຄາດລະອຽດເລິກປະມານ 15 ຊມ.
- ຍົກຮ່ອງ.

ຖ້າດິນຫາກຍ່ອຍພຽງຄວນໃຊ້ເຄື່ອງປັບທຳດິນເພື່ອຄວາມ
ສະດວກໃນການນຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ ລະບົບຈົນລະປະຫານ ການ
ຕຽມດິນຕ້ອງໃຫ້ເລິກປະມານ 30-35 ຊມ. ຖ້າດິນຟັນທີ່ຈະປຸກມີ
ຊັ້ນດິນດານ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄຖສົ້ວລະເບີດດິນດານ ອອກເສຍ
ກ່ອນ, ເມື່ອຄາດດິນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວ ຈຶ່ງຫຳການຍົກຮ່ອງປຸກ. ຖ້າ

ດິນທີ່ປູກພາກເປັນດິນຕຳ ຄວນຍົກຄູສູງປະມານ 50 ຊມ. ກ່ອນແລ້ວ ຈຶ່ງຂຸດຮອງ ເລິກປະມານ 30 ຊມ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳແຊ່ ອອຍໃນເວລາຝົນຕົກ. ນອກຈາກນັ້ນ ການປູກແບບຄູສູງ ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ລະບາຍນ້ຳຂ້າ ແລະ ອອກໃນສ່ວນອອຍສະດວກຕາມອີກ. ຖ້າ ດິນຄາບພຽງດີ ຄວນຂຸດຮອງປູກເລີຍ ດ້ວຍຄວາມເລິກປະມານ 30 - 50 ຊມ. ອີງຕາມຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ. ຖ້າໃຊ້ຄວາຍກໍ່ໃຫ້ຕຽມ ດິນຕາມຄວາມສາມາດຂອງຄວາຍກໍ່ເພາະສົມເໝືອນກັນ ແຕ່ດິນທີ່ ຄວນຕຽມດິນດ້ວຍລົດ ເພາະສາມາດໄຖ່ໄດ້ເລິກກວ່າ.

3. ການຄັດເລືອກແນວພັນ

- ແນວພັນທີ່ຈະນຳໄປປູກ ຕ້ອງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 7 - 9 ເດືອນ ອາຍຸແນວພັນ ໃນລະຫວ່າງນີ້ສາມາດປູກໄດ້ຫຼືດລຳ. ຖ້າ ຫາກອອຍມີອາຍຸສູງກວ່ານີ້ ຄວນເລືອກເອົາແຕ່ສ່ວນປາຍ ນາໃຊ້ ເຮັດຫອນພັນປູກ.

- ຕ້ອງມີຕາທີ່ສົມບູນ ປ່າສະຈາກການບວບຊຸ້ງ ແລະ ຄວນ ມີກາບໃບຫຼັມ ເພາະວ່າກາບໃບຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບວບຊຸ້ງ ໃນ ເວລາຍົກຍາຍ.

- ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ ຄວນເປັນແນວພັນທີ່ມີລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະໜາຍຕົວດີ ປ່າສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ລົບກວນ.

- ຫອນພັນທີ່ໃຊ້ປູກ ຕ້ອງມີຕາລະຫວ່າງ 3-5 ຕາ.

4. ການປຸກອ້ອຍ

ແຕ່ບໍ່ຄານ ປະຊາຊົນລາວພວກເຮົານິຍົມປຸກອ້ອຍແບບເຈັດ ເປັນຊຸມ, ດ້ວຍການຊຳ ທອນອ້ອຍໄວ້ຫ່າງຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຕາອ້ອຍ ແຕກເປັນຫໍ່ຍາວແລ້ວນຳມາປຸກ. ແຕ່ຈາກການຄົ້ນຄວ້າ (ໃນນັ້ນກໍ ມີໂຕເລກຂອງການຫົດລອງປຸກອ້ອຍຢູ່ສະຖານີຫົດລອງ ບ້ານໝາກ ນາວ) ຂອງຊຸດວຽກງານຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ຖອຍເປັນ ສິນຄ້າ ຂາອອກຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ : ປະເທດກູບາ ໄດ້ໃຫ້ເຫດສະນະວ່າ ການປຸກ ອ້ອຍແບບເຈັດເປັນຊຸມກໍມີຈຸດດີເພື່ອນັ້ນ ແຕ່ຖ້າຈະເຈັດໃນເນື້ອທີ່ ກວ້າງຂວາງ ເຫັນວ່າບໍ່ເສດຖະກິດ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງ ງານໃນການຂຸດຂຸມຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນຍົກອ້ອຍດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼືໃຊ້ ຄວາຍໄຖເປັນຮ່ອງ ແຕ່ສຳຄັນຕ້ອງໃຫ້ຮ່ອງເລິກປະມານ 30 ຊມ. ການຂຸດຂຸມມີຈຸດດີອັນໜຶ່ງຄື ອ້ອຍທົນທານຕໍ່ການລຸ້ມໄດ້ດີ.

ເຮົາໃຫ້ຂໍສັງເກດບາງປະການ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ ທ່ອນພັນ ອ້ອຍປຸກແບບຫ່າງຕັ້ງ ແລະ ຕາອ້ອຍເກີດຫໍ່ແລ້ວນັ້ນ ມັນມີຈຸດອ່ອນ ຫຼາຍຢ່າງຄື : ທ່ອຍເກີດມາບໍ່ແຂງແຮງ; ທ່ອຍໃຫຍ່, ການຈະ ເລີນເຕີບໂຕຊ້າ. ສະນັ້ນຄວນປຸກເປັນທ່ອນນອນໄປຕາມຮ່ອງເລີຍ ວິທີນີ້ມີຈຸດດີຫຼາຍຍ່ອນວ່າມັນສະດວກໃນການວາງທ່ອນ, ການຖິ້ມກໍ ສະດວກ, ທ່ອຍເກີດມາກໍຈະແຂງແຮງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບ ໂຕ ໄດ້ໄວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຖ້າຈະນຳໃຊ້ກົນຈັກກໍສະດວກ ເປັນການ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ການປຸກເປັນທ່ອນນອນໄປຕາມ

ຮ່ອງມືດີກວ່າ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຜົນຜະລິດ.

ການປູກອ້ອຍນັ້ນແມ່ນປູກໄລຍະແຖວລະຫວ່າງ 1,00 ແມັດ
ຫາ 1,60 ມ. ທີ່ເດັ່ນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ. ສະເພາະການປູກໄລຍະ
1,60 ແມັດ ແມ່ນເພື່ອຄວາມສະດວກໃນເວລານຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.
ແຕ່ບັນຫານັ້ນກໍ່ຂຶ້ນນຳຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ : ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ
ການແຕກກໍ່ຂອງແນວພັນອ້ອຍເປັນຕົ້ນ.

ການວາງທ່ອນອ້ອຍຢູ່ໃນຮ່ອງກໍ່ມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍນີ້
ຍົມໃຊ້ 3 ວິທີດັ່ງນີ້ :

- ວາງທ່ອນອ້ອຍນອນຕິດຕໍ່ກັນໄປຕາມຮ່ອງ
- ວາງທ່ອນອ້ອຍສັນກາຍສັນ ນອນຕາມຮ່ອງ
- ວາງທ່ອນອ້ອຍຕໍ່ໃຈກາງທ່ອນໜຶ່ງຫາກາງອີກທ່ອນໜຶ່ງປະ
ມານ 60 ຊມ. ນອນໄປຕາມຮ່ອງ.
- ກ່ອນປູກດີທີ່ສຸດ ແມ່ນໃຫ້ຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳອຸ່ນ 52 ປະມານ
20 ນາທີ.

ປະລິມານອ້ອຍທີ່ໃຊ້ປູກໃນເນື້ອທີ່ 1 ຣຕ. ສຳລັບແນວພັນທີ່
ມີລຳຕົ້ນໃຫຍ່ ແມ່ນປະມານ 7 ໂຕນ. ຖ້າຫາກລຳນ້ອຍ 5 - 6
ໂຕນ.

ການຖົມທ່ອນອ້ອຍ

- ການຖົມທ່ອນອ້ອຍ ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນ ແຕ່ກ່ອນຈະຖົມ
ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງດິນທີ່ເຮົາປູກ. ຖ້າດິນຊຸ່ນຫຼາຍ ຫຼື ປຽກໃຫ້ຖົມ

ໃນລະຫວ່າງ 1-2 ຊມ. ຖ້າດິນແຫ້ງ 2-5 ຊມ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັກສາຫ່ອນອອຍໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມຊຸ່ມ. ຫຼັງຈາກຖິ້ມແລ້ວ ຄວນຈະຫຼີດນ້ຳ ທັນທີ ເມື່ອເຫັນວ່າດິນແຫ້ງ ແລະ ຝົນບໍ່ຕົກ. ເພາະວ່າໃນໄລຍະນີ້ອອຍຕ່ອງການຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນນະພູມສູງສົມຄວນ (ປະມານ 28-30 ອົງສາ) ເພື່ອການແຕກງອກ.

V. ການບົວລະບັດຮັກສາອ້ອຍ

1. ການປຸກຊອນ

ການປຸກຊອນນີ້ ຄວນປຸກໃນ 2-3 ອາທິດພາຍຫຼັງປຸກເນື້ອເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ ອ້ອຍທີ່ເຮົາປຸກນັ້ນອອກບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີດີ . ການປຸກຊອນຈະໃຊ້ຫີນແບກຫ່ອນອອກຈາກອ້ອຍໃນສ່ວນຕອນດຽວ ກັບປຸກຊອນກໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າອ້ອຍຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນສະເໝີກັນ ຫຼື ເຮົາຫ່ອນໃໝ່ປຸກກໍ່ໄດ້ເໝືອນກັນ.

2. ການຫຼີດນ້ຳ

ການທີ່ຈະຫຼີດນ້ຳກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງປຸກກໍ່ຂຶ້ນປຸກບຸຊະນິດ ຂອງດິນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ໃນດິນທີ່ບໍ່ແໜ້ນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມຫຼີດນ້ຳ ພາຍຫຼັງປຸກ ຫຼາຍຄວາມວ່າ ຫຼັງຈາກຖິ້ມຫ່ອນອ້ອຍແລ້ວ ຄວນຫຼີດນ້ຳ ເພາະອ້ອຍຕ່ອງການຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນນະພູມສູງເພື່ອການແຕກງອກ ທີ່ເຮົາກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ການຫຼີດນ້ຳຄັ້ງຕ່ຳໄປນັ້ນ ແມ່ນ

ອົງໃສ່ໃນເວລາທີ່ອອຍຕອງການ ແລະ ປະລິມານນ້ຳ ທີ່ໃສ່ກໍ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນຕາມອາຍຸການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ເມື່ອອາຍຸອອຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງ
3-4 ເດືອນ ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຂາດນ້ຳ ເພາະໄລຍະນີ້ອອຍກຳລັງ
ຍືດປ່ອງ. ຖ້າຂາດນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດອອຍຫຼຸດລົງ. ຕາມປົກ
ກະຕິແລ້ວ ກໍ່ຄວນຫຼີດນ້ຳ ສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ, ສ່ວນລະດູຝົນ
ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຫຼີດອີກ.

3. ການເສຍຫາຍ

ການເສຍຫາຍ ຫຼື ເວົ້າລວມການຄວບຄຸມຫາຍໃນສ່ວນອອຍ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ປະຊາຊົນລາວເຮົາເຄີຍໃຊ້ຈັກ, ສົມເປັນເຄື່ອງ
ມື ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ແຄບ ຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ. ແຕ່ຖ້າທາງກະເຊີກວາງເຮົາຄວນໃຊ້ຄວາຍໄຖຕາມຫວ່າງ
ອອຍ ແລ້ວໃຊ້ຄາດໄຫລະອຽດ ເພື່ອຫຳລາຍເຍົາ, ສ່ວນຫາຍທີ່
ຢູ່ຕາມຄອງອອຍນັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຫຼີກອອກໃຫ້ໝົດ ຫຼືວ່າ ຖ້າມີ
ເຄື່ອງຈັກເຊັ່ນ : ຄາດສຳລັບພວນດິນ ຂາຫຍາ ກໍ່ແຮງດີ. ການ
ເສຍຫາຍກໍ່ເປັນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ ພາຍຫຼັງປູກ
ແລ້ວ. ອີກວິທີໜຶ່ງທາງເຮົາມີເງື່ອນໄຂເຮັດໄດ້ຄື ການໃຊ້ ຢາຂາ
ຫຍາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີເໝືອນກັນ. ຖ້າປູກກ່ອນລະດູຝົນຈຳເປັນຕ້ອງ
ໃຊ້ຢາຂາຫຍາ ພາຍຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ ບໍ່ດົງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມຫາຍໄດ້. ຢາທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີມີ : ອາມິຕຣິນ, ອາຕາຣາຊິນ
ບລາເດສ ຫຼື 2,4 D , ເມຕຣີບີວຊິນ ແລະ ໂປຟານິນ.

4. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ການໃສ່ຝຸ່ນສຳລັບອ້ອຍ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຍ້ອນວ່າອ້ອຍ ຕ້ອງການຫາດອາຫານ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະໜາຍໂຕ. ແຕ່ຝຸ່ນ ທີ່ນຳໃຊ້ຈະເປັນຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນຂຽວ ຫຼື ຝຸ່ນວິທະຍາສາດກໍໄດ້ເຊັ່ນ

ສຳລັບຝຸ່ນຄອກ : ຝຸ່ນຂຽວ, ຄວນໃສ່ກ່ອນການ ປູກອ້ອຍ ໃນອັດຕາ 20-30 ໂຕນ/ຮຕ. ສ່ວນຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຝຸ່ນທີ່ມີ ຫາດ NPK ໃຫ້ໃສ່ໃນເວລາປູກຄື ໃສ່ກ່ອນວາງຫ່ອນອ້ອຍ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງອີກສຳລັບຝຸ່ນໄມໂຕຣເຢັນ (N) ໃຫ້ໃສ່ຫຼັງຈາກອ້ອຍມີ ອາຍຸ ປະມານ 2-3 ເດືອນ ຫຼື ຫຼັງຈາກອ້ອຍໄດ້ປົ່ງໃບອ້ອມໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກການປະກອບໝໍ້ໃບດິນ ຖາກາຍ 6 ເດືອນ ບໍ່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນ ຊະນິດນີ້ ເພາະໃນໄລຍະນີ້ອ້ອຍກໍບໍ່ຕ້ອງການອີກແລ້ວ. ການໃສ່ ຝຸ່ນ PK ຄວນໃສ່ໃນອັດຕາ 60-30 ກິໂລ/ຮຕ. ສ່ວນຝຸ່ນໄມໂຕຣ ເຢັນໃຫ້ໃສ່ໃນອັດຕາ 90 ກິໂລ/ຮຕ. ສຳລັບຫຼັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນ ແລ້ວ ຄວນຖິ້ມໄຟຖີ ເພື່ອເວັ້ນຈາກການລະເບີຍ ແລະຄວນໃສ່ຫ່າງຈາກ ອ້ອຍປະມານ 10-15 ຊມ. ນອກນັ້ນ, ດື່ງສຸດ ກ່ອນຈະໃສ່ຝຸ່ນ ຄວນວິໄຈດິນເສຍກ່ອນ ເພາະເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ຢູ່ໃນດິນນັ້ນມີຫາດ ແຕ່ລະຊະນິດໃດນ້ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດ.

5. ການຄຸນອ້ອຍ

- ການຄຸນອ້ອຍ ແມ່ນກະທຳກັນ ຫຼັງຈາກອ້ອຍໄດ້ແຕກລູກ

ແລ້ວ ຖ້າຫາກປຸກອອຍໃນດິນຕ່ຳ ຄວນຄຸມອອຍໃຫ້ສູງ, ຖ້າປຸກໃນ
ດິນສູງຄວນຄຸມພຽງແຕ່ເອົາດິນຖິມຮ່ອງທີ່ປຸກອອຍນັ້ນໃຫ້ເຕັມກໍພຽງ
ພໍ ທັງນັ້ນກໍເລືອກປະກັນບໍ່ໃຫ້ອອຍລຸນ.

VII. ພະຍາດແມງໄມ້ແລະການບົວລະບັດຮັກສາ

ກ. ພະຍາດ

1. ພະຍາດໃບດ່າງ

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດມີຄື ໃບອອຍຈະເກີດອອຍ
ດ່າງເປັນສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ເຫຼືອງອາດເກີດຕາມກາບໃບ ຫຼື ລຳຕົ້ນ
ໃນພື້ນທີ່ອອນແອ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ທ່ອນພັນທີ່ບໍ່ເປັນພະຍາດນັ້ນມາປຸກ.
- ໃຊ້ພັນອອຍທີ່ຕາມຫານຕໍ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
- ແຈ້ງທ່ອນພັນໃນນ້ຳອອນ 50-52 ອົງສາ ເປັນເວລາ 2

ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນນຳໄປປຸກ.

- ເຜົາຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດຖິ້ມ.

- ທຳລາຍພາຫະນະທີ່ນຳພະຍາດນັ້ນມາຄື : ພວກເພຍອ່ອນ
ເພຍຈັກຈີ້ນ. ຮັກສາເນື້ອທີ່ປຸກອອຍໃຫ້ສະອາດ ປ່າສະຈາກວັດສະ
ພຸດ ຈຶ່ງເປັນພາຫະນະທີ່ສາມາດນຳພາພະຍາດດັ່ງກ່າວມາແຜ່
ຜາຍໄດ້.

2. ພະຍາດໃບຂາວ

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດນີ້, ໃບອ້ອຍຈະປ່ຽນເປັນສີຂາວອ່ອນ ຫຼື ຂາວກວ່າປົກກະຕິ ບາງເທື່ອຈະເປັນຮອຍຫຼື ມີແຂບຂາວຂະໜາດຕ່າງກັນ ເລີ່ມຈາກກົກໃບ ໄປຕາມລວງຍາວຂອງມັນ ຕໍ່ມາຈຶ່ງຂະຫຍາຍຈົນເຕັມໄປທົ່ວທັງໃບ, ລຳອ້ອຍຈະສັ້ນ ມີຂໍ້ ໘ ແຕກຫຼັກໆພົບປົກກະຕິ.

ການປ້ອງກັນ :

- ເຜົາຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດນຖມ. ^{໕໕}
- ໃຊ້ພັນທີ່ທັນຫານຕໍ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມືຮ່ວມກັບເນອທີ່ງເປັນພະຍາດ.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ທ່ອນພັນຈາກເນອທີ່ງມີພະຍາດ. ^໕

3. ພະຍາດກົກໃບເຟົ້າ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້ ^{໕໖} ກົກຂອງໃບອ້ອຍທີ່ຍັງອ່ອນ ມັກຈະມີສີເຫຼືອງ ແລະ ແຫງ ເຮັດໃຫ້ຍອດອ້ອຍເຟົ້າ ແລະຕາຍໄປ. ບາງຄັ້ງຄາວຍອດອ້ອຍຈະຮຳຂ້າກັນ ບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້. ກົກຂອງລຳອ້ອຍທີ່ມີພະຍາດຈະແຕບກວ່າກົກໃບຂອງລຳຕົ້ນ ຫຳມະດາ ພື້ນຜະລິດຂອງອ້ອຍຈະຫຼຸດລົງ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ພັນຕານຫານ.
- ເຜົາລຳຕົ້ນທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຖິ້ມ. ^໕

4. ພະຍາດແສ້ຄຳ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້ ຍອດອອຍຈະມີລັກສະນະເໝືອນ ແສ້ຄຳສັບ ຫຼື ບາວແລວແຕ່ອາການຂອງອອຍ, ລຳອອຍ, ຂໍ້ສັບໃບ ແດງ. ເມື່ອພະຍາດປາກເກີດຫຼາຍ ອອຍຈະແຫງຕາຍໄປພົ້ນພະ ລິດ ແລະ ຄວາມຫວານຂອງອອຍຈະຫຼຸດລົງ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ຫອນພັນຈາກເນອທຽບມີພະຍາດນີ້ມາປູກ
- ໃຊ້ພັນທຶນທານ.
- ເຜົາລຳຕັນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້
- ກ່ອນປູກຄວນແຊ່ຫອນພັນດ້ວຍຢາກຳຈັດເຊື້ອລາ

Ceresan

5. ພະຍາດໃບຂີດສີນ້ຳຕານ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້ ໃບອອຍຈະເປັນຈຸດຊ້ຳນ້ອຍໆມີ ສີແດງ ຕໍ່ມາຈະຂະຫຍາຍຍາວ ແລະເລີ່ມມີສີນ້ຳຕານປົນແດງອອມ ອອບດ້ວຍສີເຫຼືອງ.

ການປ້ອງກັນ :

ໃຊ້ຫອນພັນທຶນທານຕໍ່ພະຍາດນີ້ມາປູກ.

- ເຜື້ນຝຸ່ນ ຟິສຟ໌ ແລະ ໄປັສຊີອອມຈະລຶດອາການຂອງ ພະຍາດໃຫນ້ອຍລົງ.

6. ພະຍາດຂີ້ໝັ້ງ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້^{໕໖} ມັກຈະເກີດກັບອ່ອຍ ໃນໄລຍະ ຈະມີປ້ອງ ເຖິງອ່ອຍແກ່, ເລີ່ມຕົ້ນຂອງພະຍາດນີ້^໕ ໃບອ່ອຍຈະ ເປັນພະຍາດນ້ອຍໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະລຸກລາມໄປທົ່ວໃບ ແລະ ໃບກໍ ຈະຕາຍເປັນສີນ້ຳຕານແດງ ແລະ ແຫງຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ພັນທີ່ທົນທານ.
- ເຜົາລຳອ່ອຍທີ່ເປັນພະຍາດຖົມ
- ໃຊ້ຢາ ຊີແຣນ ສີດໃນເວລາອ່ອຍກຳລັງມີປ້ອງ.

7. ພະຍາດລາບ້າຄ້າງ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້^{໕໖} ໃບອ່ອຍຈະດຳໆ ເປັນຮອຍສີ ຂາວ ເຫຼືອງຕາມຄວາມຍາວຂອງໃບ ແລ້ວປ່ຽນສີນ້ຳຕານແລະຈະ ຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ.

ການປ້ອງກັນ :

- ເຜົາອ່ອຍທີ່ເປັນພະຍາດຖົມ.
- ໃຊ້ພັນທີ່ທົນທານ.

8. ພະຍາດໃຈແດງ

ລັກສະນະນີ້^{໕໖} ເມື່ອເວລາເຮົາຜ່າລຳອ່ອຍທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ ຈະເຫັນເປັນສີແດງສະຫຼັບຂາວ ໄປຕາມທາງຍາວຂອງລຳ ແຕ່ກົກ

ເຖິງປາຍມືກັນບຸດ, ບອດຈະເຫຼືອງ ປ້ອງຈະເນົ້າ ແລະ ລຳອ້ອຍ
ຈະຕາຍໄປ, ເມື່ອໃຊ້ອອຍນີ້ເປັນແນວພັນ ຈະເຮັດໃຫ້ອອຍ ແຕກ
ງອກບໍ່ດີ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ພັນຫົນຫານ.
- ພະຍາດນີ້ເກີດກັບອອຍທີ່ແກ່ເກີນກຳນົດ ສະນັ້ນຕ້ອງຕັດ
ອອຍໃຫ້ຫົນເວລາ.

9. ພະຍາດໃບຈຸດສີເຫຼືອງ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້ ໃບອ້ອຍຈະມີຈຸດຮູບຕາສີເຫຼືອງ
ແລະ ກໍ່ແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໃບ, ຈາກນັ້ນ ບໍ່ດົນໃບອອຍກໍ່ຈະໝາດ
ເປັນສີໃບຕອງແຫຼ້ງ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ອອກໄປ
ເລື້ອຍໆ, ສູດຫາຍໃບອອຍກໍ່ຈະຂາດເປັນຮູກະປ່ອງກະແປ່ງ ເຮັດ
ໃຫ້ລຳອອຍແຫຼ້ງຕາຍໄປ ຄວາມຫວານຈະຫຼຸດລົງ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ພັນຫົນຫານ.
- ເມື່ອພະຍາດຂະໜາດນີ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຄວນສິດຢາ ນາ
ແບບ ຈີແບບ ຫຼື ອີກໂຕຊີ ໃນອັດຕາ 2 ບ່ວງແກງ/ນ້ຳ 20 ລິດ
ສິດ 2 ເທື່ອຫ່າງກັນ 7 ມ.

2. ແມງໄມ້ແລະສັດຕູອ້ອຍ

1. ຕັກແຕນ

ຕັກແຕນມີ 3 ຊະນິດທີ່ເປັນສັດຕູກັບຕໍ່ອອຍຄື : ຕັກ

ແຕ່ນເຂົ້າ, ຕັກແຕ່ນຄໍລາຍ ແລະ ຕັກແຕ່ນຜີ. ແຕ່ຕັກແຕ່ນທີ່ຫຳລາຍ
ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງໃຫ້ແກ່ອອຍແມ່ນ ຕັກແຕ່ນເຂົ້າ ແລະ
ຕັກແຕ່ນຄໍລາຍ.

ລັກສະນະການຫຳລາຍຄື : ຕັກແຕ່ນຈະກັດກິນໃບຈົນເຫຼືອ
ແຕ່ກ້ານ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອອຍຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ຕັກແຕ່ນ
ຈຳນວນນີ້ ມັກເຂົ້າກັດກິນໃບອອຍປະມານເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ
ເດືອນ ຕຸລາ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໄຖມວນດິນ ບໍລິເວນທີ່ຕັກແຕ່ນໄຂ່ ເພື່ອຫຳລາຍໄຂ່.
- ເສຍຫຍາ ບົວລະບັດຮັກສາເນື້ອທີ່ປູກອອຍໃຫ້ສະອາດ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕັກແຕ່ນຕົວອ່ອນມີອາຫານກິນ.
- ໃຊ້ຢາສີດໃນຂະນະທີ່ຕັກແຕ່ນຍັງອ່ອນຢູ່ໃນໄລຍະເດືອນ
ເມສາ-ມິຖຸນາ ໂດຍໃຊ້ຢາ ລິມເດນ 3% ຊະນິດຝຸ່ນ ສີດໃນອັດ
ຕາ 6-18 ກລ/ເຮຕ.

2. ປວກ

ແມ່ນແມງໄຫຼກັດກິນສ່ວນລຸ່ມ ແລະ ອາກຂອງລຳຕົ້ນອອຍ.
ລັກສະນະການຫຳລາຍ ຄື ປວກຈະເຂົ້າຫຳລາຍອອຍໃນທຸກໄລຍະ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍກັດກິນພາກສ່ວນພາຍໃນຂອງອອຍເຮັດ
ໃຫ້ອອຍຫົກ ແລະ ລົມ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໄຖ່ເຊື້ອທີ່ປູກອອຍໜ້າຍາງເທື່ອ ເພື່ອຫຳລາຍຮັງປວກ.

- ແຊ່ທ່ອນພັນໃນນ້ຳຢາອອນດິນ 1,5% ເປັນເວລາ 10 ນາທີກ່ອນນຳໄປປູກ.

- ຖ້າມີຮັງປວກໜ້າຍາງ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍກັນຢູ່ ໃຊ້ຢາ ເອັບຕາຄະລໍ 40% ຊະນິດຟຶງ ອັດຕາ 12 ກລ/ຮຕ., ອອນດິນ 40% ຊະນິດຟຶງ ໃບອັດຕາ 6 ກລ/ຮຕ., ສິດໃຫ້ຫົວ ແລະ ຄາດປິນ ເຂົ້າກັບດິນ ຫຼື ໃສ່ຕາມຮ່ອງອອຍໃນເວລາກຳລັງປູກ.

3. ແມງດູດກິນນ້ຳຂອງໃບອ້ອຍ

ມີ: ເພຍຈັກຈັນ, ເພຍແປ້ງອ້ອຍ, ເພຍອ່ອນຮອບ ຈຶ່ງ ຈະພົບຕົວແມງໄມ້ດັ່ງກ່າວຢູ່ກອງໃບ.

ລັກສະນະການຫຳລາຍ, ແມງພວກນີ້ ຈະດູດກິນນ້ຳລຽງ ຈາກໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນຫຳໃຫ້ໃບເຫຼືອງ ແລະ ບໍລິເວນບ່ອນເປັນ ອາດຈະເກີດເຊື້ອລາຂນ.

ການປ້ອງກັນ ແມ່ນໃຊ້ສານເຄມີຄື : ດີອາຊິນອນ 2 ບ່ວງ ແກງ/ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດເຜີຍພົບເຫັນການລະບາດແມງໄມ້ດັ່ງກ່າວ.

4. ດ້ວງເຈາະລຳຕົ້ນແລະຍອດອ້ອຍ

ເປັນດ້ວງທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜົນເຜະລິດອ້ອຍ ໜ້າຍາງ ສຸດ. ສ່ວນໜ້າຍາງມີກົມພື້ນຢູ່ໃນໜ້າຍາງທ້ອງຖິ້ນ ທີ່ມີການປູກອອຍເປັນ ຕົ້ນຕໍ ສ່ວນໜ້າຍາງມີ 3 ຊະນິດດ້ວຍກັນທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນອັນຕະລາຍ

ຄ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ຕົວພົນພະລິດອອຍເຊີນ :

* ດວງກໍສິລາຍແຊກ :

ລັກສະນະການຫຳລາຍຄື ດວງຊະນິດນີ້ຈະຫຳລາຍອອຍໃນ
ທຸກໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ຂອງລຳ
ຕົ້ນຍ່າງ, ຍອດ, ລຳຕົ້ນ, ດວງຊະນິດນີ້ຈະເຈາະເຂົ້າ ໃນລຳ
ອອຍ ແລະ ຈະກັດກິນພາກສ່ວນຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລຳຕົ້ນ ເປັນ
ເຫດໃຫ້ຍອດແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໄປ ຫຼື ບໍ່ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລຳອອຍບໍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວ.

ການປ້ອງກັນ :

- ໃຊ້ທ່ອນພັນຫຼືປາສະຈາກດວງເຂົ້າຫຳລາຍ.
- ເກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງອອຍທີ່ພົບດວງໄປເຜົາຖິ້ມ.
- ໃຊ້ຢາ ຟຣາດານ ອັດຕາ 72 ກລ/ຣຕ. ໃສ່ 2 ເທື່ອ
ຄື ເມື່ອອາຍຸ 1 ເດືອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກ 2 ອາທິດ.

* ດວງກໍສິຂາວ :

ລັກສະນະການຫຳລາຍຄື ດວງດັ່ງກ່າວ ຈະເຂົ້າຫຳລາຍທຸ່ມ
ແລະ ຍອດທັງອອຍຕໍ່ ແລະ ອອຍທີ່ມີລຳຕົ້ນສົມບູນແລ້ວ ໂດຍກັດ
ກິນບໍລິເວນຄໍຍອດ ຫຳໃຫ້ຍອດແຫ້ງຕາຍ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ອອຍກໍຈະ
ແຕກແຫ້ງຢ່າງໜຶ່ງໜ້າຍ.

ການປ້ອງກັນ :

- ຫຳລາຍພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນອອຍທີ່ເຫັນວ່າມີດວງ ຫຼື ໄຂ່

- ໃຊ້ສານເຄມີແບບດຽວກັນກັບດວງກໍລາຍນ້ອຍ.

* ດວງສີຊົມພູ :

ເປັນດວງທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃນເວລາອອບຍັງນ້ອຍ ການທຳລາຍ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ອອບແຫງຕາຍ ແລະ ທີ່ແຕກໄຟຈະເຕີຍໃຫຍ່ ບໍ່ທັນ
ກັບຕົນອື່ນໆ. ລັກສະນະການທຳລາຍ ດວງກໍຈະເຈາະ ເຂົ້າໄປທີ່
ເຫງົາຂອງອອບ ຊຶ່ງຕິດກັບດິນ, ເຮັດໃຫຍ່ອອບແຫງຕາຍ. ວິທີ
ປ້ອງກັນແມ່ນເຮັດແບບດຽວກັນກັບດວງອື່ນໆ.

VII. ການເກັບກູ້

ຕ້ອງປະຕິບັດດ້ານ :

1/. ໃນບ່ອນທີ່ໃຊ້ນ້ຳຊີນລະປະທານ ຕ້ອງຢຸດເອົານ້ຳທີ່
ອອບກ່ອນ ການເກັບກູ້ຢ່າງນ້ອຍ 1 ເດືອນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມ
ຫວານ.

2/. ຕ້ອງເກັບກູ້ອອບທີ່ແກ່ເຕັມກ່ອນດ້ວຍການສັ່ງເກດ
ອອກດອກ ຫຼື ໃບຈະມີສີເຫຼືອງປົນຂຽວ. ຖ້າປະສົບໄວ້ແກ່ຫຼາຍ
ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບລົດລົງຢ່າງໄວ.

3/. ຄວນຕັດອອບ ເມື່ອອາຍຸປະມານ 12 ເດືອນຂຶ້ນໄປ
ແລະຕັດອອບທີ່ຢ່າງໄກໂຮງງານກ່ອນ.

4/. ຕ້ອງລີ້ໃບອອກ ແລະຕັດຍອດ ແລະລຳຕົ້ນໃຫ້ຈຳດິນ
ເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ນ້ຳໜັກ ແລະ ນ້ຳຕານເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງທຳ

ໃຫ້ທີ່ຈະແຕກໃໝ່ຂອງແຮງ ແລະ ມີລຳໂຫຍດດີກ່ວຍ.

5/. ອອຍທີ່ຕັດແລ້ວ ຕ້ອງຮັບສິ່ງໂຮງງານທັນທີ ອອຍທີ່
ຄາງ (ຕັດແລ້ວບໍ່ໄດ້ສິ່ງເຂົ້າໂຮງງານ) ຈະມີການສູນເສຍທັງນ້ຳ
ຟັກ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມໄລຍະເວລາຫາກມີການຈຳເປັນໃຫ້ໃຊ້
ໃບອອຍຫມົວ. ການຕັດອອຍປະໄວປະມານ 3 ມ ກໍ່ບໍ່ສະທອນ
ເຖິງເປີເຊັນນ້ຳຕານ. ແຕ່ນ້ຳທີ່ກອຍຈະລົດລົງແດ່ເລັກນ້ອຍ.

6/. ອອຍທີ່ຈັດກ່ອນຕັດ ຕ້ອງຮັບສິ່ງເຂົ້າໂຮງງານໃນທັນ
ທີ ເພາະວ່າອອຍຈຸດນີ້ ຈະເສຍຄຸນນະພາບໄວກວ່າອອຍບໍ່ຈຸດ.

7/. ກ່ອນຈະຕັດອອຍ ຖາມຄວາມສາມາດແທກຄວາມແກ່
ທີ່ ຄວາມຫວານຂອງອອຍ ກ່ອນຕັດດ້ວຍເຄື່ອງ ເຮັດໜັກໂຕແມດ .
ໂດຍເຈາະແທກຄວາມແກ່ ຫຼື ຄວາມຫວານບໍລິເວນປາຍ, ກາງ
ແລະ ກົກ ລຳອອຍ, ຫາກຄວາມຫວານແຕ່ລະບ່ອນ ໃກ້ຄຽງກັນ
ພາຍຄວາມວ່າອອຍແກ່ພ້ອມທີ່ຈະເກັບກຽວ ຫຼື ຕັດໄດ້ແລ້ວ.

VIII. ການບົວລະບັດຮັກສາຕໍ່ອອຍ

ການບົວລະບັດຮັກສາຕໍ່ອອຍ ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ
ຖ້າພວກເຮົາສາມາດປະຕິໂດຍຫຼາຍປີເທົ່າໃດ ຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ມີລາຍໄດ້ສູງເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າ ຕໍ່ອອຍເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ.

ການບົວລະບັດຮັກສາຕໍ່ອອຍ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

1/. ຕັດແຕ່ງຕໍ່ອອຍໃຫ້ຈຳດິນ ເພື່ອໃຫ້ສະເພາະຕາຍູ່ໃກ້

ດິນເຜົາໜີ້ນີ້ໂອກາດຈະເລີນເຕີບໂຕຕໍ່ໄປ.

2/. ບໍ່ຄວນເຜົາເສດເຫຼືອຂອງອ້ອຍ ພາຍຸຫຼັງທີ່ຕັດ ນອກ
ຈາກຈຳເປັນເຊັ່ນ : ເກີດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມລະບາດ.

3/. ໃຊ້ອົບເປີ, ໄຖສົ້ວ, ຫຼື ໄຖຄວາຍລົງ ໄຖລະຫວ່າງ
ແຖວອ້ອຍ ເພື່ອພວບດິນບໍລິເວນຮາກທີ່ມີຄວາມອັດແໜ້ນເນື່ອງຈາກ
ອົບນ້ຳທີ່ກຂອງລົດໄຖ ຫຼື ລົດຂົນສົ່ງທີ່ຂົນອ້ອຍໃນເວລາຕັດ; ນອກ
ນັ້ນ ກໍເພື່ອເປັນການຕັດຮາກເກົ້າຖຸມ ແລະພ້ອມດຽວກັນກໍຈະເຮັດ
ໃຫ້ດິນສາມາດເກັບນ້ຳໄວ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແກ່ການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕຂອງຕົ້ນອ້ອຍ.

4/. ໃຊ້ຄາດໆດິນ ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ດ້ວຍແຮງ ຄວາຍ
ລະຫວ່າງແຖວ ເພື່ອຍົງດິນໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳ ແລະອາກາດ
ລຸ່ມລົງດີ.

5/. ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ເພື່ອຍົກຜົນຜະລິດ ໃຫ້ສູງ
ນັ້ນ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຕໍ່ອ້ອຍໃຫ້ສູງກວ່າປູກໄໝ້ ໃນເອັດຕາ 500ກລ/ຮຕ,
ຂຶ້ນໄປ.

6/. ການປົວລະບົດຮັກສາຕໍ່ອ້ອຍ ຄວນປະຕິບັດໃນທັນທີ
ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວແລ້ວ ເພາະຖ້າປະໄວ ດິນຈະແໜ້ນແລະໄຖຍາກ

7/. ການປະຕິບັດໄວ້ຫຼາຍປີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກໍອ້ອຍທີ່ຍົງສາ
ມາດໃຫ້ລຳດັບໄດ້ ຖ້າຫາກກໍອ້ອຍຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຄວນໄຖ
ຖຸມ ແລະ ປູກໄໝ້ ເພາະມັນຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ.

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ຜົນຜະລິດຂອງພືດທຸກຊະນິດ ມັນມີການ
ພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດສະໜູນ ເຖິງລັກສະນະ, ຈຸດພິເສດຂອງແນວ
ພັນ ແລະ ຜົນຂອງການນຳໃຊ້ ເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ ເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ; ຜົນຜະລິດອ່ອຍ ແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຄື
ດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຂຶ້ນກັບການເຕີບໃຫຍ່ ຂະໜາຍຕົວ
ໃນຊ່ວງອາຍຸການໜຶ່ງຂອງມັນ. ແນວພັນອ່ອຍທີ່ມີລຳດັບໃຫຍ່ສູງ ກໍ
ສາມາດໃຫ້ໝາກຜົນຜະລິດກະສິກຳສູງ ຊຶ່ງເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້
ຈາກຕາຕະລາງ 1 ແລະ 3 .

ການເຕີບໃຫຍ່ຂະໜາຍຕົວຂອງການທົດລອງອ່ອຍແຕ່ລະ
ແນວພັນ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 6-7 ເດືອນ.

ຕາຕະລາງ 1

I ໂລ/ດ/ຊຸມວັນ	I ຄວາມສູງ (ຈຸມ)			I ຄວາມຕຸຍ (ຈຸມ)		
	ໂລ/ຍ. ເກັບກຳຕົວເລກ			ໂລ/ຍ ເກັບກຳຕົວເລກ		
I I	127/6	113/7	127/7	127/6	113/7	127/7
I I	1 84	1 84	1 84	1 84	1 84	1 84
I 1 ພັນອາ (A)	71	1 100	1 125	1 81	9 1	8 1
I 2 ພັນແອຣ໌ກາ	1	1	1	1	1	1
I 1 (RK)	1 84	1 114	1 129	1 81	9 1	8 1

1	3	1	ພັນແອນເຊີ	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	ໂອ 310	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	INCO3 10	1	83	1	1071	1	1	1	1	1		
1	4	1	ພັນເຊີໂອ	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	(CO)	1	84	1	1251	142	1	91	10	1	9	1
1	5	1	ພັນໂອທັດ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	(OH)	1	104	1	1381	156	1	101	11	1	10	1

ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍປະຊາຊົນເຄົາຍັງປູກອ້ອຍ ແບບຫຳມະຊາດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳກວ່າການປູກແບບນຳໃຊ້ເຕັກນິກອັນໃໝ່ຈາກການເກັບກຳຕົວເລກຂອງພະແນກສະຖິຕິແຜນການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ຊີນະປະທານ ແລະ ສະຫະກອນກະເສດປີ 1984 ໄດ້ຢຶດຢືນວ່າຜົນຜະລິດອ້ອຍສະເລ່ຍໃນຫົວປະເທດໄດ້ 25,5 ໂຕນ/ຮຕ. (ລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 2)。

ຕາຕະລາງ 2

1	ລ/ດ	1	ຊື່ຂອງ	1	ເບື້ອງ	1	ສະມັດຖະພາບ	1
1	1	1		1	(ຮຕ)	1	(ໂຕນ/ຮຕ)	1
1	1	1	ຟັງສາລີ	1	5	1	24	1
1	2	1	ຫຼວງນ້ຳທາ	1	5	1	26	1
1	3	1	ບແກວ	1	3	1	26	1

1 4 1	ອຸດົມໄຊ	1	29	1	26	1
1 5 1	ຫຼວງພະບາງ	1	176	1	25	1
1 6 1	ໄຊຍະບູລີ	1	37	1	25,9	1
1 7 1	ຫົວພັນ	1	122	1	18	1
1 8 1	ຊຽງຂວາງ	1	5	1	25	1
1 9 1	ວຽງຈັນ	1	205	1	35,8	1
110 1	ກຳແພງນະຄອນວຽງ			1		1
1 1 1	ຈັນ	1	676	1	30	1
111 1	ບໍລິຄຳໄຊ	1	54	1	20	1
112 1	ຄຳມ່ວນ	1	33	1	26	1
113 1	ສະຫວັນນະເຂດ	1	47	1	30	1
114 1	ສາລະວັນ	1	12	1	25	1
115 1	ເຈຸກອງ	1	5	1	20	1
116 1	ຈຳປາສັກ	1	550	1	26	1
117 1	ອັດຕະປື	1	11	1	25	1
1	ສະເລ່ຍ	1		1	25,5	1

ສະມັດຖະພາບກະສິກຳແລະເປົ້າເຊັນນ້ຳຕານຂອງອ້ອຍແຕ່ລະ
ແນວພັນ ຂອງການທົດລອງປີ 1984 ຢູ່ສູນຜະລິດ ເມັດພັນ
ແຫ່ງຊາດ

ຕາຕະລາງ 3

ເລ/ດ	ຊື່ແນວພັນ	ສະມັດຖະພາບ ສະເລ່ຍ (ໂຕນ/໒ຕ)	ປະຊາກອນ ຕານ (%)
1	ແອນເຊໂອ 310 (NCO 310)	42	9,42
2	ແອຣ໌ກາ (BK)	42	9,61
3	ອາ (A)	40	9,37
4	ເຊໂອ (CO)	45	11
5	ໂອຫັດ (OH)	50	9,84

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງອ້ອຍຂອງສູນຜະລິດເມັດ
 ພັນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃໝ່, ສະມັດຖະ
 ພາບອ້ອຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 40-50 ໂຕນ ຈຶ່ງລື້ນຈາກການຜະລິດ
 ຂອງປະຊາຊົນ ປະມານ 14-24 ໂຕນ/໒ຕ. ດັ່ງນັ້ນ ເຄົາສາ

ມາດສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບໄດ້ຈາກຕົວເລກໃນຕາຕະລາງ 2
ແລະ 3 ຂ້າງເທິງນີ້.


(ເອກະສານອ້າງອີງ)

- ຄູ່ມືກ່ຽວກັບວິທະຍາການປຸກອ້ອຍນ້ຳຕານ ຂອງສູນພະ
ລິດແຫ່ງຊາດ. ໂດຍ : ຂັນທະລີ ພານິວົງ ແລະ ໄຊຍະນັງ ວົງ
ສັກ. (1985).

- ການປຸກພືດເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຂດອົບອຸ່ນ. (1981) .
ໂດຍ : ສາດສະດາຈານ ເດໂກ ເດກອຍ ແລະ ອາດກາດີໂມ
ວາ.

ການປູກຝ້າຍ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສີຈັນທະວົງ ກິນດາວົງ
: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກຝ້າຍ

ລັກສະນະທົ່ວໄປແລະຄວາມສຳຄັນ

ຝ້າຍຈັດເຂົ້າໃນຈຳພວກພືດອາຫານສຳຄັນ, ມັນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໃນການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສັງຄົມ ເຊັ່ນ : ແຜ່ນແຜ, ໂສ້ງ ເສື້ອ, ຜ້າຫົ່ມ, ນຸ່ງຊ້ອນ, ເສື້ອ ... ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງເຄຣມີ ເຊັ່ນ ເຈຍຕອງເຄຣມີ. ບອກຈາກນັ້ນ ຝ້າຍຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການແພດອີກດ້ວຍ.

ບ່ວນຂອງແກນຝ້າຍໄດ້ບັນຈຸທາດໄຂມັນ 20-27% ຊຶ່ງເພີ່ມສາມາດກັບກອງມາປະກອບເປັນສະບູໄດ້.

ພູມພາກທີ່ເພາະສົມແກ່ການປຸກຝ້າຍຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ໄດ້ພັດທະນາກະຊວງປະເທດ ແຕ່ວ່າບາງທີ່ຝ້າຍອາດປຸກໄດ້ໃນທຸກແຫ່ງ ແຕ່ຄວນຄຳນຶງເຖິງຝົນເປັນຈຸດໝັກ ຄືເມື່ອຫາກຝ້າຍເລີ່ມແກ່ແລ້ວ, ຄວນຈະພັດຝົນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວຝ້າຍ.

I. ດິນພື້ນຖານແລະລະດູການ

ກ. ດິນປຸກທີ່ເໝາະສົມ

- ດິນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການປຸກຝ້າຍ ຄື ດິນຟຶງ,

ດິນໄຊລະດູກຸ່ມປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດິນຊະນິດນີ້ຖືກຜົນຕົກກັກເວລາ
ເຮົາສັບພາກກຳລັງດິນຄອຍໆ ກໍຈະເຂົ້າເລິກ, ດິນກໍຈະບໍ່ຕິດພາກ
ຈົກ, ບໍ່ທຽວ, ບໍ່ມີນ້ຳຂັງ, ດິນຜົງ ແລະ ຍິງດີ.

- ດິນປະເພດຮອງລົງມາແມ່ນດິນຜົງປົນຊາຍແດນລັກນ້ອຍ,
ລວມຄວາມຝາຍສາມາດປູກໄດ້ໃນດິນແທບທຸກຊະນິດ ພຽງແຕ່
ວາຕອງໃຫ້ການບຳລຸງຮັກສາ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການກຽມ
ດິນລະອຽດກໍພໍແລ້ວ ຝາຍສາມາດປູກໄດ້ດີ ໃນດິນໄຊ ເປັດສ Ph
5,2-8 ແຕ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນດິນໄຊ ເປັດສ Ph 7-8.
ດິນທີ່ເພາະສົມທີ່ສຸດ ແມ່ນດິນແດງ ພູພຽງບໍ່ລະເວນ ແລະ ດິນແຄນ
ນ້ຳ.

2. ລະດູທີ່ເໝາະສົມ

- ລະດູຝົນຕ້ອງເລືອກເດືອນປູກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຖ້າວ່າເຮົາ
ປູກແຕ່ຫົວປີຫຼາຍ ດ້ານຝາຍຈະເຟືອໃບ ພາກຝາຍຈະບໍ່ເປັນຕົກພະ
ຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ຖ້າເຮົາປູກຫາ
ຊາຄວາມອຸ່ມອຸ້ນບໍ່ພຽງພໍ ພົນຜະລິດຈະຕົກຕ່ຳ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາງທີ່ດີ
ຄວນເລື່ອລົງມືປູກຝາຍ ລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນ ຫຼື ກາງເດືອນ ກໍລະ
ກົດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າກາງເດືອນ ສິງຫາ . ເພາະວ່າຝາຍ
ຕ້ອງການນ້ຳຝົນຢ່າງພຽງພໍ ໃນເວລາຕົ້ນຝາຍເລີ່ມຕົ້ນ ເປັນດອກ
ໄປຫາການເລີ່ມແກ່ ຖ້າເວລາເກີດດອກ, ຫາກແຫງແລ້ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ດອກຝາຍນັ້ນຫຼົ່ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຝົນໃນເວ



ລາພາກຝ້າຍເລີ່ມແກ່ໄປຫາເກັບກຽວຕາມຄວາມເພາະສົມແລ້ວໃນ
 ຊົ່ວຊົດຂອງຝ້າຍ ມັນມີຄວາມຕ່ອງການກໍລະຫວ່າງ 600-800
 ມິລີແມັດ ຝ້າຍໃນເດືອນ ກໍລະກົດຄວນຈະມີປະລິມານນ້ຳຝົນ ເປັນ
 ຢ່າງນ້ອຍ 150 ມິລີແມັດ. ສຳລັບເດືອນ ສິງຫາ ຄວນຈະມີປະລິ
 ມານນ້ຳຝົນ 150-200 ມິລີແມັດ. ເພາະວ່າອາຍຸຝ້າຍນັ້ນແຕ່
 ປຸກໄປຫາມື້ເກັບກຽວໄດ້ມີອາຍຸປະມານ 5-8 ເດືອນ ຖ້າວ່າເຮົາ
 ປຸກຝ້າຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ກໍຈະໄປເກັບກຽວໃນເດືອນ ກຸມ
 ພາ. ດັ່ງນັ້ນ ການປຸກຝ້າຍຄວນປຸກໃນຕົ້ນລະດູຝົນ. ຝ້າຍມີຄວາມ
 ຕ່ອງການຕ່ແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ແສງແດດຢ່າງພຽງພໍໃນເວລາຝ້າຍ
 ເລີ່ມອອກດອກໄປຫາໄລຍະເລີ່ມແກ່ກໍຍັງຕ່ອງການແສງສະຫວ່າງຫຼື
 ແສງແດດຢ່າງພຽງພໍ.

II. ໄລຍະປຸກ

ການປຸກຖື ຫຼື ຫ່າງແມ່ນຂັ້ນກັບຫຼາຍເື່ອນໄຂເຊັ່ນ : ຂັ້ນ
 ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ດິນເບື້ອໜັກ, ເບື້ອເບົາ ດິນງາມ ຫຼື
 ບໍ່ງາມ, ອາກາດ, ແສງສະຫວ່າງ) ແລະ ຂັ້ນກັບແນວພັນ, ດັ່ງ
 ນັ້ນ ແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະດິນ ແລະແຕ່ລະແນວພັນແມ່ນປຸກໃນໄລ
 ຍະແຕກຕ່າງກັນ.

- ຖ້າເຮົາປຸກຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາໄປຫາຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ
 ໃຊ້ໄລຍະປຸກ 100 ຫາ 150×50 ຫາ 60 ຊຸດ.

- ຖ້າພວກເຮົາປຸກຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນ ກໍລະກົດໄປຫາທ້າຍ



ເດືອນ ກໍລະກົດໃຊ້ໄລຍະປຸກ 100 ຫາ 200x60 ຫາ 70 ຊຸມ.

- ຖ້າພວກເຮົາປຸກຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ໄປຫາ ກາງ

ເດືອນ ສິງຫາ ໃຊ້ໄລຍະປຸກ 75 ຫາ 85x60 - 70 ຊຸມ.

ເພາະຄວາມວ່າຍຶງປຸກຫຼ້າເທົ່າໃດ ກໍຍັງປຸກໄລຍະຖ້ວຍ
ເທົ່ານັ້ນ.

ສ່ວນຄວາມເລິກຂອງການປຸກແມ່ນນຳໃຊ້ລະຫວ່າງ 3-6
ຊຸມ; ຖ້າເປັນດິບເນື້ອໜັກ ແລະ ຄວາມອຸ່ນອຸ້ນດີ ແມ່ນໃຊ້ຄວາມ
ເລິກ 3-4 ຊຸມ, ຖ້າເປັນດິບເນື້ອເບົາ ແລະ ຄວາມອຸ່ນອຸ້ນມີ
ນ້ອຍ ແມ່ນປຸກດ້ວຍຄວາມເລິກ 5-6 ຊຸມ.

III. ພັນຝ້າຍທີ່ໃຊ້ປຸກ

ເລື່ອງແນວພັນຝ້າຍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າຖ້າ
ເຮົາໃຊ້ພັນຝ້າຍທີ່ດີໄປປຸກ ກໍຈະໄດ້ພັນຜະລິດສູງ, ສະນັ້ນໃນເມືອງ
ລາວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຸບັນນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ພະຍາຍາມ ຄົ້ນ
ຄວ້າແນວພັນຝ້າຍທີ່ດີ ເພາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ດິນ
ຝ້າອາກາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາມີພັນໃຊ້
ປຸກນີ້ 4 ພັນ ຄື :

1. ຝ້າຍພັນພັນເມືອງ
2. ຝ້າຍພັນ ລິບາເລ 50
3. ຝ້າຍພັນ ສະໂຕນວິນ 2
4. ຝ້າຍພັນ ອາກາລາ

IV. ການຕຽມດິນ

ການຕຽມດິນປູກຝ້າຍ ກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພື່ອນັກບໍລິຫານ ແຕ່ວ່າຖ້າເປັນດິນຜົງເຮົາຄວນໄຖຄາດສອງ ເທື່ອ ກໍສາມາດປູກໄດ້ໂລດ. ຖ້າເປັນດິນທຽວ ເຮົາຄວນໄຖຄາດ ປະມານ 2-4 ເທື່ອ. ທັງນີ້ ຂນຢູ່ກັບຊະນິດດິນ, ແຕ່ສ່ວນຫຼວງ ຫຼາຍຊາວໂຮມາລາວເຮົາ ເພິ່ນເຄີຍໄຖຄາດພຽງເທື່ອດຽວຫຼືສອງ ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ກໍປູກໂລດຊຶ່ງຈະເປັນການເພີ່ມຕຽວກງານໃບກາງ ແສຍຫຍ້າພວນດິນຕາມທີ່ຫຼົງ.

V. ວິທີການປູກ

ພາຍຫຼັງການຕຽມດິນໃຫ້ລະອຽດດີແລ້ວ ກໍທຳການປູກຄືປູກ ແບບວິທີຢອດເນັດຕາມຂນໃຫ້ເລິກປະມານ 2-3 ຊຸຕມ. ຂນຫຼື ຢອດຈັກ 4-6 ເນັດ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ຝາຍງອກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ດີ. ເນັດພັນທີ່ໃຊ້ປູກຄວນຈະມີຄວາມງອກແຕ່ 80%-90% ໃຫ້ປູກ ເປັນຖັນເປັນແຖວ ຖ້າວ່າເປັນບ່ອນຕາມຈ້າຍພູ ຫຼື ເຂດພູດອຍ ເຮົາຄວນພະຍາຍາມຈັດຖັນປູກໃຫ້ລົງໄປຕາມຄວາມເຈຍ ຂອງພູ ເພື່ອປ້ອງກັນການພັງຫະລາຍຂອງດິນ ແລະ ການກັດເຊາະທີ່ຈະ ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍນຳຝົນເຊາະລ້າງ. ໃຫ້ລະຫວ່າງແຖວ 90 ຫາ 100 ຊຸຕມ. ແລະ ລະຫວ່າງຖັນ 40-50 ຊຸຕມ.

VII. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຄວາມຕ້ອງການຝຸ່ນແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ມັນ
ຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຂຶ້ນກັບພູມອາກາດ ... ຝຸ່ນແຕ່
ລະປະເພດແມ່ນນຳໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ :

ຝຸ່ນຄອກ : ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນຝຸ່ນພື້ນຖານຮອງຟື້ນ ກ່ອນ
ຕຽມດິນ. ໃສ່ໃນອັດຕາ 10-20 ໂຕນ/ຮຕ.

ຝຸ່ນເຄຣມີ : ຝຸ່ນອາຊິດໃສ່ຮອງຟື້ນກ່ອນຄາດເທື່ອສຸດທ້າຍ
ໃສ່ປະມານ $\frac{1}{3}$, ສ່ວນເຫຼືອ $\frac{2}{3}$ ແມ່ນໃສ່
ເວລາຝາຍມື 3-4 ໃບ ຫຼື ຈະໃສ່ໃນໄລ
ຍະຝາຍເລີ່ມຕົ້ນປົ່ງຍອດ ຫຼື ຈະໃສ່ໃນໄລ
ຍະຂອງການປົ່ງດອກກໍໄດ້.

ຝຸ່ນຟິສຟໍ : ໃສ່ເປັນຝຸ່ນຮອງຟື້ນກ່ອນຄາດ ເທື່ອສຸດທ້າຍ
ປະມານ 30-40% ສ່ວນເຫຼືອ 60-70%
ແມ່ນໃສ່ໃນໄລຍະຝາຍເລີ່ມປົ່ງດອກ.

ຝຸ່ນກາລີ : ໃສ່ຮອງຟື້ນກ່ອນຄາດເທື່ອສຸດທ້າຍ ປະມານ
 $\frac{1}{4}$ ສ່ວນເຫຼືອ $\frac{3}{4}$ ແມ່ນໃສ່ໃນໄລຍະຝາຍ
ເລີ່ມປົ່ງດອກ.

ຝາຍແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທາດ ອາຊິດ 90-100 ກິໂລ/
ຮຕ., ທາດຟິສຟໍ ປະມານ 30-40 ກິໂລ/ຮຕ., ສ່ວນທາດກາລີ
ປະມານ 90-100 ກິໂລ/ຮຕ. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການປົ່ງ

ຄອກໄປຫາໄລຍະສຸກແກ່ ມັນຕ້ອງການຝຸ່ນ 65-70% ຫາດອາຊິດ ແລະ ຟິສຟ໌; ສ່ວນຫາດກາລີ ຕ້ອງການ 75-80%.

VII. ບົວລະບັດຮັກສາ

ກ. ການຖອນແຍກ

ໃນລະດູການທີ່ຄວາມອຸ່ນຊຸ່ນພຽງພໍ ແລະ ເພາະສົມດິດ ມັດຝ້າຍຈະເລ່ມງອກພາຍໃນ 3-6 ມ ນັບແຕ່ນຸ່ງກ, ຫຼັງຈາກງອກໜຶ່ງອາທິດ ຕໍ່ມຝ້າຍຈະໃຫຍ່ສູງປະມານ 7-15 ຊຸເນ. ແລະ ເລີ່ມມີໂບແຫ້ງ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເວລາທີ່ເພາະສົມ ສຸດໃນການເລີ່ມລົງມືຖອນແຍກ. ໃນການຖອນແຍກເຮົາຄວນຄັດເລືອກເອົາແຕ່ຕົ້ນທີ່ອົບສົມບູນແຂງແຮງດີ ປ່າສະຈາກພະຍາດ ແມງໄມ້ລຶບກວນ ປະໂວໝູ່ຕົ້ນຕຸ້ນ.

ຂ. ການເສຍຫຍ້າແລະພວນດິນ

ຝ້າຍກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພືດອື່ນໆ ຖ້າເຮົາຫາກຕ້ອງການຜົນຜະລິດສູງ ກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ພຽງພໍເປັນຕົ້ນການເສຍຫຍ້າ ແລະ ການພວນດິນ, ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ 3-5 ອາທິດ ຄວນເສຍຫຍ້າ ແລະ ພວນດິນເທື່ອທຳອິດ ແລະ ຕໍ່ໄປທາງເດືອນ ຈົນກວ່າຕົ້ນຝ້າຍຈະໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ຫຼື ວ່າຕົ້ນຝ້າຍມີອາຍຸປະມານ 3 ເດືອນຢາຍ ຈິ່ງຢຸດເຊົາການເສຍຫຍ້າ ແລະ ພວນ

ດຳເນີນການຈະເປັນການລົບກວບຕົ້ນຝ້າຍທີ່ກຳລັງອອກດອກ ແລະ ເປັນພາກ.

ຄ. ການຫົດນ້ຳ

ຫຼັງຈາກຝ້າຍເກີດແລ້ວໃຫ້ຫົດໃນທຸກໆ 10-15 ວັນ ຖ້າ ຝົນບໍ່ຕົກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຫົດນ້ຳ ໃນເວລາຝ້າຍປົ່ງຍອດ ແລະ ປົ່ງດອກ ເພາະໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ມັນມີ ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍ. ໃນຊົ່ວຊົດຝ້າຍແມ່ນໃຫ້ຫົດຢູ່ 7- 10 ຫົດ (ຈຳນວນນ້ຳ 600-800 ມ³/ຮຕ).

ງ. ການເດັດຍອດຝ້າຍ

- ການເດັດຍອດຝ້າຍ ມັນແມ່ນການສະກັດກັ້ນ ການເຕີຍ ໂຕຂອງຕົ້ນຝ້າຍ, ເຮັດໃຫ້ທາດຖະນຸບຳລຸງໄດ້ຖືກປະກອບຢູ່ໃນ ພາກຝ້າຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ແກກການສຸກແກໄດໄວ. ຫຼັງໄດ້ຮັບ ພາກຝ້າຍພວຍໃຫຍ່, ຜົນຜະລິດກໍ່ສູງ, ຄຸນນະພາບກໍ່ດີ.

- ການເດັດຍອດຝ້າຍ ແມ່ນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

ກ- ຖ້າແມ່ນເປັນພັນດໍ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເດັດໃນເມື່ອຝ້າຍປະ ກອບເປັນພາກຫຼາຍກວ່າ 12 ພາກ.

ຂ- ຖ້າແມ່ນເປັນພັນກາງ ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເດັດ ໃນເມື່ອຝ້າຍ ປະກອບເປັນພາກຫຼາຍກວ່າ 15 ພາກ.

ຄ- ຖ້າແມ່ນເປັນພັນງົບ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເດັດ ໃນເມື່ອຝ້າຍ

ປະກອບເປັນພາກຫຼາຍກວ່າ 18 ພາກ.

ສ່ວນຢູ່ລາວພວກເຮົາ, ຊາວໄຮບາ ໄດ້ເລີ່ມເດີນຍອດຝ່າຍ ໃນເວລາຕົ້ນຝ່າຍເລີ່ມເປັນພາກເທື່ອທຳອິດ.

VIII. ພະຍາດແລະແມງໄມ້ຝ້າຍ

1. ແມງໄມ້

ເວົ້າເຖິງບັງ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູຝ່າຍກໍມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ສຸດ ແຕ່ເຮົາຈະເວົ້າເຈາະຈົງສະເພາະບັງ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ສຳຄັນເລີຍ ພົບເຫັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເທົ່ານັ້ນ ຄື :

ບັງກັດໃບແລະບັງເຈາະດອກ

ບັງກັດໃບ ແລະ ບັງເຈາະດອກຝ່າຍເປັນສັດຕູ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄ້າຍແຮງຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນບັງທີ່ເຂົ້າຫຳລາຍດອກອອນ ແລະ ເຈາະພາກຝ່າຍ ລັກສະນະຕົວບັງມີສີຂຽວອອນ ແຕ່ບາງຊະນິດມີສີອາວຸກເຫຼືອງແດ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດມີເສັ້ນຕໍ່ ຢູ່ເທິງຫຼັງສອງເສັ້ນ ການກຳຈັດບັງຊະນິດນີ້ແມ່ນຄວນສັດຢາ ແອນດອນ, ເຊວິນ 85% ຫຼື ອາໂຊດອິນ 65% ໃນອັດຕາ 2 ບວງແກງ/ນັ້ນ 20 ລິດ ສິດ ທຸກໆ 10-15 ມ.

ບັງເຈາະໝາກຝ້າຍສີຂຽວ

ເປັນສັດຕູຝ່າຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບໃນປະເທດເຮົາ, ແມ່ຂອງ ໂຕບັງນີ້ ແມ່ນແມງກະບອກາງຄືນສີນ້ຳຕານ ຂະໜາດນ້ອຍໂຕໜຶ່ງ

ສິນຄ້າ ເຊິ່ງຈະເຈາະພາກຝ້າຍແກ່ ຫຼື ພາກຝ້າຍແຫ້ງແລ້ວເອົາ
ໄປກິນເນັດຝ້າຍພາຍໃນພາກຝ້າຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໜ້າຝ້າຍ ຫຼື ໃນ
ຝ້າຍມີສີຝຸດປົກກະຕິ ແລະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ການປັກຝ້າຍ ເສຍ
ຫຼາຍກວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມີບັງຊະນິດບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ບັງຊະນິດບໍ່ເກີດ
ແມ່ນຂອງບັງຈະສ້າງໄຂ່ໃສ່ໄວ້ເທິງຕີນຝ້າຍ, ໂຕອ່ອນຂອງບັງຊະ
ນິດຈະອາໄສກິນຍອດຝ້າຍອ່ອນເປັນການຊົ່ວຄາວ ແຕ່ເມື່ອຍັງ
ໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະຫາທາງເຈາະເຂົ້າໄປຫາພາກຝ້າຍ ອາໄສຢູ່ອາງໃນ
ຂອງພາກຝ້າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຝ້າຍຈະເກັບໄວ້ລຳກາຍອ່ອນ ບັງຈະຫຸ້ມ
ລາຍ ໂດຍອາໄສກິນເນັດໃນຝ້າຍນັ້ນ. ໄລຍະຝັກໄຂ່ຂອງບັງມີອາ
ຍຸປະມານ 4 ມື້ ໃນໄລຍະເປັນບັງ 20 ມື້ ແລະ ເປັນດັກແປ້ະ
ມານ 7 ມື້.

ການກຳຈັດ

ຈຳເປັນຕ້ອງພົບ ຫຼື ສິດຢາຫຸກໆ ອາຫິດ, ຢາທີ່ໃຊ້ໄດ້ແກ່
ຢາອາໂຊດຣິນ 65%, ພອບດຣິນ, ເຊວິນ 85% ແລະ ອື່ນໆ.
ສິດໃນອັດຕາ 1-2 ບວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 15-20 ລິດ. ສິດໄປ
ເລືອກໆ ຈົນກວ່າບັງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຫຸ້ມລາຍໃຫ້ໝົດໄປ. ສຳລັບບວບ
ຝ້າຍ ຫຼື ເສັ້ນຝ້າຍທີ່ເກັບໄວ້ລຳກາຍອ່ອນ ຄວນຮົມ ຫຼື ອົບດ້ວຍຢາ
ເອຕິແລນອອກໄຊ ຫຼື ເອຕິແລນຄະລໍໄຮ. ສຳລັບເນັດຝ້າຍ ທີ່
ຈະເກັບໄວ້ເຮັດແນວນັ້ນ ກໍຄວນຮົມ ຫຼື ອົບດ້ວຍຢາເພື່ອນກັນ.

ບັງໝາເຈາະໝາກຝ້າຍແລະຍອດອ່ອນ

ບັງຊະນິດບໍ່ສາມາດຫຸ້ມລາຍ ແລະ ໃຫ້ຜົນເສຍຫາຍແກ່

ການປູກຝ້າຍຢ່າງໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ການກຳຈັດ ກໍ່ຕ້ອງສິດດ້ວຍ
ຢາ ເຊັ່ນ 85%, ນາລາຊິງ; ໃບດິນ ແລະ ເອສໂທອອນໃບ
ອັດຕາ 2-3 ບ່ວງຕໍ່ກແກງ/ນ້ຳ 20 ລິດ.

2. ພະຍາດຂອງຕົ້ນຝ້າຍ

1. ພະຍາດລຳຕົ້ນນ້ຳ

ລັກສະນະອາການຕົ້ນຝ້າຍຍັງອ່ອນນ້ອຍ ໃບຝ້າຍຈະເລີ່ມ
ຮອຍບາດແຜລຸກລາມໄປເລື້ອຍໆ ສູດຫາຍຈະເຮັດໃຫ້ລຳຕົ້ນ ເນົ້າ
ເປື້ອນ. ຖ້າວາພະຍາດເປັນກັບຝ້າຍຈະມີຈຸດຕຳໜຶ່ງ ຫາສອງຈຸດ
ຊຶ່ງລາງເທື່ອກໍ່ຈະມີຂອບແດງ, ຈຸດຕຳຈະຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ເພາະຈະມີສະປໍເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນກາງຈຸດ ຈະເຮັດໃຫ້ເບື້ອງຝ້າຍ
ແຫງ ແລະ ແຂງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຜາກຝ້າຍແຕກເປັນຮອຍຢູ່
ບ່ອນທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນ. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດທີ່ອາ
ໄສຢູ່ນັ້ນ ໃຊ້ຢາອາຊິດອຸບເຟຣິກເຂັ້ມຂຶ້ນຫຼືລາຍເສັ້ນໃບຕາດເມັດ
ຝ້າຍ, ກອນປູກຈະສາມາດແກໂຂໂຕ ຖ້າວາພະຍາດນັ້ນຕັດຢູ່ຂາງ
ນອກເມັດຝ້າຍ.

2. ພະຍາດຕີນ້ຳ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດນີ້ ເລີ່ມຈາກສ່ວນລຸ່ມຂອງລຳຕົ້ນ,
ຕິດຕິນເກີດເປັນບາດແຜ ເຮັດໃຫ້ສ່ວນລຳຕົ້ນເນົ້າເປື້ອນ ແລະ ຢູ່
ການຈະເລີນເຕີຍໂຕ. ຖ້າວາພະຍາດນີ້ລະບາດ ຕອນຜາກຝ້າຍ
ແກ່ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຜາກຝ້າຍເນົ້າ, ນວນຝ້າຍ ຫຼື ໃບຝ້າຍຈະມີ

ຜິດປົກກະຕິ. ສາຍເຫດຂອງພະຍາດນິເກດຈາກເຊື້ອພະຍາດ ຟຢ ສະລິອອນ ໂມລິນຟອນ, ຊຶ່ງເຊື້ອພະຍາດນິເກດຢູ່ໃນດິນ, ໃນເມັດຝ້າຍ. ດັ່ງນັ້ນ ວິທີແກ້ໄຂພະຍາດນິເກດ ກໍແມ່ນຄືການປູກພືດພູບວຽນ ຊອກ ແລະ ຄັດເລືອກແນວພັນທີ່ຕານຫານກັບພະຍາດນິເກດນຳປູກ.

3. ພະຍາດຮາກແລະລຳຕົ້ນເນົ່າ

ລັກສະນະອາການເກີດຈາກຮາກ ແລະ ລຳຕົ້ນເນົ່າ ໃນສ່ວນທີ່ໃກ້ດິນ ຫຼື ຕົ້ນກວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ເປື້ອນລຳຕົ້ນຂອງຝ້າຍເປັນສີນ້ຳຕານແດງ ເປັນຮອຍໄໝ້ເນົ່າ ແລະ ເປື້ອຍໄປເລື້ອຍ. ສາຍເຫດຂອງພະຍາດແມ່ນເກີດຈາກເຊື້ອເຫັດລາ ນັ້ນສາມາດເປັນກັບພືດອື່ນໆ ໄດ້ເຊັ່ນ : ພາກເຂືອ, ຜັກກາດ, ນັ້ນຝະລັ່ງ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ອື່ນໆ ການກຳຈັດບໍ່ຄວນປູກຝ້າຍໃນເນື້ອທີ່ ທີ່ຝ້າຍເກີດເປັນພະຍາດນິເກດ ແລະ ຈົ່ງຫຳລາຍຕົ້ນຝ້າຍທີ່ເປັນພະຍາດນິເກດໂດຍສົບເຊິ່ງ.

4. ພະຍາດໃບໄໝ້ຈຸດສີນ້ຳຕານ

ເປັນພະຍາດທີ່ຫຳລາຍໃບຝ້າຍເປັນຈຸດໄປ, ເສັ້ນຂອງໃບຝ້າຍຈະກາຍເປັນສີດຳ, ໃບມີອາການງົ່ງ : ພະຍາດນີ້ສາມາດເປັນໄດ້ໃນພາກຝ້າຍ, ກົງກາຍຂອງຕົ້ນຝ້າຍ, ພະຍາດນີ້ຈະລະບາດຂຶ້ນໃນລະດູການໝົດຄວາມອຸ່ມອຸ້ມສູງ. ຕົ້ນຝ້າຍເນົ່າຮວງຫຼິ້ນໄປ ສາຍເຫດເກີດຈາກເຊື້ອອັນດຽວຂອງ ຊັບໂຕມັສ. ການກຳຈັດໃຊ້ພັນຝ້າຍທີ່ຕານຫານຕໍ່ພະຍາດນິເກດ ແລະ ໃຊ້ເມັດພັນຝ້າຍທີ່

ສຳນວນຈາກການຂ້າເຊື້ອພະຍາດແລ້ວນຳມາປຸກເຕົ້ານັ້ນ.

IX. ການເກັບກຽວ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະເພດຂອງຝ້າຍຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີ ກໍ່ຂຶ້ນ ປັດຈຸບັນທີ່ເກັບຝາກຝ້າຍແກບພອມກັນ, ຂອບເຂດຂອງການແກຈະ ຢຶດເວລາເຖິງ 2-3 ເດືອນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຝ້າຍຮົບຮັ້ງໃນການ ແກໄວ ຄວນນຳໃຊ້ຫາດ $MgCl_2$ ໃນອັດຕາ 8-10 ກິໂລ/ຮຕ ສິດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ດັ່ງນັ້ນ ການເກັບກຽວຝ້າຍຄວນຈະເກັບກຽວໃນ ເວລາຕອນເຊົ້າ ຫຼື ໃນເວລາຕອນບ່າຍ. ເພາະກິບສຳຮອງຂອງ ຝາກຝ້າຍ ແລະ ໃບຝ້າຍແຫຼ່ງບໍ່ຫຼາຍ, ຖ້າເກັບນວນຝ້າຍ ຫຼື ເສັ້ນໃບຝ້າຍປົກກັນກັບໃບແຫງ ແລະ ກິບ ສຳຮອງຝາກຝ້າຍແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການເລືອກຕາມຝ້າຍຫຼັງ. ຖ້າເຮົາບໍ່ ເກັບອອກແລ້ວ ຄຸນນະພາບຂອງຝ້າຍຈະບໍ່ດີ, ສີບ້າງ ແລະ ບໍ່ສະ ອາດ, ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ວິທີທີ່ດີສຸດໃນການເກັບກຽວຝ້າຍຄື : ເລືອກ ເກັບເອົາແຕ່ຝາກຝ້າຍທີ່ແຕກເຕັມທີ່ ນວນຝ້າຍພື້ນ ແລະ ແຫງດີ. ຢາກເກັບຝ້າຍໄດ້ດີ ຄວນເຮັດດັ່ງນີ້ :

1/- ຢ່າເກັບຝາກຝ້າຍທີ່ປຽກ ຫຼື ຊຸມ; ປະນວນຝ້າຍໃຫ້ ແຫງຄຸ້ມແລ້ວຈຶ່ງລົງມືເກັບກຽວໄດ້ ຫຼື ຖ້າວ່າຈຳເປັນກໍ່ຕ້ອງເກັບ ຝາກນອຍ ຫຼື ນວນຝ້າຍໝົດວາມຊຸມຊັນສູງຢູ່, ຈຶ່ງເອົາອອກຕາກ ແດດໄວ້ຈັກສອງ ຫຼື ສາມແດດກອນ ຈົນກວ່າຝ້າຍແຫງດີແລ້ວຈຶ່ງ ເກັບໃສ່ໄຖ່ ຫຼື ກະສອບມຽນໄວ້.

2/- ຢ່າເກັບຝ້າຍຈາກພາກຝ້າຍທີ່ແຕກບໍ່ປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ສະ
ໜ້າສະເໝີ ເພາະວ່ານວນຝ້າຍຈະເປັນກອບບໍ່ສົມບູນ ແລະ ສິ່ງ
ທີ່ປົກກະຕິ.

3/- ຈົ່ງເກັບຝ້າຍໃນເມື່ອຝ້າຍໃນໄຮ່ແຕກເຕັມທີ່ ເປັນ
ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ, ເກັບໃຫ້ໝົດ ເພາະວ່າຖ້າເກັບບໍ່ໝົດ ຈະເຮັດໃຫ້
ພວມຝ້າຍທີ່ເຫຼືອໃນໄຮ່ເສື່ອມຄຸບນະພາບລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ນວນຝ້າຍປຸງສີ ແລະ ເສຍຄວາມສົດໃສ ສາຍເຫດເກີດ
ມາຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງນ້ຳພອກ ລາງເທື່ອກໍ່ຖືກນ້ຳຝົນ, ໃນທ້ອງ
ຖືກແຫງແລງ, ຮອນ ແລະ ລົມແຮງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກຝ້າຍແຕກ
ໄວກວ່າປົກກະຕິ. ຖ້າປະປ່ອຍໄວດີນຈະເຮັດໃຫ້ລົມພັດ ນວນຝ້າຍ
ຕົກຈາກກີບຂອງພາກລົງສູ່ພື້ນດິນ ໃນກໍລະນີເຊັ່ນນີ້ ການເກັບຝ້າຍ
ຫຼາຍເທື່ອຫຼາຍກັນ 10-14 ມື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຝ້າຍມີ ຄຸນນະພາບ
ດີ.

4/- ພາກຝ້າຍທີ່ແຕກແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີສີຂຽວຢູ່ ເຮົາບໍ່ຄວນ
ເກັບເພາະນວນຝ້າຍ ຫຼື ເສັ້ນໃຍຈະບວບບາງຂາດງ່າຍ ບໍ່ທັນ
ຫານ, ສີບໍ່ສົດໃສ.

5/- ພາກຝ້າຍທີ່ແຕກຫາງຂ້າງເປື້ອນ ສີບໍ່ງາມ ຫຼື ຝ້າຍ
ທີ່ຕົກລົງດິນຄວນຈະເກັບແຍກຖິງໄວຕ່າງຫາກ ບໍ່ຄວນເອົາໄວປົນ
ກັບຝ້າຍທີ່ດີ ເພາະຄຸນນະພາບຂອງຝ້າຍທັງໝົດຈະປ່ຽນໄປໃນທາງ
ເສຍ ເຮັດໃຫ້ນວນຝ້າຍທີ່ເກັບໄວນັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນ
ເລື່ອງສີ ຄວາມຫິນທານເສັ້ນໃຍບໍ່ສະໜ້າສະເໝີ.

6/- ນວນຝ່າຍຈະຕ້ອງແຍກໄວ້ ໂດຍອາໄສ ແຕ່ລະຊັ້ນ ຂອງຕົ້ນຝ່າຍທີ່ເກັບໄວ້ : ພາຍຄວາມວ່າ ຕາມປົກກະຕິການເກັບ ຝ່າຍເທື່ອຫຳອິດ ແລະ ເທື່ອທີສອງຈະໄດ້ນວນຝ່າຍຈາກພາກຝ່າຍ ທີ່ຢູ່ພາກສ່ວນໃກ້ດິນສ່ວນຕ່ຳຂອງຕົ້ນຝ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນແຍກໄວ້ ພວກໜຶ່ງຕາງຫາກ.

ການເກັບເທື່ອທີສາມ ແລະ ເທື່ອທີສີ່ຈະໄດ້ນວນຝ່າຍຈາກ ສ່ວນກາງຂອງລຳຕົ້ນ. ການເກັບເທື່ອທີຫ້າ ໄປ ຈະໄດ້ນວນຝ່າຍ ຈາກສ່ວນຍອດຂອງຕົ້ນຝ່າຍ. ຝ່າຍທີ່ໄດ້ຈາກພາກຝ່າຍ ສ່ວນລຸ່ມ ແລະ ສ່ວນຍອດຈະເປັນຝ່າຍທັບແກ່ຕົ້ນ, ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ ກວ່າຝ່າຍທີ່ເກັບຈາກສ່ວນກາງຂອງລຳຕົ້ນ.

7/- ຖ້າພາກຝ່າຍທີ່ແຕກຕ່ຳແລ້ວຖືກຝົນຕົກໜັກ ຄວນປະໄວ້ ໃຫ້ແຫງດີໃນຕົ້ນຈັກ 2-3 ມ ຈຶ່ງເກັບກຽວ. ຖ້າຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼາຍມື້ຄວນຈະລົງມື້ເກັບກຽວຝ່າຍທັບທີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫງດ້ວຍຈິ ທອນ ຖ້າບໍ່ຮັບເກັບກຽວຝ່າຍກໍຈະເປັນຝ່າຍໃນຕົ້ນເຮັດໃຫ້ຝ່າຍເສື່ອມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປ່ຽນສີ, ການເກັບກຽວເທື່ອຫຳອິດຕາມປົກກະ ຕິນັ້ນ ເພິ່ນເລີ່ມເກັບແຕ່ຝ່າຍອາຍຸປະມານ 4-5 ເດືອນ ຫຼັງຈາກ ນ້ຳປຸກ, ຊຶ່ງຈະຕົກໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ ເປັນຢ່າງຊາ. ເມື່ອ ພາກຝ່າຍແກ, ແຕກ, ແຫງດີແລ້ວ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄຸນຄ່າຂອງ ຝ່າຍກໍດີ, ເສັ້ນໄຍກໍມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ. ມີຄວາມໜຽວ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ລັກສະນະຂອງເສັ້ນຝ່າຍອີກດ້ວຍ.

X. ການອັດຝ້າຍ

ເນື້ອຝ້າຍແຫຼ່ງດີແລ້ວ ຕ້ອງພະຍາຍາມແຍກເສດກີບ ຂອງ
ຊາກ ແລະ ໃບຝ້າຍແຫຼ່ງທີ່ກຕິດພາກັບນວນຝ້າຍອອກໃຫ້ໝົດ ຖ້າ
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເສດຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະປະສົມຢູ່ໃນນວນຝ້າຍ, ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການອວຝ້າຍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງທົດຄວບເຮັດໃຫ້ການ
ອວຝ້າຍສະດວກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ເຮົາຄວນເອົາຝ້າຍໄປຕາກ
ແດດໃຫ້ແຫຼ້ງຈົກເຄ່າງມາກອນ ຈົ່ງສົ່ງເຂົ້າໂຮງອວ ຫຼື ອວດວຍມື
ເພື່ອແຍກນວນຝ້າຍອອກຈາກເນື້ອຝ້າຍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນອວ
ແຕ່ສະເພາະນັ້ນກ່ອນ ແລະ ແຫຼ່ງ, ບໍ່ຄວນອວຝ້າຍໃນມືຜົນຕົກຫຼື
ມີຄວາມອຸ່ມອຸ້ມສູງ. ຝ້າຍທ້ອວໃນ 100 ກິໂລຈະໄດ້ຮັບນວນຝ້າຍ
33-40% ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 50-67% ແມ່ນເປັນແກນຝ້າຍ.

XI. ຜົນຜະລິດຝ້າຍ

ຖ້າເຮົາຫາກເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາໄດ້ດີ ສົມທົບກັບ
ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການເຂົ້າໃນການປູກແລ້ວ, ຜົນຜະລິດກໍ
ຈະໄດ້ຮັບສູງລະຫວ່າງ 3000-4000 ກິໂລ/ຮຕ.

ສຳລັບຜົນຜະລິດຢູ່ລາວພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດຜະ
ລິດໄດ້ປະມານ 1300-2000 ກິໂລ/ຮຕ.

(ເອກກະສານອ້າງອີງ)

- ກົມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ, ບາງຂໍ້ແນະ
ນຳ ກ່ຽວກັບການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ

(1 9 8 1)

- ສາດສະດາຈານ ເດກອບ, ຮຸ່ນກາດິໂນວາ ການປູກ
ພືດຂອດຮອນ ແລະ ຂອດອົບອຸ່ນ.

(1 9 8 1)

ການປູກໝາກພິກໄທ

ແປຮຽບຮຽງໂດຍ: ນາງຂັນແກ້ວ ອຸປະລາວັນ

: ວັນນະກອນ ພິມມະສະຖິດ



ການປຸກໝາກພິກໄທ

ໝາກພິກໄທເປັນເຄື່ອງປຸງອາຫານຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕະຫຼາດຫຼາຍ ເນື່ອງທຽບໃສ່ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງຊະນິດອື່ນ. ປະເທດທີ່ຜະລິດໝາກພິກໄທອອກເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ແກ່ປະເທດໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບະເຣຊິນ ປະເທດທີ່ກ່າວມານີ້ສົ່ງໝາກພິກໄທເປັນສິນຄ້າອອກເຖິງ 70% ຂອງໝາກພິກໄທໃນຕະຫຼາດໂລກ.

ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໝາກພິກໄທ ແມ່ນຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຂະຫຍາຍໄປປະເທດພະມາ ຕໍ່ມາກໍມີຜູ້ນຳເຂົ້າມາປຸກ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ປະເທດເຮົາປະຊາຊົນກໍລັງນິຍົມບໍລິໂພກໝາກພິກໄທ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການປຸກໝາກພິກໄທກໍລັງເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງບັນດາບັນຊາຝັ່ງ ເພາະເປັນພືດທີ່ເພາະ ສົມກັບເນືອງຮອນ.

ການປຸກໝາກພິກໄທ ເປັນວຽກລະອຽດທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ຜູ້ປຸກຕ້ອງສະລະເວລາໃຫ້ໃກ້ສ່ວນໝາກພິກໄທທີ່ສົມຄວນໝາກພິກໄທເປັນພືດສຳລັບເນືອງຮອນ ໂດຍສະເພາະ, ເປັນພືດທີ່ເປັນເຄືອ ແລະ ມີພູມ ງາ ການ ສາຂາຫຼາຍໝາກພິກໄທສາມາດເລືອ ແລະ ຈັບເກາະດ້ວຍຮາກນ້ອຍໆຊຶ່ງເອ້ນວ່າຕົ້ນກັບແກ່. ຮາກໝາກພິກໄທ ມີລະບົບຮາກຕົ້ນມີຮາກໃຫຍ່ກັບຫຼາຍໆລຸ້ນລົງໄປໃນດິນ ຮາກຝອຍພັດມີຫຼາຍ ແລະ ຈັບຕາມໜ້າດິນຊຶ່ງອອກເກີດ

ກົງກັນຂ້າມກັບໃບ ຮວງອ່ອນ ຫຼື ພາກອ່ອນຂອງພິກໄທໃຊ້ປະກອບ
ໃນອາຫານ ໃນແກ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປຸງແຕ່ງ ນອກນັ້ນຍັງສາມາດນຳ
ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານປຸງແຕ່ງຢາອີກດ້ວຍ.

ດິນພ້າອາກາດ

ພິກໄທເປັນພືດເລື່ອງຮ້ອນ ມັກອາກາດອຸ່ນ ແລະ ອຸ່ນຊຸ່ນ
ສາມາດປູກໃນດິນທີ່ອົມສົມບູນ ດ້ວຍອິນຊີວິດຖູ ແລະ ເປັນດິນທີ່
ລະບາຍນ້ຳໄດ້ງ່າຍ ມີລະດັບນ້ຳໃນດິນຕ່ຳ ຕ້ອງການປະລິມານນ້ຳ
ຝົນຢ່າງນ້ອຍປີລະ 1000-2000 ມມ. ປູກໄດ້ແຕ່ລະດັບນ້ຳທະ
ເລຖິງ 1100 ເມັດ.

ການກຽມພັນປູກ

ໃຊ້ລຳຕົ້ນສ່ວນຍອດ ຫຼື ສ່ວນອັນຫຍ່ແກ່ປານໃດ ມີອາຍຸລະ
ຫວ່າງ 1-2 ປີ ເຮັດພັນແບບດັດສັດ ຄວບຄັດຈາກຕົ້ນທີ່ມີຄວາມອ
ດົມສົມບູນໃຫ້ພົບຜະລິດສູງ ຫົນຫານຕະພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເມື່ອ
ຄັດຕົ້ນພັນໄດ້ແລ້ວ ຕ້ອງຄອຍງ ແກະຕົ້ນກັບແກ່ໃຫ້ຫຼຸດຈາກຄາງຢາ
ໃຫ້ຕົ້ນຫັກ ຫຼື ຊຳ ນຳມາຕັດເປັນຫອນໆ ຫອນໜຶ່ງມີປະມານ 5-7
ຂໍ້ຕັດໃບອອກບາງສ່ວນ ນຳຍອດພັນທີ່ຕັດໄວ້ໄປປັກຊຳ ໃຫ້ຂຸ່ຢູ່ໃຕ້
ລະດັບດິນແປງຊຳປະມານ 3-4 ຂໍ້ຈົນອອກຮາກແຂງແຮງດີ ແລ້ວ
ຈຶ່ງນຳໄປປູກ ຊາວສວນທີ່ມີຍອດພັນຂອງຕົນເອງ ມັກຈະຕັດຍອດ
ແລ້ວນຳລົງປູກໃນໜານເລີຍ.

ການຊໍາ

ການກຽມດິນ ຄວນນຳດິນທີ່ມີຄວາມອົດໝົນສົມບູນ ເຊັ່ນ ທາດິນ ຫຼື ດິນທີ່ນຳມາປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຂີ້ເຖົ້າ, ແກບ, ແປງ ໃຫ້ພຽງແລ້ວປັກຍອດພັນໃຫ້ຫ່າງກັນ 10 ຊັງຕີແມັດ ແລະໃຫ້ແຖວຫ່າງກັນ 20 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ດິນນຳໃຫ້ຊຸ່ມເທິງໜານ ແລ້ວປັກໃຫ້ຮົ່ມ ເພື່ອກັນແດດບາງສ່ວນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນໜານເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຍອດພັນໄຫວແຕ່ກຣາກໄວ ເມື່ອຊຳໄປໄດ້ 6 ອາທິດ ໃຫ້ເອົາສິ່ງທີ່ປັກຮົ່ມນັ້ນອອກປະມານ $1/4$ ເພື່ອໃຫ້ຍອດພັນໄດ້ຮັບແສງແດດຕໍ່ໄປຈົ່ງຄອຍໆ ເອົາອອກໃຫ້ພົດພາຍໃນອາທິດທີ 8 ຫຼັງຈາກນັ້ນຈົ່ງຂັດເອົາຍອດພັນໄປປູກ ຫຼື ອາດຈະນຳໄປຊຳຕໍ່ໃນຖົງຢາງ ອີກໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວຈົ່ງນຳໄປປູກ ຈະເຮັດໃຫ້ເປີດຊຸ້ມກາຍຫຼຸດລົງ.

ການຕຽມຄ້າງ

ເນື່ອງຈາກພາກພື້ນໄຫວເປັນພືດທີ່ມີລຳຕົ້ນອ່ອນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສສິ່ງອື່ນເປັນທີ່ເກາະຊູລຳຕົ້ນ ສິ່ງທີ່ຕົ້ນພັນໄຫວໃຊ້ເກາະຊູລຳຕົ້ນນັ້ນເອີ້ນວ່າ ຄ້າງຕົ້ນພາກພື້ນໄຫວ. ຄ້າງພາກພື້ນໄຫວບາງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື ຄ້າງປະເພດໜຶ່ງຊົດກັບຄ້າງປະເພດທີ່ບໍ່ມີຊົດ.

ກ- ຄ້າງມີຊົດ ທີ່ເພາະສົມທັງຈະໃຊ້ເປັນຄ້າງ ຕົ້ນພາກ

ພິກໄທໄດ້ແກ່ນໄມ້ໝູ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ລະບົບຮາກເລິກໄປ
ໃບຂຽວຕະຫຼອດປີ ຈຶ່ງອາດຈະປຸກຕາມເທິງໄຕ້ແລະຝັ່ງ, ຕົ້ນ
ພາກ, ຕົ້ນພາວ ...

ຂ- ຄຳງຸ່ມຊົດ ໄດ້ແກ່ໄມ້ເບື້ອງຂຽວຈະມີຕ່າງໆ,
ຄຳງຸ່ມຊົດ ຄຳງຸ່ມຈັກ, ຂະໜາດຂອງຄຳງຸ່ມຄວນເປັນໄມ້ ສີ
ຫຼຸ້ມຂະໜາດ 10×10 ຈຶ່ງຕີໄມ້ດ ຍາວ 4 ແມັດ. ຖ້າເປັນຄຳງຸ່ມ
ຊົດມີໂຄງເຫຼັກທາງໃບເພື່ອຄວາມພັບຕົງແຂງແຮງ, ຖ້າ
ເປັນຄຳງຸ່ມຈັກ ຄວນມີຂະໜາດເທົ່າ ຫຼືໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຍາວຂອງ
ດິນຈຸດໃຈກເລິກນອຍ.

ຜົນໄດ້- ເສຍຂອງຄຳງຸ່ມແຕ່ລະປະເພດ.

ຄຳງຸ່ມຊົດ : ບໍ່ສູນເປື້ອງຄຳໃຈຈາຍຫຼາຍ

ຄຳງຸ່ມຈັກ : ຈະໃຈເວລາປຸກລວງໜ້າ (ປຸກຄຳງຸ່ມ) ປະມານ
2 ປີ ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ, ສູນເປື້ອງຝຸ່ນ ແລະ
ຢາປາບສັດຕູພືດຫຼາຍກວ່າ ເພາະຝຸ່ນຈະຖືກຄຳງຸ່ມ
ຍາດຄຸດໄປເປັນອາຫານ.

ການຕຽມດິນ

ຖ້າເປັນປ່າຍກເບີກໃໝ່ ແມ່ນຕ້ອງຂຸດຕໍ່ຮາກໄມ້ ແລະຫຍ້າ
ອອກໃຫ້ໄຫຼດ ແລ້ວຈັງໄຖ ຫຼື ຂຸດດິນຕາກແດດໄວປະມານ 15 ມ
ຈັງໄຖ ແລະ ພວນດິນ ແລະ ປັບໜ້າດິນໃຫ້ພຽງ ຈາກນັ້ນກໍກະໄລ
ຍະປຸກ ຈຶ່ງຂຸດກັບແຕ່ລະແນວພັນ. ໄລຍະຕົ້ນແມ່ນຫ່າງກັນ 2-

2,25 ແມັດ ແຫຼວຫ່າງກັນ 2-2,5 ແມັດ ຫຼື ເຮັກຕາລະປະມານ 2500-1600 ຄາງ, ໃຫ້ຟັງຄາງລົງໃນດິນເລິກປະມານ 60 ຊັງຕີແມັດ ຖິ້ມໃຫ້ເສົາແໜ້ນ ຈາກນັ້ນກໍຂຸດຂຸມຂະໜາດກວາງ 40 ຊັງຕີແມັດ ຍາວ 60 ຊັງຕີແມັດ ເລິກ 40 ຊັງຕີແມັດ ຫ່າງດ້ານເໜືອ ແລະ ດ້ານໃຕ້ຂອງເສົາດ້ານລະ 1 ຂຸມ ໃຫ້ປາກຂຸມຫ່າງຈາກ ເຫງົາຄາງປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ປະສົມດິນທີ່ຂຸດຂຸມມາກັບຝຸ່ນ ຄອກ 1 ສ່ວນ ຕໍ່ ດິນ 2 ສ່ວນ ແລວກວດດິນຖິ້ມລົງໄປໃນຂຸມປະມານເຄັ່ງຂຸມ ນຳເອົາຍອດພິກໄທລົງປຸກໃນຂຸມ ໃຫ້ປາຍຍອດເອົາເຫຼົ້າຄາງການວາງຍອດໃຫ້ເອົາດ້ານໜ້າ ຫຼື ຕີນກັບແກ່ອອກ ນອກຄາງ ແລວຖິ້ມດິນໃຫ້ແໜ້ນ ຫຼື ດຸບນຳຈົນຈຸ່ມ ແລະ ບັງຮົ່ມໃຫ້ພິກໄທ ຫຼັງປຸກປະມານ 1 ເດືອນ ໃຫ້ເອົາບັງຮົ່ມອອກເຫຼືອເລິກເຫຼືອ ນອຍ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນພິກໄທຄອຍໆ ເຄີຍກັບແສງແດດ ເມື່ອສັງເກດເຫັນວ່າຕົ້ນພິກໄທສາມາດຈະຫົນຕໍ່ແສງແດດປົກກະຕິໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງເອົາບັງຮົ່ມອອກໃຫ້ໝົດ. ເມື່ອຕົ້ນພິກໄທເລີ່ມແຕກຍອດອອນ ແລະ ຍອດຍາວພໍທີ່ຈະຜູກກັບຄາງໄດ້ ໃຫ້ໃຊ້ເຈື້ອກເພືອງ ຫຼື ຕອກພັດ ຕິດກັບຄາງ ແຕ່ຄວບລະວັງດີ ຢ່າມັດແໜ້ນເກີນໄປໃຫ້ມັດແຕ່ສະເພາະຍອດທີ່ຕອງການປະມານຄາງລະ 3-5 ຍອດ ນອກນັ້ນຕອງເດັດຖຸ ເພື່ອກັນການຍາດອາຫານກັນເພາະຖ້າປ່ອຍຍອດໄວຫຼາຍ ເກີນໄປຮາກຕົ້ນພິກໄທ ກໍບໍ່ສາມາດຈະສົ່ງອາຫານໄປລ້ຽງ ລຳຕົ້ນໄດ້ພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນພິກໄທຂອງແຮງໄດ້.

ຕາມປົກກະຕິຮາກຂອງຕົ້ນພິກໄທ ມັກຈະແພ່ຕາມຜ້າດິນສະ

ນັບທຸກໄລຍະ 1-2 ປີ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນ.

ການດູແລະຮັກສາ

ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນພືກໄທ

ເມື່ອຕົ້ນພືກໄທເລີ່ມແຕກຍອດອອນໃຫ້ຄ່ອຍເດັດ ຍອດອອນ
ອອກ ແລະ ເຫຼືອຍອດທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດໄວ້ພຽງຕົ້ນລະ 2-3 ຍອດ
(ຄາງລະບໍ່ຄວນເກີນ 4-6 ຍອດ ເບິ່ງຕາມຂະໜາດຄາງ) ຈັດ
ໃຫ້ຍອດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເປັນລະບຽບ ຢ່າໃຫ້ຮວມກັນຢູ່ພຽງດ້ານໃດດ້ານ
ໜຶ່ງຂອງຄາງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ມັດຍອດເຫຼົ່ານີ້ຕັດກັບຄາງ ຖ້າມີຍອດໃໝ່
ເກີນຄວາມຕ້ອງການ ຕ້ອງເດັດຖິ້ມໃຫ້ໝົດການຜຸກຍອດໃຫ້ຜຸກທຸກຂ
ວນຂໍ້ການຜຸກຍອດ ແລະ ຕັດແຕ່ງບ່ອນຕ້ອງເຮັດຕັດຕໍ່ກັນໄປ ທຸກອາ
ທິດ ໂດຍວິທີການຜຸກວຽນຈົນກວ່າຕົ້ນພືກໄທຈະສູງເຖິງຍອດຄາງຫຼື
ເມື່ອຕົ້ນພືກໄທມີອາຍຸປະມານ 1 ປີ ກໍຕັດເຄືອພືກໄທ ເຫຼືອຄວາມ
ສູງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ຈາກລະດັບພື້ນຖານ ແລະ ລຽງເຄືອຕໍ່
ໄປລະຫວ່າງຕົ້ນພືກໄທຈະເລີນເຕີຍໂຕ ໃນປີທີ 2 ນີ້ ກໍຕູ້ແລ
ຕັດແຕ່ງເຊັ່ນດຽວກັບປີທໍາອິດ ຈົນກວ່າເຄືອພືກໄທຈະສູງຖ້ວມຄາງ
ເມື່ອຍອດພືກໄທສູງກາຍຄາງໄປແລ້ວປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້
ເອົາຍອດທີ່ສູງພື້ນຄາງ ມັດຮວມກັນຢູ່ຍອດຄາງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໜັກ
ຍອດຖ້ວງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກັບແກ່ທ້ອງຄາງຢູ່ນັ້ນຫຼຸດອອກຈາກຄາງ.
ເມື່ອພືກໄທມີອາຍຸເກີນ 1 ປີ ໃຫ້ເອົາເຄືອກໍລົງຂະໜາດ $\frac{1}{4}$ ຊັງ

ຕິແມັດ ຜູກຕັບເຄືອໝາກໄວ້ກ່ອນແລ້ວເປັນຂັ້ນ ແຕ່ລະຂັ້ນກັນ
 40-50 ຈຶ່ງຕິແມັດ ໃຫ້ຂັກອີ່ມຢູ່ສູງຈາກພື້ນດິນປະມານ 1 ແມັດ
 ແລະ ຂສຸດຫາຍຢູ່ຫ່າງຍອດຄາງປະມານ 5-10 ຈຶ່ງຕິແມັດ ທັງນີ້
 ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຄືອໝາກພັກໄຫໄດ້ຕົງຊື່ ແລະ ສະດວກແກກງານເກັບ
 ໝາກນັບເອງ.

ການປັບຫຍ້າ

ຄວນໃຊ້ແຮງຄົບບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາກຂ້າຫຍ້າ ເພາະໝາກພັກໄຫ
 ເປັນພືດອາວະຈາກອອນແອ ຖ້າຖືກລະອອງຢາ ອາດເຮັດໃຫ້ພັກໄຫ
 ຫຼຸດ ແລະ ອາດເຖິງຕາຍໄດ້. ຢູ່ຮອບເຫງົ້າໃນລັດສະໝີ 50 ຈຶ່ງ
 ຕິແມັດ ຄວນໃຊ້ວິທີກັກຫຍ້າແທນການຖາງ ເພາະການຖາງຈະກະ
 ຫົບກະເທືອນຕຣາກຕັບພັກໄຫ ທີ່ຢູ່ຕາມໝາກດິນສຳລັບສ່ວນທີ່ປັກເປັນ
 ຂັນໄດ້ ຄວນໃຊ້ວິທີຕັດແທນວິທີກັກ ເພາະຕອງການຮາກຫຍ້າ ໄວ
 ສຳລັບປ່ອງກັບການຟັງຫະລາຍຂອງດິນ.

ການພວບດິນເປັນສິ່ງຈຳເປັນຫຼາຍ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮາກ
 ພັກໄຫໄຫຜ່າກະຈາຍນັບ ດູດອາຫານໄດ້ສະດວກ ນອກນັ້ນ ຍັງເຮັດ
 ໃຫ້ຄາງພັກໄຫແໜ້ນແຂງແຮງ, ການພວບດິນນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດ ພ້ອມກັນ
 ກັບການໃສ່ຝຸນຄອກ ຄືຫຼັງຈາກກຳຈັດຫຍ້າສຳເລັດແລ້ວ. ສຳລັບລະ
 ດູແລງຄວນຫາຫຍ້າແຫງ ຫຼືເຟືອງ ຫຼືເປືອກຖົ່ວຄຸມເຫງົ້າເພື່ອຊ່ວຍ
 ປ່ອງກັບການລະເຫຼີຍນ້ຳໃນດິນ ເປັນການຊ່ວຍຮັກສາຄວາມອຸ່ມອຸ້ມ
 ໃນດິນ ແລະກາຍເປັນຝຸນໃຫ້ຕົ້ນພັກໄຫຈະເລີນງອກງາມອີກດ້ວຍ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ພິກໂທແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທັງຝຸ່ນຄອກ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ.

ກ- ຝຸ່ນຄອກ : ຄວນໃສ່ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະກຽມຂຸມປູກ ໂດຍໃສ່ຄວາມກວມ ຈາກນັ້ນກໍຄວນໃສ່ພ້ອມກັບຝຸ່ນເຄມີຫຼ້າຄັ້ງ ໃສ່ຕາມລະປະມານ 3 ກະປ໋ອງນົມ, ຝຸ່ນຄອກຈະຊ່ວຍຈັບຝຸ່ນເຄມີບໍ່ໃຫ້ສະຫຼາຍຕົວໂດງາຍ.

ຂ- ຝຸ່ນເຄມີ : ຝຸ່ນຄອກບໍ່ອາດໃຫ້ທາດອາຫານແກ່ຕົ້ນພິກໂທໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈະເລີນງອກງາມຈົ່ງຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນເຄມີ ຊຶ່ງສຸດທ້າຍຈະສົມໄດ້ແກ່ 12-12-17-2 ເປັນສູດຝຸ່ນເຄມີ ຮວມມີທາດ NPK ແລະ Mg ແລະ ສູດ 13-21-21.

ການເກັບກ່ຽວ

ຜູ້ປູກຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ຕົ້ນພິກໂທອອກດອກກ່ອນອາຍຸຈົນກວ່າຈະມີອາຍຸຄົບ 2 ປີ ຖ້າອອກກ່ອນກໍຄວນເດັດຖົມບາງສ່ວນຊຶ່ງນັບຈາກມື້ອອກດອກ ຈົນຮອດເມັດແກ່ ແມ່ນກິນເວລາປະມານ 6-8 ເດືອນ.

ຜົນຜະລິດພິກໂທຈະເກັບກ່ຽວເອົາໃນຄັ້ງຫຳອິດ (ປີທີ 3 ນັບຈາກມື້ປູກ) ມີປະລິມານໜ້ອຍ ແລະ ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ເມື່ອພິກໂທມີອາຍຸ

ລະຫວ່າງ 5-8 ປີ ຈາກນັ້ນກໍຈະຄ່ອຍລົດລົງ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮັບການ
ຕິດແຕງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາດີ ກໍຈະສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຕິດ
ຕໍ່ກັນ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ. ເມື່ອເຫັນວ່າສວບພຶກໄຫຼອດໂຊມ ຈົນບໍ່
ສາມາດຈະບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ຜົນກຸນຄ່າ ຈິ່ງຄ່ອຍຮັດຕາຍປູກໃໝ່ແຕ່ຄວນ
ເວັ້ນໄລຍະ ໂດຍປູກພຶດຊະນິດອັນຂັ້ນຈັກ 2-3 ປີ ແລ້ວຈິ່ງກັບມາ
ປູກພຶກໄຫຼໃໝ່.

ການເກັບພຶກໄຫຼ

ການເກັບພຶກໄຫຼແຍກໄລຍະການເກັບຕາມຊະນິດ ຂອງພຶກ
ໄຫຼ ທີ່ຕ້ອງການຄື :

1. ເກັບເພື່ອນຳໄປເຮັດພຶກໄຫຼຂາວ ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຊຸ່
ພາກພຶກໄຫຼ ຖ້າເຫັນວ່າພາກພຶກໄຫຼ ປ່ຽນຈາກສີຂຽວແກ່ເປັນສີ
ເຫຼືອງຈົນສຸກ ມີສີແດງ ພາກພຶກໄຫຼຈະບໍ່ສຸກພ້ອມກັນທັງພ້ອມ ຈະ
ຄ່ອຍໆ ສຸກໄປເລື້ອຍ ຜູ້ປູກຈະຕ້ອງເກັບພາກພຶກໄຫຼທັນທີເມື່ອເຫັນ
ວ່າພາກພຶກໄຫຼແຖວເຫຼັກຮ່ວງໃນພ້ອມທັງ ເລີ່ມສຸກຄັກແລ້ວ 1-2
ພາກຈະປ່ອຍໄວຈົນສຸກພຶດທັງພ້ອມໄດ້ ເພາະຈະຫຼົບ ແລະ ເສຍ
ຫາຍ.

ຮ່ວງພຶກໄຫຼຈະແກ່ພ້ອມກັນດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ປູກຕ້ອງຄ່ອຍໆເກັບ
ເອົາແຕ່ພ້ອມຕາມຄວາມຕ້ອງການ ປະມານອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ
ຫຼື ຖ້າຂາດກວ່ານັ້ນ. ປົກກະຕິແມ່ນເລີ່ມເກັບພ້ອມໃນເດືອນ ມັງກອນ
ແລະ ຈະເກັບຖ້ວນໃນເດືອນ ກຸມພາ ແລະ ມີນາ.

2. ເກັບເພື່ອນຳໄປເຮັດພິກໄທຕຳ ຈະຕ້ອງເກັບໃນຂະນະທີ່ພາກຍັງມີສີຂຽວຢູ່ ແຕ່ເມັດພາຍໃນຈະຕ້ອງແກ່ແລ້ວ, ຈະທົດສອບໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ເລັບຢິກ ພາກພິກໄທເບິ່ງ ຖ້າເຫັນວ່າເມັດທີ່ແກ່ອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຍັງມີຢາງສີຂາວຢູ່ພາຍໃນ ກໍສະແດງວ່າພິກພາກພິກໄທຍ່ແກ່ ຍັງບໍ່ຄວບເກັບກຽວເທື່ອ.

ພະຍາດແລະແມງໄມ້ຂອງພາກພິກໄທ

ແມງໄມ້

1. ແມງແຄງດູດກິນຊຸດອກ. ແມງແຄງຊະນິດນີ້ມີໂຕນ້ອຍຫຼາຍປະມານ $1/2$ ຊິງຕິແມັດ ລັກສະນະພິເສດມີເຂົ້າຢູ່ຫຼັງ 1 ຄູ່. ການຫຳລາຍດູດກິນນ້ຳລຽງຂອງຊຸດອກ ໃຫ້ຫຽວເປັນສີນ້ຳຕານແລ້ວຫຼົ້ນໃບຫສົດ.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໃຊ້ຢາ ມາລາຊິງ 57%3-5 ບ່ວງຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດ. ໃຊ້ຢາ ເຊວິນ 85% 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດກໍໄດ້.

2. ແມງແຄງຂຽວ. ໂຕສີຂຽວ ປົກກິນນ້ຳຕານ ລຳໂຕຍາວ 1,3 ຊິງຕິແມັດ ການຫຳລາຍທັງໂຕອອນ ແລະ ໂຕແກດດກິນນ້ຳລຽງຂອງພ້ວມອອນຂອງພາກພິກໄທ ເຮັດໃຫ້ຫຼົ້ນກ່ອນພາກພິກໄທຈະແກ່.

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ ໃຫ້ໃຊ້ແບບດຽວກັບແມງແຄງດູດກິນຊຸດອກພາກພິກໄທ.

3. ຄວາງວາງພາກພິກໄທ. ເປັນຄວາງວາງຂະໜາດນ້ອຍ ໂຕສິບກ້ຳຕາມ ຍາວປະມານ $1/2$ ຊັງຕີແມັດ ມີສີດຳງາງ ປົນຕາມ ໂຕ ອອກຫາກິນຕອບກາງຄືບ ສ່ວນຕອບກາງເວັ້ນລຸ່ມຕາມເຄື່ອ ພາກພິກໄທ ຕົວອ່ອນຈະກິນຢູ່ໃນຍອດອ່ອນຂອງພາກພິກໄທສ່ວນ ໂຕແກກິນຕາມໃບຂອງຕົ້ນພິກໄທ.

ການປ່ອງກັບ ແລະ ກຳຈັດ ຖ້າໂຕອ່ອນຫຳລາຍບ່ອນໃດ ໃຫ້ຕັດເອົາເຄື່ອທີ່ຖືກຫຳລາຍນັ້ນໄປເຜົາຖິ້ມ ແລ້ວໃຊ້ຢາຂ້າແມງ ໄມ້ສິດ. ໃຊ້ຢາ ເຊວິນ 85% ໃບອັດຕາສ່ວນ 1 ບ່ວງແກງຕໍ່ ນ້ຳ 20 ລິດສິດ. ສ່ວນການກຳຈັດຕົວອ່ອນນັ້ນໃຊ້ຢາ ດີອາຊິນອນ ຊະນິດຟົງປີນບັ້ງ ຊະນິດ 60% 1,5 ບ່ວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດໃຫ້ທົ່ວເຄື່ອຂອງຕົ້ນພິກໄທ.

4. ເພຍແປງ. ມີສີຂາວຄືແປງປົກຄຸມຕົວຢູ່ ດູດກິນນ້ຳ ລ້ຽງຜ່ວດອກ ໃບ ແລະ ເຄື່ອ ຖ້າຜ່ວດອກຖືກຫຳລາຍ ດ້ວຍເພຍ ແປງ ຈະໃຫ້ຊຸ່ມພາກບໍ່ສົມບູນ.

ການປ່ອງກັບກຳຈັດ ໃຊ້ຢາ ເຊວິນ 85% ແລະ ມາລາ ຊິງ ຕາມສ່ວນປະສົມແບບປ່ອງກັບແມງແຄງດູດກິນຊ່ວຍອກ.

5. ເພຍຫອຍ. ເປັນແມງໝີ່ໂຕນ້ອຍມີສີນ້ຳຕານຈະພົບ ເຫັນຕາມໃບ ລຳຕົ້ນ ດູດກິນນ້ຳລ້ຽງໃບໃບ ແລະ ເຄື່ອຖ້າມີຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຍອດພິກໄທຫຼຸດ ສະນັ້ນຈະພາຍຈະຫຼຸດລົງການປ່ອງກັບ ກຳຈັດເຊັ່ນດຽວກັບເພຍແປງ.

6. ເພຍອອນ. ເພຍຊະນິດນີ້ ຍັງຕົວນ້ອຍເທົ່າກັບຫົວ

ເຂັ້ມໝັ້ນ ມີຫຼາຍສີ ພົບເຫັນທັງສີຂຽວ ສີດຳ ທັງມີປີກ ແລະບໍ່ມີປີກ ຈະໝຸນກັນດູດກັນນ້ຳລຽງຂອງຍອດພາກພິກໄທ ຖາຫຳລາຍໃນໃບ ຈະເຮັດໃຫ້ໃບມ່ວນເຂົ້າຫາກັນແລວຫຽວ ຈະຫຼົ້ນໃນທີ່ສຸດການປ່ອງ ກັນ ແລະ ກຳຈັດໃຫ້ໃຊ້ຢາຊະນິດດຽວ ແລະ ອັດຕາດຽວກັນກັບ ເພຍແປງ.

7. ດວງພັດພາກພິກໄທ. ເປັນແມງໄມ້ໂຕນ້ອຍໆ ມີສີ ດຳ ຫົວສີເຫຼືອງ ມັກພົບເຫັນການລະບາດໃນຂອບເຂດ ກວາງ ຂວາງໃນສ່ວນພາກພິກໄທ ດວງພັດຈະກັດກິນໃບເປັນຮູບອຍໆເຮັດ ໃຫ້ໃບຫຽວ ແລວຫຼົ້ນໃນທີ່ສຸດ. ການປ່ອງກັນກຳຈັດ ໃຊ້ຢາເຊວິນ 85% 1 ບວງແກງ ຕໍ່ ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດໃຫ້ຫົວທັງໝົດ.

8. ເພຍເຕັ້ນ. ເປັນເພຍລັກສະນະເພຍຈັກຈັນ ໂຕນ້ອຍ ມີສີດຳ ມີເຂົ້າຢູ່ໂກງ ກັບຫົວ ພໍສັງເກດເຫັນເພຍເຕັ້ນ ດູດກິນນ້ຳ ລຽງຈາກໃບ ເຮັດໃຫ້ໃບມີສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີນ້ຳຕານເປັນຍອມໆ. ການປ່ອງກັນກຳຈັດ ໃຊ້ຢາ ມາລາຊິງ ຫຼື ເຊວິນ ຕາມອັດຕາທີ່ ໃຊ້ກັບແມງແຄງ ດູດກິນຊໍດອກພາກພິກໄທ.

9. ບາງພະລາຊາ. ເປັນບັງສີຂຽວ ໂຕແກ່ແມ່ນແມງກະ ສັບ ເປັນກາງຄືນ ຫຳລາຍໂດຍການກັດກິນໃບພາກພິກໄທ ເຮັດໃຫ້ໃບ ຂາດ ແລະ ເສຍຫາຍຫຼາຍ.

ການປ່ອງກັນກຳຈັດ ໃຊ້ຢາ ເຊວິນ 85% 1,5 ບວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດໃຫ້ຫົວ.

10. ຂີກະເດືອນຟອຍ. ເປັນຂີກະເດືອນນ້ອຍໆ ຊຶ່ງບໍ່ສາ

ມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແຕ່ບາງຄັ້ງອາດຈະເຫັນ ໂຕແມ່ໄດ້
ດ້ວຍຕາເປົ່າ. ການຫຳລາຍແມ່ນຢູ່ໃນຮາກເຮັດໃຫ້ຮາກເປັນ ປຸດ
ເປັນເປົ່າ ແລະບໍ່ສາມາດດູດເອົາອາຫານໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຕົນ ແລະ
ໃບຜາກພິກໄຫຼ້ອງ ການປ່ອງກັບຫຳລາຍຕົນທີ່ຖືກລົບກວບຈາກຂໍ
ກະເດືອນຝອຍ ໂດຍການຂູດເອົາຫຼັງຮາກໄປຖິ້ມແລ້ວເຜົາໄຟພ້ອມ
ຫຼັງເຜົາຂຸມທີ່ຂູດອອກແລ້ວ ດ້ວຍຫຍ້າ ຫຼື ເຜືອງແຫງ ໃຊ້ຢາຈຳ
ພວກ ເນມາໂຕໄຊ ຂາເຊັ່ນ : ເນມາບອນ ຫຼື ເຊວິດອບຊະນິດ
ເມັດ ໂຮຍໃຫ້ຫົວຂອງ ລະ 3-4 ບວງປະສົມກັບດິນ ແລ້ວຈັງປຸກ
ຜາກພິກໄຫຼ້ໃສ່ຕົ້ນ.

ພະຍາດໝາກພິກໄຫຼ້

1. ພະຍາດຮາກເນົາຂອງຜາກພິກໄຫຼ້ ເປັນພະຍາດທີ່ຫຳ
ລາຍຜາກພິກໄຫຼ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພະຍາດນີ້ມີພາຫະນະນຳມາເຊັ່ນ :
ຄົນ, ນ້ຳຫິດ, ແມງລຳຜາ ແລະ ຫອຍຫາກ. ອາການຂອງພະ
ຍາດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນໄລຍະຕົ້ນຄື : ເຄືອຈະຫຼຽວ ໃບຈະປ່ຽນ
ເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ຫຼົ້ນ. ໃບຈະຫຼົ້ນໝົດທັນພາຍໃນ 7-14 ວັນ,
ຫຼັງຈາກທີ່ສັງເກດເຫັນອາການອອກເປັນຫອນໆ ແຕຍອດລົງມາຈົນ
ເຖິງຕົ້ນເຫງົ້າ, ສັງເກດເຫັນຂໍຈະເຫຼືອງແລ້ວ ກາຍເປັນສີດຳ,
ຖ້າຂູດຕົ້ນອອກເບິ່ງກໍຈະເຫັນຮາກເນົາ ແລະ ມີກິ່ນເພັບ. ພະຍາດ
ນີ້ ເກີດຈາກເຊື້ອບັກເຕີຣີ.

ການບ້ອງກັນ

- ບໍ່ຄວນປຸກພາກພິກໄຫໄກລຳຫ້ວຍ, ຮ່ອງນ້ຳ, ຂອບສະນ້ຳ ແລະ ບ່ອນທີ່ນ້ຳຂັງ.

- ດື່ມປຸກຕອງລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ.

- ຖ້າປຸກໃນບ່ອນດື່ມຄ່ອຍ ຕອງປັບເປັນຮູບຂັ້ນໄດ

- ຄວນເຮັດທາງຍາງຮອບສ່ວນ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຜ່ານສ່ວນແລະຄວນລ້ອມຮວ້ວ. ການກຳຈັດ ຖ້າມີພະຍາດຮາກເນົາລະບາດໃນສ່ວນ ໃຫ້ເຜົາສ່ວນທີ່ເປັນພະຍາດສາໃຊ້ຢາໄດໂຟລາແທບ, ມັງແຊດ-ດີ 1 ບ່ວງກາເຟ ຕໍ່ນ້ຳ 10 ລິດ ຫຼື 2 ບ່ວງກາເຟ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດຕິນທີ່ເປັນນ້ອຍ ສ່ວນຕິນທີ່ເປັນຫຼາຍ ຕອງໄດ້ຂຸດເຜົາໄຟຖຸມ ແລ້ວໃຊ້ຢາ ແຕລາກະລໍ 100 ກຸ້ມ ໂຮຍຕ່ອງຂຸມ ຖ້າບໍ່ມີໃຊ້ປຸກຂາວ 1 ກລ ຕ່ອງກໍໄດ້ຜົນດີເຊັ່ນກັນ.

2. ພະຍາດຮາກຂາວ ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ເຂົ້າຫຳລາຍຮາກອາການຈະມີໃບເຫຼືອງແລ້ວຫຼົ້ນ ໃບບໍ່ລົດວນຮາກຈະມີເສັ້ນໄຍຂາວປົກຄຸມຢູ່. ຖ້າເປັນນ້ອຍກໍໃຫ້ຕັດສ່ວນທີ່ເປັນອອກແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ຖ້າເປັນຫຼາຍກໍອຸດຖຸມທັງຂຸມເລີຍ ໃຊ້ຢາ ແຕລາກະລໍ 3 ບ່ວງແກງ ປະສົມນ້ຳ 20 ລິດ ໃຊ້ຫຼີດຕາມບໍລິເວນຮາກ ຫຼືໃຊ້ບ່ອກໄດມິກສະເຈີຕິດ (ການກຽມ ບ່ອກໄດມິກສະເຈີ ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍສືຍາຍອບ 1 ກກ. ປະສົມກັບປຸກຂາວ 3-5 ກິໂລແລ້ວປະສົມນ້ຳ 100 ລິດ).

3. ພະຍາດຂອງພຽງກິນໃບ ພົບເຫັນເປັນຈຸດສີເຫຼືອງແດງ
ຂອງພຽງເຫຼັກ ຫຼັງໜ້າໃບ ແລະ ຫຼັງໃບ ໃຫ້ໃຊ້ ຢູ່ມາດນັ້ນ ຫຼື ຈຸດ
ເບຍ 75 ກຸ້ມຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດສິດກໍຈະແກໂຂໄດ.

ການປຸງແຕງພາກພິກໄທ ເພື່ອໃຫ້ເປັນພະລິດຕະພັນສົມຄຸນ
ຫຼື ວ່າ ເພື່ອນຳມາປຸງແຕງອາຫານ ກໍຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອໃຫ້
ພະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບ.

ວິທີການເຮັດໝາກພິກໄທຂາວ

ເກັບພວພາກພິກໄທທີ່ເຫັນວ່າມີພາກຢູ່ໃນພື້ນ ສຸກແດງດີ
ແລ້ວປະມານ 2-3 ພາກ ແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

1. ເອົາພວພາກພິກໄທສົ່ງລົງໃນກະສອບ ຖົງຜ້າ ກະຕາ
ຫຼື ກະບຽກໄດ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ ແລ້ວລວມກັນເອົາເຂົ້າໃສ່
ໃນໄຖ່ເຂົ້າສາບ ແລ້ວມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ ແລ້ວນຳກະສອບທີ່ບັນຈຸ
ພາກພິກໄທໄປແຊບນ້ຳໃຫ້ຈົມ ຄືແຊບເຂົ້າປຸກການຫຼຸດລົງເລືອກແຊບ
ໃນນ້ຳທີ່ສະອາດ ຈົ່ງຈະໄດ້ແກ່ນພາກພິກໄທສີຂາວດີ ການແຊບຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້ ຄວນແຊບໃນນ້ຳທີ່ໃສ່ ແລະ ໃຫ້ມີແກ່ນເພາະສົມທີ່ສຸດ
ຖ້າແຊບໃນນ້ຳໄຫຼ່ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 7-10 ວັນກໍເອົາອອກຈາກ
ນ້ຳໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກແຊບໃນນ້ຳທີ່ບໍ່ໄຫຼ່ອ້າງນ້ຳສ້າງ ນ້ຳບົ່ງໃຫ້ແຊບ
ມານ 5-7 ວັນ ແລ້ວກໍຈະເອົາອອກມາໄດ້ ແຕ່ຂໍສຳຄັນຕ້ອງສັງ
ເກດເບິ່ງເມັດພາກພິກໄທ ວ່າເປັນກະແກນນັ້ນບ່ອນພຸດແລ້ວຫຼືຍັງ
ໃຫ້ອອນ ແລະ ພຸດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເບົາ.

ເມື່ອເຫັນວ່າອອນເພາະສົມແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ຍົກກະສອບ ຂັນມາ
 ແລ້ວຖອກພາກພິກໄຫໃສ່ໃນກະຕຳໃຫຍ່ຫຼືກະບຸງໃຫຍ່ສາມຖົງບໍ່ໃຫ້
 ເມັດພາກພິກໄຫລອດອອກໄດ້ ແລ້ວຂົນໄປປຸງປຸຍດີຂ້າ ເພື່ອໃຫ້
 ເມັດພາກພິກໄຫຫຼດອອກຈາກຟ້ວ ແລະ ແກນຫຼຸດອອກຈາກເປືອກ
 ເມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປໄລນ້ຳ ໂດຍໃຊ້ມືຊາວໄປຊາວມາ ຫຼື
 ຄົນດວຍມື ປ່ອຍໃຫ້ການພາກ ແລະ ເປືອກຂອງແກນຟ້ອນ ແລ້ວ
 ປ່ອຍໃຫ້ອອກໄປຕາມນ້ຳ (ເຊັ່ນດຽວກັບເຮົາເອົາເປືອກຖົງຂຽວ
 ອອກເມື່ອກຽມເຮັດເຂົ້າຫຼົ້ມນັ້ນເອງ) ໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ແກນພິກໄຫຫຼ່ຍມີ
 ເປືອກລອນໆ. ຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ລະອຽດດີ ກໍ່ເອົາຂົນມາປຸງປຸຍໃໝ່ອີກ
 ເຮັດໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ແກນພິກໄຫສະອາດ ແລະ ລອນ
 ດີ. ເມື່ອໄດ້ເມັດພິກໄຫຫຼ່ຍດີແລ້ວ ກໍ່ນຳໄປຕາກໃສ່ສາດ ຫຼືລາບ
 ຕາກແລ້ວແຕ່ສະດວກ ພະຍາຍາມປັ່ນໄປມາໃຫ້ຖືກແດດ ສະພາສະ
 ເພີ່ມຄວນປະໄວໃຫ້ຄຸມດີນເກີນໄປ ເພາະແກນພາກພິກໄຫ ແທນທີ່
 ຈະຂາວສະອາດ ອາດຈະກາຍເປັນສີຂຽວ ແລ້ວລາຄາຈະຫຼຸດລົງ
 ສະນັ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີແດດໃຫ້ແຈ້ງແກນພາກພິກໄຫລອກເປືອກແລ້ວນັ້ນໄວ
 ໃບນ້ຳໃຫ້ຈົມດີກ່ອນລ້ຖາ ໂອກາດມີແດດ ຈົ່ງເອົາອອກຕາກແຕ່ກໍ່ລ້
 ຖານານເກີນກວ່າ 1-2 ວັນບໍ່ໄດ້ ຄວນຫວັດຫຼືຢາງ ຫຼື ເຮັດຢ່າງ
 ເຮົາແກນພາກພິກໄຫຈະແຫງ. ໃນເຂດສ່ວນທີ່ອາໄສນ້ຳຟ້ານ້ຳຝົນ
 ພາກພິກໄຫໄດ້ເກັບກຽວປະມານ ຕື້ອນ ຕຸລາ (10), ຖົງ
 ຕື້ອນ ຫຼື ນວາ (12) ແຕ່ວ່າຖ້າມີລະບົບຊົນລະປະທານ ພາກພິກ
 ໄຫຈະໃຫ້ພາກໄປເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນ ຈະເປັນບັນຫາເລື້ອງການຕາກ

ຈົ່ງໄດ້ສະເໜີວິທີການດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ. ຖ້າໄດ້ຕາກແດດດີໆ ປະມານ 5-6 ວັນ ກໍຈະໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ເມັດພິກໄທທີ່ເປັນແກນແຫງຈະມີສີຂາວ ເອີ້ນກັນວ່າ "ຜາກພິກໄທເມັດ ຫຼື ຜາກພິກໄທຫ້ອນ".

ກ່ອນຈະບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ເພື່ອເກັບມຽນ ຫຼື ສົ່ງຂາຍນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແກນຜາກພິກໄທແຫງດີ ໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ມປະມານ 10 % ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຟັດ ຫຼື ຫາຄວາມສະອາດ ໃຫ້ລະອຽດດີ ຈຶ່ງເກັບມຽນ ຫຼື ສົ່ງຂາຍ.

ວິທີຫັດສອບແບ່ຍັງງ່າຍໆພົບບ້ານ ກໍກໍເອົາພິກໄທແກນແຫງແລ້ວປ່ອຍມັນລອດງ່າມມີຫຼາຍຄັ້ງ ເມື່ອເຫັນວ່າມັນລອດໄດ້ດີຕິດຕາມງ່າມມີ ແລະ ເມັດມັນບໍ່ຕິດກັນ ລອດແບບມ່ອນໆຖືວ່າມັນແຫງດີໃຊ້ໄດ້.

- ວິທີຫັດສອບດ້ວຍການຫັບ ຫຼື ຂົບເບິ່ງ ຖ້າຂົບແລ້ວແຕກກະຈາຍເປັນຫຼາຍສ່ຽງ ແລະ ແຕກງາຍໝາຍຄວາມວ່າພິກໄທແກນແຫງດີ ແຕ່ຖ້າແຕກເປັນສອງສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ ຖືວ່າແກນຜາກພິກໄທຍັງບໍ່ທັນແຫງດີເທື່ອຕ້ອງໄດ້ຕາກອີກ.

- ອັດຕາການປ່ຽນຮູບຈາກຜາກພິກໄທສີເທົາເປັນຜາກພິກໄທແກນແຫງຂາວແມ່ນ 28% (100 ກິໂລດິບໄດ້ 28 ກິໂລແຫງ).

ວິທີເຮັດໝາກພິກໄທແກ່ນດຳ

ການກຽມນັກຂນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ບາງຄັ້ງຕ້ອງການແກນຜາກພິກໄທສີຂາວ ບາງຕະຫຼາດຕ້ອງການແກນຜາກ

ພິກໄທສິດກຳ ສະໄໝ ການຜະລິດກໍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປັນອັນສຳຄັນ.

ການເຮັດພາກພິກໄທແກນດຳນີ ແຕກຕ່າງຈາກແກນຂາວພິ
ສົມຄວນ ຄືເກັບເອົາພິກໄທທີ່ເຫັນວ່າແກຕັ້ງຕົວ ແຕ່ບໍ່
ໃຫມ່ພາກໃນພື້ນບໍ່ສຸກເທື່ອ ເພາະຖ້າມີພາກສຸກເຈື້ອປົນຢູ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ສິດພາກພິກໄທດຳ ມີສິດສະພາສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ
ຕົກຕ່ຳ.

ເກັບພິກໄທທີ່ແກຕັ້ງຕົວ (ແຕ່ບໍ່ໃຫມ່ພາກສຸກ) ມາ
ກອງຄວມກັນໄວ້ໃນຮົ່ມ ກອງຕະລາງ ຫຼື ຮົ່ມຊາຍຄ້າອື່ນໆ ກໍໄດ້
ຄວມກອງໃສ່ສາດຫຼັງໄວ້ແລ້ວ ບໍ່ຄວມກອງໃສ່ພື້ນດິນ ເພາະຈະບໍ່
ສະອາດ ຖ້າເປັນພື້ນຊຸມກໍຄວມຫາຄວາມສະອາດເສຍກ່ອນ ການ
ກອງໄວ້ນີ້ ກໍເພື່ອຈຸດປະສົງລັກສະນະບົ່ມພິກໄທບົ່ມເບື້ອງໃຈ
ເວລາປົ່ມປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮອບແລ້ວຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຂຽວຫຼຸດອອກຈາກຂວັນຂອງພວງາຍຂັນ ເມື່ອເຮົາ
ເຄາະ ຫຼື ຟາດອອກ.

ວິທີເຄາະ ຫຼື ຟາດເອົາເມັດພາກພິກໄທອອກ ເຮັດໄດ້ທັງ
ໃຊ້ເຄື່ອງມືເຄາະ ໄດ້ທັງການໃຊ້ປະກອບພື້ນເມືອງ.

- ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຟາດຂະໜາດນ້ອຍແບບລະດັບຄອບຄົວ ຫຼື
ສະຫະກອນກໍຊ່ວຍໃຫ້ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

- ໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບພື້ນເມືອງ ຕີໄມ້ແບບແນວໂຟ ສູງປະ
ມານ 20 ຊັງຕີແມັດ ກວາງ 1 ແມັດ ບາວ 1,5 ແມັດ ຫຼື ຂະ

ຫາດໃຫຍ່ກວ່ານກໍໄດ້ ແລະແຕ່ງອຸປະໂຫຼຸດທາງກວ້າງ ທາງສູງ ແລະ ທາງຍາວ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງຫາຕາຫາງເຫຼົ່າກຸ່ງ ຂະໜາດ ເມັດພາກພິກໂຫລອດໄດ້ ແຕ່ກາງພົວ ພາກພິກໂຫລອດບໍ່ໄດ້ ຊະນິດແທນຫາ ແລວບັນຈຸພາກພິກໂຫລບັນ, ແລວໃສ່, ເອົາຄົນຂົນ ໄປ, ໃຊ້ຕື້ນທັງສອງຂ້າງຍີ ຄືຍີ່ເຂົາ ຈົນກວ່າເມັດພິກໂຫ ຈະຫຼຸດ ອອກຈາກກາງຂອງພົວ ດານລຸ່ມຂອງເຄື່ອງຍີນ ຄວບຫາສາດຫຼືພາ ຊະນະອື່ນໆ ຫຼື ພົບຊົມງສະອາດຮອງຮັບໄວ້.

- ນຳເອົາເມັດພາກພິກໂຫທີ່ຫຼຸດແລວໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫງ ໂດຍການປັ່ນໄປນຳໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ປະມານ 4-5 ແດດຫຼັກ ກໍ ຈະກາຍເປັນສີດຳ ແລະ ແຫງດີ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ " ແກ່ນພາກພິກ ໂຫດຳ " .

- ກອບຈະບັນຈຸເພື່ອເກັບມ້ຽບ ຫຼື ສົ່ງຂາຍ ກໍຕ້ອງໄດ້ຝັດ ໃຫ້ເມັດລົບ ແລະ ສົ່ງເຈືອປົນອອກໃຫ້ເຫຼືອແຕ່ເມັດພາກພິກໂຫ ລວບໆ ຈົ່ງຈະໄດ້ພາດຕະຖານຕະຫຼາດ.

ໃຫ້ດີແທ້ ເພື່ອໃຫ້ທັງຂອງເມັດພາກພິກໂຫດຳເຫຼືອມ ແລະ ງາມດີ ກໍໃຫ້ເອົາເມັດພາກພິກໂຫທີ່ຍັງສີດຳ ຫຼັງຈາກຍີແລວບັນນາ ລວກນຳຮອນໆ ປະມານ 5 ບາທີ ແລວຈົ່ງເຊື້ ໄປຕາກແດດຕາມ ວິທີການທີ່ໄດ້ແນະນຳມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ອັດຕາການປ່ຽນຮູບຂອງພາກພິກໂຫແກ່ນດຳ ໄດ້ປະມານ 33% (ຄືພາກພິກໂຫເມັດສີດ 100 ກິໂລ ຈະໃຫ້ພາກພິກໂຫແກ່ນ ດຳແຫງ 33 ກິໂລ).

ເອກກະສານອ້າງອີງ

- ກາບປຸກພິກໄທ.

ບາງ ມັກທະນາ ບຸນນິບ, ກົມສິ່ງເສີມການກະເສດ, ຄຳ
ແບະບຳທີ 28; ປະເທດໄທ (1980).

- ສັກສິຣິ ເກີດປິດີ (1954) ກາບປຸກພິກໄທ ທັງ
ສີຄຳແບະບຳການກະເສດທີ 2, ກົມກະສິກຳ.

ການປູກກາ

ແປຮຽບຮຽງໂດຍ: ນາງຂັນແກ້ວ ອຸປະລາວັນ

: ວັນນະກອນ ພິມມະສະຖິດ



ການປຸກງາ

ງາເປັນພືດທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ເມັດເຮັດຂະຫຼົມ ຫວານຕ່າງໆ ປະກອບໃສ່ອາຫານ ແລະ ປຸງນຮູບເປັນນ້ຳມັນ ສະ ລັດປະກອບອາຫານ ນ້ຳມັນເບີຕຽມ ນ້ຳມັນໃສ່ຜົມ ສະບູ ນ້ຳອັບ ນ້ຳຫອມ ແລະ ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າອີກຫຼາຍຢ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນໃນ ລາວເຮົາ ນ້ຳມັນງາບອກຈາກໃຊ້ເປັນນ້ຳມັນໃຊ້ຂົວ, ຈົນແລ້ວຍັງ ເປັນຢາໃຊ້ຕກະດູກຂອງພໍ່ຢາພບເມືອງ.

ງາພັນເມືອງມີຢູ່ 3 ຂະນິດຄື:

1. ງາຕຳ ເມັດອ່າວຍາວ ມີເປືອກຫຸ້ມສີດຳ
2. ງາຂາວ ລັກສະນະເມັດຄືກັບງາຕຳ ແຕ່ມີເປືອກຫຸ້ມສີ ຂາວ.
3. ງາຂຸ້ນອດ ເມັດອ່າວກົມ ເປືອກຫຸ້ມສີນ້ຳຕານ ສີເທົ່າ ໃນບາງຫ້ອງຖິ້ມໃຫ້ຊ່ວາງາເຈືອງ.

ປະເພດດິນ

ງາເປັນພືດທີ່ປຸກໄດ້ໃນດິນທຸກຊະນິດ ຫຼັກການລະບາຍນ້ຳດີ ມີອົບຊີວິດຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດິນຊາຍ ແລະ ດິນດາກ (ດິນດ່າງ) ດິນທີ່ເໝາະສົມກັບການປຸກງາ ຄື ດິນຮວນປົບຊາຍມີອົບຊີວິດຫຼາຍ ບໍ່ເປັນກົດ ຫຼື ເປັນດັ່ງຈົນເກີນໄປ ແລະ ພື້ນທີ່ລວນລະບາຍນ້ຳໄດ້

ສະດວກ, ຄວບໂຖດິບ 2 ເທື່ອ ແລະ ເມື່ອໂຖແລ້ວແຕ່ລະເທື່ອ
ຕອງຕາກແດດໄວປະມານ 2-3 ແດດ ແລ້ວອາດດິບໃຫ້ແຕກແລ້ວ
ຕາກດິບອີກ 3-4 ແດດ ເພື່ອຂາເຊື້ອພະຍາດ ແມງໄມ້ ແລະວັດ
ຊະພິດທີ່ຢູ່ໃນດິນໃຫ້ຕາຍກອນ.

ລະດູແລະວິທີປູກ

ລະດູປູກງາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ຄື ຕອນທ້າຍເດືອນ ມີນາ
(3) ຫຼື ຕອນເດືອນ 4 (ເມສາ) ໃບໄລຍະນີ້ ມີຜົນຕົກລົກ
ນອຍ ຊຶ່ງເໝາະແກ່ການງອກ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີທີ່ສຸດ
ທີ່ປູກທົ່ວໄປມີ 2 ວິທີຄື :

1/- ວິທີຫວານ ເປັນວິທີທີ່ເລີຍເຮັດຢູ່ທົ່ວໄປ ເພາະສະ
ດວກທີ່ສຸດແຕ່ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ຄື ຕອນບົວລະບັດຮັກສາ ພວນດິນຫຼືກ
ຫຍາບສະດວກ ວິທີຫວານນີ້ໃນເດືອນ 1 ເຮັກຕາ ໃຊ້ເນີດພັນປະ
ມານ 18-20 ລິດ ຫຼື 22 ກິໂລ ປຶບກັບຊາຍລະອຽດ ຫຼື ຂີ້ເຖົ້າ
ໃນອັດຕາດຽວກັນກັບເນີດພັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຫວານກະຈາຍໄດ້
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສະໜ້າສະເໝີ.

2/- ການຢອດເນີດເປັນແຖວ ວິທີນີ້ສະດວກຕໍ່ການປະຕິ
ບັດຕູແລະຮັກສາການພວນດິນໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ການເກັບກຽວ, ໄລຍະ
ປູກໃຊ້ໄລຍະຫວາງແຖວ 0,5-1,0 ແມັດໄລຍະລະຫວ່າງຕ່ຳ ຫຼື
ລະຫວ່າງຂຸ່ນ 10-15 ຊ.ມ. ເມື່ອຕັ້ງໃຫຍ່ຈະຕິດກັນພໍດີເຮັດໃຫ້
ຈຳພວກວັດສະດີຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ວິທີຢອດນີ້ຈະໃຊ້ເນີດພັນ

ເຮັດຕາໜຶ່ງ 15 ກ.ກ ໂດຍໃຊ້ຈັກເຮັດເປັນຮ່ອງຕ່າງໆ ແລ້ວໂຮຍ
ເມັດລົງໄປໃຊ້ດິນຖົມບາງໆ ເມື່ອຢອດໄດ້ 3-4 ວັນ ງາຈະງອກ
ສູງປະມານ 1 ຄືບ ໃຫ້ຖອນຕົ້ນທີ່ບຽດກັນຖົມ.

ການບໍາລຸງຮັກສາ

ເມື່ອງາສູງປະມານໜຶ່ງຄືບ ຫຼື ແຕກໃບປະມານ 4-6 ໃບ
ຕ້ອງກໍາຈັດວັດສະດຸ 1 ເທື່ອ ແລະ ຈະເຮັດອີກຕາມເມື່ອຕາມງາ
ສູງປະມານ 0,5 ແມັດ.

ການເກັບກ່ຽວ

ງາພັນເມືອງທີ່ປູກທ້າຍເດືອນ 3 (ມີນາ) ຫຼື ຕົ້ນເດືອນ
4 (ເມສາ) ຈະເລີ່ມມື້ກແກ ເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນທ້າຍເດືອນ 6 (ມິ
ຖຸນາ) ຫຼື ຕົ້ນເດືອນ 7 (ກໍລະກົດ) ຫຼື ມີອາຍຸປະມານ 100-
120 ວັນ ສ່ວນງາຕ່າງປະເທດ ອາຍສັນມີອາຍຸພຽງ 50 ມ ຂນ
ໄປສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້. ບາງທ້ອງຖິ່ນທ້າຍເດືອນ 9 ຕົ້ນເດືອນ
10 ຈຶ່ງປູກ ແລ້ວໃຫ້ງາແກໃນຕອນລະດູແລງຈະເຮັດໃຫ້ງາຍ່ອມ.

ວິທີເກັບກ່ຽວ

ໃຊ້ມື ຫຼື ກ່ຽວຕັດໃຫ້ຕ່ຳຈາກງາທີ່ມີຝັກລົງມາ ປະມານ
30 ຊຸຕມ. ເມື່ອໄດ້ແລ້ວ ເອົາມາກອງຮວມກັນໄວ້ບ່ອນແຈງປະ
ມານ 2-3 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ໃບຫຼົ້ມ. ເມື່ອຫຼົ້ມແລ້ວ ມັດຮວມກັນ

ເປັນກຳໜົງ ຂະໜາດກຳໜົງ ແລ້ວອີງໃສ່ຮ່າງທີ່ຕຽມໄວ້ ໃຫ້ຍອດຊຸບ
ເທິງ ແລະ ວິທີການນຳມ້າມາອີງໃສ່ກັນເປັນພຽງ ກາງແຈງໃຫ້
ຖືກແດດເອົາຍອດຂຶ້ນຄືກັນປະຕາກແດດໄວ້ 2-3 ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເວລາແດດກາງ ເກົ່າມາຟາດໃສ່ແຜນແພທີ່ຫຼາງໄວ້ ຫຼືໃສ່ລານດິນກໍ
ໄດ້ ຫຼັງຈາກຟາດແລ້ວກໍເອົາກະດູກຟືດ ຫຼື ຮອນເອົາສິ່ງສຶກກະປົກ
ອອກແລ້ວຕາກອີກແດດໜຶ່ງໃຫ້ແຫງກອນ ເພື່ອປ່ອງກັນແມງໄມ້ທີ່ຕິດ
ຢູ່ແລ້ວເກັບໃສ່ກະສອບ ແລະ ນຳອອກຈຳໜ່າຍສູ່ຕະຫຼາດຕໍ່ໄປ.



ຮູບ 13. ເມັດໝາກກາ

ພະຍາດ ແມງໄມ້ ສັດຕູຂອງງາເທົ່າທີ່ພົບມີດັ່ງນີ້

ພະຍາດທີ່ພົບເຫັນ

1. ພະຍາດຍອດຟອຍ ມັກເປັນກັບງາທົ່ວໄປ ເມື່ອປຸກ
ແລ້ວຝົນຕົກຕັກເກັ້ນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດນີ້ ການປ່ອງກັນກໍ
ພະຍາຍາມປຸກໃນໄລຍະຝົນຮວຍລົງແດດແລ້ວ ຕອນຫາຍລະດູຝົນ ຫຼື

ເລີ່ມປຸກ ຫຼື ຫວ່າຍງາຕອບຝົນຕົກເທື່ອທີໜຶ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວ
ກອນຝົນຕົກໜັກ.

2. ບັງກິນໃບ ແລະ ຝັກ ໃຊ້ຢາ ເຊວິນ 85% 1 ບວງ
ແກງຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດ ຫຼື ຢາພວກ ໂຟດສະຕິນ ໄບດິນ 2
ບວງແກງ ຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ ສິດ.

3. ບັງກິນໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນ (ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ບັງກິນໃບ ແລະ ຝັກ).

4. ເພຍອອນ (ໃຊ້ຢາແບບດຽວກັນໃນບັງກິນໃບແລະຝັກ).

(ເອກກະສານອ້າງອີງ)

- ການປຸກງາ, ກົມສົ່ງເສີມການກະເສດ, ປະເທດໄທ
(1 9 8 0).

ການປູກຫຸ່ງສາ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກທຸ່ງສາ

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ທຸ່ງສາຊະນິດເກີດຕາມທຳມະຊາດກົກສູງເຖິງ 4 ຫາ 5 ແມັດ, ມີອາຍຸເຖິງ 10 ປີ ແຕ່ຊະນິດອາຍຸສັ້ນກົກສູງ 1 ຫາ 2 ແມັດ ແລະ ກໍມີຊະນິດໃຫຍ່ກວ່າໄວກວ່າ ແຕ່ປຸກເຖິງມີໃຫຍ່ກວ່າ 75 ຫາ 100 ວັບ.

ແກ່ນທຸ່ງສາມີນ້ຳມັນ 46% ຫາ 55%, ນ້ຳມັນທຸ່ງສາເປັນຊະນິດນ້ຳມັນບໍ່ເຫຼັ້ມແຫງມີຄວາມນັບສູງ. ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຮອນ 500 ຫາ 600 ອົງສາຊັງຕີກາດ, ບໍ່ປ່ຽນຫາດ, ບໍ່ໄຟຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂເຢັນ 18 ຫາ 0 ອົງສາຊັງຕີກາດ ກໍບໍ່ກາຍໄດ້, ບໍ່ເຊື່ອມເຂົ້າກັບນ້ຳມັນກາດ ແລະ ແອັດຊັງ. ສະນັ້ນ ນ້ຳມັນທຸ່ງສາເປັນຊະນິດນ້ຳມັນທີ່ມີພິເສດ, ໃຊ້ເປັນນ້ຳມັນຍົບ, ລົດໄຟ, ອາຍພົມ ແລະ ຊະນິດເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ.

ນ້ຳມັນທຸ່ງສາ ຍັງສາມາດປຸງແຕ່ງເຮັດຢາຂ້າແມງຫຍິບ, ເຮັດສະບູ, ນ້ຳຫອມ, ເຮັດຜູ້ ແລະ ອື່ນໆ ...

ເຫຍື່ອ ທຸ່ງສາ ຫຼັງຈາກຍົບເອົານ້ຳມັນແລ້ວຍັງເປັນຝຸ່ນໃສ່ພືດຕ່າງໆ (ແຕ່ໃຫ້ສັດກິນບໍ່ໄດ້). ນອກນັ້ນ ໃບ, ລຳຕົ້ນ, ຮາກ, ກໍມີຄຸນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ ໃບເຮັດຝຸ່ນຍົມ ແລະ ລຽງມອນ, ລຳຕົ້ນເຮັດເຈຍຮາກເຮັດເປັນວັດຖຸປະກອບເຮັດຢາ.

ເຫັນໄດ້ວ່າພາກທຸ່ງສາ ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນວຽກງານ

ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.

ດິນພ້ຳອາກາດແລະລະດູການ

ອາກາດ

ຫຼັງສາ ເປັນພືດກຳເນີດຢູ່ເຂດຮ້ອນ ສະນັ້ນ ເງື່ອນໄຂອາກາດຂອງປະເທດເຮົາແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້ ລວມແຕ່ເພາະສົມໃນການເຕີບໂຕຂອງມັນ.

ດິນ

ດິນທີ່ເພາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບປູກຫຼັງສາແມ່ນດິນຟຶງ, ດິນໝໍພືດວັດຖຸປົນຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດິນຫລະບາຍນ້ຳໄວ (ບໍ່ເປັນດິນສົມ).

ລະດູການປູກ

ຫຼັງສາປູກໄດ້ 2 ລະດູຄື ລະດູຝົນ ເດືອນ 6 ຫາເດືອນ 7, ລະດູແລງເດືອນ 10 ຫາເດືອນ 11, ຖ້າປູກແຄມແມ່ນ້ຳປູກເດືອນ 11, ຫາກປູກຕາມດິນພຽງ, ເນີນພູແມ່ນປູກເດືອນ 6 ຫາເດືອນ 7.

ການຕຽມດິນແລະວິທີປູກພົວລະບັດຮັກສາ

1. ການຕຽມດິນ

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງດິນເຊັ່ນ ດິນແຄມແມ່ນ້ຳ ບໍ່ຈຳເປັນ

ໄຖ, ຄາດ, ຫາກເປັນດິນທີ່ງ່າຍໄຖ ແລະ ຄາດສອງເທື່ອກໍ່ສາມາດປູກໄດ້, ຫາກເປັນດິນບຸກເບີກໃໝ່ ຊຶ່ງມີແຕ່ຫຼັງຫຍ້າ ຕ້ອງໄຖກ່ອນປູກຫຼັງເດືອນ, ໃກ້ຈະປູກຈຶ່ງໄຖ ແລະ ຄາດຕື່ມ. ໃນການໄຖ ຕ້ອງໄຖໃຫ້ເລິກ ແລະ ຄາດໃຫ້ລະອຽດ.


2 ວິທີການປູກ

- ເລືອກພັນຈະປູກ : ຕ້ອງເລືອກແກ່ນທີ່ໃຫຍ່; ເຕັມດີ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດ. ວິທີເລືອກພັນໃຫ້ເອົາແກ່ນສາກຫຼັງສາ ແຊບ້າໃນໄລຍະໜຶ່ງ ຫາກແກ່ນໃດຢູ່ແມ່ນບໍ່ດີແລ້ວເອົາຖິ້ມ.

- ວິທີການເລົ່າພັນໃຫ້ອກໄວ : ເລືອກພັນແລ້ວ ກ່ອນຈະປູກໃຫ້ເອົາແກ່ນພັນແຊບ້າຮອນ 30 ອົງສາຊົ່ວຕິດດ້ວຍວິທີປະສົມນ້ຳຮອນກັບນ້ຳເຢັນໃນອັດຕາ 1 ສ່ວນນ້ຳຮອນ 2 ສ່ວນນ້ຳເຢັນ, ແຊໄວ້ພາຍໃນ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວເອົາໄປປູກ ຫຼື ເອົາແກ່ນພັນບໍ່ມີກັບດິນຊາຍຊຸມໃຫ້ແຕກໜຶ່ງ ແລ້ວຈຶ່ງປູກກໍ່ໄດ້.


- ການປູກ : ຂຸມໜຶ່ງຕໍ່ 2-3 ແກ່ນ, ຂຸມເລິກ 6-8 ຊຕມ. ຖ້າເບຍຫຼັງສາຂະໜາດໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ກໍ່ຢອບເອົາກົກບ່ວງາມອອກແລ້ວປະໄວຂຸມໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ.

- ໄລຍະປູກ : ຖ້າດິນດີ ເຊັ່ນ ດິນແຄມນ້ຳ ປູກໄລຍະແຖວ 1,5-2 ແມັດ, ໄລຍະຕັນ 6-8 ຊຕມ., ຖ້າດິນບໍ່ດີປູກ 1,2 ແມັດ $\times$ 5 ຊຕມ.



ໄລຍະແຖວ 1,5-2 ແມັດ ໄລຍະຕັ້ງ 6-8 ແມັດ.

ຮູບ 14. ໄລຍະປູກ



ຮູບ 15. ການຕັດໄມ້

3. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ການໃສ່ຝຸ່ນກໍແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຂອດໜຶ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປູກ
ຫຼັກສາໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດອດສາຫະກຳ
ຈະເລີນ, ແຕ່ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດໃນປະຈຸບັນ ພວກ
ເຮົາຈະບໍ່ອໍານວຍນຳກຽວກັບການໃສ່ຝຸ່ນ.

4. ການບົວລະບັດຮັກສາ

- ການຖອນແຍກ : ຫຼັງຈາກຫຼັກສາເລີ່ມງອກໄດ້ 20 ຫາ
25 ມື້ ຕົ້ນຫຼັກສາມີ 2 ໃບ, ແຕ່ຈົນນັ້ນເປັນເວລາທີ່ເພາະສົມ ທີ່
ສຸດໃນການເລ່ມລົງມືຖອນແຍກ ໃນການຖອນແຍກ ເຮົາຄວນຄັດ
ເລືອກແຕ່ຕົ້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນແຂງແຮງດີ, ປາສະຈາກພະຍາດ ແມງ
ໄມລົບກວນ ແລະ ປະໂຫຍງຕົ້ນຕໍຂຶ້ນ.

- ການເສຍຫຍາ ແລະ ພວບດິນ : ຖ້າເຮົາຕ້ອງການ
ຜົນຜະລິດສູງ ກໍຈຳເປັນໄດ້ທຳການບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ພຽງພໍເປັນ
ຕົ້ນຄືການເສຍຫຍາ ແລະ ພວບດິນ ຄືຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ 3-4 ອາ
ທິດ ຄວນເສຍຫຍາ ແລະ ພວບດິນ, ເທື່ອທີ່ສອງຄວນເສຍຫຍາ
ແລະ ພວບດິນເມື່ອຫຼັກສາອາຍຸໄດ້ 2-3 ເດືອນ.

- ການເດັດຍອດ : ການເດັດຍອດເປັນການປະກອບ
ສ່ວນໃຫ້ພາກຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ສຸກໄວ. ການເດັດຍອດຕ້ອງ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້ :

- ເດັດຍອດເວລາຕົ້ນຫຼັກສາມີ 4-5 ໃບແທ້, ຕົ້ນສູງປະ

ມານ 30 ຫາ 40 ຊຸດ. ເດັດຍອດເວລາທຳມີຄວາມເປັນ
ແຕ່ຕົ້ນໃດອອນເພຍບໍ່ຄວນເດັດຍອດ. ນອກນັ້ນ ຖ້າຫາກຕ້ອງການ
ໃບຫຼັກສາ ເພື່ອລຽນມອບກໍຄວນເດັດໃບຈຳນວນ 1/3 ຂອງຈຳນວນ
ໃບໃນທັງຕົ້ນ, ເດັດແຕ່ໃບລຸ່ມຂຶ້ນໄປ, ເດັດໃບເດືອນທັງສອງ
ເທື່ອຄື : ໃບຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງ.

- ການກຳຈັດບັງກັບໃບຫຼັກສາ : ຫຼັກສາຫຼັກຈາກປຸກແລ່ວ
ທັງເດືອນ ບັງກັບໃບເລີ່ມທຳລາຍຕະຫຼອດ ເວລາການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົ້ນຫຼັກສາ. ວິທີກຳຈັດ ຖ້າມີແຮງງານພຽງພໍອາດຈະຈັບເອົາ
ແລ່ວເຜົາໄຟ. ການໃຊ້ຢາກຳຈັດເຊັ່ນ ຢາໂບຣອິດ 50% ຫຼື ເອສ
ໄທອອນ 25% ໃບອັດຕາ 2-3 ບວງຕໍ່ນ້ຳ 8 ລິດ ສິດໃສຕາມ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົ້ນຫຼັກສາ.

5. ການເກັບກຽມແລະເລືອກພັນ

- ເກັບກຽມ : ຍ້ອນພວກພາກຫຼັກສາບໍ່ສຸກພ້ອມກັນ ສະນັ້ນ
ຕ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງເກັບກຽມເປັນສອງຊຸດ ເວລາເຫັນພາກຫຼັກສາ
ສ່ວນຫຼາຍມີສີດຳ ແລະ ເປືອກບອກຂອງພາກເລີ່ມແຕກແຫງກໍຄວນ
ລົງມືເກັບກຽມໄດ້. ພາກທີ່ເກັບມາແລ່ວເອົາໄປຕາກແດດຈົນ ໃຫ້
ເປືອກບອກແຫງແຕກອອກເປັນແຊກແລ່ວເກັບມຽນໄດ້.

- ເລືອກເມັດພັນ : ຢາກໄດ້ແກ່ນພັນດີຕ້ອງເລືອກ 3
ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້ : ຕົ້ນໃຫຍ່ງາມດີ, ພ້ວໃຫຍ່ງາມ, ເມັດພັນໃຫຍ່
ເຕັມດີ. ເລືອກເອົາພ້ວໃຫຍ່ໃນນັ້ນແມ່ນເລືອກເອົາພາກຢູ່ກາງພ້ວ
ເພື່ອໄວ້ເຮັດແນວພັນ.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ໄດ້ກ່ຽວກັບການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາພືດຕ່າງໆ

(1979)

ກົມຄຸ້ມຄອງດິນແກ ແລະ ປູກຝັງ

ການປູກໝາກມ່ວງທີ່ມະພານ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກໝາກມ່ວງຫົມະພານ

I. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ໝາກມ່ວງຫົມະພານ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ຢູ່ໃນຕະກູນດຽວກັບ ຕົ້ນໝາກມ່ວງ. ໝາກມ່ວງຫົມະພານ ມີແຫຼ່ງກຳເນີດເກີດຂຶ້ນຢູ່ອາເມຣິກາກາງ ແລະ ອາເມຣິກາໃຕ້ ຕໍ່ມາໄດ້ມີຜູ້ນຳມາປຸກໃນອິນເດຍແລະອາຟະຣິກາກາງ. ໝາກມ່ວງຫົມະພານເປັນຕົ້ນໄມ້ເຂດຮອນ ມີປະເທດຕ່າງໆນິຍົມປຸກເຊັ່ນ : ອິນເດຍ ພາກຕາເວັນຕົກ, ຟິລິບປິນ, ອິນດູຈີນ ແລະອາຟະຣິກາຕາເວັນຕົກ - ຕາເວັນອອກ. ຕົ້ນໝາກມ່ວງຫົມະພານ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕາມຫ້າມະຊາດ ມັນບໍ່ເລືອກດິນ, ຖ້າເປັນດິນທີ່ມີຜູ້ຫຼາຍກໍຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໄວ ແລະ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະໃນດິນ ທີ່ມີຫີນປະສົມຢູ່ດ້ວຍ ຕົ້ນໝາກມ່ວງຫົມະພານກໍສາມາດງອກງາມຂຶ້ນໄດ້, ສະແດງເຖິງຄວາມທົນທານເປັນພິເສດ. ປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນໝາກມ່ວງຫົມະພານກໍມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ :

ໜ່ວຍ

ສາມາດເຮັດກວນໝາກໄມ້, ນ້ຳສົ້ມ. ສ່ວນນ້ຳຈາກໜ່ວຍໃຊ້ສຳລັບແກ່ໂລກກະເພາະອາຫານ, ແກ່ຈັບຄໍ, ແກ່ຖາຍໝັກ, ຂັບນ້ຳປັດສະວະ ແລະ ຂັບນ້ຳເຕືອ.

ເບື້ອງກເມັດ

ນຳມາສະກັດໄດ້ກົດເກັ້ມັນ, ມີພິດຕໍ່ຜົວໝັ້ງ. ແຕ່ໃຊ້ເປັນຢາ
ແກ້ໂລກຜົວໝັ້ງ, ໂລກເລືອດຕຳ, ທາງດານອຸດສາຫະກຳນຳໄປ
ເຮັດເກັ້ມກຳພິມ, ກະບຸ່ງ, ຢາງປຸກາງ, ສີຫາເຮືອນ.

ແກ່ນ

ໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານ, ໃຫ້ໂປຼຕີນສູງ ແລະ ຍ່ອຍງ່າຍ.

ໃບແລະຍອດອ່ອນ

ໃຊ້ບັນເທົາຫ້ອງບິດ, ຫ້ອງຈຸ ແລະ ລິດສະດວງ.

ໃບແກ່

ບິດໃຫລະອຽດ ໃຊ້ປົວແພໄຟໄໝ້ ຫຼືນຳມາບິດໃຫມ່ນໃຊ້ສີ
ຟ້າກໄດ້.

ຢາງຈາກເບື້ອງກວ່າຕົ້ນ

ໃຊ້ເຮັດເກັ້ມກຳພິມ, ຢາງກາວ, ເກັ້ມັນຜັດໃຫ້ເປັນເງົາເຫຼືອມ
ເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້.

ເບື້ອງກວ່າຕົ້ນ

ໃຊ້ເປັນຢາຕິແກ້ປວດຟ້າ, ຫຼື ຕົ້ມກິນແກ້ໂລກຫ້ອງຈຸ.

ຮາກ

ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຫ້ອງຈຸ, ເປັນຢາສະໝານແຜ.

ນອກຈາກແກ່ນພາຍໃນຂອງມັນ ຈະມີລາຄາດີແລ້ວ ຕົ້ນ , ໃບ ແລະ ດອກຂອງມັນກໍເປັນປະໂຫຍດຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ລຳຕົ້ນໃຊ້ເປັນ ໄມ້ປຸ້ນໄດດີ, ສ່ວນຍອດ ແລະ ດອກແມ່ນສາມາດເປັນອາຫານ ຈຳພວກຜັກ, ໝູ່ຍດິບຂອງມັນກໍໃຊ້ເປັນອາຫານຕົ້ນແກງໄດ້ສ່ວນ ແກ່ນຂອງມັນ, ຖ້າຕ້ອງການເກັບ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິດເອົາໝ້ວຍ ເພາະແກ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໝ້ວຍ, ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງໝ້ວຍຕ່າງຫາກ.


ເມື່ອປິດເອົາແກ່ນແລ້ວ, ປ່ອຍໃຫ້ໝ້ວຍຕິດຢູ່ກັບຕົ້ນ ແລະ ມັນຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປ ຕາມຫຸ້ມຂະໜາດຂອງມັນ.

ຕົ້ນໝາກມ່ວງຫົມະພານ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໝາກ, ໃບຂະໜາດ ກາງ, ການປົ່ງໃບບໍ່ປົ່ງເປັນລູ່ ແຕ່ມັນຈະປົ່ງເລື້ອຍໆໄປຕະ ຫຼອດໝົດປີ, ລຳຕົ້ນຂອງມັນ, ຖ້າຫາກເອົາມີດຟັນຈະມີຢາງໝູ່ວງ ໄຫຼອອກມາຕາມຮອຍຟັນ ແລະ ເປັນຢາງທີ່ໝູ່ວງຫຼາຍ. ເມື່ອນຳ ມາແຊບກໍແລ້ວກໍຈະໃຊ້ແທນກາວຕິດເຈຍໄດ້.

II. ການປູກ

ໝາກມ່ວງຫົມະພານຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ, ການຕັ້ງກໍ ຫຼື ຕອນ ຍັງບໍ່ມີຍົນກັນເທື່ອ ແຕ່ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກງ່ອງງາມໃນດິນທຸກ ປະເພດ.

ການປູກໝາກມ່ວງຫົມະພານ ໂດຍວິທີຫວ່ານແກ່ນໃຫ້ເປັນ ແຖວເພື່ອນການຂຸດຂຸມປູກເຊັ່ນດຽວກັນ ຄືເວັ້ນໄລຍະລະຫວ່າງຕົ້ນ ປະມານ 4 ມ. ແລະ ລະຫວ່າງແຖວປະມານ 5 ມ. ຈຶ່ງເພາະສົມ



ລະຫວ່າງຕົ້ນ 4 ມ. ລະຫວ່າງແຖວ 5 ມ.

ຮູບ 16. ການປູກ

ແລະ ຂຸມທີ່ຈະຫວ່ານແກ່ນນັ້ນ ຕ້ອງຂຸດໃຫ້ເລິກປະມານ 15 ຊຕມ. ແລວຢອດແກ່ນລົງໄປໃນຂຸມໆລະ 4-5 ແມັດ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກຈຳພວກ 5 ຊຕມ, ຂໍຄວາຍ ລົງໄປໃນຂຸມພຽງເລິກນອຍ ແລວເອົາດິນປາກຂຸມຖິ້ມ. ເມື່ອເກັບໝາກມ່ວງທີ່ມະພານຝັນດິນຂຶ້ນມາ ຫຼືລຳໝ້າຝັນດິນຂຶ້ນມາປະມານ 7,5 ຊມ. ກໍຄວນຫາຫາງປ່ອງກັນ ສັດ ຫຼື ຈົນມາຢຽບຢຳ, ໂດຍວິທີອອມຮ້ວຮອບຕົ້ນ. ແຕ່ລະຂຸມຕ້ອງປູກ, ເມື່ອລຳໝ້າຫາກສູງໄດ້ປະມານ 30 ຊຕມ. ກໍໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງ, ຂະໜາດໃຫຍ່, ແລວຫຼັກຕົ້ນທີ່ບໍ່ແຂງແຮງນັ້ນອອກປະໄວໃຫ້ເຫຼືອພຽງຂຸມລະ 1 ຕົ້ນກໍພໍ.

ຕົ້ນໝາກມ່ວງທີ່ມະພານ ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີອາຍຸປະມານ 3-4 ປີ ແຕ່ຜົນຜະລິດຍັງບໍ່ທັນຫຼວງຫຼາຍ, ຈົນກວ່າຕົ້ນຈະມີອາຍຸເຖິງ 7-8 ປີ ຈຶ່ງຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕົ້ນໜຶ່ງອາດຈະມີບໍ່ຕໍ່ກວ່າ 800-1000 ໝວຍຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບໝວຍໝາກມ່ວງທີ່

ມະຊາດທີ່ສູງ ອາດຈະເກັບອອກຂາຍໄດ້ແຕ່ບໍ່ສູ່ຈະມີລາຄາເໝາະ
ກັບພາກໃນອຸດສາຫະກຳ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການປຸກ ກໍ່ຕ້ອງຢູ່ທີ່ແກ່ນ
ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຕ້ອງການແກ່ນອອກຂາຍເປັນສິນຄ້າ ກໍ່ຈະ
ຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບວິທີແກ້ແກ່ນດ້ວຍ. ແຕ່ວິທີການແກ້ແກ່ນພາກມວງທີ່
ມະຊາດກໍ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຍາກຄື ໃຊ້ມີດບາງຫ້າມະດາ ຜ່າເປືອກແຂງ
ທີ່ຫມັ້ນນອກ, ກໍ່ຈະເຫັນນວນຂາວພາຍໃນປະກອບກັນຢູ່ 2 ຊຶ່ງ
ແລະ ເອົານວນຂາວນ້ອຍຈາກເປືອກແຂງແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ແກ່ນພາກ
ມວງທີ່ມະຊາດກໍ່ມາຄົວ ຫຼື ຂັ້ວຮັບປະທານອາຫານໄດ້ ພຽງແຕ່
ນວນຂອງມັນກໍ່ມັນບໍ່ນອຍກວ່າຖ້ວດິນ.

ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ການແກ້ແກ່ນພາຍໃນຂອງມັນອອກມາ
ເປັນອາຫານບໍລິໂພກນັ້ນ ຖ້າຫາກເຮັດບໍ່ຖືກວິທີກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບອັນ
ຕະລາຍເໝາະກັນຄືວ່າ : ຖ້າຫາກມີ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄປ
ຖືກກັບຢາງທີ່ເປືອກແຂງຂອງມັນແລ້ວ ຢາງນັ້ນອາດຈະກັດມືຂອງ
ເຮົາພອງ ແລະ ເປື່ອຍໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຮັກສາບໍ່ຫມັ້ນ. ເພາະຢາງຂອງ
ພາກມວງທີ່ມະຊາດມີພຶດ ຫຼື ມີກົດຮາຍແຮງສັ່ງກັດຢູ່ດ້ວຍ.

ວິທີປ່ອງກັນໃນໄລຍະຫຳອິດ, ເມື່ອຈະລົງຜ່າເປືອກແຂງ
ຈະຕ້ອງໃຊ້ປຸ່ນຂາວ (ປຸ່ນຄຽວ) ຫາໃສ່ມືໃຫ້ທົ່ວເສຍກ່ອນທີ່ຈະລົງ
ຜ່າເປືອກ, ເປັນການປ່ອງກັນໄດ້ວິທີໜຶ່ງ ແລະ ຄວນເລືອກຜ່າ
ເປືອກແກ່ນທີ່ຍັງສືດຢູ່ ຈະຜ່າໄດ້ງ່າຍກວ່າ.

ແກ່ນພາກມວງທີ່ມະຊາດໃນປະຈຸບັນ ນັບວ່າມີຄຸນຄ່າລາຄາ
ສົມຄວນເພາະເປັນສິນຄ້າສິ່ງອອກໄປຈຳພາຍ ໃນຕ່າງປະເທດ,

ເພາະຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນມີຫຼາຍ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນອາຫານ
ບໍລິໂພກເທົ່ານັ້ນ, ຢ່າງຈາກຕົ້ນໝາກມ່ວງຫຼືພະພານ ກໍຍັງນຳມາ
ເຮັດກາວຕິດເຈຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ວິທີການປົວລະບັດຮັກສາ ສຳລັບຕົ້ນໝາກມ່ວງຫຼືພະພານກໍ
ບໍ່ຕ້ອງເປັນໜຶ່ງເທື່ອເປັນໜຶ່ງ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊຸກຢາກຳຈັດ
ແມງໄມ ແລະ ສັດຕູພືດພຽງແຕ່ໃຊ້ວິທີກຸ້ມກອງໄຟໃຫ້ມີຄວັນແບບ
ໄລຍຸງກໍສາມາດຂັບໄລແມງໄມອອກໄປໄດ້.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

- ກະເສດຕະກຳ ເມືອງຮອນແຜນພັດທະນາ (1983)
ໂດຍ ກຸສິນ ຫຳຣິງ.

ການປູກຂ່າ

ແປແລະຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກຂ່າ

I. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຂ່າເປັນພືດຜັກທີ່ສາມາດນຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ; ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງແກງເຜັດ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນພືດເປັນຢາ ໃນການປຸງຢາພຽງເລື້ອງ.

ຂ່າມີຖິ່ນກາງເນີດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເປັນພືດພືດອາຍຸຍືນນານ, ມີກົມຫອມ ມີລຳຕົ້ນສີຂາວຢູ່ໃຕ້ດິນແຕ່ຈະອຸກາຍແລະ ໃບເທິງຜົນດິນສູງປະມານ 100-150 ຊັງຕີແມັດ ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີໃນບ່ອນທີ່ພື້ນດິນເງົາ ແລະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີໃນດິນທຸກຊະນິດ ແຕ່ພັກດິນຜຸຜົງ ແລະ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ມີຄວາມອຸ່ມຊຸ່ມພຽງພໍແຕ່ບໍ່ມັກນ້ຳຂັງ.

II. ພັນທີ່ໃຊ້ປຸກ

ເປັນພັນພືດເລື້ອງນິຍົມໃຊ້ກັນມາເຖິງນານສົມຄວນ. ສຳລັບການຂະຫຍາຍພັນ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຫຼົ່າເປັນການປຸກຂະຫຍາຍ.

III. ການຕຽມດິນ

ອຸດໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 25 - 30 ຊ.ຕມ., ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5 - 7 ວັນ, ຫວ່ານໂຮຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼືຝຸ່ນບິນໃຫ້ຫຼາຍ

ພວນດິນໃຫລະນອດ ເກັບເສດໄມ້ ແລະເສດວັດຊະພິດອອກໃຫ້
ພົກ.

IV. ການປູກ

ໃຊ້ໄລຍະລະຫວ່າງຂຸມປະມານ 70 ຊຸມ. ລະຫວ່າງ
ແຖວປະມານ 100 ຊຸມ. ຫຼັງຈາກຕຽມດິນແລ້ວ ໃຫ້ຂຸດຂຸມໂດຍ
ໃຊ້ໄລຍະປູກທີ່ໄດກຳນົດໄວ້. ຂຸດໜ້າຈາກກົກເຄົ້າຂອງເຫງົ້າ
ພອມໃຫ້ມີດິນຕິດມາກັບຮາກດ້ວຍ ໂດຍໃຊ້ສຽມແບ່ງ ແລະຄວາມ
ຍາວຂອງໜ້າຍາວປະມານ 1 ຄົບ ຫຼື 20 ຊຸມ. ພອມໃຫ້ມີດິນ
ຕິດມາພອມ. ຝັງລົງໃນຂຸມທີ່ຂຸດໄວ້ແລ້ວຂຸມລະ 2-3 ໝູ່ ຖິ້ມດິນ
ໃຫ້ເທົ່າກັບຄວາມເລິກຂອງໜ້າທີ່ຂຸດຈາກບ່ອນເດີມ ແລ້ວຫຼີດນ້ຳ
ໃຫ້ອຸ່ມ.

V. ການບົວລະບັດຮັກສາ

1. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຖ້າດິນປູກຫາກມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່
ຝຸ່ນແຕ່ຖ້າຈະໃສ່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນສຸດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 180-
300 ກິໂລ ຕໍ່ 1 ເຮັກຕາ ໃສ່ເດືອນລະເຫຼ່ອ.

2. ການຫຼີກລ້ຽງ

ໃນໄລຍະເລີ່ມປຸກໃໝ່ ຄວນຫຼີກລ້ຽງວັນລະ 1-2 ເທື່ອ
ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ ຫຼື ໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸ່ມຊຸ່ມພຽງພໍ. ຫຼັງ
ຈາກຂ້າມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີແລ້ວ ຈຶ່ງຫຼີກລ້ຽງ
2 - 3 ວັນຕໍ່ 1 ເທື່ອກໍໄດ້.

3. ການພວນດິນແລະກຳຈັດວັດຊະພຶດ

ໃນໄລຍະຫຳອິດ ຫຼັງຈາກປຸກ, ຖ້າມີວັດຊະພຶດເກີດຂຶ້ນ
ຄວນກຳຈັດໂດຍໄວນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຄວນພວນດິນຮອບໆໄພ່ເພື່ອ
ໃຫ້ດິນຜຸຜົງມີການຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ.

VI. ການເກັບກ່ຽວ

ຖ້າດິນແຫງຄວນມີການຫຼີກລ້ຽງກ່ອນເກັບກ່ຽວ. ເພື່ອສະ
ດວກຕໍ່ການຂຸດຖອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ. ສ່ວນຈະຂຸດ ຫຼື ຖອນຂ້າອອນຫຼືຂ້າແກ້ນນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ການໃຊ້ປະກອບເປັນອາຫານ ກໍຕ້ອງ
ເປັນຂ້າອອນ ແຕ່ຖ້າໃຊ້ເປັນຢາຜັນເມືອງກໍຕ້ອງເປັນຂ້າແກ້.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການປຸກຜັກກິນດອກ ແລະ ກິນຫົວ (1986)

ອຸດົມ ໂກໄສສຸກ ວ ຫ ບ. ກະສັດສາດ.

ການປູກຂົງ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກຊົງ

ຂົງເປັນພືດຜັກທີ່ໃຊ້ບໍລິໂພກສື່ດ ແລະ ນຳໄປປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນພືດເປັນຢາ ໃຊ້ປະກອບຢາພັນເມືອງ ມີລົດຊາດເຜັດຮອນ ເພາະກັບອາຫານຄົນລາວພວກເຮົາໃຊ້ປະກອບອາຫານໄດ້ທັງຄາວ ແລະ ຫວານ.

I. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຂົງເປັນພືດທີ່ມີລຳຕົ້ນເປັນເຫງົ້າສີຂາວນວນ ຢູ່ໃຕ້ດິນມີກາຍໃບທີ່ຫຸ້ມລຳຕົ້ນ, ໃບຍາວປາຍຮຽວແຫຼມ ຂົງມັກຂະຫຍາຍຕົວໃນດິນຕົມປົນຊາຍທີ່ມີລັກສະນະຟັງ, ມີອິນຊີວິດຖູ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ມີການລະບາຍນ້ຳດື ບໍ່ມັກເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນດິນຮຽວ ຫຼື ດິນຊາຍເກີນໄປ. ລະດູທີ່ເພາະສົມໃນການປຸກຂົງຄືເດືອນ ມີນາ ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ.

II. ພັນທີ່ໃຊ້ປຸກ

ຂົງທີ່ປຸກໃນປະເທດລາວເຮົາ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນພັນພັນເມືອງ, ໂດຍມີການຂະຫຍາຍພັນປຸກຕໍ່ກັນໄປເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງການຂະຫຍາຍພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໃຊ້ສ່ວນຂອງເຫງົ້າຫົວ.

III. ການຕຽມດິນ

ຊຸດ, ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 25 - 30 ຊຸຕມ., ຕາກ

ດິນໄວ້ 5 - 7 ວັນ, ໂຮຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນຍີ່ມໃຫ້ຫຼາຍພວມດິນ ແລະ ບຶດດິນໃຫລະອຽດເພື່ອໃຫ້ມັນຜຸຜົງເກັບເສດວັດຂູ່ະພິດ ຫຼື ເສດໄມອອກໃຫ້ໜີດ ແລະ ຍົກເປັນໝານ ຫຼື ບໍ່ກໍສຸດແລ້ວແຕ່.

IV. ການບຸກ

ຫຼັງຈາກຕຽມດິນແລ້ວ ໃຫ້ຂຸດຂຸມໂດຍໃຊ້ໄລຍະຫວ່າງຂຸມ 25 ຊຸດໝູ່ ແລະ ໄລຍະລະຫວ່າງແຖວ 50 ຊຸດໝູ່. ໃຊ້ຫອນພັນທີ່ຈຳ ອອກແລ້ວ, ວາງລົງໃນຂຸມໆລະ 1 ຫີວ, ໂດຍວາງຕັ້ງທີ່ແຕກ ໝູ່ຕັ້ງຂຸມ, ແລ້ວຖິ້ມດິນໃຫ້ໜາປະມານ 2-4 ຊຸດໝູ່. ໃຊ້ຫຍາແຫງ ບົກຄຸມແລ້ວທົດນ້ຳ.

V. ການບົວລະບັດຮັກສາ

1. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ໂດຍບົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົານິຍົມໃສ່ຝຸ່ນຄອກໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການຕຽມດິນແລ້ວຖິ້ມຕັ້ງຫຳອິດເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຂົງງາມ.

2. ການຫົດນ້ຳ

ຫຼັງຈາກປູກຂົງແລ້ວ ຄວນຫົດນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນໄລຍະຫຳອິດຄວນໃຫນ້າ 1-2 ເທື່ອ ເພື່ອໃຫ້ຂົງຕັ້ງຕົວໄດ້ ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃຫ້ຫົດນ້ຳພຽງວັນລະເທື່ອກໍພໍແລ້ວ.

3. ການພວນດິນແລະກຳຈັດວັດຊະພຶດ

ເມື່ອຂົງມີອາຍຸໄດ້ເຖິງ 2 ເດືອນ ຫຼັງຈາກປຸກ, ຄວນມີການພວນດິນ ແລະ ຖິ້ມຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກ 1 ເດືອນໃຫ້ພວນດິນຖິ້ມຕົ້ນອີກຄັ້ງ ຫຼັງເຖິງຈະເຮັດໃຫ້ຂົງແຕກພືດ ແລະ ກໍ່ແຂງແຮງ.

ໃນລະຫວ່າງການພວນດິນ, ຕ້ອງກຳຈັດວັດຊະພຶດໄປພ້ອມ ເລີຍເພາະວັດຊະພຶດເປັນຕົວຍາດແຍ່ງກໍ່ ແລະ ອາຫານ ນອກຈາກນີ້ວັດຊະພຶດຍັງເປັນຕົວນຳເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພຶດຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ. ເມື່ອເຮົາເຫັນວັດຊະພຶດເກີດຂຶ້ນໃນໝາກ ຄວນກຳຈັດທັນທີ.

VI. ການເກັບກ່ຽວ

ອາດຈະໃຊ້ມືຖອນ ຫຼື ເອົາຈິກຫຼືສຽມຂຸດເອົາກໍ່ໄດ້, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການເກັບກ່ຽວ, ດິນຄວນມີຄວາມຈຸ່ມຊຸ່ມພໍສົມຄວນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຖອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍອີກດ້ວຍ.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການປູກພັກກິນນອກ ແລະ ກິນຫົວ (1986).

ອຸດົມ ໂກໄສສຸກ ວ ຫ ບ ກະເສດສາດ.

ຄຸນປະໂຫຍດແລະການປຸງແຕ່ງຂີ້

ແປ ແລະຮຽບຮຽງໂດຍ: ຈັນທະວົງ
ວັນນະກອນ ພິມມະສະຖິດ

ຄຸນປະໂຫຍດແລະການປຸງແຕ່ງຂົງ

ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຂົງ

ຂົງເປັນພືດທີ່ລຸກໃນເຂດຮອບ ຕະກູນ (Zingiberaceae) ມີຊື່ທາງພຶກສາສາດວ່າ Zingiber Officinale rosae ຂຶ້ນເປັນກໍ່ຄ້າຍຂຽນ ຫຼື ຂົງ. ລຳຕົ້ນກົມໃຫຍ່ ຂະໜາດນ້ອມ ໃບຍາວຮຽວ ອອກດອກລະຫວ່າງກາຍໃບ. ຂະໜາດພືດດ້ວຍຮາກ ຫຼື ທີ່ຮອງວ່າ (" ງາຂົງ ") ຊຶ່ງເປັນຮາກສະສົມອາຫານແຕກແຫຼ່ງໃຕ້ດິນ. ມີລັກສະນະຄ້າຍນ້ອມຂົງບໍ່ແມ່ນຫົວ ແຕ່ຫາກແມ່ນລຳຕົ້ນຢູ່ໃຕ້ດິນນັ້ນເອງ ຄ້າຍຄືກັບຂົງແຕ່ຕົ້ນນ້ອຍກວ່າ ແລະ ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີແຕກຕ່າງກັນ ຂົງມີສ່ວນປະກອບສຳຄັນຄື :

1. ນ້ຳມັນທີ່ຈັບຕົວກັນ (Fixed oil) ຊຶ່ງບອກຈາກຈະປະກອບດ້ວຍ ນ້ຳມັນທີ່ໄຫວໄຂມັນ (Fatty oil) ແລະ (Unidentified resin) ຢ່າງທີ່ສາມາດຈຳແນກໄດ້ແລະຍັງມີ ເຊື່ອຂົງ (Gingerol) ຊຶ່ງມີລົດເຜີ້ດກັບຂົງ (Pungent) ມີລັກສະນະໜຽວກັນຫອມ.

2. ນ້ຳມັນທີ່ສາມາດລະເຫຼີຍໄດ້ (Volatile oil) ປະກອບດ້ວຍ Zingiberene (Sesquiterpene) d-camphene p-phellandrene Zingiberol ນ້ຳມັນທັງສອງປະເພດນີ້ ເປັນນ້ຳມັນຫອມລະເຫຼີຍຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຂົງປະມານ 1-2%.

- ສ່ວນປະກອບ : ໃນແງ່ຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ໃນ
ຂົງແກສິດ ບໍລິມາດທີ່ຮັບປະທານໄດ້ 100 ກຼາມ (g) ມີດັ່ງນີ້:

- ຄວາມອຸ່ມ	- 80,3%	
- ກາລິລີ	- 37	ກາລິລີ
- ໂປຣຕິນ	- 11	ກຼາມ (g)
- ໄຂມັນ	- 0,9	-"
- ຄາໂບໄຮເດຣດ	- 6,9	-"
- ການຊີ	- 2	ມິນລີກຼາມ(mg)
- ຟິສຟໍ	- 29	-"
- ເຫຼັກ	- 3,0	-"
- ວິຕາມິນ A	- 0	ພວຍສາກິນ
- ວິຕາມິນ B ₁	- 0,04	ມິນລີກຼາມ(mg)
- ວິຕາມິນ B ₂	- 0,05	-"
- ວິຕາມິນ C	- 4,0	-"
- ໃບອາຊິບ	- 0,6	-"

ຄຸນປະໂຫຍດແລະການປຸງແຕ່ງຊີ້ງ

ຊີ້ງເປັນຜູ້ກັກກັນດີໃນການປະກອບອາຫານຄາວ - ຄວາມ
ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປຸງເພື່ອຊ່ວຍແຕ່ງກັນ ແລະ ລົດ
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຍັງເປັນສ່ວນປະກອບໃນເກົ້າລາຕາງໆ ເພື່ອເປັນ
ຢາຮັກສາໂຮກ ໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມ (Cermivative) ເປັນຢາ

ກະຕຸ້ນປະສາດ (Stimulant).

- ຕາມຄຸນສົມບັດ ຢາໂບຮານກ່າວວ່າ : ຂົງເປັນຢາ ອາຍຸວິດທະນະ ແກໂລກປາກເປື້ອນ ຄໍເປື້ອນ ບຳລຸງໄຟທາດ, ຂັບ ເສນຫະ (ຂກະເຫ), ຂັບລົມ ເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ມີກຳລັງ ຍອຍອາ ຫານ, ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງສືດຊຸນ ແກແກນຫອງ ຈຸກສຽບ, ແກບິດ ແກປວດຮາກ ແລະ ແກນອບບໍ່ຫຼົບ ຊຶ່ງມັກໃຊ້ສ່ວນຂອງຫົວຂົງ ໃນ ການປະກອບຢາໂບຮານຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນທີ່ເປັນ ລຳໄສ້ມີກຳລັງສາມາດໃຊ້ແກ້ພະຍາດໜວ ແລະ ດອກໃຊ້ແກ້ພະຍາດຕາ ປຽກ ຈຸນອກດວຍ.

ເນື່ອງຈາກຂົງມີລົດເຜັດ ແລະ ມີນ້ຳມັນລະເຕີຍເປັນສ່ວນ ປະກອບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂົງມີຄຸນຄ່າໄປເພີ່ມການບີບຕົວ ຂອງລຳໄສ້ (Peristalsis) ຊຶ່ງເພາະສຳລັບໃຊ້ເປັນຢາກິນເຂົ້າແຊບ. ໃນອາຟະຣິກການິຍົມໃຊ້ຢາງໝຽວໆ ທີ່ຫົວຂົງຫາບໍລິເວນຫົວ ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບຫົວ ທັງນີ້ອາດເນື່ອງຈາກນ້ຳມັນລະເຕີຍແລະ ຄວາມເຜັດຮອນຂອງຂົງໄປເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂະຫຍາຍຕົວເລືອດ ລົມເດີມສະດວກ ແລະ ຖ້າໃຊ້ຂົງແຫ້ງປິ່ນໃຫ້ເປັນຜົງລະອຽດ ປະ ສົມກັບນ້ຳມັນວາເຊີລິນ ຫາບໍລິເວນ ຂໍ ຈະສາມາດລຸດອາການ ປວດຂໍ້ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຊາວອາຟະຣິກກາຍັງເຊື່ອກັນວ່າ ການກິນ ອາຫານປະກອບດ້ວຍຂົງຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ກິນຕົວແຮງ ແລະ ຊ່ວຍ ປ້ອງກັນຍຸງກັດໄດ ສ່ວນຂອງຂົງທີ່ໃຊ້ໃນທາງຢາມັກໃຊ້ຫົວຂົງແກ ແລ້ວ.

- ຂົງເວົ້າທົ່ວໄປແລ້ວ ຊາວລາວທຸກເຜົ່າຊົບຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ຮູ້ຈັກຢ່າງແຕ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ສິດ ຕາມຄວາມເຄີຍຊົບຂອງໃຜ ລາວຢູ່ແລ້ວ ການປຸກກຳພົບເຫັນຫົວຫນ້າພາຍໃນປະເທດຕາມ ປຸງແຕ່ງນັ້ນຍັງຈຳກັດຢູ່. ຂົງອາດຈະເປັນສິບຄ່າອອກຢ່າງໜຶ່ງ ຈະ ນຳລາຍໂດຍສົມຄວນໃຫ້ແກ່ປະເທດເຮົາ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຕະຫຼາດ ພາຍນອກຕ້ອງການໃບຮູບຂົງແຫ່ງ ແລະ ປະເທດທີ່ສົ່ງຊຸດຂ້າໃນ ເຂດອາຊີໄຕ້ກສັງກະໂປ, ປາກິດສະຖານ, ບັງກະລາເທດ ມາ ເລເຊຍ ອົງກົງ.

ການເຮັດຂົງແຫ້ງ

ຂົງແຫ້ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຕະຫຼາດການຄ້າ ແລະ ເຊື່ອ ກັນວ່າ ຂົງແຫ້ງມີຄຸນສົມບັດຄືກັນກັບຂົງສົດ. ຂົງແຫ້ງຂອງບາງປະ ເທດທີ່ຜະລິດສົ່ງອອກເຊັ່ນ : ອາເມລິກາ, ມິລິກສະນະງາມແລະ ມີກົບຫອມ ຂົງຂອງ ໂຄຊິນຊັນ ມີກົບຄາຍຄືກັບຜາກນາວ. ຂົງແຫ້ງ ຂອງອາຟະລິກການຸກົບຄາຍຄືກາລະບູບໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ຕາກແຫ້ງ ໂດຍບໍ່ຂຸດເປືອກ ມີລັກສະນະໜຽວຫຍຸ້ງ ມີລົດເຜັດຮອນຄື ຜາກ ພິກໄທຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂົງແຫ້ງຈາກບອນຕາງໆ, ມີກົບຕາງກັນອອກໄປ ແລະ ມີປະລິມານຂອງນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຕາງກັນນຳມອກຈາກຈະ ເປັນສິບຄ່າຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ປະສົງນຳໄປໃຊ້ໃນທາງຢາແລ້ວຂົງແຫ້ງ ຍັງໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບສຳລັບສະກັດນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍອີກດ້ວຍ.

ປະເທດອັງກິດ ອາເມລິກາ ໄດ້ກຳນົດພາດຕະຖານ ຂອງ

ຂົງແຫງໄດ້ດັງນີ້ :

ມາດຕະຖານຂົງແຫງ

<u>ສ່ວນປະກອບ :</u>	<u>ອາເມລິກາ %</u>	<u>ອັງກິດ</u>
- ແປງມີໜອຍກວ່າ	42%	-
- ກາກ (Crude fiber) ບໍ່ເກີນ	8	-
- ປຸບ (Cao (Lime)	1	-
- ນ້ຳຫລໍ່ສະກັດໄດ້ ບໍ່ໜອຍກວ່າ	12	10
- ຂົງແຫງທັງໝົດ (Total ash)		
ບໍ່ເກີນ	7	6
- ຂົງແຫງທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳ ອີໂດຣອິກ	2	-
ໜອຍກວ່າ		
- ຂົງແຫງທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳບໍ່ໜອຍກວ່າ	2	1,7
- ຫາດເຫຼົ້າ (90%) ລະລາຍໄດ້ໃນນ້ຳ		
ມາດສະກັດອອກໄດ້ ບໍ່ໜອຍກວ່າ	-	4,5
- ເອແຕລລະລາຍໄດ້ໃນນ້ຳມາດສະກັດ		
ອອກມາໄດ້ ບໍ່ໜອຍກວ່າ	4,5	-

ຖ້າເປັນຂົງແຫງເຄື່ອນດ້ວຍປຸງຂາວ. ຈະຕ້ອງມີປຸງ (Cao) ບໍ່ເກີນຮອຍລະ 4 ແລະ ຂົງແຫງ (Total ash) ບໍ່ເກີນຮອຍລະ 10, ສ່ວນປະກອບອື່ນໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານໃນຕາຕະລາງທຸກປະການ ຈຶ່ງຈະສົ່ງອອກຂາຍໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້.

ໄດ້ມີການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າພາບຂອງຂົງສິດໃນໄລຍະຕ່າງໆ ພົບ
ວ່າຂົງແກ້ຫັກໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ພະຈິກ ມີປະລິມານແປງມີຫຼາຍ
ແລະ ຂົງຖ້າຂອນຂ້າງສູງ ເມື່ອນຳມາຕາກແຫງແລ້ວ ຈະໄດ້ຂົງ
ແຫງໜັກປະລິມານແປງຕ່ຳ ແລະ ຂົງຖ້າສູງບໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະ
ຖານຈົບເພາະໃນການນຳມາເຮັດເປັນຂົງແຫງ ແຕ່ຖ້າເປັນຂົງທີ່
ເກັບໃນເດືອນ ທັນວາ ມີຫຼາຍ ຈົ່ງຈະມີປະລິມານຂອງແປງສູງຂຶ້ນ
ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍຍັງມີປະລິມານຂອງຂົງຖ້າສູງ ສະນັ້ນ ຖ້າຈະເຮັດ
ຂົງແຫງກໍຄວນພິຈາລະນາຄິດເລືອກພັນທີ່ຈະນຳມາປຸກ ເມື່ອເວລາ
ນຳມາຕາກແລ້ວຈະໄດ້ຂົງແຫງ ຖືກຕາມມາດຕະຖານ ການຊຸຂາຍ
ຂອງປະເທດຕ່າງໆ.

ວິທີເຮັດຂົງແຫງໜັກຍົກຫຼາຍເອີ້ນວ່າ : ການຕາກແບບ
ປະເທດສິລັງກາ ນັບພາຍດິ່ງການນຳຂົງທີ່ສ້າງສະອາດດີ ແລະ
ຂຸດເປືອກບອກແລ້ວໃສ່ໃນນ້ຳຮອນທີ່ຝັດປະມານ 5 ບາຕີ ແລ້ວນຳ
ມາແຜ່ຕາກແດດກາງ ຈົນຂົງແຫງທຸກ ຖ້າຕອງການໃຫ້ສີຂອງຂົງ
ງາມໃຫ້ຂຽວນ້ຳປຸນ (ປຸນຂາວ) ແລ້ວຕາກໃຫ້ແຫງອີກເທື່ອ
ວິທີດັ່ງກ່າວເປັນວິທີປະຍັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຫຼື ອາດຈະຟອກສີ
ດ້ວຍນ້ຳຢາ ຊັບເຟີໄດອອກໄຊ (SO_2) 2% ຫຼື ແປງຟອກສີ
0,5% (Bleaching Powder) ໜັກທຳດກະລໍ (Avail-
lable Chlorine) ປະມານ 70% ແຊ່ຂົງໃນນ້ຳຢາ 1 ຄົບ
ແລ້ວຈົ່ງນຳເອົາໄປຕາກແດດໃຫ້ຄວາມຮອນປະມານ 50-70 ອົງ
ສາເຊ.

ຂົງແຫ່ງທີ່ໄດ້ລັກສະນະຄ້າຍຄືຂົງແຫ່ງອາຟະອິກກາຕີ: ມີ
 ລັກສະນະຫຼຽວ ກະຍູ ກະຍີ ເລັກນ້ອຍ ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ແລະເວ
 ລາທີ່ກວ້າງແລວຈະເຫັນເສັ້ນບໍລະອຽດ ຄືກັບຂົງຈາກ ອາເມລິກາ
 ການຟອກສີດວຍແປງຟອກສີຈະໄດ້ພົບດີກວ່າ ຟອກດວຍນ້ຳຢາ ຊັ້ນ
 ເພີ່ມໂດຍອກໄຊ ການເຄື່ອນຂົງດວຍນ້ຳປຸນ (ປຸນຂາວ) ໄດ້ພົບດີ
 ພໍໃຊ້ສີຂາວຂອງປຸນຈະຊ່ວຍປິດບັງສີກຳຂອງຂົງ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງ
 ກັນຈຳພວກແມງໄມ້ໄດ ເມື່ອຕ້ອງການໃຊ້ກັນກໍເອົາຂົງ ໄປລ້າງ
 ເອົາປຸນຂາວອອກ ແລະ ຖືກຕ້ອງການຂົງຜົງ (ຜົງ) ໃຊ້ບົດ
 ຈາກຂົງທີ່ຕາກແຫ້ງຈົນກອບ ນຳມາບົດໃຫ້ລະອຽດແລວໃສ່ແກວອັດ
 ຝາໃຫ້ແໜ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ແລະ ຂົງກິນໄດ້ງ່າຍ ຄືກັບ
 ການຊົງຊາຫຼວງ ໄປ.

ການປ່ຽນຮູບອາຫານຂົງ

- ອາຫານຂົງທີ່ປ່ຽນຮູບເປັນເຄື່ອງດື່ມ ມີຊາຂົງ ແລະນ້ຳ
 ເຊື່ອມຂົງ.

ວັດຖຸດິບ

ໃບຊາ, ຂົງ, ດອກຊອນ ຜັກກາບກຳ (Menthol)
 ໃບເຕີຍ, ເປືອກຜາກກຽງ.

ການຕຽມ

1. ລ້າງຂົງແກ່ໃຫ້ສະອາດ ຊ່ວຍເປັນແຜ່ນບາງ ນຳໄປ

ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງທີ່ສຸດ ບົດພິດຕກເປັນເມັດນ້ອຍໆ ເກັບໃສ່ແກວ
ອັດຟາໃຫ້ແໜ້ນ.

2. ເປືອກໝາກກຽງ ໃບເຕີຍ ລ້າງສະອາດຊອບລະອຽດ
ດອກຊອນທັງດອກ ນຳຕາກແດດຈົນແຫ້ງ ແຍກໃສ່ແກວເກັບໄວ້.

3. ຜັກການກຳ (Menthol) ນຳມາຢ່າງ ຫຼື ຂົວຈົນ
ມີກິ່ນຫອມ ແລວບົດໃຫ້ແຫ້ງກໍພິມຄວນ ຈົ່ງເກັບໃສ່ແກວ.

ຊາຂົງ, ຈະມີກິ່ນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ : ກິ່ນດອກຊອນ, ກິ່ນ
ຜັກການກຳ, ກິ່ນໃບເຕີຍ ແລະ ກິ່ນເປືອກໝາກກຽງ.

+ ສ່ວນປະສົມຂອງ ຊາຂົງ ກິ່ນຕ່າງໆ :

- ຂົງປິ່ນ	1 ບວງຊາ
- ໃບຊາ	$\frac{1}{2}$ - "
- ກິ່ນດອກຊອນ (ດອກຊອນ)	2 ດອກ
- ກິ່ນໃບເຕີຍ (ໃບເຕີຍ)	$\frac{1}{4}$ ບວງຊາ
- ຜັກການກຳ	1/8 ບວງຊາ
- ກິ່ນເປືອກໝາກກຽງ	1/2 - "

ວິທີເຮັດ

1. ໃຊ້ເຈ້ຍຕອງບາງໆ ສຳລັບຫໍ່ໃບຊາ ຕັດເປັນ 4 ຫຼຽນ
ມີບຸກຄົນ ຫຍິບແຄມຕາມທາງຍາວບັນຈຸ ຊາ ຂົງ ກິ່ນຕ່າງໆ ຕາມ
ສ່ວນປະສົມເບື້ອງຕົ້ນ. ເນ້ນປາກຖົງທັງສອງດ້ານ ແລວພິບຮົມໃຊ້
ດ້າຍເສັ້ນໃຫຍ່ຫຍິບຕິດໂດຍຮອບໆ.

2. ເວລາຈະຊົງໄດ້ໃຫ້ເຫບ້ນໄດ້ 1 ຖ້ວຍ ຮວດເທິງຖົງ
 ຊາ ຖົງນປະໄວຍໄດ້ໜຶ່ງຈົງໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລົດຊາດຂນ
 ອາດຈະຕົ້ມນ້ຳຕານໄດ້ຕາມໃຈມັກ (ຊົງແບບດຽວກັບຊາຊະນິດຖົງ
 ທົ່ວໆ ໄປ).

ໝາຍເຫດ

ຂົງ 1-1,5 ກິໂລກຼາມ ຕາກແຫ້ງແລ້ວຈະໄດ້ ນ້ຳໜັກປະ
 ມານ 50 ກຼາມ ເມື່ອນ້ຳບັນຈຸຖົງໆ ລະ 1 ບວງຊາຈະໄດ້ປະມານ
 100 ຖົງນ້ອຍ (ພາຍເຖິງວ່າ 0,5 ກຼາມຕໍ່ ຖົງນ້ອຍ).

ໄດ້ທົດລອງບົດຊາ ຂົງ ກິໂລກຼາມ ໃຫ້ລະອຽດເປັນຜົງ
 ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນການຕັກຈາກພາຊະນະແລ້ວປຸງໄດ້ທັນທີ ປະກົດ
 ວ່າ ຂົງແຫ້ງ ແລະ ຜັກການກຳ ສາມາດບົດຈະເປັນຜົງລະອຽດ
 ໄດ້ ແລະ ຖ້າບໍ່ບັນຈຸເປັນຖົງນ້ອຍໆ ແຕ່ບັນຈຸລວມກັນໃນພາຊະນະ
 ແລ້ວ ຂົງແຫ້ງສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງພາຊະນະບັນຈຸ ສ່ວນໃບ
 ຊາ ໃບເຕີຍ, ເປືອກພາກກຽງ ແລະ ດອກຊອນ ຈະຢູ່ສ່ວນເທິງ
 ສາຍເຫດດົງກ່າວນ ເນື່ອງມາຈາກເມັດຂອງຂົງແຫ້ງ ຈະມີນ້ຳໜັກ
 ຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງນັ້ນ ການຍື່ນຈາກພາຊະນະມາຊົງນ້ຳໄດ້ ອາດເຮັດ
 ໃຫ້ບໍ່ໄດ້ສັດສ່ວນຂອງຊາຂົງ ທົດເພື່ອນກັບການບັນຈຸຊາລວມກັນ
 ໃນຖົງນ້ອຍໆ ຕາມສັດສ່ວນທີ່ກຳນົດຈະເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ນ້ຳເຊື່ອມຂົງ

ສ່ວນປະສົມ

- ຂົງແກທຍັງສິດ
- ບາ້ສະອາດ
- ບາ້ຕາບຊາຍ
- ໂຊດຽມເບບໂຊເອັດ (ຟິງໂຊດາ)

ວິທີເຮັດ

1. ລ້າງຂົງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວທັບໃຫ້ແກ້ ແລະ ຫັບໜາໆ.
2. ໃສ່ບາ້ສະອາດໃນຂົງ ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຂົງ 100 ກຸ້ມ
ບາ້ 2 ລິດ ຕົ້ມໃຫ້ຮອບດົນ 30 ນາທີ ແລ້ວຕອງ ແລະ ຕອງບາ້
໔x ຫຼັງໄວ້.
3. ໃສ່ບາ້ຕາບຊາຍໃນບາ້ ຂົງ ຫຼັງ ຫຼັງໄວ້ໃນອັດຕາສ່ວນ
ບາ້ຂົງ 3 ຖ້ວຍ, ບາ້ຕາບຊາຍ 2 ຖ້ວຍຕົ້ມຈົນບາ້ຕາບລະລາຍ
ແລ້ວຕອງແລ້ວຕົ້ມໂຊດຽມເບບໂຊເອັດ ໃນອັດຕາສ່ວນບໍ່ເກີນ
0,1% (ຟິງໂຊດາ).
4. ບັນຈຸລົງຂວດທີ່ຂາເຊອແລ້ວ ບັນຈຸຂະບະທີ່ຍັງຮອນອັດ
ແກ້ວໃຫ້ແໜ້ນ.
5. ເວລາຈະໃຊ້ຕົ້ມໃຫ້ຕົ້ມບາ້ສະອາດອີກພໍຄວນ ແລະ ໃສ່
ບາ້ກ່ອນ ເພື່ອຈະໄດ້ກັນເຢັນ.

ຂັ້ນຕອນ 3 ລົດ

ສ່ວນປະສົມ

- ຂົງອອນ 4 ຖວຍ
- ນ້ຳສັມ 1 ຖວຍ (ຖວຍແຈວ)
- ນ້ຳຕານຊາຍ 1 ຖວຍ (ຖວຍແຈວ)
- ເກືອປົ່ນ 1 ບວງໂຕະ
- ນ້ຳລ້າງ 1 ຖວຍ (ຖວຍແຈວ)
- ພາກບາວ ພໍ່ຄວນ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສົມຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍ).

ວິທີເຮັດ

1. ຂົງປອກເປືອກແລ້ວຊອຍບາງໆ ທັງສອງດ້ານບໍ່ໃຫ້ຂາດຈາກກັນ ເອບວ່າ ຂົງຍືດ ຫຼື ຈະແກະສະຫຼັກ ຊອຍຕາມໃຈຊອຍ ແລ້ວເອົາໄປແຊບກັ້ນເກືອໝໍ້ລົດເຄັມອອບໆ ຈົນຂົງອອນຕົວ.
2. ຕົ້ມນ້ຳສັມ ນ້ຳຕານ ເກືອ ນ້ຳ ຕາມສ່ວນປະສົມໃຫ້ຮອນຈັກໜ້ອຍ ແລ້ວປົງລົງຕອງດ້ວຍຜາຂາວບາງໆ ແລ້ວປະໄວໃຫ້ເປັນ.
3. ບົບຂົງຈາກນ້ຳເກືອເຊັດໃຫ້ແຫ້ງບົບພາກບາວຮວດຂົງໃຫ້ຫົວຈົນຂົງເປັນສີແດງ ນ້ຳຂົງລົງບັນຈຸໃນແກວ.
4. ຖອກສ່ວນປະສົມທີ່ຕົ້ມໄວ້ລົງໃຫ້ຖວມຂົງ ໄລ່ອາກາດ

ອອກໃຫ້ຜູ້ຕິດ ອັດໃຫ້ແທບ ເກັບໄວ້ຮັບປະທານໄດ້ດີນາມ ພິສິນ
ຄວນ.

ໝາຍເຫດ

ແກ້ວ ຫຼື ໂຖ ທີ່ບັນຈຸຂົງ ຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳໄປ
ຜັງໃບຊົງຮອບໆ 20 ບາທີ ຍົກລົງວາງໄວ້ໃຫ້ແກ້ວແຫ້ງ ຈົ່ງບັນຈຸ
ຂົງ ແລະ ສ່ວນປະສົມຕາມເປັນແລ້ວ.

ຂົງດອກເຄັມ

ສ່ວນປະສົມ

- | | |
|---------------|----------------------------|
| - ຂົງອອນ | 4 ຂິດ |
| - ເກືອປີ່ນ | $\frac{1}{4}$ ຖວຍ (ຖວຍແຈວ) |
| - ນ້ຳລ້າງ | 1-1,5 ຖວຍ |
| - ພາກບາວປະມານ | 2 ຫວຍ. |

ວິທີເຮັດ

1. ຂົງປອກເປື້ອນ ແລ້ວຊອຍບາງໆ ທັງ 2 ດ້ານບໍ່ໃຫ້
ຂາດຈາກກັນ ເອບວ່າ ຂົງຍືດ ຫຼື ຈະແກະສະຫຼັກຊອຍຕາມໃຈບຳ
ໄປແຊບກໍ່ເກືອໝໍລົດເຄັມອອບໆ ຈົນຂົງອອບຕົວ.
2. ຕັ້ມນ້ຳເກືອຕາມສ່ວນ ພໍຮອບ, ເກືອລະລາຍພຶດຕອງ
ດ້ວຍຜ້າຂາວບາງ ແລ້ວຕັ້ງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ.

3. ບິບຂົງຈາກນ້ຳເກືອ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ ບິບພາກນາວຮວດ ຂົງໃຫ້ຫົວຈົບຂົງເປັນສີ່ແດງ ແລວບິບນ້ຳພາກນາວອອກວາງຂົງຜັງ ໃຫ້ແຫ້ງ ແລວບິບຈຸໃສ່ແກວ.

4. ຖອກນ້ຳເກືອທີ່ໄວ້ລົງໃນແກ້ວ ໃຫ້ຖວມຂົງໄລ່ອາ ກາດອອກໃຫ້ພຸດ ອັດຝາໃຫ້ແໜ້ນ ເກັບໄວ້ຮັບປະທານໄດ້ດົນນານ.

ຂົງດອກເຄັມ

ສ່ວນປະສົມ

- ຂົງອອນສິດ
- ນ້ຳປາ
- ນ້ຳຕານປິບ

ວິທີເຮັດ

1. ລ້າງຂົງໃຫ້ສະອາດ ຂຸດເປືອກອອກໃຫ້ພຸດ ລ້າງອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ.

2. ຊອຍຂົງແບບຂົງຍືດ ຫຼື ຈະຊອຍເປັນ 4 ຫຼ່ຽມນ້ອຍໆ ກໍໄດ້.

3. ນຳຂົງທີ່ຊອຍແລ້ວໄປຜັງແດດ (ຕາກແດດ) ເພື່ອໃຫ້ ຫຽວ ແຕຢາຕາກຈົບແຫ້ງກອບ.

4. ຕອງນ້ຳປາ 1 ຖວຍ ນ້ຳລ້າ 1 ຖວຍ ປະສົມກັບນ້ຳ ຕານປິບ 1/2 ຖວຍ ຄາງໄຟໃຫ້ຮອນ ກະຈຳນວນນ້ຳປາເມື່ອໝົດ

ແລ້ວ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ຈະຖວມຂົງ ເມື່ອບັນຈຸໃສ່ແກ້ວ.

5. ບັນຈຸຂົງທີ່ຕາກແດດຫຽວແລ້ວນັ້ນ ລົງໃນແກ້ວພິພິດຕ່ອງຍິນ.

6. ໃສ່ນ້ຳປາທີ່ຕົ້ມໄວ້ລົງໃນຂະນະທີ່ນ້ຳປາຍັງຮ້ອນຢູ່ແລ້ວ ອັດຟາໃຫ້ແກ້ວ.

7. ພຸ້ນນ້ຳອອກຕາກແດດສະເລ່ຍ ປະມານ 15 ວັນກໍພໍໄດ້ແລ້ວ.

8. ຖ້າເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະໄດ້ລົດເຄັມຫວານພິດກອບແລະ ບໍ່ຕົກໂພ້ນ.

ຂົງແຊ່ອຸ່ມ

ສ່ວນປະສົມ

- ຂົງສົດ	1-1,5	ກິໂລກຼາມ
- ນ້ຳຕານຊາຍ	1	ກິໂລກຼາມ
- ເກືອ	$\frac{1}{2}$	ຖວຍ (ຖວຍນ້ອຍ)
- ນ້ຳປຸນໃສ		

ວິທີເຮັດ

1. ປອກເປືອກຂົງສົດ ລ້າງໃຫ້ສະອາດຊອບເປັນຮູບຕາມຕ້ອງການ ຫຼາຍປະມານ.

2. ນ້ຳເກືອ $1/2$ ຖວຍຕໍ່ນ້ຳປຸນໃສ 4 ຖວຍ ປະສົມກັນ

ຕອງໃຫ້ສະອາດ ແຊ່ຂົງຄ້າງຄົບໄວ້, ຕົ້ມເຊົ້າເອົາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ.

3. ແບ່ງນ້ຳຕານອອກ $1/2$ ກິໂລກຼາມ ກະວ່າຈະໄດ້ຈັກ ດ້ວຍ ໃຊ້ອັດຕາສ່ວນນ້ຳຕານ 1 ດ້ວຍ ຕົ້ມນ້ຳ 3 ດ້ວຍ. ຕົ້ມໃຫ້ ຮອນ ແລວຕອງໃຫ້ສະອາດປະໄວໃຫ້ເປັນ.

4. ເອົານ້ຳໃສ່ເຮືອຍ ແລວເອົາຂົງທີ່ຕຽມໄວ້ແລ້ວ ນັ້ນ ລົງແຊ່ພໍດີເຊົ້າມາ ເອົາຂົງອອກຈາກນ້ຳໃຫ້ສະເດັດດີ ແລ້ວນຳ ເອົານ້ຳດັ່ງກ່າວໄພ່ອີກ ພໍດີຄວນຕົ້ມນ້ຳຕານລົງໄປ $3/4$ ດ້ວຍຕົ້ມ ໃຫ້ຮອນ ແລ້ວປົງລົງປະໄວໃຫ້ເປັນ ແລ້ວກໍເອົາຂົງລົງແຊ່ອີກ.

5. ເຮັດແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ປະມານ 4-5 ວັນຈົນຂົງ ນ້ຳຕານ ມີລົດຫວານ ແລະ ກອບ ນຳເອົາຂົງ ແລະ ນ້ຳເຊື່ອມ ໃສ່ພື້ນກະທະທອງ ຕົ້ມນ້ຳລົງໄປອີກເລັກໜ້ອຍຂ້ອຍຈົນນ້ຳຕານຈົບເປັນ ເກັດ ນຳຂົງອອກຕາກແດດໃຫ້ຕົກເກັດແລ້ວໃສ່ກະປ່ອງ.

ໝາຍເຫດ

ຂົງທີ່ຈະແຊ່ ອັນຄວນໃຊ້ຂົງອອບ ເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ເຜັດ ຫຼາຍ ຖ້າໃຊ້ຂົງອອບຂ້າງແກ ຈະໄດ້ຂົງແຊ່ອມຫົມລົດເຜັດ ບໍ່ແຊ່ ຍ່ອຍ (ຂົງແຊ່ອມ ກໍແມ່ນຂົງຫວານນັ້ນເອງ ທີ່ໃຊ້ເປັນເຂົ້າໝີຂົງ).

ການເກັບຊີ້ໃນນ້ຳຢາ ຊັ້ນເພີ່ໄດ້ອອກໄຂ

1. ຂຸດຜົວຂົງອອກ ແລະ ລ້າງໃຫ້ສະອາດໃຊ້ທັງແຫງ.

2. ຕຽມນ້ຳຢາ ຊັບເຟີໄດອອກໄຊ 0,2% ໂດຍໃຊ້ສານ
(Metasodium bisulphite). ຕຽມນ້ຳຢາໃຫ້ຮອບ.
 3. ເອົາຂົງລົງຕົ້ມໃນນ້ຳຢານປະມານ 5 ນາທີ
 4. ເອົາຂົງທີ່ຕົ້ມແລ້ວ ແລະ ນ້ຳຢາບັນຈຸແກ້ວ ຂະນະ
ຮອນໆ ຢູ່.
 5. ເກັບໄວ້ກັບແທບຂົງສິດ.
-

ເອກກະສານອ້າງອີງ

- ການປ່ຽນຮູບຂົງ : ຄູ່ມືສົ່ງເສີມການກະເສດທີ 17, ກົມສົ່ງເສີມການກະເສດ, ປະເທດໄທ, (1980).
- ລາຍງານກິດຈະການວິທະຍາສາດ ສະບັບ 27, ເລື່ອງ
ຂົງ* (1964).
- ທຸລະລິກໂບໂອກາດຄົບຮອບ 10 ປີ ແຫ່ງການກໍ່ຕັ້ງນູບ
ນິຕິ ສ.ດຣ. ແຖມ ນິລະນິດ 1 ກໍລະກົດ (1977).

ການປູກຫົວສີໃຄ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ເພື່ອງສີ ຈັນທະລາວັນ



ການປຸກຫົວສີໃຄ

ຫົວສີໃຄເປັນພືດຜັກທີ່ສາມາດນຳມາ ປະກອບອາຫານໄດ້ ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຍັງເປັນພືດປະກອບເປັນຢາພື້ນເມືອງອີກດ້ວຍ ມີກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດ... ສາມາດນຳໄປປະກອບເປັນເຄື່ອງສຳ ອາງໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ. ມັນເປັນພືດທີ່ມີຖົນກຳເນີດໃນທະວີບອາຊີ ມີ ຍືມປຸກກັນຫຼາຍໃນປະເທດອິນເດຍ, ພະມາ ມາເລເຊຍ, ອິນ ໂດເນເຊຍ...

I. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ຫົວສີໃຄສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີໃນດິນທຸກຊະ ນິດແຕ່ພັກດິນຜົງ ມີການລະບາຍນ້ຳ ໄດ້ດີປຸກໃນປະເທດພວກເຮົາ ໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ຫົວສີໃຄເປັນພືດທີ່ມີອາຍຸເຫຼົ້າງານ, ມີລະບົບຮາກ ເປັນຟອຍຍືດຈັບຜິວດິນ. ຫົວສີໃຄຈະມີຄວາມສູງເຖິງ 1 ແມັດ, ມີລຳຕົ້ນແຫ້ງ 4-7 ຈຶ່ງຕິແມັດ ແຕ່ລຳຕົ້ນຖືກຫຸ້ມດ້ວຍກາບໃບ. ໃບຍາວແຄບ, ເສັ້ນໃບຂະໜານກັບການໃບ, ໃບຂອງຫົວສີໃຄ ດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ.

II. ພັນທີ່ໃຊ້ປຸກ

ຫົວສີໃຄທີ່ນຳມາປຸກ ເປັນພັນພື້ນເມືອງທີ່ປຸກກັນຕ່ຳໄປ.

III. ການຕຽມດິນ

ຂຸດໄຖດິນໃຫ້ເລີກປະມານ 15-20 ຊຸດ. ຕາກດິນໄວ້ 5 - 7 ວັນ ໂຮຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນປົ່ມໃຫ້ຫຼາຍ. ແລວພວນດິນໃຫ້ດິນຍິງ ແລະ ຜູ້ຟັງເພາະສົມສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ເກັບເສດວັດຊະພິດ ຫຼື ໄມ້ໃຫ້ຮຽບຮອຍ.

IV. ການປູກ

ໄລຍະປູກຂອງຫົວສີໂຄ ຄືໄລຍະລະຫວ່າງຕົ້ນ 35 ຊຸດ. ໄລຍະລະຫວ່າງແຖວ 70 ຊຸດ. ຫຼັງຈາກຕຽມດິນໄວ້ແລ້ວໃຫ້ຂຸດຂຸດຂະໜາດ 30 ຊຸດ. ຫ່າງກັນຕາມໄລຍະປູກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ນຳຫົວສີໂຄທີ່ໄດ້ຕັດໃບຮຽບຮອຍແລ້ວ ນຳປູກລົງໃນຂຸດລະ 4 ຕົ້ນ. ຟັງສ່ວນຂອງຕົ້ນໃຫ້ເລີກຈາກໝາດິນປະມານ 4-5 ຊຸດ.

V. ການບົວລະບັດຮັກສາ

1. ການໃສ່ຝຸ່ນ

ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ ພໍຕົ້ນຫົວສີໂຄຕັ້ງຕົວໄດ້ປະມານ 1 ເດືອນ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 300 ກິໂລ/ ເຮັກຕາ. ໂດຍໂຮຍໃສ່ຂ້າງຕົ້ນແລ້ວພວນດິນຖິ້ມ.

2. ການຫົດນ້ຳ

ການຫົດນ້ຳຄວນຫົດຢ່າງພຽງພໍ ໃນໄລຍະຫຳອິດໂດຍຫົດ
ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ພໍຫົວສີໃສຕັ້ງຕົວດີແລ້ວໃຫ້ຫົດນ້ຳຕອນແລງຄັ້ງ
ດຽວກໍພໍ.

3. ການພວນດິນແລະກຳຈັດວັດຊະພຶດ

ວັດຊະພຶດເປັນຕົວອັນຕະລາຍ ໃນການຍາດແຍ່ງອາຫານ
ຈາກລຳຕົ້ນ ຖ້າມີວັດຊະພຶດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຳອິດ ຄວນຮີບຖອນ
ອອກ, ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ວັດຊະພຶດທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວຂະຫຍາຍຕົວລຸກລາມກັບ
ຫົວສີໃສ ນອກຈາກນີ້ຄວນພວນດິນອ້ອມໆຕົ້ນ ແລະ ຄຸນຖິມເພື່ອ
ໃຫ້ມີການຖ່າຍເຫອາກາດໄດ້ດີ.

VI. ການເກັບກ່ຽວ

ເມື່ອຕົ້ນຫົວສີໃສເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເຕັມສ່ວນ ແລະ
ໄດ້ຂະໜາດດີແລ້ວຕາມທອງຕະຫຼາດຕອງການ, ໃຫ້ແບ່ງແລ້ງຫຼັກ
ອອກກ່ອນຈະຫຼັກຄວນຫົດນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸ່ມອຸ່ນຫຼັກໄດ້ສະ
ດວງ ບໍ່ເສຍຫາຍ, ລາງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ແລະ ນຳເອົາໄປຂາຍ
ໃນທອງຕະຫຼາດໄດ້.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

ການປຸກຜັກກິນຕອກ ແລະ ກິນຫົວ (1986)
ອຸດົມ ໂກໄສສຸກ ວ ຫ ບ. ກະເສດສາດ .

ການປູກກົກກະຖິນ

ແປຮຽບຮຽງໂດຍ: ນາງຂັນແກ້ວ ອຸປະລາວັນ

ວັນນະກອນ ພິມມະສະຖິດ



ການປຸກກົກກະຖິນ

ກົກກະຖິນເປັນພືດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ມີຂົນຢູ່ທົ່ວໄປ ຍອດ ແລະ ພາກອອນກໍສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີມປຸກກັນຕາມເຮືອນຊານບານ ຊ່ອງ, ຕາມໂຮມບ້ານສ່ວນ ຕໍ່ມາໄດ້ຜູ້ວິໄຈພົບວ່າ ໃບໃບກະຖິນ ມີໂປຣຕິນຢູ່ສູງເພາະທີ່ຈະນຳມາປັດປະສົມກັບອາຫານເພື່ອລ້ຽງສັດ ແລະ ປະກົດວ່າສາມາດໃຊ້ລ້ຽງສັດໄດ້ຜົນດີ.

ກະຖິນເປັນຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົນທີ່ປຸກງ່າຍ ທົນແລ້ງໄດ້ດີ ບໍ່ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນ ເມື່ອປຸກແລ້ວ ໃບທີ່ອົດຫຼົງບໍ່ໄດ້ ຕັດໃບເທົ່ານັ້ນ, ທົດອງການປະຕິບັດດູແລ ແລະ ການປຸກກະຖິນ ໄດ້ລົງທຶນຈັງດຽວກໍສາມາດຕັດໃບຂາຍໄປໄດ້ຫຼາຍປີ.

ພັນ

ເມັດກະຖິນບໍ່ມີຂາຍທົ່ວໄປຄືກັບພືດອື່ນໆ ຜູ້ປຸກກໍຈະເກັບແນວພັນເອງ. ຜູ້ປຸກທີ່ຕ້ອງການເຮັດສ່ວນກະຖິນ ສ່ວນຫຼາຍມັກສົ່ງພັນຈາກສ່ວນທີ່ດຳເນີນການປຸກກະຖິນຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ຮັກສາແນວພັນໄວ້ໃຫ້.

ການຕຽມດິນ

ການຕຽມດິນປຸກ ແມ່ນຄືກັນກັບຕົ້ນອື່ນໆທົ່ວໄປໂດຍການໄຖດິນຕາກໄວ້ ແລ້ວໄຖພວນປັບລະດັບໜ້າດິນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ວິທີປຸກ

ນຳເມັດກະຖິບຊຶ່ງຈະໃຊ້ປຸກພັນໃສ່ພາຊະນະ ເຊັ່ນ : ປິບ (ປິບແປງນົວ) ປະມານຂອບປິບ ຫຼື $3/4$ ປິບ ຕົ້ມນ້ຳປະມານ 1 ປິບໃຫ້ຟົດ ເອົານ້ຳຊຶ່ງຕົ້ມຟົດນັ້ນລວກເມັດກະຖິບໃນປິບແລ້ວຄົນໃຫ້ ຫົ່ວແລ້ວຈຶ່ງຖອກນ້ຳຖາມ ການທີ່ຕອງລວກເມັດກະຖິບກ່ອນນຳໄປປຸກ ພະແຈ້ງເປືອກເມັດກະຖິບແຂງຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປືອກອອນ ໃຫ້ ກ່ອນຈຶ່ງຈະປຸກງອກດີ ເມັດກະຖິບລວກແລ້ວນີ້ ເມື່ອນຳໄປປຸກຈະ ອອກງອກພາຍໃນ 7 ວັນ.

ການປຸກຄວນປຸກໃນລະດູຝົນ ເພາະເມັດກະຖິບອອກງອກດີ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ໃຊ້ໄລຍະລະຫວ່າງແຖວ 100 ຊັງຕີ ແມັດລະຫວ່າງຕັ້ງ 50 ຊັງຕີແມັດ ຢອດເມັດຂຸນລະ 6-7 ເມັດ ໂດຍອຸດຂຸນໃຫ້ເລິກປະມານ 2,5 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຢອດເມັດເອົາ ດິນຖິ້ມຂຸນບາງໆ ຫາກຖິ້ມດິນໜ້າເກີນໄປ ກໍຈະບໍ່ອອກງອກເມັດພັນ ໃຊ້ປະມານ 18 ຫາ 20 ກິໂລ ຕໍ່ເບື້ອຕູ້ປຸກ 1 ເຮັກຕາ.

ການບຳລຸງຮັກສາ

ເມື່ອເມັດງອກແລ້ວ ຕ້ອງລະວັງຢ່າໃຫ້ຕົ້ນຫຍ້າຂຸນຖວມຕົ້ນ ກະຖິບ ການພວມດິນຫຼືກຫຍ້າໃນປີທີ່ອິດທິພົນເຮັດປະມານ 3-4 ຄັ້ງ ເມື່ອກະຖິບໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະເປັນຮົ່ມຄຸມຫຍ້າບໍ່ໃຫ້ຂົນເອງສຳລັບການ ຫຼືກຫຍ້າໃນປີຕໍ່ໄປ ແມ່ນເຮັດປີລະ 1-2 ຄັ້ງກໍພໍ ຊຶ່ງແລ້ວແຕ່ສະ ຖານທີ່ປຸກ ເພາະຖ້ານີ້ຫຍ້າຂຸນຫຼາຍກໍບໍ່ສະດວກໃນການຍາງໄປຕັດ ໃບກະຖິບ.

ການຕັດງ່າແລະໃບເພື່ອໄປຕາກແຫ້ງ

ເມື່ອປູກກະຖິບອ້າຍໄດ້ປະມານ 10-12 ເດືອນກໍຈະເລີ່ມ ຕັດໃບກະຖິບ ຄັ້ງທຳອິດໄດ້, ການຕັດກະຖິບນີ້ ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ ກຽວ (ລັກສະນະຄ້າຍກຽວ ແຕ່ໃບກວ້າງກວ່າແລະບໍ່ມີຮອງແຂວ) ເພື່ອສະດວກໃນການກຽວ ແລະ ໂບນງ່າຕັດໃບເວລາດຽວກັນໄດ້ ຫຼາຍໆ ງ່າ ການຕັດງ່າແມ່ນກະໂລຍະສູງຈາກພື້ນດິນ ຂຸ່ນໄປປະ ມານ 70 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຈະຕັດຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນທຸກໆ 2 ເດືອນ. ສຳລັບລະດູຝົນກະຖິບຈະແຕກງ່າສາຂາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໃບ ອາດຈະເວັບໄລຍະໃນການຕັດກອບຮອດ 2 ເດືອນເລັກນ້ອຍກໍໄດ້ ສຳລັບໃບລະດູແລງຈະຕ່ອງຕັດ ໂດຍໃຫ້ງ່າແຕກໃຜປະມານ 3 ເດືອນ ດັ່ງນັ້ນ ໃບ 1 ປີ ຜູ້ປູກຈະຕັດກະຖິບສະເລຍ 5-6 ຄັ້ງ ໃບເນື້ອຫຼັກກະຖິບ 1 ເຮັກຕາ ຕັດຄັ້ງໜຶ່ງ ຈະໄດ້ກະຖິບຊອຍ ຕາກແຫ້ງປະມານ 1,3 - 1,5 ໂຕນ ຫາກໃບໄລຍະທີ່ຝົນຕົກ ທັກ ຈະໄດ້ນ້ຳທັກກະຖິບແຫ້ງ 1,7-2,4 ໂຕນຕໍ່ເນື້ອທີ 1 ເຮັກຕາຕໍ່ ການຕັດ 1 ຄັ້ງ ສະເລຍແລ້ວການຕັດກະຖິບໃນປີໜຶ່ງ ໄດ້ເຖິງ ເຮັກຕາລະ 7,2-13 ໂຕນ.

ເມື່ອຜູ້ປູກຕັດງ່າກະຖິບ ແລະ ຂົນອອກມາຈາກໄຮ່ແລ້ວຈະ ຮອນງ່າສິດໄວເພື່ອຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍຕໍ່ໄປ. ການຊອຍນ້ອຍຈະຊອຍ ທັງງ່າ ແລະ ໃບຮ່ວມກັນສຳລັບງ່າທີ່ຕັດໄປຊອຍໄດ້ຂະໜາດ ເສັ້ນ ຜາກາງບໍ່ຄ່ວນໃຫຍ່ກວ່າຂະໜາດຂອງສີດຳ.

ຂ່າວລະວັງ : ງ່າກະຖິນທີ່ນຳໄປຊອບ ຄວນເປັນງ່າທີ່
ອອນ ພາຍໃນຍັງບໍ່ມີເປັນໄມ້ເປັນແກນແຂງ ເພາະຖ້າມີງ່າແກນປະ
ປົບກັນໄປເມື່ອຕາກແຫ້ງແລ້ວ ນຳໄປບິດບິດເປັນອາຫານສັດລ້ຽງ
ໂດຍສະເພາະລູກໂກ ແກນໄມ້ທີ່ບິດນັ້ນຈະເປັນສັດນ ເປັນອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ກະເພາະລູກໂກ ຖ້າກະຖິນບິດສັດນຫຼາຍ ຜູ້ປຸກກໍຈະຂາດ
ລາຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີແຫຼ່ງຈຳໜ່າຍໃນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປຸກຄວນລະມັດ
ລະວັງໃນເລື່ອງນັ້ນ.

ການຊອບໃບ ແລະ ງ່າອອນຂອງກະຖິນ ຈະໃຊ້ມື ຫຼື
ເຄື່ອງມືຊອບ ເພື່ອຄວາມສະດວກກໍໄດ້ ຊຶ່ງເຄື່ອງມືຊອບລາຄາຢາຍ
ແພງ ແລະ ມີຂາຍໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ເມື່ອຊອບໃບ ແລະ
ງ່າກະຖິນອອນເປັນຕອນບ່ອຍ ແລ້ວ ກໍນຳເອົາໄປຕາກຢູ່ລຳບຸຊີ
ມັງ ຫຼື ສາດກໍໄດ້ ໂດຍເຄຍໃຫຍ່ບາງໆ ຖ້າແຕດດີ ຕາກພຽງແຕດ
ດຽວກໍອາດຈະພໍແລ້ວນຳໄປໃສ່ໃນກະເປົ້າໄວ້ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ໂຮງ
ງານບິດບິນກະຖິນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຖ້າຜູ້ປຸກບໍ່ມີລາຍຊື່ມັງກໍສາມາດຕາກ
ຢູ່ລຳບຸຊີກໍໄດ້ ແຕ່ເວລາແກ້ຍກູ ແລະ ມາຮວບຮວມໃສ່ ກະເປົ້າ
ບັນ ຢາໃຫມ່ເສດດິບຕິດໄປນຳກະຖິນທີ່ຕາກແຫ້ງແລ້ວ ໂຮງງານ
ຈະຮັບຊຸ້ ແລ້ວນຳເຂົ້າໃນເຄື່ອງບິດລະອຽດ ກະຖິນທີ່ບິດລະອຽດ
ແລ້ວ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍໆ ຣຳ.

ມາດຕະຖານຂອງໃບກະຖິນປັ້ນທີ່ດີ ຄື ດັ່ງລຸ່ມນີ້

1. ມີຄວາມຍຸ້ມຍຸ້ນໃຫຍ່ 12%

2. ມີໂປຣຕິນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 18%
3. ມີສິ່ງເຈືອປົນອື່ນໆ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 5%
4. ຄຸນນະພາບຂອງໂບກະຖິນທີ່ບິດປົນແຫ່ງ ຈະຕ້ອງມີສີຂຽວໆ ບໍ່ເປັນລັກສະນະສີນ້ຳຕານ.

ຄວາມຕ້ອງການໃບກະຖິນບົດພາຍໃນປະເທດ

ໃບກະຖິນບົດຄວາມສຳຄັນ ໃນສ່ວນປະກອບອາຫານສັດ ໂດຍສະເພາະໂຮງງານອາຫານສັດທາງອຸດົມ ກໍມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ ສຳລັບໂຮງປະສົມອາຫານຫຼັກຖິ່ນນັ້ນ ກໍມີຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນກັນ ບັນດາສະຫະກອນ, ນິຄົມຊຸກ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຜະລິດເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຄວນຜູກພັນກັບບັນດາໂຮງງານອາຫານສັດ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະອຽດກອນ ຈຶ່ງປະຕິບັດຕາມຂອດເຕັກນິກ ຂອງໂຮງງານ ແລະ ມາດຖານລາຄາຂາຍ ແລະ ບໍລິມາດທີ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງການໃນແຕ່ລະປີ ເພາະຖ້າບໍ່ຮັບໃຊ້ໃນໂຮງງານແລ້ວອາດຈະຫາຕະຫຼາດຍາກ ແລະ ສ້າງຄວາມລຳບາກແກ່ຜູ້ຜະລິດ.

ເອກກະສານອ້າງອີງ

- ການປູກກະຖິນ, ກົມສົ່ງເສີມການກະເສດ ປະເທດໄທ
(1 9 8 0).

