

ບົດທີ1

ມ້ອນພື້ນເມືອງລາວ

1.1 ຮູບຮ່າງລັກຊະນະ ແລະ ວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຕມ້ອນ

ກ. ມ້ອນແມ່ນສັດປະເພດແມງກະບີກາງຄືນ, ມີວົງຈອນຊີວິດທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:

- ໄລຍະໄຂ່ໃຊ້ເວລາ 9 – 12 ວັນ.
- ໄລຍະເປັນໂຕບົງມ້ອນໃຊ້ເວລາກິນໃບມອນ 23 - 25 ວັນ.
- ໄລຍະເປັນດັກແດ້ໃຊ້ເວລາ 7 - 9 ວັນ.
- ໄລຍະແມງກະບີໃຊ້ເວລາ 2 - 3 ວັນ.



(ຮູບວົງຈອນຊີວິດຂອງມ້ອນ)

1.2 ພື້ນມ້ອນພື້ນເມືອງ

- ມ້ອນນ້ອຍນາໝົ່ມຝັກຫລອກສີເຫຼືອງ ຫລື ຂາວ.
- ມ້ອນນາໝົ່ມຝັກຫລອກສີເຫຼືອງ ຫລື ຂາວ.

- ມ້ອນນາງພ້າຝັກຫລອກເຫລືອງ ຫລື ຂາວ (ສຳລັບມ້ອນນາງ ພ້າໄຂ່ແຕກເອງປີລະຄັ້ງ).



(ຮູບໂຕມ້ອນພື້ນເມືອງ)

1.3 ການປັບປຸງແນວພັນໂຕມ້ອນ

ການປັບປຸງແນວພັນໂຕມ້ອນ ມີຄວາມສຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫລວງຫລາຍ ດ້ານເສດຖະກິດ. ມ້ອນເປັນສັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປັບປຸງພັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຖ້າລ້ຽງພັນເກົ່າຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫລາຍປີຈະເຮັດໃຫ້ການ ລ້ຽງມ້ອນມີບັນຫາເຊັ່ນ: ມ້ອນຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຮັງຫລອກ ບາງ ຫລື ເອີ້ນວ່າ: ມ້ອນກາຍພັນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ:

ໂຕມ້ອນທີ່ຈະລ້ຽງຮັກສາພັນຕ້ອງເລືອກຈາກການລ້ຽງແບບພິເສດ, ບໍ່ໃຫ້ລ້ຽງປົນກັບມ້ອນທີ່ລ້ຽງທົ່ວໄປ, ມີການຄັດພັນມ້ອນຕ້ອງເລີ່ມຈາກ ເປັນໂຕມ້ອນ, ຝັກຫລອກ, ດັກແດ້ ແລະ ເປັນແມ່ບີ້. ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະສົມ ພັນຂ້າມກະດິ້ງ ຫລື ປະສົມພັນຂ້າມເຂດລ້ຽງຖ້າມີເງື່ອນໄຂ, ຂ້າມສາຍ ເລືອດຍິ່ງເປັນການດີ.



(ຮູບການລ້ຽງມ້ອນສຳລັບເຮັດແນວພັນ)

ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ຄຳພັນ ພັນທະວົງ.

ບັນນາທິການໂດຍ: ທ່ານ ຄຳເສີມ ມະນີວົງ.

ທ່ານ ໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ.

ທ່ານ ຄຳຜຸຍ ໄຊທາລາດ.

ອອກແບບໜ້າປົກໂດຍ: ທ່ານ ປານຕະນະ ອາລຸນສະຫວດ.

ຈັດໜ້າໂດຍ: ນາງ ສີໄພ.

ເຈົ້າຂອງ: ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ (PADETC).

- ການສາວໄໝລວມ (ສາວໄປເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ໄດ້ແຍກໄໝເປືອກໄໝປາຍ ຫລື ໄໝຍອດເລີຍເປັນໄໝປະເພດດຽວກັນ).
- ການສາວໄໝຍອດຕ້ອງມີການແຍກເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນລະຫວ່າງໄໝເປືອກ, ໄໝຍອດ ແລະ ໄໝປາຍ.

ສ. ການຮັກສາສີຂອງເສັ້ນໄໝ

ແຍກຮັງຫລອກເປື້ອນ, ຮັງທີ່ມີມ້ອນຕາຍຢູ່ໃນອອກໃຫ້ໝົດ, ປຸງນໍ້າໝໍ້ສາວໄໝຖ້າເຫັນວ່ານໍ້າໃນໝໍ້ກໍາ

ຊ. ການສາວໄໝເປືອກນອກ

ເປັນການແຍກໄໝເປືອກທີ່ບໍ່ງາມອອກ, ກ່ອນທີ່ຈະສາວໄໝຍອດ, ໄໝເປືອກມີພຽງ 15% ໃນຮັງຫລອກເທົ່ານັ້ນ

ຍ. ການສາວໄໝຍອດ.

ເປັນການຍົກຄຸນນະພາບເສັ້ນໄໝ ແບບນໍາເຄື່ອງສາວໄໝແບບປັບປຸງ, ໄໝຍອດເປັນເສັ້ນໄໝທີ່ຢູ່ທັງກາງຂອງຮັງຫລອກ, ໄໝຍອດມີປະມານ 60 – 65 % ໃນຮັງຫລອກ, ເປັນເສັ້ນໄໝທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ບົດທີ2

ມອນ

2.1 ພັນຕົ້ນມອນ

ພັນຕົ້ນມອນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວ (ຕົ້ນມອນພື້ນເມືອງ) ມີ:

- ຕົ້ນມອນແກ້ວ, ມອນຂີ້ຮີດ, ມອນນ້ອຍ, ມອນຍອດກໍາ ແລະ ມອນກິນໝາກ.



(ຮູບຕົ້ນມອນແຕ່ລະຊະນິດ)

2.2 ການເລືອກໃຊ້ພັນຕົ້ນມອນ

ກ່ອນທີ່ຈະນໍາເອົາພັນມອນໃດໜຶ່ງມາປູກໃຫ້ຄໍານຶງເບິ່ງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ກິ່ງມອນທີ່ເອົາມາເຮັດແນວພັນຕ້ອງສົມບູນບໍ່ເປັນພະຍາດ.
- ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງຂອງກິ່ງຕ້ອງມີ 1.5 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນໄປ.
- ມີອາຍຸແຕ່ 6 ເດືອນຫາ 10 ເດືອນ.
- ຂະໜາດຂອງໃບຕ້ອງປານກາງຫາໃຫຍ່.

- ຕຸ່ມຕາຕ້ອງຖື.
- ມີຄຸນຄ່າອາຫານສູງ.
- ຕັດແຕ່ງແລ້ວແຕກກິ່ງງ່າຫລາຍ.
- ທົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ.
- ປູກແລ້ວມີອາຍຸຍາວໃຫ້ໃບຫລາຍ.

2.3 ການຂະຫຍາຍພັນຕົ້ນມອນ

ຕົ້ນມອນສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ການປູກງ່າໃນສວນ ໂດຍກົງ ຫລື ການຊໍາໃນໜານ ກ່ອນເອົາ ໄປປູກ. ການຊໍາກໍນິຍົມກັນໃຊ້ 2 ວິທີຄື: ການຊໍາໃນໜານກ້າເບ້ຍ ແລະ ຊໍາໃນຖົງຢາງປາສະຕິກ

- ການປູກງ່າໃນສວນໂດຍກົງກໍສະດວກສະບາຍແຕ່ເປືອງທ່ອນພັນ, ການໃຫ້ໃບປີທໍາອິດ ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີເປີເຊັນການ ລອດຕາຍກໍຕໍ່າ (ດິນແຫ້ງແລ້ງປູກບໍ່ໄດ້).



(ຮູບປູກຕົ້ນມອນດ້ວຍກິ່ງໃນປີທໍາອິດ)

- ການຊໍາໃນໜານໃຊ້ຕົ້ນທົນຕໍ່າກ່ວາເພາະສົມກັບການຊໍາຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງຊໍາກ່ອນການ ປູກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ.

- ຂະໜາດຂອງເສັ້ນໄໝ (ກໍານົດຝັກຫລອກໃນໝໍ້ສາວ) .ການສາວເສັ້ນໄໝແມ່ນ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະລາດ ຫລື ມີຈຸດປະສົງ ຈະເອົາໄປເຮັດຫຍັງ ໂດຍທົ່ວໄປຖ້າສາວໄໝລວດກໍຈະເລີ່ມຈາກ 40 - 80 ຮັງ.

ຄ. ການຕົ້ມຮັງຫລອກ.

ການຕົ້ມຮັງຫລອກແມ່ນ ການເຮັດໃຫ້ກາວຊີລີຊິນທີ່ຕິດຢູ່ນໍ້າເສັ້ນໄໝນັ້ນລະລາຍ ເພື່ອຈະດຶງເສັ້ນໄໝອອກໄດ້. ການຕົ້ມແມ່ນອີງໃສ່ປະເພດຂອງຮັງຫລອກເຊັ່ນ:

- ຮັງຫລອກດີທໍາມະດາຕົ້ມໃນອຸນະພູມ 70 - 80 ອົງສາ.
- ຮັງຫລອກແຝດຕົ້ມໃນອຸນະພູມ 80 - 90 ອົງສາ.
- ຮັງຫລອກອົບແຫ້ງຕົ້ມໃນອຸນະພູມ 90 - 100 ອົງສາ.
- ຖ້ານໍ້າໃນໝໍ້ຕົ້ມເຢັນກ່ວາທີ່ກໍານົດໄວ້ ຈະສາວເສັ້ນໄໝບໍ່ອອກ, ຖ້ານໍ້າໃນໝໍ້ຮ້ອນເກີນກໍານົດຝັກຫລອກໃນໝໍ້ຈະເປື້ອຍ.

ງ. ການທາວເງື່ອນໄໝ.

ການທາວເງື່ອນໄໝແມ່ນ ການຈັບສົ້ນ ຫລື ເງື່ອນເສັ້ນໄໝໃນຝັກຫລອກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນໄມ້ຄົບເພື່ອຂີດເອົາເງື່ອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ການຈັບສົ້ນເສັ້ນໄໝສະໝໍ່າສະເໝີຈະໄດ້ເສັ້ນໄໝລັງສະໝໍ່າສະເໝີເຊິ່ງສັບຂອງການສາວໄໝເອີ້ນວ່າເສັ້ນໄໝເລິງງາມ).

ຈ. ການສາວເສັ້ນໄໝ.

ການສາວໄໝມີ 2 ວິທີຄື:

ຂ.ສູດຄິດໄລ່ນໍ້າໜັກໄໝດິບຫລັງຈາກຮູ້ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝແລ້ວ

ນໍ້າໜັກຮັງຫລອກເຕັມ X ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ

ນໍ້າໜັກໄໝດິບ=

100

3.12 ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການສາວໄໝ

- ກ່ອນຈະເກັບຮັງຫລອກນໍາມາສາວເສັ້ນໄໝໃຫ້ສັງເກດວ່າໂຕມ້ອນກາຍເປັນດັກແດ້ ຫລື ຍັງມ້ອນຈະກາຍເປັນດັກແດ້ໃນມື້ທີ 5 (ນັບຈາກມື້ເອົາເຂົ້າຈໍ)
- ບໍ່ຄວນສາວເສັ້ນໄໝກ່ອນທີ່ໂຕມ້ອນບໍ່ທັນເປັນດັກແດ້ (ຝັກຫລອກບໍ່ທັນແຂງ).
- ດັກແດ້ມ້ອນມີອາຍຸໃນຝັກຫລອກພຽງແຕ່ 7 – 9 ວັນ ຈາກນັ້ນກໍຈະກາຍເປັນແມ່ບີ້ໝົນຝັກຫລອກອອກມາ.

ກ. ກຽມອຸປະກອນການສາວເສັ້ນໄໝ

ເຕົາ, ໝໍ້ຕົ້ມຮັງຫລອກ, ໝາກຄ້ວງ (ເຄື່ອງສາວໄໝ), ໄມ້ຄີບ, ຈອງຕາຫລົວ, ຊາມ, ອັກປັ່ນໄໝ, ເຄື່ອງເຮັດປອຍໄໝ, ຝ້າຍໄໝໄໝ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ.

ຂ. ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການສາວເສັ້ນໄໝ.

ກ່ອນການລົງມືສາວເສັ້ນໄໝຕ້ອງຄັດເລືອກຮັງຫລອກກ່ອນເຊັ່ນ: ຮັງ ຫລອກທີ່ລົມບູນດີ (ງາມ) ,ແຝດ, ດ້ານ, ຜິດຮູບປະພັນ, ເປື້ອນ, ໜອນແມງວັນເຈາະໃຫ້ແຍກສາວຄົນລະຄັ້ງ.

- ການຊໍາໃນຖົງຢາງປາສະຕິກໃຊ້ທຶນຕົ້ນສູງຕ້ອງທົດນໍ້າສໝໍ້າສະເໝີ ແຕ່ສະດວກເວລາຂົນສົ່ງເປີເຊັນການລອດຕາຍກໍສູງ.



(ຮູບໜານຊໍາມອນ)

2.4 ເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດສວນມອນ

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງສະພາບຂອງດິນຕ້ອງເປັນດິນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ດິນຊາຍປົນດິນໜຽວ (ດິນແຄມນໍ້າ) $pH > 5$ ມີໜ້າດິນເລິກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1 ແມັດເປັນດິນຊຸ່ມຊື່ນ ເໝາະສົມດີ (ບໍ່ແຫ້ງແລ້ງເກີນໄປ, ນໍ້າບໍ່ຂັງ).

ສວນມອນຕ້ອງບໍ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຫລາຍຈົນເກີນໄປດີທີ່ສຸດບໍ່ຄວນເກີນ 1 ກິໂລແມັດເພາະຈະບໍ່ສະດວກໃນການຂົນສົ່ງໃບມອນ (ສິ້ນເປືອງແຮງງານ,ໃບມອນຫ່ຽວ) ສວນມອນບໍ່ຄວນຢູ່ໄກເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຈົນເກີນໄປເພື່ອຫລີກເວັ້ນການຕິດເຊື້ອພະຍາດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການລ້ຽງມ້ອນມ້ອນ ແລະ ຢາຂ້າພະຍາດຕ່າງໆ.



(ຮູບເຮືອນລ້ຽງມ້ອນກັບສວນມອນ).

2.5 ການວາງແຜນປູກຕົ້ນມອນ

ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານແຮງງານ (ຕ້ອງວາງແຜນ) ຈະລ້ຽງມ້ອນເປັນປະເພນີ, ລ້ຽງເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເສີມ ຫລື ລ້ຽງເປັນອາຊີບຫລັກ.

- ລ້ຽງມ້ອນ 1 ແຜ່ນມີຈຳນວນ 20 000 ໂຕຕ້ອງການມີສວນມອນ 1 ໄລ່ຖ້າຈະລ້ຽງ 1 ແຜ່ນ ແຕ່ລະເດືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງມີສວນມອນຫລາຍກ່ວາ 1 ໄລ່ (ຖ້າເອົາແນວພັນໄວ້ 1 ແມ່ປີລ້ຽງແຕ່ນ້ອຍຈົນມ້ອນ ເຮັດຮັງຈະໝົດໃບມອນປະມານ 5 - 6 ກິໂລ (ສຳລັບມ້ອນພື້ນເມືອງ) ແຕ່ຢ່າລືມຄຳນຶງເຖິງ ປັດໃຈ 3 ຢ່າງ ເຊັ່ນ:

- ແຮງງານລ້ຽງມ້ອນສາວໄໝ.
- ປະລິມານໃບມອນທີ່ມີໃນສວນ.
- ອຸປະກອນການລ້ຽງ, ເນື້ອສຳລັບລ້ຽງມ້ອນ.

- ມ້ອນເຮັດຮັງໄດ້ 2 ວັນ ໃຫ້ເລິກຜ້າປົກຈຳອອກໃຫ້ອາກາດລ່ວງອາກາດແຫ້ງເພາະສົມຝັກຫລອກຈະສາວງ່າຍ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫລາຍຝັກຫລອກສາວຍາກ.
- ຄວນໃຊ້ເຕົາຖ່ານຫລຸດຄວາມຊຸ່ມເວລາຝົນຕົກໜັກ.

3.10 ສາຍເຫດການເກີດພະຍາດ ແລະ ສັດຕູອື່ນໆຂອງໂຕມ້ອນ

ກ. ເກີດຈາກສິ່ງບໍ່ມີຊີວິດ

- ໄດ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ອາຍພິດຈາກສານເຄມີຕ່າງໆ.
- ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານໃບມອນ ຫລື ການບົວລະບັດຮັກສາລ້ຽງເກືອພາໃຫ້ເກີດບາດແຜເປັນຕົ້ນ.

ຂ. ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

- ໄດ້ແກ່ຈຸລິນຊີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຊື້ອລາ, ແບກເຕີເລຍ, ໄວລັສ, ໂປໂລໂຕຊົວ ລວມທັງສັດອື່ນໆເຊັ່ນ: ແມງວັນລາຍ, ມົດ, ໝູ, ຈີໂກະ, ຈີຈຽມ ...

3.11 ສູດຄິດໄລ່ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝໃນຮັງຫລອກ ແລະ ໄໝດິບ

ກ. ສູດຄິດໄລ່ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝໃນຮັງຫລອກ.

ນ້ຳໜັກປັດກຫລອກເປົ່າ

$$\text{ເປີເຊັນເສັ້ນໄໝ} = \frac{\text{ນ້ຳໜັກປັດກຫລອກເປົ່າ}}{\text{ນ້ຳໜັກຮັງຫລອກເຕັມ}} \times 100$$



(ຮູບມ້ອນສຸກ)

3.9 ການເກັບມ້ອນສຸກເຂົ້າຈໍ່ ແລະ ການດູແລຮັກສາ.

- ເກັບມ້ອນສຸກໃຫ້ທັນເວລາຖ້າຊັກຊ້າມ້ອນຈະພົນໄຍຖິ້ມຈະໄດ້ຝັກຫລອກບາງ.
- ເກັບມ້ອນສຸກເຂົ້າຈໍ່ໃຫ້ພໍດີໃນອັດຕາສ່ວນປະມານ 600 ໂຕຕໍ່ 1 ຕາແມັດ.
- ຍິ່ງໃສ່ມ້ອນໃນແຕະຈໍ່ຕຶບເທົ່າໃດ ຍິ່ງມີໂອກາດໄດ້ຮັງແຜດ, ຜິດຮູບປະພັນຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
- ຖ້າໃສ່ບາງເກີນໄປກໍເປັນການເປືອງເນື້ອທີ່ແຕະ.
- ໃສ່ຈໍ່ໃນອັດຕາພໍດີແລ້ວໃຊ້ຜ້າປົກປິດປະຕູຕ້ອງການຄວາມມືດ.
- 1 ວັນຕໍ່ມາກວດກາເບິ່ງໂຕທີ່ບໍ່ເຮັດຮັງ, ໂຕຕາຍອອກຈາກຈໍ່.
- ຄວບຄຸມອຸຫະພູມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ 23 - 24 ອົງສາເຊ.
- ຄວາມຊຸ່ມທີ່ເໝາະສົມ 60 - 70%.

4 ການນຶດການໃຊ້ແຮງງານກິດຈະກຳປູກຕົ້ນມອນ

4 ໄລຍະການປູກ:

- ໄລຍະຕົ້ນ 0.75 ມ ໄລຍະແຖວ 1.5 ມ (ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ).
- ໄລຍະຕົ້ນ 0.75 ມ ໄລຍະແຖວ 2 ມ (ການໃຊ້ລົດໄຖນ້ອຍ).
- ໄລຍະຕົ້ນ 0.75 ມ ໄລຍະແຖວ 2.5 ມ (ການໃຊ້ລົດໄຖກາງ).
- ໄລຍະຕົ້ນ 0.75 ມ ໄລຍະແຖວ 3 ມ (ການໃຊ້ລົດໄຖໃຫຍ່)
- ໄລຍະຕົ້ນ 1 ມ ໄລຍະແຖວ 1 ມ (ສຳລັບດິນຄ້ອຍຊັນ).

4 ສູດຄິດໄລ່ເບ້ຍມອນໃນສວນ

ເນື້ອທີ່ (ຕາແມັດ).

$$\text{ຈຳນວນເບ້ຍມອນໃນເນື້ອທີ່ຈະປູກ} = \frac{\text{ເນື້ອທີ່ (ຕາແມັດ)}}{\text{ໄລຍະຕົ້ນ (ແມັດ) X ໄລຍະແຖວ (ແມັດ)}}$$

2.6 ການກຽມດິນປູກມອນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂຕ້ອງໂຖຄາດພວນດິນເສຍກ່ອນຈຶ່ງຊຸດຊຸມ ຫລື ຮ່ອງແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ.

- ຊຸດຊຸມຂະໜາດ 40 ຊມ X 40 ຊມ ເລິກ 40 ຊມ.
- ຊຸດຮ່ອງຂະໜາດກ້ວາງ 40 ຊມ X 40 ຊມ ເລິກ 40 ຊມ ຄວາມຍາວ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການໃນຊຸມ ຫລື ຮ່ອງທີ່ກຽມນັ້ນຕ້ອງເອົາເສດພືດ, ເພື່ອງເຂົ້າລົງຫລາຍພໍສົມຄວນຈົນເກືອບ

ເຕັມ, ເອົາຝຸ່ນຄອກໂຮຍໃສ່ ,ໂຮຍປູນຂາວລົງໄປ ອີກຖົມດິນໃຫ້ ເຕັມປະໄວຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນຂຶ້ນ ໄປ (ເພາະໄລຍະ 30 ວັນ ເປັນການຍ່ອຍສະລາຍຂອງເສດພືດ, ເປັນໄລຍະແຜງຄວາມຮ້ອນ ຖ້າປູກຕົ້ນມອນໄລຍະນີ້ຕົ້ນມອນຈະຕາຍ.



(ຮູບສວນມອນທີ່ປູກເປັນແຖວ).

2.7 ລະດູການ - ການປູກຕົ້ນມອນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດປູກຕົ້ນມອນໄດ້ທຸກລະດູຖ້າຫາກວ່າ ສະຖານທີ່ ແຫ່ງນັ້ນມີຊົນລະປະທານນ້ຳສະດວກຕະລອດປີ.

- ຖ້າບ່ອນປູກມອນທີ່ອາໃສແຕ່ທຳມະຊາດຕ້ອງໄດ້ປູກໄລຍະຕົ້ນ ລະດູຝົນໝາຍຄວາມວ່າ: ຕ້ອງປູກໄລຍະຫລັງປີໃໝ່ລາວ (ເດືອນ 4 – 5) ຂອງທຸກໆປີທີ່ມີຝົນຕົກແດ່ແລ້ວ.
- ຖ້າເປັນການປູກດ້ວຍງ່າຕ້ອງປູກກ່ອນເດືອນເມສາ (4) ທຸກໆ ປີຖ້າ ສະພາບດິນແຫ້ງແລ້ງບໍ່ເໝາະສົມກັບການປູກງ່າເວລາເຄື່ອນ ຍ້າຍເບື້ຍ ມອນອອກຈາກໜານຊ້າໄປປູກໃນສວນຕ້ອງທຳການຕັດ

3.8 ໂຕມ້ອນນອນ-ມ້ອນຕີນ-ມ້ອນສຸກ

ກ. ມ້ອນນອນເອີ້ນວ່າ (ມ້ອນລອກຄາບ).

- ໂຕມ້ອນຕັ້ງຫົວຂຶ້ນ - ບໍ່ເໜັງບໍ່ຕິງ - ບໍ່ກິນໃບມອນ.
- ຫົວໃຫຍ່ - ປາກນ້ອຍ - ມີສີເຫລືອງ - ຂາມີສີໃສງ.

ຂ. ມ້ອນຕີນ

- ໂຕມ້ອນເລືອຕາມໃບມອນ-ກິນໃບມອນ-ຫົວນ້ອນລົງ.



(ຮູບມ້ອນກິນໃບມອນ)

ຄ. ມ້ອນສຸກ

- ໂຕມ້ອນຫົດສັ້ນເຂົ້າ.
- ລຳຕົວເປັນສີເຫລືອງ (ມ້ອນຝັກຫລອກເຫລືອງ).
- ລຳຕົວສີໃສງ (ມ້ອນຝັກຫລອກສີຂາວ).
- ຊູຫົວຂຶ້ນແກ້ວງຫົວໄປມາຊອກຫາບ່ອນເຮັດຮັງ (ເຮັດຝັກ ຫລອກ).
- ຂີ້ມ້ອນມີຂະໜາດໃຫຍ່ບົບຈະນຸ່ມ, ມີສີຂຽວ.
- ປາກມີເສັ້ນໄຍພົ່ນອອກມາ.

ຕາຕະລາງລ້ຽງມ້ອນອາຍຸແກ່ (ອາຍຸ4 – 5)

ອາຍຸ	ໃບມອນ	ອຸນະພູມ	ຄວາມຊຸ່ມ	ເວລາກິນ ໃບມອນ	ເວລານອນ	ເນື້ອທີ່
4	64.5ກກ	25ອົງສາ	75-80%	3ມື້5ຊົ່ວໂມງ	ປະມານ2ມື້	6.4-10 ຕາແມັດ
5	235ກກ	24ອົງສາ	70-75%	6ມື້	0	15-20 ຕາແມັດ

ອາຍຸ 5 ຕ້ອງເສຍຂີ້ທຸກໆມື້, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ບໍ່ໃຫ້ໂຕມ້ອນແໜ້ນ
ໃນກະດິງ, ເກືອໃບມອນເພີ່ມຂຶ້ນໃຊ້ໃບມອນແກ່, ໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4
ຄາບຕໍ່ວັນ.

4 ສັງເກດສະພາບຂອງໂຕມ້ອນທຸກໆເຊົ້າ ກ່ອນໃຫ້ອາຫານຖ້າມີ
ອາການເປັນພະຍາດໃຫ້ແຍກໂຕທີ່ເປັນພະຍາດອອກກ່ອນຈຶ່ງເກືອ
ໃບມອນ (ມ້ອນທີ່ຕິດພະຍາດແຍກອອກມາບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມທົ່ວທົບ,
ບໍ່ເອົາໄປເກືອປາ, ບໍ່ເອົາໄປເກືອໄກ່ຝັງຖິ້ມຢ່າງດຽວ).

~ ການລ້ຽງມ້ອນລະດູຝົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິເສດເພາະອາກາດ
ຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມສູງເພາະສົມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອພະ
ຍາດໂດຍສະເພາະ (ເຊື້ອລາ, ໄວລັສ).

- ລ້ຽງມ້ອນໃສ່ຫ່າງໆ, ເກືອບາງໆແຕ່ເກືອຫລາຍເທື່ອ, ໃບມອນ
ປຸກຕ້ອງເຊັດ ຫລື ພົງກ່ອນ ຈຶ່ງນຳມາເກືອມ້ອນ.

ແຕ່ງກິ່ງ ແລະ ຮາກ. ຮາກຍາວເກີນໄປໃຫ້ຕັດອອກສ່ວນກິ່ງທີ່ບໍ່
ສົມບູນໃຫ້ຕັດຈຳຕົ້ນ ສ່ວນກິ່ງສົມບູນທີ່ປະໄວ້ນັ້ນໃຫ້ຕັດປະໄວ້ປະ
ມານ 10 ຊມ ເທົ່ານັ້ນ (ບໍ່ຄວນຖອນເບ້ຍມອນອອກຈາກໜານ
ໄວ້ຫລາຍວັນເພາະຕົ້ນມອນຈະຫຼົງແຫ້ງ ແລະ ຕາຍ.

2.8 ການດູແລຮັກສາສວນມອນ

ຫລັງຈາກປຸກຕົ້ນມອນໃນສວນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມຢ່າງໄກ່ສິດຈະໄດ້ຮູ້ເປັນເປັນລອດຕາຍ ແລະ
ປຸກແທນທັນເວລາ, ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ຫລື ນ້ຳຂັງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນ
ເວລາດູແລເສຍຫຍ້າ ບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າຮົກເຮື້ອຖ້ວມຕົ້ນມອນກໍລະນີທີ່ມີ
ການປ່ອຍສັດກໍຕ້ອງໄດ້ຮັວສວນເປັນຢ່າງດີ.

- ແຕ່ລະປີໃຊ້ລົດໄຖຕາມຫວ່າງແຖວຂອງຕົ້ນມອນເພື່ອເປັນການ
ພວນດິນ.

- ການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ກຳຈັດວັດສະພຶດໃຊ້ເຟືອງເຂົ້າ,
ກາບຖົ່ວ, ແກບຄຸມໜ້າດິນຕາມຫວ່າງຕົ້ນມອນຈະເປັນການຮັກສາ
ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນໄປໃນຕົວ.



(ຮູບເສຍຫຍ້າໃສ່ຝຸ່ນຄຸມດິນ)

4 ໃສ່ຝຸ່ນຕົ້ນຕອນມີ 3 ວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄື:

- ຕົ້ນມອນທີ່ຫາກໍປູກປີທຳອິດໃຊ້ຈົກນ້ອຍຂຸດອ້ອມກົກຕົ້ນມອນ ຫ່າງຈາກຕົ້ນມອນປະມານ 25 – 30 ຊມ ໂຮຍຝຸ່ນຄອກໃສ່ຕາມ ຮ່ອງທີ່ຂຸດແລ້ວຖິມໄວ້.
- ຂຸດຊຸມລະຫວ່າງຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ, ເວັ້ນຫວ່າງຈຶ່ງຂຸດອີກຊຸມໜຶ່ງ, ເສຍ ຫຍາຕາມຫວ່າງຕົ້ນມອນນັ້ນລົງຊຸມໃຫ້ເຕັມໃຊ້ຝຸ່ນຄອກໂຮຍລົງໄປ ແລ້ວຖິມດິນປະໄວ້ເຮັດແບບນີ້ປີລະຄັ້ງດ້ວຍວິທີສັບປ່ຽນບ່ອນຂຸດ.
- ຂຸດຮ່ອງລະຫວ່າງແຖວຕາມລວງຍາວຂະໜາດກ້ວາງ 30 ຊມ ເລິກ 30 ຊມ ຍາວຢຽດຕາມຫວ່າງແຖວຂອງຕົ້ນມອນ (ເວັ້ນ ຫວ່າງແຖວຈຶ່ງຂຸດອີກ) ເສຍຫຍ້າຕາມຫວ່າງຕົ້ນມອນລົງຮ່ອງ ໂຮຍຝຸ່ນຄອກລົງໄປໂຮຍປູນຂາວຊ້ຳອີກ (ຖ້າມີ).

2.9 ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນ

ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນ ມີຄວາມຈຳເປັນອັນໃຫຍ່ຫລວງເປັນ ການຍົກຄຸນນະພາບ ແລະ ປະປົມານໃບມອນ, ຖ້າມອນບໍ່ມີການ

ຂ. ການເສຍຂີ້ໂຕມ້ອນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ໃຊ້ຕານ່າງເສຍຂີ້ມ້ອນ, ໃຊ້ໄມ້ຖູ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ມີຈັບໂຕມ້ອນ.
- ອາຍຸ 1 ເສຍຂີ້ 1 ເທື່ອກ່ອນມ້ອນນອນຄັ້ງທີ 1
- ອາຍຸ 2 ເສຍຂີ້ 2 ເທື່ອ, ຫລັງຕົ້ນນອນຄັ້ງທີ 1 ແລະ ກ່ອນ ນອນຄັ້ງທີ 2.
- ອາຍຸ 3 ເສຍຂີ້ 2 ເທື່ອ, ຫລັງຕົ້ນນອນຄັ້ງທີ 2 ແລະ ກ່ອນ ນອນ ຄັ້ງທີ 3.

ຄ. ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່:

- ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໂຕມ້ອນຢູ່ຢ່າງແອອັດ.
- ຫລຸດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນໃນກະດົງມ້ອນ.
- ໃຫ້ໂຕມ້ອນໄດ້ກິນໃບມອນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

3.7 ການດຳເນີນການລ້ຽງມ້ອນອາຍຸແກ່

ກ. ການຄວບຄຸມອຸນະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ:

- ຫລຸດຄວາມຮ້ອນ: ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ, ຊິດນ້ຳໃສ່ພື້ນເຮືອນລ້ຽງ, ຊິດນ້ຳໃສ່ຫລັງຄາມຸງສັງກະສີ.
- ເພີ່ມຄວາມອຸ່ນ: ໄຕ້ດອກໄຟ ຫລື ດັງເຕົາຖ່ານໃນເຮືອນລ້ຽງ ມ້ອນ.
- ຫລຸດຄວາມຊຸ່ມ: ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ຫລື ໃຊ້ພັດ ລົມເປົ່າ.
- ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ: ໃຊ້ກ້ອງຊິດນ້ຳຝອຍ, ໃຊ້ແພຈຸບນ້ຳພໍ້ພາດງ ອ້ອມຮ້ານລ້ຽງ ຫລື ຫົດພື້ນເຮືອນລ້ຽງ.

ຕາຕະລາງການລ້ຽງມ້ອນ20000ໂຕ

ອາຍຸ	ຈຳນວນໃບມອນ	ອຸນະພູມ	ຄວາມຊຸ່ມ	ເວລາກິນ ໃບມອນ	ເວລາ ນອນ	ເນື້ອທີ່
1	1.8 -1.9 ກກ	28 ອົງສາ	80-90%	2ມື້3ຊົ່ວໂມ ງ	1ມື້	0.4-1.6 ຕາແມັດ
2	5 ກກ	27ອົງສາ	80-85%	2ມື້	1ມື້	1.6-3.2 ຕາແມັດ
3	15 ກກ	26ອົງສາ	70-80%	2.5ມື້	1ມື້	3.2-6.4 ຕາແມັດ

3.5 ການປິດໃບມອນ

- ການປິດໃບມອນຄວນຫລີກເວັ້ນເວລາແດດຮ້ອນໂພດ ແລະ ເວລາຝົນກຳລັງຕົກ.ປິດຕອນເຊົ້າທີ່ແດດບໍ່ທັນຮ້ອນ ແລະ ຕອນແລງຫລັງ 4 ໂມງແລງ.
- ເວລາເກືອໃຫ້ຊອຍໃບມອນເປັນຮູບ 4 ຫລ່ຽມຍາວ, ລວງກ້ວາງເທົ່າ ກັບລວງຍາວຂອງໂຕມ້ອນ, ລວງຍາວເທົ່າ 2 ເທື່ອຂອງລວງກ້ວາງ.

3.6 ການເສຍຂີ້ມ້ອນ

ກ.ຈຸດປະສົງ:

- ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມໃນກະດົງມ້ອນ.
- ໃຫ້ໂຕມ້ອນໄດ້ກິນໃບມອນໃໝ່ ແລະ ສົດຢູ່ສະເໝີ.
- ນຳເອົາເສດໃບມອນທີ່ເຫລືອ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດໄປຖິ້ມ.

ຕັດແຕ່ງໃບຈະນ້ອຍ ມັກເກີດພະຍາດເກັບກ່ຽວໃບມອນຍາກ ການຕັດແຕ່ງກໍຂຶ້ນ ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ການວາງແຜນສວນມອນທີ່ປູກເຮັດແນວພັນຈະຕັດພຽງປີລະຄັ້ງຄື: ຕັດຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ

= ສ່ວນວ່າສວນມອນສຳລັບລ້ຽງມ້ອນຕ້ອງຕັດຫລາຍຄັ້ງຕໍ່ປີດັ່ງນີ້:

ກ.ຕັດຕໍ່າ

ຕັດ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງທີ່ຕົ້ນມອນພັກຕົວຄື: ລະຫວ່າງເດືອນ 12 - 3 ຂອງທຸກໆປີ.

ວິທີຕັດ: ຖ້າເປັນຕົ້ນມອນປູກປີທຳອິດໃຫ້ຕັດຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 25 - 30 ຊມ. ຖ້າເປັນຕົ້ນມອນປີທີ 2 ຫລື 3 ຂຶ້ນໄປໃຫ້ຕັດຫ່າງຈາກບ່ອນຕັດປີທຳອິດປະມານ 5 – 10 ຊມ. ຕັດກ່ອນການລ້ຽງມ້ອນ 90 ວັນ.



(ຮູບການຕັດຕໍ່າຕົ້ນມອນ)

ຂ.ຕັດກາງ

ແມ່ນຕັດຫລັງຈາກເກັບກຸ່ວໃບມອນໄປລ້ຽງມ້ອນຄັ້ງທີ1ຂອງປີ (ເກັບຜົນການຕັດຕໍ່າ) ຕັດກ່ອນການລ້ຽງມ້ອນ 60 - 75 ວັນ.
ວິທີຕັດ: ລັງເກດເບິ່ງສີຂອງກິ່ງ ຫລື ລຳຕົ້ນຂອງມອນຈະມີສີນ້ຳຕານເຊື່ອມຕໍ່ກັບສີຂຽວໃຫ້ຕັດລະຫວ່າງກາງສີນ້ຳຕານເຊື່ອມຕໍ່ກັບສີຂຽວ (ລະຫວ່າງກາງຂອງລຳຕົ້ນ).



(ຮູບຕັດກາງ).

ຄ.ຕັດສູງຫລື ເດັດຍອດ

ເພາະສົມກັບການກຽມໃບມອນລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ(ໃຫ້ຍອດຫລາຍມີໃບອ່ອນ)ຕັດກ່ອນການລ້ຽງມ້ອນ 35 - 40 ວັນ.

2.10 ການກຽມສວນມອນເພື່ອລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ-ອາຍຸແກ່.

ກ. ມ້ອນອາຍຸນ້ອຍກຳນົດແຕ່ອາຍຸ 1 - 3 ການເກັບໃບມອນຕ້ອງປະຕິ ບັດດັ່ງນີ້:

- ~ ມ້ອນອາຍຸ 1 ເກັບໃບມອນທີ 1 - 3 (ນັບຍອດລົງ).
- ~ ມ້ອນອາຍຸ 2 ເກັບໃບມອນທີ 4 - 6.
- ~ ມ້ອນອາຍຸ 3 ເກັບໃບມອນທີ 7 - 9.

- 5 ນາທີຕໍ່ມາທຳການປັດໂຕມ້ອນນ້ອຍດ້ວຍຂົນໄກ່ໃສ່ກະດິ່ງທີ່ກຽມໄວ້.
- ຂະຫຍາຍ (ເຂ່ຍ) ໂຕມ້ອນນ້ອຍໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີປະມານເທົ່າ 2 ເທົ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນໄຂ່.
- 5 ນາທີ ຕໍ່ມາຊອຍໃບມອນອ່ອນໃບທີ 1 ເກືອມ້ອນເປັນຄາບທຳອິດ.



(ຮູບກຳລັງປັດມ້ອນ)

3.4 ດຳເນີນການລ້ຽງມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ (ອາຍຸ 1 -3).

ໂຕມ້ອນອາຍຸນ້ອຍ ມີຄວາມອ່ອນແອສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ ວ່າທາງຜິວໜັງກໍຄືທາງອາຫານ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເປັນພິເສດໂດຍ ສະເພາະອັນດັບ 1 ຄືການອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດ, ການປິດໃບມອນ, ການຊອຍໃບມອນ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການເສຍຂີ້ມ້ອນອາຍຸ ນ້ອຍໃຊ້ເວລາກິນ ໃບມອນ 10 - 11 ວັນຈົນລະ 3 - 4 ຄັ້ງ.

- ສຳເລັດແລ້ວເອົາອຸປະກອນມາເກັບໄວ້ທີ່ເດີມ,
- ກ່ອນເອົາມ້ອນເຂົ້າລ້ຽງຄັ້ງຕໍ່ໄປປະມານ 3 - 5 ວັນໃຫ້ອົບ ຫ້ອງດ້ວຍ ຢາກູ້ລິນອີກ 1 ຄັ້ງໃຫ້ ທົ່ວຫ້ອງໃຊ້ເວລາ 3 - 5 ວັນຕໍ່ມາຈຶ່ງສາ ມາດເອົາມ້ອນເຂົ້າລ້ຽງໄດ້. (ໃຊ້ໃນອັດຕາສ່ວນ ກູ້ລິນ 60% ຈຳນວນ 100 ກະລາມ ປະສົມກັບນ້ຳ 10 ລິດ ຊິດໃຫ້ທົ່ວຫ້ອງ)

3.3 ການປັດມ້ອນນ້ອຍລ້ຽງຄາບທຳອິດ.

- ໄຂ່ມ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະວາງໃສ່ເຈ້ຍ ຫລື ແຜ່ນແພຮູ້ແລ້ວວ່າໄຂ່ມ້ອນພື້ນ ເມືອງປົກກະຕິມີອາຍຸພຽງ 9 - 11 ວັນ ເທົ່ານັ້ນດັ່ງນັ້ນໄກ້ຈະຮອດມື້ຕ້ອງຕິດຕາມຖ້າອຸນະພູມປົກກະຕິໄຂ່ມ້ອນຈະ ແຕກມື້ທີ 9 ຫລື 10 ເທົ່ານັ້ນ ຍົກເວັ້ນອາກາດໜາວ.
- ເປີດຊອງໄຂ່ມ້ອນໃສ່ແສງເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າປັດມ້ອນເວລາ 9 -10 ໂມງເຊົ້າ (ບໍ່ຄວນລ້ຽງມ້ອນໂດຍບໍ່ປັດ) ລ້ຽງມ້ອນໂດຍບໍ່ປັດມ້ອນຈະລ້ຽງຍາກມ້ອນນອນມ້ອນຕື່ນບໍ່ພ້ອມກັນ, ມີມ້ອນຄອດຫລາຍມ້ອນໄດ້ນອນໃຕ້ໃບມອນ.

~ ຂັ້ນຕອນການປັດມ້ອນ:

- ໂຮຍຢາເປບໂຊນໃສ່ໂຕມ້ອນໃຫ້ທົ່ວປະໄວ້ປະມານ 3 - 5 ນາທີ (ຖ້າມີ).
- ຊອຍໃບມອນອ່ອນໆທີ່ເປັນສີນ້ຳຕານ (ໃບໄກ້ກັບຍອດ) ໂຮຍໃສ່ໂຕມ້ອນໃຫ້ທົ່ວ.

ຢາກໄດ້ໃບມອນຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຕ້ອງຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນໃຫ້ຖືກ ຕາມເຕັກນິກໄລຍະອາຍຸ 1 - 3 ມ້ອນຕ້ອງການໃບມອນທີ່ອ່ອນຈຶ່ງມີ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງແບ່ງຕັດແຕ່ງສະເພາະ.

ຂ. ມ້ອນແກ່ກຳນົດແຕ່ອາຍຸ 4 - 5

ມ້ອນອາຍຸແກ່ຕ້ອງການໃບມອນຫລາຍ ແລະ ໃບແກ່ ທີ່ມີສີຂຽວເຂັ້ມ ເພາະເປັນໄລຍະຕົວມ້ອນສ້າງຕ່ອມໂຍໄໝຜະລິດເປັນເສັ້ນໄໝໃນລຳຕົວ (ຫລືກເວັ້ນໃບທີ່ເປັນພະຍາດແລະແກ່ຈົນກອບ).



(ຮູບສວນມອນສຳລັບມ້ອນແກ່).

2.11 ພະຍາດມອນ ແລະ ວິທີກຳຈັດ

ພະຍາດມອນທີ່ມັກພົບເຫັນສ່ວນຫລາຍແມ່ນ: ພະຍາດຮາກເນົ່າ, ພະຍາດໃບດ່າງ, ພະຍາດ, ພະຍາດລາແບ້ງຂາວ, ພະຍາດລາໝຽງ ແລະ ອື່ນໆ.

ວິທີກຳຈັດ: ເມື່ອພົບເຫັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕັດຮວບຮວມໄປເຜົາໄຟຖິ້ມ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໄປອ່ອນອື່ນ, ຕ້ອງຕັດແຕ່ງຕົ້ນມອນຕາມລະດູການ.

ບົດທີ3

ການລ້ຽງມ້ອນ

3.1 ການກຽມອຸປະກອນການລ້ຽງມ້ອນ-ເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ

ກ່ອນການລ້ຽງມ້ອນ ຕ້ອງໄດ້ສຳຫລວດເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນທີ່ ຮັບໃຊ້ມີພຽງພໍ ຫລື ຍັງມີຫຍັງຂາດເຫລືອເຊັ່ນ: ກະດັງມ້ອນ (ໂທ່ມ້ອນ), ຮ້ານມ້ອນ, ຜ້າປົກມ້ອນ, ຜ້າປົກມ້ອນ, ຂົນໄກ່, ຊຽງ, ມົດ, ໄມ້ຖູ່, ກະຕ່າ, ກະຈາດ, ຕານ່າງເສຍຂີ້ມ້ອນ, ຈໍ່ ມ້ອນສຸກຈຳພວກນີ້ເປັນຕົ້ນ.



(ຮູບອຸປະກອນການລ້ຽງມ້ອນ).

ກ. ການລ້ຽງມ້ອນສ້າງລາຍຮັບເສີມຕ້ອງມີເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ.

ເພື່ອການປ້ອງກັນສັດຕູໂຕມ້ອນໄດ້ຢ່າງດີເຊັ່ນ: ໝູ, ແມງ ວັນລາຍ, ມົດ, ຈີ່ໂກະ, ຈີ່ກຽມ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄື:

- ອາກາດປອດໂປ່ງ.
- ຫ່າງໄກຈາກສະຖານທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ.

- ຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນທີ່ແອອັດ.
- ໄກ້ກັບແຫລ່ງນ້ຳ ສະດວກເວລາອະນາໄມອຸປະກອນ ແລະ ເຮືອນລ້ຽງ.
- ບໍ່ໄກສວນມ້ອນເກີນໄປ.



(ຮູບເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ).

3.2 ການອະນາໄມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ເຮືອນລ້ຽງມ້ອນ

- ຫລັງຈາກລ້ຽງມ້ອນສຳເລັດເອົາມ້ອນອອກຈາກເຮືອນລ້ຽງແລ້ວ ບໍ່ ໃຫ້ເອົາອຸປະກອນໄປ ໃສ່ຈັກອັນໃຫ້ຊົດຢາອົບຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແຊ່ ໄວ້ 2 - 3 ວັນ (ປົດປະຕູໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫລິ້ນ).
- ເອົາອຸປະກອນທັງໝົດອອກໄປລ້າງຄູ່ໃສ່ສະບູຄັກແນ່ຕາກແດດ ໃຫ້ແຫ້ງ.
- ລ້າງເຮືອນລ້ຽງມ້ອນຄູ່ພື້ນ, ຮ້ານມ້ອນ, ຝາຂ້າງເຮືອນລ້ຽງໃຫ້ລະອຽດ
- ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ແຫ້ງ.